

BG

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБОБЩЕНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ
НА ПРОДУКТА ЗА БИОЦИДЕН ПРОДУКТ

Dr. Mort Brodi

Продуктов(и) тип(ове)

PT14: Родентициди

Номер на разрешително: 2345-1, 2345-3, 2345-3, 2345-4

Номер на актив R4BP: BG-0018971-0000

Глава 1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Търговско(и) наименование(я) на продукта

Търговско наименование	Dr. Mort Brodi DDD-Expert Brodi Rat-Bilen Active Brodi Rat-Bittex Brodi RatStop Brodi Plahotox Brodi Bromtox Brodi Halek Brodi Mishemor Brodi Plahomor Brodi DDD Brodi Inferno Brodi RATOSTOP Brodi pellets Снайпер пелети 25 Brodi Sniper pellets 25 Brodi Доминатор Ултра Dominator Ultra
------------------------	---

1.2. Притежател на разрешение

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	Farmavit OOD
	Адрес	blvd. Tsar Boris III, n° 63, Office n° 1 1612 Sofia България
Номер на разрешително		2345-1, 2345-3, 2345-3, 2345-4
Номер на актив R4BP		BG-0018971-0000
Дата на издаване на разрешението		30/01/2014
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението		31/12/2026

1.3. Производител(и) на продукта

1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)

Активно вещество	Бродифакум
Име на производителя	Activa s.r.l
Адрес на производителя	via Feltre 32 20132 Milano Италия
Местонахождение на производствените обекти	Tezza S.r.l - via Tre Ponti 22 37050 S. Maria Di Zevio Италия

Глава 2. СЪСТАВ И ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРОДУКТА

2.1. Качествена и количествена информация за състава на продукта

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Бродифакум	3-[3-(4'-bromobi phenyl- 4-yl)-1,2 ,3,4-tetrahydro -1 -naphthyl]-4-hyd roxycoumarin	активно вещество	56073-10-0	259-980-5	0,0025 % (w/w)

2.2. Вид(ове) формулатия

RB Готова за употреба примамка

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Предупреждения за опасност	H373: Може да причини увреждане на органи (b lood) при продължителна или повтаряща се екс позиция {1:посочете път на експозиция, ако е д оказано убедително, че няма други пътища на експозиция, които причиняват опасността:}.
Препоръки за безопасност	P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P301+P310: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обратете на в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ . P308+P313: ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински медицински съвет. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с националната уредба.

Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И)

4.1. Описание на употребите

Таблица 1. Домашна мишка – професионална употреба – на закрито

Вид продукт	РТ14: Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Не е от значение за родентициди.
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: <i>Mus musculus</i> Общоприето наименование: други: Домашна мишка Етап на развитие: други: juveniles to adults
Област(и) на употреба	използване на закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Залагане на примамки Подробно описание: Готова за употреба родентицидна примамка, под формата на пелети за употреба в дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия.
Степен и честота на приложение	Дозиране: 20 g - 40 g пелети за дератизационна кутия Разреждане (%): 0,0025 Брой и времеви график на прилагане: Ако е необходима повече от една дератизационна кутия, минималното разстояние между кутиите с примамки трябва да бъде 5 метра.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	От 1,5 Kg до 25Kg (съдържащи родентицидна примака под форма на пелети). Материал на опаковката: PE/Алуминий/Полиестер

4.1.1. Специфични инструкции за употреба

Кутиите с примамка трябва да бъдат наблюдавани на всеки 2 до 3 дни в началото на приложението, а след това веднъж седмично, за да се провери дали примамката е приета, дали дератизационната кутия е непокътната и да се премахнат телата на гризачите. Ако е необходимо добавете нова примамка в кутията.

4.1.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

4.1.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спеши мерки за опазване на околната среда

Когато поставяте станции с примамки близо до системи за отвеждане на вода, уверете се, че контактът с водата е избегнат.

4.1.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

4.1.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

4.2. Описание на употребите

Таблица 2. Плъхове - професионална употреба – на закрито

Вид продукт	РТ14: Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Не е от значение за родентициди.
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Rattus norvegicus Общоприето наименование: други: Кафяв плъх Етап на развитие: други: Juveniles to adults
Област(и) на употреба	използване на закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Залагане на примамки Подробно описание: Готова за употреба родентицидна примамка, под формата на пелети за употреба в дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия.
Степен и честота на приложение	Дозиране: 100 g - 200 g за дератизационна кутия. Разреждане (%): 0,0025 Брой и времеви график на прилагане: Ако е необходима повече от една кутия, минималното разстояние между кутиите с примамки трябва да бъде 5 метра.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	От 1,5 Kg до 25Kg (съдържащи родентицидна примака под форма на пелети) Материал на опаковката: PE/Алуминий/Полиестер

--	--

4.2.1. Специфични инструкции за употреба

Кутиите с примамка трябва да бъдат наблюдавани 5 до 7 дни след началото на приложението, а след това веднъж седмично, за да се провери дали примамката е приета, дали дератизационната кутия е непокътната и да се премахнат телата на гризачите. Ако е необходимо добавете нова примамка в кутията.

4.2.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

4.2.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спеши мерки за опазване на околната среда

Когато поставяте станции с примамки близо до системи за отвеждане на вода, уверете се, че контактът с водата е избегнат.

4.2.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

4.2.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

4.3. Описание на употребите

Таблица 3. Домашни мишки и плъхове – професионална употреба – около сгради

Вид продукт	РТ14: Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Не е от значение за родентициди.
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: <i>Mus musculus</i> Общоприето наименование: други: Домашна мишка Етап на развитие: други: Juveniles to adults Научно наименование: <i>Rattus norvegicus</i> Общоприето наименование: други: Кафяв плъх Етап на развитие: други: Juveniles to adults
Област(и) на употреба	други: Other Около сгради
Метод(и) на прилагане	Метод: Залагане на примамки Подробно описание: Готова за употреба родентицидна примамка, под формата на пелети за употреба в

	дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия.
Степен и честота на приложение	<p>Дозиране: Домашна мишка: 20 – 40 g пелети за дератизационна кутия; Кафяв плъх: 100 g - 200 g пелети за дератизационна кутия.</p> <p>Разреждане (%): 0,0025</p> <p>Брой и времеви график на прилагане: Ако е необходима повече от една кутия, минималното разстояние между кутиите с примамки трябва да бъде 5 метра.</p>
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	От 1,5 Kg до 25Kg (съдържаща родентицидна примамка под формата на пелети) Материал на опаковката: PE/Алуминий/Полиестер

4.3.1. Специфични инструкции за употреба

- Защитавайте примамката от атмосферните условия (напр. дъжд, сняг и др.). Поставете дератизационните кутии в зони, които не подлежат на наводняване.
- Дератизационните кутии трябва да бъдат наблюдавани [за мишки - най-малко на всеки 2 до 3 дни в] [за плъхове - само 5 до 7 дни след] началото на лечението и най-малко веднъж седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали дератизационните кутии са непокътнати и да се премахват телата на гризачите. Ако е необходимо добавете нова примамка в кутията.
- Заменете всяка примамка в дератизационна кутия, в която примамката е била повредена от вода или замърсена с мръсотия.

4.3.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Не използвайте този продукт директно в дупките.

4.3.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и специфични мерки за опазване на околната среда

При поставянето на дератизационните кутии близо до повърхностни води (напр. реки, езера, водни канали, диги, напоителни канавки) или системи за отводняване на водата да се избягва контактът с вода.

4.3.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

4.3.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

4.4. Описание на употребите

Таблица 4. Домашна мишка – масова употреба – на закрито

Вид продукт	РТ14: Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Не е от значение за родентициди
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: <i>Mus musculus</i> Общоприето наименование: други: Домашна мишка Етап на развитие: други: Juveniles to adults
Област(и) на употреба	използване на закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Залагане на примамки Подробно описание: Готова за употреба родентицидна примамка, под формата на пелети за употреба в дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия.
Степен и честота на приложение	Дозиране: 20 g - 40 g пелети за дератизационна кутия Разреждане (%): 0,0025 Брой и времеви график на прилагане: Ако е необходима повече от една кутия, минималното разстояние между кутиите с примамки трябва да бъде 5 метра.
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	До 150 g (съдържащи родентицидна примамка под форма на пелети предварително дозирани в пакетчета от 10-15-20 g). Материал на опаковката: PE/Алуминий/Полиестер

4.4.1. Специфични инструкции за употреба

Кутиите с примамка трябва да бъдат наблюдавани на всеки 2 до 3 дни в началото на приложението, а след това веднъж седмично, за да се провери дали примамката е приета, дали е дератизационната кутия е непокътната и да се премахнат телата на гризачите. Ако е необходимо добавете нова примамка в кутията.

4.4.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

4.4.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

4.4.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

4.4.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

4.5. Описание на употребите

Таблица 5. Плъхове – масова употреба – на закрито

Вид продукт	РТ14: Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Не е от значение за родентициди.
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Rattus norvegicus Общоприето наименование: други: Кафяв плъх Етап на развитие: други: Juveniles to adults
Област(и) на употреба	използване на закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Залагане на примамки Подробно описание: Готова за употреба родентицидна примамка, под формата на пелети за употреба в дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия.
Степен и честота на приложение	Дозиране: 100 g - 200 g за дератизация кутия Разреждане (%): 0,0025 Брой и времеви график на прилагане: Ако е необходима повече от една кутия, минималното разстояние между кутиите с примамки трябва да бъде 5 метра.
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	До 150g (съдържащи родентицидна примамка под форма на пелети в предварително дозирани вътрешни опаковки от 10-15-20 g) Материал на опаковката: PE/Алуминий/Полиестер

4.5.1. Специфични инструкции за употреба

Кутиите с примамка трябва да бъдат наблюдавани 5 до 7 дни в началото на приложението, а след това веднъж седмично, за да се провери дали примамката е приета, дали е дератизационната кутия е непокътната и да се премахнат телата на гризачите. Ако е необходимо добавете нова примамка в кутията.

4.5.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

4.5.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

4.5.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

4.5.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

4.6. Описание на употребите

Таблица 6. Плъхове – масова употреба – около сгради

Вид продукт	PT14: Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Не е от значение за родентициди.
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Rattus norvegicus Общоприето наименование: други: Кафяв плъх Етап на развитие: други: Juveniles to adults
Област(и) на употреба	други: Other Около сгради
Метод(и) на прилагане	Метод: Залагане на примамки Подробно описание: Готова за употреба родентицидна примамка, под формата на пелети за употреба в дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия
Степен и честота на приложение	Дозиране: 100 g - 200 g пелети за дератизационна кутия Разреждане (%): 0,0025 Брой и времеви график на прилагане: Ако е необходима повече от една кутия, минималното разстояние между кутиите с примамки трябва да бъде 5 метра.

Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	До 150g (съдържащи родентицидна примамка под форма на пелети предварително дозирана във вътрешни опаковки от 10-15-20 g) Материал на опаковката: PE/Алуминий/Полиестер

4.6.1. Специфични инструкции за употреба

- Поставете дератизационните кутии в зони, които не подлежат на наводняване.
- Заменете всяка примамка в дератизационна кутия, в която примамката е била повредена от вода или замърсена с мръсотия.
- Дератизационните кутии трябва да бъдат наблюдавани само 5 до 7 дни след началото на третирането.

4.6.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

4.6.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

4.6.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

4.6.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА¹

5.1. Указания за употреба

Професионални потребители

- Прочетете и следвайте информацията за продукта, както и всяка информация, придружаваща продукта или предоставена на мястото на продажба, преди да го използвате.
- Извършете предварителен преглед на заразената зона и оценка на място, за да се идентифицират видовете гризачи, местата на тяхната дейност и да се определи вероятната причина и степента на заразяване.
- Отстранете храната, която е лесно достижима за гризачите (например разсипани зърна или хранителни отпадъци). Освен това не почистявайте заразената зона точно преди третиране, тъй като това само смущава популацията на гризачите и прави приемането на примамки по-трудно досягаемо.
- Продуктът следва да се използва само като част от интегрирана система за борба с вредителите (IPM), включваща, наред с другото, хигиенни мерки и, където е възможно, физически методи за контрол.
- Помислете за превантивни мерки за контрол (например да се запушат отворите, да се премахнат потенциалните храни и напитки, доколкото е възможно), за да подобрите приема на продукта и да намалите вероятността от повторно нападение.
- Станциите за примамка трябва да се поставят в непосредствена близост до местата, където преди това е наблюдавана активността на гризачите (напр. пътеки за преминаване, места за гнездене и складиране на храна, дупки и т.н.).
- Където е възможно, станциите за примамки трябва да бъдат закрепени към земята или други конструкции.
- Станциите за примамка трябва да бъдат ясно обозначени, да показват, че съдържат родентициди и че не трябва да се преместват или отварят (вж. точка 5.3 за информацията, която трябва да бъде показана на етикета).
- Когато продуктът се използва на обществени места, обработените площи трябва да бъдат маркирани по време на периода на третиране и в близост до примамките трябва да бъде предоставено обявление, обясняващо риска от първично или вторично отравяне с антикоагуланта, както и посочващо първите мерки, които трябва да се вземат в случай на отравяне.
- Примамката трябва да бъде закрепена така, че да не може да бъде извадена от станцията.

¹Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба.

-
- Поставете продукта далеч от деца, птици, домашни любимци, селскостопански животни и други нецелеви животни.
 - Поставете продукта далеч от храна, напитки и фуражи, както и от съдове или повърхности, които са в контакт с тях.
 - Когато използвате продукта, не яжте, не пийте и не пушете. Измийте ръцете и директно изложената кожа след употребата на продукта.
 - Ако поглъщането на примамки е ниско в сравнение с очевидния размер на заразяването, помислете за замяната на станциите за примамка на допълнителни места и възможността да се преминете към друга формулировка на примамки.
 - Ако след период на лечение от 35 дни примамките продължават да се консумират и не може да се наблюдава спад в активността на гризачите, трябва да се определи вероятната причина. В случаите, когато са изключени други елементи, има вероятност да има устойчиви гризачи, така че да се обмисли използването на не-антикоагулантен родентицид, когато има такъв, или по-мощен антикоагулантен родентицид. Също така помислете за използването на капани като алтернативна мярка за контрол.
 - Отстранете останалите примамки или станции в края на периода на третиране.
 - Поставяйте примамката в дератизационните кутии чрез дозиращо устройство.

Масова употреба:

- Прочетете и следвайте информацията за продукта, както и всяка информация, придружаваща продукта или предоставена на мястото на продажба, преди да го използвате.
- Преди да се използват родентицидните продукти, следва да се обмислят нехимични методи за контрол (например капани).
- Отстранете храната, която е лесно достигима за гризачите (например разсипани зърна или хранителни отпадъци). Освен това не почиствайте заразената зона точно преди третиране, тъй като това само смущава популацията на гризачите и прави приемането на примамки по-трудно постижимо.
- Станциите за примамка трябва да се поставят в непосредствена близост до местата, където преди това е наблюдавана активността на гризачите (напр. пътеки за преминаване, места за гнездене и складиране на храна, дупки и т.н.).
- Където е възможно, станциите за примамки трябва да бъдат закрепени към земята или други конструкции.
- Не отваряйте сашетата с примамка.
- Поставете продукта далеч от деца, птици, домашни любимци, селскостопански животни и други нецелеви животни.
- Поставете продукта далеч от храна, напитки и фуражи, както и от съдове или повърхности, които са в контакт с тях.
- Не поставяйте дератизационните кутии близо до системи за отвеждане на вода, където те могат да попаднат в контактът с водата.
- Когато използвате продукта, не яжте, не пийте и не пушете. Измийте ръцете и директно изложената кожа след употребата на продукта.
- Отстранете останалите примамки или станции в края на периода на третиране.

5.2. Мерки за намаляване на риска

За професионална употреба:

- Не започвайте работа, докато не прочетете и не разберете всички предпазни мерки.
- Носете защитни ръкавици.
- Не яжте, не пийте и не пушете, когато използвате този продукт.
- Където е възможно, преди третирането информирайте всички потенциални свидетели (например ползватели на третираната област и околностите) за контролната кампания за гризачи [в съответствие с правилата за добри практики, ако са налични].
- За да се намали рисъкът от вторично отравяне, търсете и отстранявайте мъртвите гризачи на чести интервали по време на третирането (например поне два пъти седмично).
- Продуктите не трябва да се използват повече от 35 дни без оценка на състоянието на заразяването и на ефикасността на лечението.
- Не използвайте примамки, съдържащи антикоагулантни активни вещества, като постоянни примамки за предотвратяване на заразяване с гризачи или за мониторинг на активността на гризачи.
- Информацията за продукта (т.е. етикет и / или листовка) трябва ясно да показва, че:

Продуктът не трябва да се доставя за масова употреба (например "само за професионалисти").

Продуктът трябва да се използва в подходящи устойчиви станции за примамки (например "използвайте само в станции за примамка, които са устойчиви на разрушаване").

Потребителите трябва правилно да обозначават станциите с примамка с информацията, посочена в раздел 5.3 от Кратката характеристика на продукта (например "етикетиране на станциите с примамка съгласно препоръките на продукта").

- Използването на този продукт трябва да елиминира гризачите в рамките на 35 дни. Информацията за продукта (т.е. етикет и / или листовка) трябва ясно да препоръчва в случай на съмнение за липса на ефикасност в края на третирането (т.е. все още се наблюдава активност на гризачи), потребителят да търси съвет от доставчика на продукта или да се обади на служба за контрол на вредителите.

-
- Не мийте станциите за стръв с вода между приложенията.
 - Изхвърлете мъртвите гризачи в съответствие с местните изисквания.

За масова употреба:

- Не започвайте работа, докато не прочетете и не разберете всички предпазни мерки.- Не яжте, не пийте и не пушете, когато използвате този продукт.
- Помислете за превантивни мерки за контрол (запушване на дупки, премахване на потенциални храни и напитки, доколкото е възможно), за да подобрите приема на продукта и да намалите вероятността от повторно заразяване.
- Не използвайте примамки, съдържащи антикоагулантни активни вещества, като постоянни примамки за предотвратяване на заразяване с гризачи или за мониторинг на активността на гризачи.- Информацията за продукта (т.е. етикет и / или листовка) трябва ясно да показва, че:

Продуктът трябва да се използва в подходящи устойчиви станции за примамки (например "използвайте само в станции за примамка, които са устойчиви на разрушаване").

Потребителите трябва правилно да обозначават станциите с примамка с информацията, посочена в раздел 5.3 от Кратката характеристика на продукта (например "етикутиране на станциите с примамка съгласно препоръките на продукта").

- Използването на този продукт трябва да елиминира гризачите в рамките на 35 дни. Информацията за продукта (т.е. етикет и / или листовка) трябва ясно да препоръчва в случай на съмнение за липса на ефикасност в края на третирането (т.е. все още се наблюдава активност на гризачи), потребителят да търси съвет от доставчика на продукта или да се обади на служба за контрол на вредителите.
- Търсете и отстранявайте мъртвите гризачи по време на третирането, поне толкова често, колкото се наблюдават дератизациянните кутии.
- Изхвърлете мъртвите гризачи в съответствие с местните изисквания.

5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

За професионална и масова употреба:

- Този продукт съдържа антикоагулантно вещество. При поглъщане симптомите, които могат да бъдат забавени, могат да включват кървене от носа и кървене от венците. В тежки случаи може да има кръвонасядане и наличие на кръв във фекалиите или урината.

- Антиidot: Витамин K1 се прилага само от медицински / ветеринарен персонал.

- В случай на:

Излагане на кожата, измийте кожата с вода и след това с вода и сапун.

Излагане на очите, изплакнете очите с течности за изплакване на очите или вода, задръжте клепачите отворени най-малко 10 минути.

Поглъщане, изплакнете внимателно с вода. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Не предизвикайте повръщане. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ и покажете контейнера или етикета на продукта. Свържете се с ветеринарен хирург в случай на поглъщане от домашен любимец.

Допълнителни инструкции за професионална употреба:

- Станциите за примамка трябва да бъдат етикетирани със следната информация: "не се премествайте или отваряйте"; "Съдържа родентицид"; "Име на продукта или номер на разрешението"; "Активно вещество (а)" и "в случай на инцидент, се обадете на център по токсикология.

- Опасен за дивата природа.

5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

В края на третирането, изхвърлете неизядените примаки и опаковката в съответствие с местните изисквания.

5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

- Да се съхранява на сухо, хладно и добре проветриво място. Съхранявайте контейнера затворен и далеч от пряка слънчева светлина.

- Да се съхранява на места, които не са достъпни за деца, птици, домашни любимци и селскостопански животни.

- Срок на годност: 24 месеца.

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

- Поради забавения си начин на действие, антикоагулантните родентициди отнемат от 4 до 10 дни, за да бъдат ефективни след консумацията на примамката.
- Гризачите могат да бъдат носители на болести. Не докосвайте мъртвите гризачи с голи ръце, използвайте ръкавици или използвайте инструменти като щипци, когато ги изхвърляте.
- Този продукт съдържа горчив агент и багрило.