

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

Denumirea produsului: Vertox Oktablok

Tipul (tipurile) de produs (produse): TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

Numărul curent: RO/2022/0324/MRS/IE/BPA 70533

Numărul curent R4BP 3: RO-0029349-0000

Cuprins

Informații administrative	1
1.1. Denumirea comercială a produsului	1
1.2. Detinatorul autorizației	1
1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide	1
1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active	2
2. Compoziția și formularea produsului	2
2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid	2
2.2. Tipul preparatului	2
3. Fraze de pericol și de precauție	2
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)	3
5. Direcții generale de utilizare	12
5.1. Instrucțiuni de utilizare	12
5.2. Măsuri de reducere a riscurilor	13
5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	14
5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia	14
5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	15
6. Alte informații	15

Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului

Vertox Cub Parafinat Pro
Prokum Cub Parafinat Pro
METATOX PROFESSIONAL bloc rodenticid parafinic

1.2. Detinatorul autorizației

Numele și adresa detinatorului autorizației	Numele	PelGar International Limited
	Adresa	18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon Franța
Numărul curent	RO/2022/0324/MRS/IE/BPA 70533	
Numărul curent R4BP 3	RO-0029349-0000	
Data autorizației	15/03/2023	
Data de expirare a autorizației	01/07/2024	

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Numele producatorului	PelGar International Limited
Adresa producătorului	Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Regatul Unit
Adresa locurilor de producție	Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Regatul Unit
	SC Pest Control Expert Drumul Lapus Depozit Nr 99-101 Sector 1 România
	SC Promedivet SRL str. Lunga 46/G Sovata 54500 jud. Mures România
	METATOX Peszticid Gyártó-, és Forgalmazó Kft. 5520 Szeghalom Kossuth u. 8. Ungaria

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activa	11 - Brodifacum
Numele producatorului	PelGar International Limited
Adresa producătorului	Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Regatul Unit
Adresa locurilor de producție	Prazska 54 280 02 Kolin Republica Cehă

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Brodifacum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Substanța activă	56073-10-0	259-980-5	0,005

2.2. Tipul preparatului

RB - Bait (gata de utilizare)

3. Fraze de pericol și de precauție

Fraze de pericol

Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

Conține 1,2-benzisothiazolin-3-one. Poate provoca o reacție alergică.

Poate provoca leziuni ale organelor blood în caz de expunere prelungită sau repetată.

Poate dăuna fătului.

Fraze de precauție

Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.

A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.

Purtați mănuși de protecție.

ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere:Consultați medicul.

Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.

A se depozita sub cheie.

Aruncați conținutul la in accordance with national regulations.

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)**4.1 Modul de utilizare****Utilizarea 1 - Profesional - in interior si in exterior (in jurul cladirilor)****Tipul produsului**

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Nu este relevant pentru rodenticide.

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea stiintifica: Mus musculus
denumirea comună: Soarece de casa
etapă de dezvoltare: Adulti si minori

denumirea stiintifica: Rattus norvegicus
denumirea comună: Sobolan maro
etapă de dezvoltare: Adulti si minori

Domeniul de utilizare

de interior

în aer liber

In interior
In exterior in jurul cladirilor

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: cerere momeală
Descriere detaliata:
Momeală gata de folosit în stații rezistente la manipulări.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: Șobolani: 10 - 60 g de momeală pe stație. Dacă este nevoie de mai multe stații, distanța minimă între stații trebuie să fie de 5 metri. Șoareci: 5 - 20 g de momeală pe stație. Dacă este nevoie de mai multe stații, distanța minimă între stații trebuie să fie de 2 metri.

Diluare (%): N/A

Numărul și calendarul de aplicare:

Șoareci

Infestare mare – 5 - 20g de momeală în stații la fiecare 2 metri

Infestare scăzută – 5 - 20g de momeală în stații la fiecare 5 metri.

Șobolani

Infestare mare – 10 - 60 g de momeală în stații la fiecare 5 metri

Infestare scăzută – 10 - 60 g de momeală în stații la fiecare 10 metri.

Programul standard de folosire a momelii (maxim 35 de zile - vezi Instrucțiunile de folosință)

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Blocuri libere sau înfășurate în PP sau PE de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g, 60g pentru uz amator și blocuri de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g, 60g, 100g sau 200g pentru utilizare profesională în următoarele ambalaje exterioare:

- Găleată sau cuvă de PE sau PP

Mărime de ambalaj minim 3 kg.

Mărime de ambalaj maxim 20 kg.

Blocuri libere de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g, 60g, 100g sau 200g în saci necăptușite sau într-o pungă de PP sau PE legat cu sârmă într-o cutie de carton cu perete dublu.

Mărime de ambalaj minim 3 kg.

Mărime de ambalaj maxim 20 kg.

Blocuri de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g sau 60g.

Cutie de carton "uni-trays" (tăvi mulate din styrene cu blocuri pop-out)

Mărime de ambalaj minim 3 kg.

Mărime de ambalaj maxim 12 kg.

2,3 sau 4 blocuri de 5g, ambalate în stații de momeală de șoareci de unică sau de mai multă folosință de HDPE sau de PP, toate ambalate cu multipli de 1,2 sau 4 în ambalaje exterioare de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau în pungă lipită cu căldură sau exterior din plastic cu un capac din carton lipit cu căldură.

Cutii de șoareci multipli în pachet:

10g - 250

15g - 125

20g – 96, 120, 144

30g – 96, 120, 144

40g – 72, 96, 120

60g – 48, 60, 72, 96

80g – 32, 48, 60, 72, 96

1 sau 2 blocuri de 10g sau 1 bloc de 20g, ambalate în stații de momeală de șoareci de unică sau de mai multă folosință rezistentă la manipulări de PET, HIPS, PVC, PE, HDPE sau PP, toate ambalate cu multipli de 1,2,3,4,5 sau 6 în ambalaje exterioare de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau în pungă lipită cu căldură sau exterior din plastic cu un capac din carton lipit cu căldură. Blocuri adiționale pot fi incluse în ambalaje exterioare ca rezerve.

Cutii de șoareci multipli în pachet:

10g - 250

20g – 96, 120, 144

30g – 96, 120, 144

40g – 72, 96, 120

50g - 48, 60, 72, 96

60g – 48, 60, 72, 96

80g – 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

120g - 32, 48, 60, 72, 96

1, 2 sau 3 blocuri de 20g, ambalate în stații de momeală de șobolani de unică sau de mai multă folosință rezistentă la manipulări de PET, HIPS, PVC, PE, HDPE sau PP, toate ambalate cu multipli de 1,2,4 sau 6 în ambalaje exterioare de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau în pungă lipită cu căldură sau exterior din plastic cu un capac din carton lipit cu căldură. Blocuri adiționale pot fi incluse în ambalaje exterioare ca rezerve.

Cutii de șobolani multipli în pachet:

20g – 96, 120, 144

40g – 72, 96, 120

60g – 48, 60, 72, 96

80g – 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

120g - 32, 48, 60, 72, 96

240g – 16, 32, 48, 60, 72, 96

Blocuri de 50g, ambalate în stații de momeală de șobolani de unică sau de mai multă folosință de HDPE sau de PP, toate ambalate cu multipli de 1,2 sau 4 în ambalaje exterioare de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau în pungă lipită cu căldură sau exterior din plastic cu un capac din carton lipit cu căldură.

Cutii de șoareci multipli în pachet:

50g – 60, 72, 96

80g – 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96

1 -20 blocuri de 20g într-o pungă de PE sau în ambalaj "clamshell/blister" într-un exterior de stație de momeală de rozătoare rezistentă la manipulări folosibile de mai multe ori din PE, PP, PET, HIPS, PVC.

Ambalaj de rezerve - ambalaj "blister", pungă în cutie de carton.

Unități multiple în pachet:

80g – 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96

400g – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

Ambalaj de rezerve - ambalaj "blister", pungă (hârtie/PE, AL/PE, hârtie/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, ambalaj "blister" PVC) în cutie de carton

Unități multiple în pachet: 80g – 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96

400g – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

ȘOARECI

- Stațiile de momeală trebuie vizitate cel puțin la fiecare 2-3 zile la începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după aceasta, pentru a verifica, dacă momeala este acceptată, stațiile de momeală sunt intacte și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Se umple din nou momeala când este necesar.

- [Când sunt disponibile] Urmăriți orice instrucțiuni suplimentare furnizate de codul de cea mai bună practică relevantă.

ȘOBOLANI

- Stațiile de momeală trebuie vizitate cel puțin la fiecare 5-7 zile la începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după aceasta, pentru a verifica, dacă momeala este acceptată, stațiile de momeală sunt intacte și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Se umple din nou momeala când este necesar.

- [Când sunt disponibile] Urmăriți orice instrucțiuni suplimentare furnizate de codul de cea mai bună practică relevantă.

CÂND FOLOSIȚI ÎN EXTERIOR

- Protejați momeala de la condițiile atmosferice (de ex. ploaie zăpadă, etc.) Plasați momeala care nu sunt predispușe inundațiilor.

- Înlocuiți orice momeală din stațiile de momeală care a fost deteriorat de apă sau contaminat cu murdărie.

4.1.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

- Nu plasați produsul direct în vizuini.

4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

INTERIOR

- Când amplasați stațiile de momeală în apropierea sistemelor de drenaj, să vă asigurați că momeala nu poate intra în contact cu apa.

EXTERIOR

- Când amplasați momeala în apropierea apelor de suprafață (de ex. râuri, iazuri, canale de apă, diguri, șanțuri de irigație) sau sisteme de drenaj, să vă asigurați, că momeala nu poate să intre în contact cu apa.

4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

N/A

4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

N/A

4.2 Modul de utilizare

Utilizarea 2 - Profesioniști antrenați - interior și exterior (în jurul clădirilor) și în sistemele de canalizare

Tipul produsului	TP 14 - Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Mus musculus denumirea comună: Șoarece de casă etapă de dezvoltare: Adulți și minori denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Șobolan maro etapă de dezvoltare: Adulți și minori
Domeniul de utilizare	de interior în aer liber Interior Exterior - în jurul clădirilor În sistemele de canalizare
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de folosit în stații de momeală rezistente la manipulări Puncte de momeală acoperite și protejate. Aplicația momelii gata de folosit în vizuini. Sisteme de canalizare - Momeala gata de folosit trebuie ancorat sau aplicat în stații de momeală care previn momeala să intre în contact cu apa reziduală.
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: ȘOBOLANI: 10 - 60 g de momeală pe stație de momeală. Dacă este nevoie de mai multe stații de momeală, distanța minimă între stațiile de momeală trebuie să fie 5 metri. ȘOARECI: 5 - 20 g de momeală pe stație de momeală. Dacă este nevoie de mai multe stații de momeală, distanța minimă dintre stații de momeală trebuie să fie de 2 metri. Diluare (%): N/A Numărul și calendarul de aplicare: Șoareci Infestare mare – 5 - 20g momeală în stații de momeală la fiecare 2 metri. Infestare scăzută – 5 - 20g momeală în stații de momeală la fiecare 5 metri. Șobolani Infestare mare – 10 - 60g momeală în stații de momeală la fiecare 5 metri. Infestare scăzută – 10 - 60g momeală în stații de momeală la fiecare 10 metri. Program de momelire standard (max 35 zile - vezi Instrucțiunile de utilizare). Momelire în impulsuri.
Categoria (categoriile) de utilizatori	instruiți profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Blocuri libere sau înfășurate în PP sau PE de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g, 60g pentru uz

amator și blocuri de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g, 60g, 100g sau 200g pentru utilizare profesională în următoarele ambalaje exterioare:

- Găleată sau cuvă de PE sau PP

Mărime de ambalaj minim 3 kg.

Mărime de ambalaj maxim 20 kg.

Blocuri libere de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g, 60g, 100g sau 200g în saci necăptușite sau într-o pungă de PP sau PE legat cu sârmă într-o cutie de carton cu perete dublu.

Mărime de ambalaj minim 3 kg.

Mărime de ambalaj maxim 20 kg.

Blocuri de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g sau 60g.

Cutie de carton "uni-trays" (tăvi mulate din styrene cu blocuri pop-out)

Mărime de ambalaj minim 3 kg.

Mărime de ambalaj maxim 12 kg.

2,3 sau 4 blocuri de 5g, ambalate în stații de momeală de șoareci de unică sau de mai multă folosință de HDPE sau de PP, toate ambalate cu multipli de 1,2 sau 4 în ambalaje exterioare de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau în pungă lipită cu căldură sau exterior din plastic cu un capac din carton lipit cu căldură.

Cutii de șoareci multipli în pachet:

10g - 250

15g - 125

20g – 96, 120, 144

30g – 96, 120, 144

40g – 72, 96, 120

60g – 48, 60, 72, 96

80g – 32, 48, 60, 72, 96

1 sau 2 blocuri de 10g sau 1 bloc de 20g, ambalate în stații de momeală de șoareci de unică sau de mai multă folosință rezistentă la manipulări de PET, HIPS, PVC, PE, HDPE sau PP, toate ambalate cu multipli de 1,2,3,4,5 sau 6 în ambalaje exterioare de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau

în pungă lipită cu căldură sau exterior din plastic cu un capac din carton lipit cu căldură.

Blocuri adiționale pot fi incluse în ambalaje exterioare ca rezerve.

Cutii de șoareci multipli în pachet:

10g - 250

20g – 96, 120, 144

30g – 96, 120, 144

40g – 72, 96, 120

50g - 48, 60, 72, 96

60g – 48, 60, 72, 96

80g – 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

120g - 32, 48, 60, 72, 96

1, 2 sau 3 blocuri de 20g, ambalate în stații de momeală de șobolani de unică sau de mai multă folosință rezistentă la manipulări de PET, HIPS, PVC, PE, HDPE sau PP, toate ambalate cu multipli de 1,2,4 sau 6 în ambalaje exterioare de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau în pungă lipită cu căldură sau exterior din plastic cu un capac din carton lipit cu căldură. Blocuri adiționale pot fi incluse în ambalaje exterioare ca rezerve.

Cutii de șobolani multipli în pachet:

20g – 96, 120, 144

40g – 72, 96, 120

60g – 48, 60, 72, 96

80g – 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

120g - 32, 48, 60, 72, 96

240g – 16, 32, 48, 60, 72, 96

Blocuri de 50g, ambalate în stații de momeală de șobolani de unică sau de mai multă folosință de HDPE sau de PP, toate ambalate cu multipli de 1,2 sau 4 în ambalaje

exterioare de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau în pungă lipită cu căldură sau exterior din plastic cu un capac din carton lipit cu căldură.

Cutii de șoareci multipli în pachet:

50g – 60, 72, 96

80g – 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96

1 -20 blocuri de 20g într-o pungă de PE sau în ambalaj "clamshell/blister" într-un exterior de stație de momeală de rozătoare rezistentă la manipulări folosibilă de mai multe ori din PE, PP, PET, HIPS, PVC.

Ambalaj de rezerve - ambalaj "blister", pungă în cutie de carton.

Unități multiple în pachet:

80g – 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96

400g – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

Ambalaj de rezerve - ambalaj "blister", pungă (hârtie/PE, AL/PE, hârtie/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, ambalaj "blister" PVC) în cutie de carton

Unități multiple în pachet:

80g – 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96

400g – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

- Îndepărtați produsul rămas la sfârșitul perioadei de tratament.

- [Când este disponibil] Urmăriți price instrucțiune adițională furnizată de codul de cea mai bună practică relevantă.

- Nu folosiți produsul ca momeală permanentă pentru prevenirea infestațiilor de rozătoare sau monitorizarea acitivităților de rozătoare.

- Dacă este folosit pentru momelire în pulsuri: - Înlocuiți momeala consumată doar după 3 zile și apoi la intervale de maximum 7 zile. Colectați momeala respinsă și rozătoarele moarte.

EXTERIOR

- Protejați momeala de la condițiile atmosferice. Plasați punctele de momeală în zone care nu sunt predispuse inundațiilor.

- Înlocuiți orice momeală în punctele de momeală care a fost deteriorat de apă sau contaminată de pământ.

- Îndepărtați produsul rămas la sfârșitul perioadei de tratament [Nu se aplică unde se autorizează explicit momelirea permanentă].

- [Când este disponibil] Urmăriți instrucțiunile adiționale furnizate de codul de cea mai bună practică relevantă.

UTILIZARE ÎN SISTEMELE DE CANALIZARE

- Momeala trebuie amplasată în așa fel încât să nu intre în contact cu apa și să nu fie luată de apă.

PUNCTE DE MOMEALĂ ACOPERITE/PROTEJATE

- [Pentru utilizare în exterior punctele de momeală trebuie acoperite și amplasate strategic, ca să se minimizeze expunerea la speciile non -țintă].

- [Când este disponibil] Urmăriți orice informație adițională furnizată de codul de cea mai bună practică relevantă.

APLICAȚIE DIRECTĂ ÎN VIZUINI

- Momelile trebuie plasate astfel încât să minimizeze expunerea la speciile non-țintă și la copii.

- Acoperiți sau blocați intrarea vizuinilor, pentru a reduce riscul ca momeala să fie respinsă.

-[Când este disponibil] Urmăriți orice informație adițională furnizată de codul de cea mai bună practică relevantă.

MOMELIRE ÎN IMPULSURI

- Înlocuiți momeala consumată doar după 3 zile și după aceea la intervale de 7 zile. Colectați orice momeală respinsă și rozătoarele moarte.

- [Când este disponibil] Urmăriți orice informație adițională furnizată de codul de cea mai bună practică relevantă.

4.2.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

- Acolo unde este posibil, înainte de tratamentul informații orice trecător (de ex. utilizatorii ariei tratate și a împrejurimilor) despre campania de control a rozătoarelor [în concordanță cu codul de bună practică aplicabilă, dacă există]

- Luați în considerare măsurile preventive (de ex. astupați găurile, îndepărtați alimentele și băuturile potențiale cât se poate) pentru a îmbunătăți consumul de produs și pentru a reduce probabilitatea reinfestării.

- Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare, căutați și îndepărtați rozătoarele moarte în timpul tratamentului la intervale frecvente, în linie cu recomandările furnizate de codul de cea mai bună practică relevantă.

- Să nu folosiți produsul ca momeală permanentă pentru prevenirea infestărilor de rozătoare sau monitorizarea activităților de rozătoare.

UTILIZARE ÎN SISTEMELE DE CANALIZARE

- [dacă politica sau legislația națională o cere] Amplasați momeala doar la sistemele de canalizare, care sunt conectate la stația de epurare.

APLICARE DIRECTĂ ÎN VIZUINI

- Acolo unde este posibil, înainte de tratamentul informații orice trecător (de ex. utilizatorii ariei tratate și a împrejurimilor) despre campania de control a rozătoarelor [în concordanță cu codul de bună practică aplicabilă, dacă există]

4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- Când amplasați punctele de momeală în apropierea sistemelor de drenaj a apei, să vă asigurați că momeala nu poate să intre în contact cu apa.

EXTERIOR

- Când amplasați momeala în apropierea apelor de suprafață (de ex. râuri, iazuri, canale de apă, diguri, șanțuri de irigație) sau sisteme de drenaj, să vă asigurați, că momeala nu poate să intre în contact cu apa.

4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

N/A

4.2.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

N/A

5. Direcții generale de utilizare

5.1. Instrucțiuni de utilizare

PROFESIONIȘTI

- Înainte de utilizare, citiți și urmăriți informațiile de produs precum și orice informație care însoțește produsul sau este furnizat la punctul de vânzare.
- Efectuați un sondaj înainte de momelirii pe aria infestată, și o evaluare la fața locului pentru a identifica specia de rozătoare, locurile lor de activitate și determinați cauza probabilă și mărimea infestării.
- Îndepărtați hrana ușor de ajuns pentru rozătoare (de ex. cereale vărsate sau deșeuri de alimente). În afară de aceasta, nu curățați aria infestată înainte de tratament, pentru că aceasta deranjează populația de rozătoare, și astfel acceptarea momelii devine mai dificil de atins.
- Produsul trebuie folosit doar ca parte dintr-un sistem integrat de management (IPM), incluzând printre altele și măsuri de igienă și acolo unde este posibil metode de control fizice.
- Luați în considerare măsurile preventive de control (de ex. astupați găurile, îndepărtați hrana și băutura potențială cât este de posibil) pentru a îmbunătăți consumul de produs și a reduce probabilitatea reinfestării.
- Stațiile de momeală trebuie plasate în vecinătatea imediată a locurilor unde activitatea de rozătoare a fost observată în prealabil (de ex. căile de călătorie, locurile de cuibare, locurile de hrănire, găuri, vizuini, etc.).
- Acolo unde este posibil, stațiile de momeală trebuie să fie ancorate la pământ sau la alte structuri.
- Stațiile de momeală trebuie etichetate în așa fel încât să arate clar, că conțin rodenticide și că nu pot fi mișcate sau deschise.
- [Dacă politica sau legislația națională o cere] Atunci când produsul este folosit în zone publice, ariile tratate trebuie marcate în timpul tratamentului și o notă care explică riscurile primare și secundare de otrăvire de către anticoagulant precum și indică primile măsuri de luat în cazul otrăvirii, trebuie plasate dealungul momelilor.
- Momeala trebuie ancorat ca să nu poate fi târât din stația de momeală.
- Plasați produsul inaccesibil copiilor, păsărilor, animalelor de companie, animalelor de fermă și alte animale non-țintă.
- Plasați produsul departe de alimente, băutură și furaje, precum și ustensile sau suprafețe care intră în contact cu acestea.
- Purtați mănuși protective, rezistente la chimicale, când manipulați produsul.
- A nu mânca, bea sau fuma când utilizați produsul. Spălați mâinile și pielea expusă direct după utilizarea produsului.
- Dacă absorbția de momeală este relativ scăzut la mărimea aparentă a infestației, considerați reamplasarea stațiilor de momeală la locuri mai îndepărtate și schimbarea tipului de momeală.
- Dacă după o perioadă de tratament de 35 de zile, consumul nu se oprește și nu se observă declin în activitatea de rozătoare, trebuie găsit cauza probabilă. Unde alte elemente au fost excluse, este probabil, că există rozătoare rezistente, deci luați în considerare unui rodenticid non-anticoagulant rodenticid, acolo unde este posibil, sau utilizarea unui rodenticid anticoagulant mai puternic. Deasemenea considerați utilizarea capcanelor ca o măsură alternativă de control.
- Îndepărtați momeala rămasă sau stațiile de momeală la sfârșitul perioadei de tratament.

PROFESIONIȘTI ANTRENAȘI

- Înainte de utilizare, citiți și urmăriți informațiile de produs precum și orice informație care însoțește produsul sau este furnizat la punctul de vânzare. - Efectuați un sondaj înainte de momelirii pe aria infestată, și o evaluare la fața locului pentru a identifica specia de rozătoare, locurile lor de activitate și determinați cauza probabilă și mărimea infestării. - Îndepărtați hrana ușor de ajuns pentru rozătoare (de ex. cereale vărsate sau deșeuri de alimente). În afară de aceasta, nu curățați aria infestată înainte de tratament, pentru că aceasta deranjează populația de rozătoare, și astfel acceptarea momelii devine mai dificil de atins. - Produsul trebuie folosit doar ca parte dintr-un sistem integrat de management (IPM), incluzând printre altele și măsuri de igienă și acolo unde este posibil metode de control fizice.
- Stațiile de momeală trebuie plasate în vecinătatea imediată a locurilor unde activitatea de rozătoare a fost observată în prealabil (de ex. căile de călătorie, locurile de cuibare, locurile de hrănire, găuri, vizuini, etc.). - Acolo unde este posibil, stațiile de momeală trebuie să fie ancorate la pământ sau la alte structuri. - Stațiile de momeală trebuie etichetate în așa fel încât să arate clar, că conțin rodenticide și că nu pot fi mișcate sau deschise.
- [Dacă politica sau legislația națională o cere] Atunci când produsul este folosit în zone publice, ariile tratate trebuie marcate în timpul tratamentului și o notă care explică riscurile primare și secundare de otrăvire de către anticoagulant precum și indică primile măsuri de luat în cazul otrăvirii, trebuie plasate dealungul momelilor.
- Momeala trebuie ancorat ca să nu poate fi târât din stația de momeală. - Plasați produsul inaccesibil copiilor, păsărilor, animalelor de companie, animalelor de fermă și alte animale non-țintă. - Plasați produsul departe de alimente, băutură și furaje, precum și ustensile sau suprafețe care intră în contact cu acestea. - Purtați mănuși protective, rezistente la chimicale, când manipulați produsul. - A nu mânca, bea sau fuma când utilizați produsul. Spălați mâinile și pielea expusă direct după utilizarea produsului. - A nu mânca, bea sau fuma când utilizați produsul. Spălați mâinile și pielea expusă direct după utilizarea produsului.
- Frecvența vizitelor la aria tratată ar trebui să fie discreția operatorului, în lumina studiului condus la începutul tratamentului. Frecvența trebuie să fie consistentă cu recomandările furnizate de codul de cea mai bună practică relevantă.
- Dacă absorbția de momeală este relativ scăzut la mărimea aparentă a infestației, considerați reamplasarea stațiilor de momeală la locuri mai îndepărtate și schimbarea tipului de momeală.
- Dacă după o perioadă de tratament de 35 de zile, consumul nu se oprește și nu se observă declin în activitatea de rozătoare, trebuie găsit cauza probabilă. Unde alte elemente au fost excluse, este probabil, că există rozătoare rezistente, deci luați în considerare unui rodenticid non-anticoagulant rodenticid, acolo unde este posibil, sau utilizarea unui rodenticid anticoagulant mai puternic. Deasemenea considerați utilizarea capcanelor ca o măsură alternativă de control.

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

PROFESIONIȘTI

- Acolo unde este posibil, înaintea tratamentului informați orice trecător (de ex. utilizatorii ariei tratate și a împrejurimilor) despre campania de control a rozătoarelor [în concordanță cu codul de bună practică aplicabilă, dacă există]

- Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare, cîutați și îndepărtați rozătoarele moarte, la intervale frecvente în timpul tratamentului (de ex. de două ori pe săptămână). [Acolo unde este relevant, specificați dacă sunt necesare inspecții mai frecvente sau zilnice].

- Produsul nu trebuie folosit după 35 de zile fără o evaluare stării infestației și a eficacității tratamentului.

- Nu utilizați momeală care conține substanță activă anticoagulantă ca momeală permanentă pentru prevenirea infestațiilor de rozătoare sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor.

- Informația de produs (de ex. etichetă și/sau prospect) trebuie să arate clar:

produsul nu poate fi furnizat publicului general (de ex. "doar pentru profesioniști").

produsul trebuie folosit în stații de momeală rezistente la manipulări adecvate (de ex. "folosiți doar în stații de momeală rezistente la manipulări").

utilizatorii trebuie să eticheteze corect stațiile de momeală (de ex. etichetați stațiile de momeală conform cu recomandările produsului").

- Utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informația de produs (de ex. etichetă și/sau prospect) trebuie să recomande clar că în cazul lipsei suspectate de eficacitate până la sfârșitul tratamentului (de ex. activitatea de rozătoare se mai observă), utilizatorul trebuie să ceară sfat de la furnizorul produsului, sau să se apeleze la o firmă de deratizare.

- Nu spălați stațiile de momeală între aplicații.

- Dispuneți de rozătoarele moarte conform cu cerințele locale [Metoda de dispunere trebuie descris specific în SPC-ul național și trebuie să apară pe eticheta produsului].

PROFESIONIȘTI ANTRENAȚI

- Acolo unde este posibil, înaintea tratamentului informați orice trecător (de ex. utilizatorii ariei tratate și a împrejurimilor) despre campania de control a rozătoarelor [în concordanță cu codul de bună practică aplicabilă, dacă există]

- Informația de produs (de ex. etichetă și/sau prospect) trebuie să arate clar:

produsul nu poate fi furnizat publicului general (de ex. "doar pentru profesioniști").

- Nu utilizați în zone unde rezistența la substanța activă este suspectată.

- Produsul nu trebuie folosit după 35 de zile fără o evaluare stării infestației și a eficacității tratamentului.

- Nu rotați anticoagulanți diferiți cu potențial mai slab sau comparabil pentru scopuri de management al rezistenței. Pentru utilizare rotațională, luați în considerație: Do not rotate the use of different anticoagulants with comparable or weaker potency for resistance management purposes. For rotational use, consider using a non-anticoagulant rodenticide, if available, or a more potent anticoagulant.

- Do not wash the bait stations or utensils used in covered and protected bait points with water between applications.

- Dispuneți de rozătoarele moarte conform cu cerințele locale.

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- Acest produs conține o substanță anticoagulantă. Dacă este înghițit, simptomele, care pot fi întârziate, pot include sângerarea de nas și de gingii. În cazuri severe, pot apărea vânătăi și sânge în excremente sau urină.

- Antidot: Vitamina K1 administrat doar de personal medical/veterinar.

- În caz de:

- Expunerea dermală, spălați pielea cu apă și apoi cu apă și săpun.

- Expunerea ochilor, clătiți ochii cu lichid de clătit ochi sau apă, țineți pleoapele deschise cel puțin 10 minute.

- Expunere orală, clătiți gura cu apă. Nu administrați nimic prin gură persoanelor inconștiente. Nu provocați vomă. Dacă este înghițit, solicitați sfatul medicului imediat și arătați-le ambalajul sau eticheta produsului. Contactați un chirurg veterinar, dacă este înghițit de un animal de companie.

- Stațiile de momeală trebuie etichetate cu următoarele informații: "nu mișcați sau deschideți"; "conține un rodenticid"; "numele produsului sau număr de autorizație"; "substanța/e activă" și "în caz de accident, sunați la centrul de informare toxicologică [inserați numărul național]".

- Periculos pentru animale sălbatice.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

- LA sfârșitul tratamentului dispuneți de momeala neconsumată și de ambalaj în conformitate cu cerințele locale.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

- Păstrați într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Păstrați containerul închis și departe de lumina directă de soare.
- Păstrați în locuri în care nu au acces copii, păsări, animale de companie și animale de fermă.
- Termen de valabilitate: 2 ani

6. Alte informații

- Din cauza modului de acțiune întârziat, rodenticidelor pe bază de anticoagulant ia 4-10 zile după consumul momelii ca să aibă efect.
- Rozătoarele pot fi purtători de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâini goale., folosiți mănuși sau unelte, ca clește când le aruncați.
- Acest produs conține un agent amar și colorant.
- Utilizați biocidele în mod sigur și sustenabil.
- Este ilegal utilizarea acestui produs pentru alte utilizări sau în alt mod decât cel prescris pe etichetă.
- Poison Information: For information or to report a poisoning incident contact The National Poisons Information Centre, Beaumont Hospital, Dublin (01-8092166), retain the label for reference.
- Please note IRELAND applies a minimum Professional pack size of 2.5 Kg instead of 3.0 kg.