



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
 Τηλέφωνο: 210 928 72 41
 Email: biocides@minagric.gr

Αθήνα, 14 -02-2023
 Αριθ. πρωτ.: 1673/45557

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (ΤΠ18 εντομοκτόνο) σκευάσματος ΤΟΧΟΤΙΣ DP»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 17(7).
2. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 414/2013 της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2013 σχετικά με τον καθορισμό διαδικασίας αδειοδότησης για ίδια βιοκτόνα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
3. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
4. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τη με αριθ. 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
6. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/1130 της επιτροπής της 13ης Αυγούστου 2018 σχετικά με την έγκριση της ουσίας cypermethrin (κυπερμεθρίνης) ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18.
7. Την άδεια διάθεσης στην αγορά του προϊόντος αναφοράς FREE LAND DUST (R4BP3 ASSET Νο: GR-0030247-0000) που έλαβε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

8. Τις διατάξεις του ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
9. Την απόφαση 1881/286212/19-10-2020 (Β' 4612) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.
10. Τη με αριθ. **BC-MW059549-93** αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας στο μητρώο των βιοκτόνων (R4BP3) καθώς και τις με αρ. πρωτ. 5220/140424/01-06-2020, 949/25713/26-01-2023 και 1673/45557/13-02-2023 συμπληρωματικές αιτήσεις.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0558 (R4BP3 Asset No: GR-0024655-0000)** στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** ΤΟΧΟΤΙΣ DP
 2. **Μορφή:** DP - Σκόνη επίπασης
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Cypermethrin 0,263 % β/β
Βοηθητικές ουσίες 99,737 % β/β
 4. **Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 92 %
 5. **Παρασκευαστής της δ.ο:** Tagros Chemicals India Ltd, Ινδία (άρθρο 95 supplier : Limaru NV)
 6. **Κάτοχος της έγκρισης:** ΣΕΓΕ Α.Β.Ε.Ε., Εθνικής Αντιστάσεως 84, 152 31 Χαλάνδρι, Ελλάδα
 7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** α)ΣΕΓΕ Α.Β.Ε.Ε., Ελλάδα, β)Activa S.r.l., Ιταλία
 8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** α)ΣΕΓΕ Α.Β.Ε.Ε., Ελλάδα, β)SINAPAK, Ιταλία
γ)FERBI S.r.l., Ιταλία
- Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ΣΕΓΕ Α.Β.Ε.Ε., Ελλάδα

II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

III. Καταστάματα πώλησης:

Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να πωλούνται μόνο από καταστάματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και μόνο σε συνεργεία με άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα πρέπει να αναφέρουν επί της ετικέτας τη φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία με άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

IV. ΗΜ. ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **18/01/2033**.
- β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
- γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Σκευάσματος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

**«Με εντολή Προϊσταμένου
Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΣΕΓΕ Α.Β.Ε.Ε., Εθνικής Αντιστάσεως 84, 152 31 Χαλάνδρι, Ελλάδα.

ΕΔ: Τμήμα Γ3

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος ΤΟΧΟΤΙΣ DP

Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα
ΤΟΧΟΤΙΣ DP	ΕΛΛΑΔΑ

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	ΣΕΓΕ Α.Β.Ε.Ε.
	Διεύθυνση	Εθνικής Αντιστάσεως 84, 152 31 Χαλάνδρι, Ελλάδα
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ18-0558	
Ημερομηνία έκδοσης	14-02-2023	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	18-01-2033	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	ΣΕΓΕ Α.Β.Ε.Ε.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Εθνικής Αντιστάσεως 84, 152 31 Χαλάνδρι, Ελλάδα
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ, Βιομηχανική περιοχή Οινοφύτων, Θέση Μαδαρό, 32011 Οινόφυτα, Ελλάδα

Όνομα παρασκευαστή	Activa S.r.l
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Feltre 32, 20132 Milano, Ιταλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	α) c/o SINAPAK Viale Dell' Industria E Artigianato 7, 27049 Stradella (PV), Ιταλία β) c/o FERBI S.r.l Contrada Ripoli, 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE), Ιταλία

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	Cypermethrin
Όνομα παρασκευαστή	Tagros Chemicals India Private Ltd. (άρθρο 95 supplier : Limaru NV, Business Center Mezzo, Paalsesteenweg 170 Bus 7, B-3583 BERINGEN, Βέλγιο)
Διεύθυνση παρασκευαστή	Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building, IV Floor 72, Marshallas Road, 600 008 Egmore, Chennai, Ινδία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam, Cuddalore, 607 005 Tamil Nadu, Ινδία

2. Σύνθεση σκευάσματος και τύπος σκευάσματος**2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος**


Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Cypermethrin	(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	Δραστική Ουσία	52315-07-8	257-842-9	0,263 % β/β
DPM – methoxymethyl-ethoxy propanol	2-methoxymethyl-ethoxy propanol	Διαλύτης	34590-94-8	252-104-2	0,750 % β/β

2.2 Τύπος σκευάσματος

DP - Σκόνη επίπασης

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του σκευάσματος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Δηλώσεις προφύλαξης	P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Εφαρμογή σε ρωγμές και σχισμές, σε κενά και κοιλότητες – Επαγγελματίες χρήστες – Βαδιστικά έντομα

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο σε σκόνη για χρήση κατά των βαδιστικών εντόμων. Για εφαρμογή σε ρωγμές και σχισμές, κενά και κοιλότητες.
Οργανισμοί στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: Μαύρο μυρμήγκι Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία Επιστημονική ονομασία: <i>Blatta orientalis</i> Κοινή ονομασία: Ανατολίτικη κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία Επιστημονική ονομασία: <i>Blattella germanica</i> Κοινή ονομασία: Γερμανική κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία Κοινή ονομασία: Άλλα βαδιστικά έντομα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι (οικιακοί χώροι και μεγάλα κτίρια) - σε χώρους όπου τα έντομα συνηθίζουν να κρύβονται.
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Εφαρμογή με το χέρι Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές, σε επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από το νεροχύτη της κουζίνας, κάτω από το φούρνο ή το θερμοσίφωνα, σε όλες τις ρωγμές και τις σχισμές που μπορεί να είναι ένα καταφύγιο έκτακτης ανάγκης για κατσαρίδες και μυρμήγκια. Η εφαρμογή (επίπαση) πρέπει να γίνεται με τη χρήση του ειδικού δοχείου που είναι εφοδιασμένο με τον κατάλληλο διασκορπιστή (όπου υπάρχει) ή με επαγγελματικό εξοπλισμό για την εφαρμογή με επίπαση.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	8 γρ. σκευάσματος / m ² Ετοιμο προς χρήση

	Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 2 φορές το χρόνο.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μεγέθη και υλικό συσκευασίας	Φιάλη HDPE 1kg, Κάδος HDPE 5kg

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται στη συνιστώμενη δόση.

Τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τον καθαρισμό των χώρων εφαρμογής πρέπει να ενημερώνονται από τον επαγγελματία χρήστη σχετικά με τα μέτρα περιορισμού του κινδύνου για να διασφαλιστεί ότι το προϊόν δεν μπαίνει στο αποχετευτικό σύστημα.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Ο χώρος όπου πραγματοποιείται η εφαρμογή πρέπει να καλύπτεται με πλαστικό φύλλο/μεμβράνη μίας χρήσης, ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση των παρακείμενων επιφανειών και του πατώματος.

Μετά την εφαρμογή, απορρίψτε το πλαστικό φύλλο/μεμβράνη και τα συλλεγμένα υπολείμματα ως επικίνδυνα απόβλητα.

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές σε επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από το νεροχύτη της κουζίνας, κάτω από το φούρνο ή το θερμοσίφωνα, σε όλες τις ρωγμές και τις σχισμές που μπορεί να είναι ένα καταφύγιο έκτακτης ανάγκης για κατσαρίδες και μυρμήγκια.

Μην το εφαρμόζετε σε περιοχές που συνηθίζεται να γίνεται υγρό καθαρισμό.

Μη χρησιμοποιείτε διαδικασίες υγρού καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε μόνο διαδικασίες στεγνού καθαρισμού (κενό ή σκούπα) ή χρησιμοποιήστε υγρό χαρτί. Μετά τον καθαρισμό, πετάξτε το συλλεχθέν υλικό στους περιέκτες ξηρού υλικού ή τα υγρά χαρτιά που χρησιμοποιήθηκαν ως στερεά απόβλητα.

Βλέπε επίσης Γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε Γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε Γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε Γενικές οδηγίες χρήσης.

Πίνακας 2. Χρήση # 2 – Σφηκοφωλιές – Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Άμεση εφαρμογή στη σφηκοφωλιά.
Οργανισμοί στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Vespula germanica</i> Κοινή ονομασία: Γερμανική σφήκα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
Πεδίο εφαρμογής	Εφαρμογή στη φωλιά.
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Χειροκίνητη εφαρμογή Η εφαρμογή (επίπαση) πρέπει να γίνεται με τη χρήση του ειδικού δοχείου που είναι εφοδιασμένο με τον κατάλληλο διασκορπιστή.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	10 γρ. σκευάσματος / φωλιά. Μία μόνο φωλιά ανά εφαρμογή. Ετοιμο προς χρήση Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 2 φορές το χρόνο.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μεγέθη και υλικό συσκευασίας	Φιάλη HDPE 1kg, Κάδος HDPE 5kg

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται στη συνιστώμενη δόση στην είσοδο της φωλιάς. Μία και μόνο εφαρμογή μπορεί να εξαλείψει εντελώς την αποικία. Απλώστε απαλά τη σκόνη επίπασης για να κατευθύνετε την πλήρη ποσότητα στην είσοδο της φωλιάς. Εφαρμόστε κατά προτίμηση το σούρουπο και την αυγή.

Βλέπε επίσης Γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Ο χώρος όπου πραγματοποιείται η εφαρμογή πρέπει να καλύπτεται με πλαστικό φύλλο/μεμβράνη μίας χρήσης, ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση των παρακείμενων

επιφανειών και πάτωμα.

Μετά την επεξεργασία, απορρίψτε το πλαστικό φύλλο/μεμβράνη και τα συλλεχθέντα υπολείμματα ως επικίνδυνα απόβλητα.

Η φωλιά θα αφαιρεθεί και θα απορριφθεί (εάν είναι εφικτό) κατά προτίμηση από τον επαγγελματία χρήστη ως μέρος της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Μετά τον έλεγχο των σφηκοφωλιών συλλέξτε τη φωλιά μέσα/πάνω σε κάλυμμα/σακούλα μίας χρήσης και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα του προϊόντος με ηλεκτρική σκούπα.

Μία φωλιά ανά εφαρμογή.

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε Γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε Γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε Γενικές οδηγίες χρήσης.

Πίνακας 3. Χρήση # 3 – Εφαρμογή σε ρωγμές και σχισμές, σε κενά και κοιλότητες – Ευρύ κοινό – Βαδιστικά έντομα

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο σε σκόνη για χρήση κατά των βαδιστικών εντόμων. Για εφαρμογή σε ρωγμές και σχισμές, κενά και κοιλότητες.
Οργανισμοί στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: Μαύρο μυρμήγκι Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία Επιστημονική ονομασία: <i>Blatta orientalis</i> Κοινή ονομασία: Ανατολίτικη κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία Επιστημονική ονομασία: <i>Blattella germanica</i> Κοινή ονομασία: Γερμανική κατσαρίδα

	Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι (οικιακοί χώροι) - σε χώρους όπου τα έντομα συνηθίζουν να κρύβονται.
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές, σε επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από το νεροχύτη της κουζίνας, κάτω από το φούρνο ή το θερμοσίφωνα, σε όλες τις ρωγμές και τις σχισμές που μπορεί να είναι ένα καταφύγιο έκτακτης ανάγκης για κατσαρίδες και μυρμήγκια. Η εφαρμογή (επίπαση) πρέπει να γίνεται με τη χρήση του ειδικού δοχείου που είναι εφοδιασμένο με τον κατάλληλο διασκορπιστή.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	8 γρ. σκευάσματος / m ² Ετοιμο προς χρήση Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 2 φορές το χρόνο.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Ευρύ κοινό
Μεγέθη και υλικό συσκευασίας	100g, 250g, 500g HDPE σωλήνας διασκορπισμού σκόνης. 100g, 250g, 500g HDPE σωλήνας διασκορπισμού σκόνης με σταθερό καπάκι.

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

<p>Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται στη συνιστώμενη δόση.</p> <p>Για συσκευασία φιάλης με καπάκι διασκορπισμού: Ανακινήστε απαλά τη συσκευασία, αφαιρέστε το καπάκι και γυρίστε τη φιάλη ανάποδα. Για την επεξεργασία μιας επιφάνειας ενός τετραγωνικού μέτρου, γυρίστε τη φιάλη ανάποδα 5 φορές, κινούμενοι από την προς επεξεργασία περιοχή, απελευθερώνοντας μια συνολική δόση των 8 g ανά τετραγωνικό μέτρο.</p> <p>Για τη συσκευασία φιαλών με σταθερό καπάκι: Ανακινήστε απαλά τη συσκευασία, περιστρέψτε το κύπελλο και γυρίστε τη φιάλη ανάποδα. Για την επεξεργασία μιας επιφάνειας ενός τετραγωνικού μέτρου, πιέστε ελαφρά τη φιάλη για 3 δευτερόλεπτα, κινούμενοι από την προς επεξεργασία περιοχή, απελευθερώνοντας μια συνολική δόση των 8 g ανά τετραγωνικό μέτρο.</p> <p>Η εξόντωση της ανατολίτικης κατσαρίδας αναμένεται 4 ώρες μετά την έκθεση στις επεξεργασμένες επιφάνειες.</p> <p>Βλέπε επίσης Γενικές οδηγίες χρήσης.</p>
--

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές, σε επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από το νεροχύτη της κουζίνας, κάτω από το φούρνο ή το θερμοσίφωνα, σε όλες τις ρωγμές και τις σχισμές που μπορεί να είναι ένα καταφύγιο έκτακτης ανάγκης για κατσαρίδες και μυρμήγκια.

Μην το εφαρμόζετε σε περιοχές που συνηθίζεται να γίνεται υγρό καθάρισμα.

Μη χρησιμοποιείτε διαδικασίες υγρού καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε μόνο διαδικασίες στεγνού καθαρισμού (κενό ή σκούπα) ή χρησιμοποιήστε υγρό χαρτί. Μετά τον καθαρισμό, πετάξτε το συλλεχθέν υλικό στους περιέκτες ξηρού υλικού ή τα υγρά χαρτιά που χρησιμοποιήθηκαν ως στερεά απόβλητα.

4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε Γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε Γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε Γενικές οδηγίες χρήσης.

Πίνακας 4. Χρήση # 4 – Σφηκοφωλιές – Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Άμεση εφαρμογή στη σφηκοφωλιά
Οργανισμοί στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Vespuula germanica</i> Κοινή ονομασία: Γερμανική σφήκα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
Πεδίο εφαρμογής	Εφαρμογή στη φωλιά.
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Χειροκίνητη εφαρμογή στη φωλιά. Η εφαρμογή (επίπαση) πρέπει να γίνεται με τη χρήση του ειδικού δοχείου που είναι εφοδιασμένο με τον κατάλληλο διασκορπιστή.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής	10 γρ. σκευάσματος / φωλιά Έτοιμο προς χρήση Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 2 φορές το χρόνο.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Ευρύ κοινό
Μεγέθη και υλικό συσκευασίας	100g, 250g, 500g HDPE σωλήνας διασκορπισμού σκόνη. 100g, 250g, 500g HDPE σωλήνας διασκορπισμού κόνεως με σταθερό καπάκι.

4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

<p>Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται στη συνιστώμενη δόση στην είσοδο της φωλιάς.</p> <p>Για συσκευασία φιάλης με καπάκι διασκορπισμού: Ανακινήστε απαλά τη συσκευασία, αφαιρέστε το καπάκι και γυρίστε τη φιάλη ανάποδα. Για την επεξεργασία μιας επιφάνειας ενός τετραγωνικού μέτρου, γυρίστε τη φιάλη ανάποδα 6 φορές, κινούμενοι από την προς επεξεργασία περιοχή, απελευθερώνοντας μια συνολική δόση των 10 g ανά φωλιά.</p> <p>Για τη συσκευασία φιάλης με σταθερό καπάκι: Ανακινήστε απαλά τη συσκευασία, περιστρέψτε το κύπελλο και γυρίστε τη φιάλη ανάποδα. Για την επεξεργασία μιας επιφάνειας ενός τετραγωνικού μέτρου, πιέστε ελαφρά τη φιάλη για 4 δευτερόλεπτα, κινούμενοι από την προς επεξεργασία περιοχή, απελευθερώνοντας μια συνολική δόση των 10 g ανά φωλιά.</p> <p>Μία και μόνο εφαρμογή μπορεί να εξαλείψει εντελώς την αποικία. Απλώστε απαλά τη σκόνη επίτασης για να κατευθύνετε την πλήρη ποσότητα στην είσοδο της φωλιάς. Εφαρμόστε κατά προτίμηση το σούρουπο και την αυγή. Απομακρύνετε την φωλιά που έχει υποστεί εφαρμογή (εάν είναι εφικτό) αφού εξετάσετε τη φωλιά και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σφήκες γύρω της. Μετά τον έλεγχο των σφηκοφωλιών, συλλέξτε τη φωλιά μέσα/πάνω σε κάλυμμα/σακούλα μίας χρήσης και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα προϊόντων με ηλεκτρική σκούπα.</p> <p>Βλέπε επίσης Γενικές οδηγίες χρήσης.</p>

4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Θεραπεία μίας φωλιάς ανά εφαρμογή.

4.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης.

Πίνακας 5. Χρήση # 5 – Εφαρμογή σε φωλιές μυρμηγκιών – Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Άμεση εφαρμογή στη μυρμηγκοφωλιά.
Οργανισμοί στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: Μαύρο μυρμήγκι Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί χώροι, στις φωλιές.
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Χειροκίνητη εφαρμογή γύρω και στην είσοδο της Η εφαρμογή (επίπαση) πρέπει να γίνεται με τη χρήση του ειδικού δοχείου που είναι εφοδιασμένο με τον κατάλληλο διασκορπιστή.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	5 γρ. σκευάσματος / φωλιά Ετοιμο προς χρήση Μία εφαρμογή ανά φωλιά.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Ευρύ κοινό.
Μεγέθη και υλικό συσκευασίας	100g, 250g, 500g HDPE σωλήνας διασκορπισμού σκόνης. 100g, 250g, 500g HDPE σωλήνας διασκορπισμού σκόνης με σταθερό καπάκι.

4.5.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται στη συνιστώμενη δόση.

Για συσκευασία φιάλης με καπάκι διασκορπισμού: Ανακινήστε απαλά τη συσκευασία, αφαιρέστε το καπάκι και γυρίστε τη φιάλη ανάποδα. Για την επεξεργασία μιας επιφάνειας ενός τετραγωνικού μέτρου, γυρίστε τη φιάλη ανάποδα 3 φορές, κινούμενοι από την προς επεξεργασία περιοχή, απελευθερώνοντας μια συνολική δόση των 5 g ανά φωλιά.

Για τη συσκευασία φιάλης με στιβαρό κύπελλο: Ανακινήστε απαλά τη συσκευασία, περιστρέψτε το κύπελλο και γυρίστε τη φιάλη ανάποδα άνω κάτω. Για την επεξεργασία μιας επιφάνειας ενός τετραγωνικού μέτρου, πιέστε ελαφρά τη φιάλη για 2 δευτερόλεπτα, κινούμενοι από την προς επεξεργασία περιοχή, απελευθερώνοντας μια συνολική δόση των 5 g ανά φωλιά.

Θα πρέπει να γίνεται μία μόνο εφαρμογή ανά φωλιά. Μία και μόνο εφαρμογή μπορεί να εξαλείψει εντελώς την αποικία.

Εάν τα μυρμήγκια εμφανίζονται από πολλαπλές οπές εισόδου, η συνολική ποσότητα σκόνης (5 g) πρέπει να διαιρεθεί με τον αριθμό των εισόδων (για παράδειγμα, εάν υπάρχουν 5 είσοδοι στη φωλιά, εφαρμόστε 1 g του προϊόντος/είσοδος).

Η εφαρμογή μπορεί να γίνει σε πλακόστρωτες και μη επιφάνειες.

Για να βελτιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, μην εφαρμόζετε σε περίπτωση βροχής ή ανέμου.

Βλέπε επίσης Γενικές οδηγίες χρήσης.

4.5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Μία φωλιά ανά εφαρμογή

4.5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε Γενικές Οδηγίες Χρήσης.

4.5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε Γενικές Οδηγίες Χρήσης.

4.5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε Γενικές Οδηγίες Χρήσης.

Πίνακας 6. Χρήση # 6 – Τοπική εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους περιμετρικά των κτιρίων εναντίον της *Blatta orientalis* – Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Τοπική εφαρμογή περιμετρικά του κτιρίου κοντά στα παράθυρα και τα κατώφλια.
Οργανισμοί στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Blatta orientalis</i> Κοινή ονομασία: Ανατολίτικη κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί χώροι – περιμετρικά του κτιρίου κοντά στα παράθυρα και τα κατώφλια.
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Χειροκίνητη εφαρμογή σκονίζοντας απευθείας από τη συσκευασία. Η εφαρμογή (επίπαση) πρέπει να γίνεται με τη χρήση του ειδικού δοχείου που είναι εφοδιασμένο με τον κατάλληλο διασκορπιστή.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	8 γρ. / m ² .

	Ετοιμο προς χρήση. Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 2 φορές το χρόνο.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Ευρύ κοινό
Μεγέθη και υλικό συσκευασίας	100g, 250g, 500g HDPE σωλήνας διασκορπισμού σκόνης. 100g, 250g, 500g HDPE σωλήνας διασκορπισμού σκόνης με σταθερό καπάκι.

4.6.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται στη συνιστώμενη δόση κοντά στα παράθυρα και τα κατώφλια.

Για συσκευασία φιάλης με καπάκι διασκορπισμού: Ανακινήστε απαλά τη συσκευασία, αφαιρέστε το καπάκι και γυρίστε τη φιάλη ανάποδα. Για την επεξεργασία μιας επιφάνειας ενός τετραγωνικού μέτρου, γυρίστε τη φιάλη ανάποδα 5 φορές, κινούμενοι από την προς επεξεργασία περιοχή, απελευθερώνοντας μια συνολική δόση των 8 g ανά τετραγωνικό μέτρο.

Για τη συσκευασία φιάλης με σταθερό καπάκι: Ανακινήστε απαλά τη συσκευασία, περιστρέψτε το κύπελλο και γυρίστε τη φιάλη ανάποδα. Για την επεξεργασία μιας επιφάνειας ενός τετραγωνικού μέτρου, πιέστε ελαφρά τη φιάλη για 3 δευτερόλεπτα, κινούμενοι από την προς επεξεργασία περιοχή, απελευθερώνοντας μια συνολική δόση των 8 g ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται μόνο σε χώρους που προστατεύονται από την βροχή (π.χ. καλύπτονται από στέγες).

Η θανάτωση της ανατολίτικης κατσαρίδας αναμένεται 4 ώρες μετά την έκθεση στις επεξεργασμένες επιφάνειες.

Βλέπε επίσης Γενικές οδηγίες χρήσης.

4.6.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Εφαρμόστε μόνο κοντά στα παράθυρα και τα κατώφλια.

Μην το εφαρμόζετε σε περίπτωση βροχής και σε θυελλώδεις ημέρες.

4.6.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε Γενικές Οδηγίες Χρήσης.

4.6.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε Γενικές Οδηγίες Χρήσης.

4.6.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε Γενικές Οδηγίες Χρήσης.

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

Βλέπε συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης.

Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση και να ακολουθείτε τις οδηγίες που δίνονται.

Για χρήση μόνο σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, κατοικίδια ζώα (ιδίως γάτες) και ζώα μη στόχους.

Στρατηγικές διαχείρισης ανθεκτικότητας

Για επαγγελματίες:

- Λάβετε υπόψη τον κύκλο ζωής και τα χαρακτηριστικά των εντόμων-στόχων για να προσαρμόσετε τις θεραπείες. Ειδικότερα, στοχεύστε στο πιο ευαίσθητο στάδιο του εχθρού, στο χρόνο εφαρμογής και στις περιοχές που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
- Όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να συστήνεται ο συνδυασμός των επεξεργασιών εφαρμογής με μη χημικά μέτρα.
- Όταν απαιτείται παρατεταμένη περίοδος ελέγχου, οι θεραπείες πρέπει να εναλλάσσονται με προϊόντα που έχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικούς τρόπους δράσης.
- Καθιερώστε ένα βασικό επίπεδο και παρακολουθήστε τα επίπεδα αποτελεσματικότητας σε πληθυσμούς σε περιοχές-κλειδιά, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν σημαντικές αλλαγές στην ευαισθησία στη δραστική ουσία. Οι πληροφορίες από τα προγράμματα παρακολούθησης της ανθεκτικότητας επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων και παρέχουν πληροφορίες για τη σωστή λήψη αποφάσεων.
- Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνουν εάν η θεραπεία είναι αναποτελεσματική και να αναφέρουν άμεσα στον κάτοχο της έγκρισης ή στον διανομέα.
- Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να αναφέρει τυχόν παρατηρούμενα περιστατικά ανθεκτικότητας στις Αρμόδιες Αρχές (ΑΑ) ή σε άλλους εντεταλμένους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση της ανθεκτικότητας.

- Μην χρησιμοποιείτε/εφαρμόζετε το προϊόν σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ή έχει διαπιστωθεί ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία που περιέχεται σε αυτό το προϊόν.
- Μην [χρησιμοποιείτε/εφαρμόζετε] το προϊόν σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ή έχει διαπιστωθεί ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία (-ες) που περιέχεται (-ονται) σε αυτό το προϊόν.

Για το ευρύ κοινό:

- Εάν η προσβολή επιμένει επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία χρήστη.

5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Περιέχει κυπερμεθρίνη, μπορεί να είναι επικίνδυνο/τοξικό για τα κατοικίδια ζώα (π.χ. γάτες, μέλισσες, ψάρια και άλλους υδρόβιους οργανισμούς).

Αυτό το βιοκτόνο προϊόν περιέχει κυπερμεθρίνη η οποία είναι επικίνδυνη για μέλισσες.

Κρατήστε τις γάτες μακριά από τις επεξεργασμένες επιφάνειες. Λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας τους στην κυπερμεθρίνη, το προϊόν μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες σε γάτες.

Μην το εφαρμόζετε σε χώρους όπου υπάρχουν ενυδρεία και/ή τερράριο.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και μη στοχευόμενα ζώα/κατοικίδια ζώα.

Κρατήστε τα μη εμπλεκόμενα άτομα, τα παιδιά και τα κατοικίδια μακριά από επεξεργασμένες επιφάνειες/περιοχές.

Μην εφαρμόζετε σε ανθρώπους και κατοικίδια ζώα.

Καλύψτε όλες τις επιφάνειες και τις εγκαταστάσεις που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφών και πόσιμο νερό.

Να μην εφαρμόζεται απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και κτηνοτροφικά ζώα/κατοικίδια ζώα.

Βλέπε χρήση συγκεκριμένων μέτρων μετριασμού κινδύνου, όπως περιγράφεται στις παραπάνω ενότητες.

5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Εάν απαιτείται ιατρική συμβουλή, να έχετε πρόχειρο τον περιέκτη ή ετικέτα.

Τα πυρεθροειδή μπορεί να προκαλέσουν παραισθησία (κάψιμο και τσίμπημα του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εάν τα συμπτώματα επιμένουν: Λάβετε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης: Ζητήστε ιατρική συμβουλή άμεσα ή καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Ζητήστε ιατρική συμβουλή άμεσα ή καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ζητήστε ιατρική συμβουλή άμεσα ή καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή άμεσα ή καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, ξεπλύνετε με νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και εύκολο να γίνει. Ζητήστε ιατρική συμβουλή άμεσα ή καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

Μην απελευθερώνετε το προϊόν ή τις κενές συσκευασίες του στο περιβάλλον.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του

Απορρίψτε το περιεχόμενο/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Μην αδειάζετε σε αποχετεύσεις. Μην μολύνετε επιφανειακά ύδατα/λίμνες, σωλήνες νερού ή τάφρους με το προϊόν ή με το άδειο δοχείο.

Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευασία.

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και μη στοχευόμενα ζώα/κατοικίδια ζώα.

Χρόνος ζωής: 2 χρόνια, στον αρχικό περιέκτη σε θερμοκρασίες δωματίου. Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες και την έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως.

Αποθηκεύστε σε ξηρό μέρος, προστατέψτε από την υγρασία.

Μην αποθηκεύετε κοντά σε τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

6. Άλλες πληροφορίες

Το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα.