

# Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

**Productnaam:** Aeroxon Fruitvliegenva

**Productsoort(en):** PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

**Toelatingsnummer:** EU-0026770-0000

**Referentienummer van de asset  
in R4BP 3:** NL-0028648-0000

## Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	3
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	5
5.1. Gebruiksvoorschrift	5
5.2. Risicobeperkende maatregelen	5
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	5
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	6
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	6
6. Overige informatie	6

## Administratieve informatie

### 1.1. Handelsnaam van het product

Aeroxon Fruitvliegenva
Aeroxon Fruitvliegenva / Aeroxon Piège à mouches à fruits
Aeroxon Fruitvliegenva / Aeroxon Piège à mouches à fruits / Aeroxon Fruchtfliegenfalle
Aeroxon Fruitvliegenva / Aeroxon Piège à mouches des fruits
Aeroxon Fruitvliegenva / Aeroxon Piège à mouches des fruits / Aeroxon Fruchtfliegenfalle
Kruidvat Fruitvliegjesval / Kruidvat Piège à mouches des fruits
Vapona Fruitvliegjesval / Vapona Piège Pour Mouches à Fruits

### 1.2. Toelatingshouder

<b>Naam en adres van de toelatingshouder</b>	Naam	Aeroxon Insect Control GmbH
	Adres	Bahnhofstr. 35 71332 Waiblingen Duitsland
<b>Toelatingsnummer</b>	EU-0026770-0000	
<b>Referentienummer van de asset in R4BP 3</b>	NL-0028648-0000	
<b>Toelatingsdatum</b>	03/06/2022	
<b>Vervaldatum</b>	10/02/2032	

### 1.3. Fabrikant(en) van de biociden

<b>Naam van de fabrikant</b>	Aeroxon Insect Control GmbH
<b>Adres van de fabrikant</b>	Bahnhofstraße 35 71332 Waiblingen Duitsland
<b>Productielocatie</b>	Bahnhofstraße 35 71332 Waiblingen Duitsland
	Aeroxon s.r.o.; Dr. Sedlaka 827 33901 Klatovy Tsjechische Republiek

#### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

<b>Werkzame stof</b>	2323 - Azijn
<b>Naam van de fabrikant</b>	CARL KÜHNE KG (GmbH & Co.)
<b>Adres van de fabrikant</b>	Kühnehöfe 11 22761 Hamburg Duitsland
<b>Productielocatie</b>	Kühnehöfe 11 22761 Hamburg Duitsland

## 2. Productsamenstelling en -formulering

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Azijn		Werkzame stof	8028-52-2		86,5

### 2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning
--

### 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Veiligheidsaanbevelingen

### 4. Toegelaten gebruik

#### 4.1 Omschrijving van het gebruik

##### Gebruik 1 - fruitvliegen, binnenruimte

Productsoort

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Lokstof met lijmval met groot vangoppervlak

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: *Drosophila* spp.  
Triviale naam: fruitvlieg  
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Toepassingsgebied

Binnen

Binnen-  
Binnenruimte

Toepassingsmethode(n)

Methode: gebruiksklare lokstof met lijmval  
Gedetailleerde beschrijving:

Laat de fles, voordat u hem opent, minstens 30 minuten rechtop staan en schroef vervolgens de dop van de fles los door hem omlaag te duwen en tegelijkertijd te draaien.

1. Verwijder het witte bescherm papier met één snelle beweging van de kleverige binnenkant van de val.

2. Vouw de val tot een driehoek en zet hem bovenaan in elkaar. De kleverige oppervlakken wijzen naar binnen.

3. Schuif de ronde opening van de val over de fles tot beneden.

Plaats de val op een afstand van maximaal 1 m van de plaag.

Dosering en frequentie van de toepassing

Toe te passen dosis: 1 fles met 40 ml lokstof (86,5 mL azijn/100 mL)  
Verdunning (%): Onverdund gebruiken.  
Aantal en timing van de toepassing:

	<p>Na opening van de fles houdt het lokeffect tot 8 weken aan. Bij plaag en voor preventie. Vervang de lijmvial als het lijmoppervlak bedekt is met fruitvliegen.</p>
<p><b>Categorie/categorieën gebruikers</b></p>	<p>Breed publiek (niet-professioneel)</p>
<p><b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b></p>	<p>Gebruiksklare lijmvial. Bestaande uit flesje met 40 ml inhoud, lijmvial. PET-flesjes, karton</p>

#### 4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie hoofdstuk 5.1

#### 4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie hoofdstuk 5.2

#### 4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie hoofdstuk 5.3

#### 4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie hoofdstuk 5.4

#### **4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Zie hoofdstuk 5.5

### **5. Algemene gebruiksaanwijzing**

#### **5.1. Gebruiksvoorschrift**

Laat de fles, voordat u hem opent ,minstens 30 minuten rechtop staan en schroef vervolgens de dop van de fles los door hem omlaag te duwen en tegelijkertijd te draaien.

1. Verwijder het witte bescherm papier met één snelle beweging van de kleverige binnenkant van de val.
2. Vouw de val tot een driehoek en zet hem bovenaan in elkaar. De kleverige oppervlakken wijzen naar binnen.
3. Schuif de ronde opening van de val over de fles tot beneden.

Plaats de val op een afstand van maximaal 1 m van de plaag.

Verwijder overrijp fruit. Vermijd direct zonlicht op de val.

De beste vangresultaten worden verkregen op een tochtvrije plaats, in de onmiddellijke nabijheid van een mogelijke bron van overlast door fruitvliegen (bijv. fruitschalen, afvalbakken).

Na opening van de fles houdt de werking tot 8 weken aan.

Een aanzienlijke vermindering van fruitvliegen kan worden verwacht 72 uur na begin van de behandeling.

#### **5.2. Risicobeperkende maatregelen**

-

#### **5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

-

#### 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

#### 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Uitsluitend in de originele verpakking bewaren. Koel en droog bewaren, op een temperatuur van maximaal 30°C en beschermen tegen direct zonlicht. Rechtop bewaren. Beschermen tegen vorst.  
Houdbaarheid: 4 jaar

#### 6. Overige informatie

-