

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: AGITA® 10WG

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA:UP/I-543-04/17-12/41

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3): HR-0019956-0000

Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	2
2. Sastav i formulacija proizvoda	2
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	3
3. Oznake opasnosti i obavijesti	3
4. Odobrena uporaba	3
5. Opće upute za uporabu	6
5.1. Upute za uporabu	6
5.2. Mjere za smanjenje rizika	6
5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	7
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	7
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja	7
6. Ostale informacije	7

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

AGITA® 10WG

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	Elanco Animal Health Inc.
	Adresa	Mattenstrasse 24A 4058 Basel Švicarska
Broj odobrenja	KLASA:UP/I-543-04/17-12/41	
Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)	HR-0019956-0000	
Datum odobrenja	27/12/2018	
Datum isteka odobrenja	11/06/2028	

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača	Kwizda Agro GmbH
Adresa proizvođača	Werk Leobendorf B6 Laaer Straße, Kwizda-Allee 1 2100 Leobendorf Austrija
Lokacija proizvodnih pogona	Werk Leobendorf B6 Laaer Straße, Kwizda-Allee 1 2100 Leobendorf Austrija
Naziv proizvođača	Schirm GmbH
Adresa proizvođača	Dieselstraße 8 85107 Baar-Ebenhausen Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Dieselstraße 8 85107 Baar-Ebenhausen Njemačka

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	54 - Tiametoksam
Naziv proizvođača	Syngenta Crop Protection AG
Adresa proizvođača	Syngenta Crop Protection AG CH-4002 Basel Švicarska
Lokacija proizvodnih pogona	ESIM Chemicals GmbH 4020 Linz Austrija
	Deccan Fine Chemicals (India) Private Limited 403110 Goa Indija
Aktivna tvar	65 - Cis-trikoz-9-en (muskalur)
Naziv proizvođača	Denka International B.V.
Adresa proizvođača	Hanzeweg 1 3771 Barnveld Nizozemska
Lokacija proizvodnih pogona	Hanzeweg 1 3771 Barnveld Nizozemska

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Tiametoksam	thiamethoxam	Aktivna tvar	153719-23-4	428-650-4	10
Cis-trikoz-9-en (muskalur)	cis-Tricos-9-ene; (Z)-Tricos-9-ene	Aktivna tvar	27519-02-4	248-505-7	0,05

2.2. Vrsta formulacije

WG-granule disperzibilne u vodi

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja

Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost. Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.

Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.

Oznake obavijesti

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

Čuvati izvan dohvata djece.

Pažljivo pročitajte i slijedite upute.

Prije uporabe pribaviti posebne upute.

Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti.

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost:Zatražiti pomoć liječnika.

Sakupiti proliveno/rasuto.

Skladištiti pod ključem.

Odložiti sadržaj u/na skladu sa nacionalnim propisima..

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Profesionalna uporaba

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Za profesionalnu uporabu za suzbijanje kućne muhe (*Musca domestica*) u zatvorenom prostoru u životinjskim nastambama.

**Ciljni organizam(mi)
(uključujući razvojnu fazu)**

Znanstveno ime: *Musca domestica*
Uobičajeno ime: kućna muha
Stadij razvoja: odrasli

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

AGITA 10 WG je formulacija pogodna za suzbijanje odrasle kućne muhe u prostorijama za držanje životinja uključujući perad, svinje, prostorije za preradu mlijeka, štale, objekte za rad sa životinjama ili držanje životinja i ostala povezana područja na kojima je nužno suzbijanje kućne muhe. Proizvod treba primijeniti na mjestima na kojima se muhe najčešće hrane ili odmaraju, na primjer, ali ne ograničeno, na prozorske okvire i klupčice, vrhove zidova, pregrade na farmama i prolaze. Proizvod se nanosi isključivo na ploče koje se vješaju.

Načini primjene

Metoda: premazivanje
Detaljan opis:

100 g proizvoda dispergirati u 80 mL vode. Nanijeti nastalu suspenziju na ploče dimenzija 20 cm x 30 cm koje se razmještaju po prostoriji u kojoj se drže životinje, a gdje se muhe skupljaju. Rasporediti 10 ploča na zid površine 80-120 m².

Primjena se može ponoviti svakih 6 tjedana. Može proteći do 4 tjedna dok se uoči djelovanje/učinkovitost.

Ponovno tretirati površine tek nakon najmanje 6 tjedana. Ponovo primijeniti ako je prašina prekrila tretirane površine ili ako su insekti konzumirali mamac.

**Broj i vremenski raspored
primjena**

Stopa primjene: 100 g proizvoda dispergirati u 80 mL vode. Nanijeti nastalu suspenziju na ploče za vješanje dimenzija 20 cm x 30 cm. Na zid površine 80-120 m² treba rasporediti 10 ploča.

Razrjeđivanje (%): 100 g proizvoda dispergirati u 80 mL vode.

Broj i vremenski raspored primjene:

Primjena se može ponoviti svakih 6 tjedana. Može proteći do 4 tjedna dok se uoči djelovanje/učinkovitost.

Ponovo tretirati površine tek nakon najmanje 6 tjedana.

Ponovo primijeniti ako je prašina prekrila tretirane površine ili ako su insekti konzumirali mamac.

Kategorije korisnika

profesionalac

**Veličine pakiranja i ambalažni
materijal**

HDPE boca od 100 g do 5 kg
PET/Alu/PET/PE laminirana vrećica s printom – 25 x 20 g vrećica spremjenih u dispenzer od čvrstog kartona.

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Prije uporabe pročitati etiketu i informacije o proizvodu.

Proizvod sadrži tiametoksam. OPASNO ZA PČELE.

Samo za profesionalnu uporabu.

Samo za uporabu u zatvorenim prostorima.

Držati dalje od hrane, pića i hrane za životinje.

NE PRIMJENJIVATI na mjestima gdje može doći do kontaminacije hrane, hrane za životinje i vode.

Primijeniti izvan dohvata djece i životinja.

U odvojenoj posudi pomiješati navedenu količinu AGITA 10 WG s odgovarajućom količinom mlake vode. Upotrijebiti posudu za 1/3 većeg volumena od količine vode koju treba dodati i prije primjene (četkom/valjkom) pričekati da se prestane pjeniti.

Ne nanositi proizvod izravno na površine (npr. zidove) u objektu.

Proizvod se nanosi na neapsorbirajuće ploče koje se razmještaju na zidove ili stropove na kojima se muhe skupljaju.

Kod pripreme suspenzije i primjene proizvoda, radnik mora nositi jednokratnu radnu odjeću (npr. papirnato radno odijelo, pregaču, ogrtač) kako bi se spriječilo ispuštanje u kanalizaciju uslijed pranja onečišćene odjeće.

OPRATI RUKU I IZLOŽENU KOŽU nakon primjene i prije jela.

Mjesto na kojem se priprema otopina i premazuju ploče, mora biti prekriveno plastičnom folijom za jednokratnu uporabu kako bi se spriječilo onečišćenje okolnih površina i poda.

Ne čistiti tretirane predmete (npr. ploče).

Ukloniti sve tretirane predmete (npr. ploče) premazane biocidnim proizvodom prije čišćenja i/ili dezinfekcije životinjskih nastambi/zaklona.

Oprema upotrijebljena za nanošenje (npr. četke, valjci, ploče) ne smije se čistiti nakon upotrebe. Sva onečišćena oprema može se ponovo upotrijebiti bez čišćenja (ako je moguće) i uvijek se treba sigurno zbrinuti u skladu s lokalnim propisima (bez ispuštanja u otpadne vode).

Proizvod treba upotrebljavati u kombinaciji s larvicidom i izmjenjivati sa sredstvom za suzbijanje odraslih muha drugačijeg načina djelovanja. U slučaju neučinkovitosti o tome treba obavijestiti nositelja odobrenja.

Može proteći do 4 tjedna dok se uoči djelovanje/učinkovitost. Ponovno tretirati površine tek nakon najmanje 6 tjedana.

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidi upute za uporabu specifične za uporabu.

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pobrinite se da je medicinsko osoblje upoznato s materijalima u pitanju i da je poduzelo mjere opreza za svoju zaštitu. Uklonite pogođenu osobu iz zone opasnosti u dobro prozračenu prostoriju ili na svjež zrak i spriječite hipotermiju.

U SLUČAJU IZLOŽENOSTI ILI SUMNJE NA IZLOŽENOST: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

AKO SE UDIŠE: Ako se jave simptomi, nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Isprati kožu s vodom. Ako se jave simptomi, nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

AKO SE PROGUTA: Ako se jave simptomi, nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Ako se jave simptomi, isprati oči vodom. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U slučaju istjecanja proizvoda zaustaviti daljnje onečišćenje. Prikupiti prolivenu tekućinu za kasnije zbrinjavanje. Nakon uklanjanja proizvoda očistiti onečišćene podove i predmete vodom u skladu s propisima o zaštiti okoliša.

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Raspoloživi sadržaj neškodljivo zbrinuti u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

Ostaci proizvoda, voda od pranja opreme za tretiranje i drugi ostaci od primjene proizvoda (npr. prazna ambalaža, istrošene kartonske ploče) moraju se zbrinuti u skladu s važećim propisima za zbrinjavanje otpada.

Ne ispuštajte otpadne produkte ili vodu od pranja opreme za tretiranje u odvođe.

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Čuvati na suhom, hladnom i dobro zračenom mjestu.

Čuvati u originalnom spremniku.

Spremnike čuvati dobro zatvorene.

Skladištiti zaštićeno od izravnog sunčevog svjetla.

Rok uporabe: 2 godine.

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

Vidi 4.1.1

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Vidi 4.1.2

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidi 4.1.3

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 4.1.4

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Vidi 4.1.5

6. Ostale informacije

Kontinuirano treba provoditi praćenje potencijala za pojavu rezistencije, a relevantne strategije za upravljanje rezistencijom trebaju biti uključene na etiketi kako slijedi:

Ovaj proizvod ne smije se kontinuirano upotrebljavati za suzbijanje kućnih muha u intenzivnom ili kontroliranom okolišu prostorija za držanje životinja jer to može izazvati neuspjeh zbog otpornosti na insekticid.

Tiametoksam je aktivni sastojak proizvoda AGITA 10WG koji spada u razred neonikotinoidnih insekticida i ima drugačiji način djelovanja od ostalih razreda insekticida kao što su piretroidi i organofosfati.

Uzorak upotrebe na pločama za vješanje osigurava da veći dio prostora za držanje životinja nije tretiran čime se smanjuje vjerojatnost dolaska u kontakt sa subletalnim talogom. Ipak, za minimalizaciju vjerojatnosti za razvoj rezistencije u budućnosti preporučuje se izbjegavanje isključive i kontinuirane uporabe proizvoda AGITA 10WG kao jedinog sredstva za suzbijanje muha.

AGITA 10WG treba se upotrebljavati kao jednu od komponenti integriranog programa suzbijanja kukaca koji uključuje proizvode iz različitih kemijskih razreda i nekemijska sredstva (npr. mreže protiv kukaca, higijenske mjere).

Otrovan za pčele.