

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: RATIMOR BRODIFACOUM ŽITNI MAMAC

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA:UP/I-543-04/22-12/13

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3): HR-0029212-0000

Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	1
2. Sastav i formulacija proizvoda	2
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Oznake opasnosti i obavijesti	2
4. Odobrena uporaba	3
5. Opće upute za uporabu	18
5.1. Upute za uporabu	18
5.2. Mjere za smanjenje rizika	20
5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	21
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	22
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja	22
6. Ostale informacije	22

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

RATIMOR BRODIFACOUM ŽITNI MAMAC

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	Unichem d.o.o.
	Adresa	Sinja Gorica 2 SI 1360 Vrhnika Slovenija
Broj odobrenja	KLASA:UP/I-543-04/22-12/13	
Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)	HR-0029212-0000	
Datum odobrenja	09/08/2022	
Datum isteka odobrenja	01/07/2024	

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača	Unichem d.o.o.
Adresa proizvođača	Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Slovenija
Lokacija proizvodnih pogona	Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Slovenija

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	11 - Brodifakum
Naziv proizvođača	ACTIVA S.r.l.
Adresa proizvođača	ACTIVA S.r.l., Via Feltre, 32 20132 – Milano Milano Italija
Lokacija proizvodnih pogona	Dr. TEZZA S.r.l. - Via Tre Ponti, 22 37050 S. Maria di Zevio (VR) Italija

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Brodifakum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Aktivna tvar	56073-10-0	259-980-5	0,0029

2.2. Vrsta formulacije

RB - mamac (pripremljen za uporabu)

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja	Može uzrokovati oštećenje organa (krv) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti ..
Oznake obavijesti	<p>Čuvati izvan dohvata djece.</p> <p>Pažljivo pročitajte i slijedite upute.</p> <p>Ne udisati prašinu.</p> <p>Nositi zaštitne rukavice.</p> <p>U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet liječnika.</p> <p>U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti pomoć liječnika.</p> <p>Odložiti sadržaj u/na skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.</p>

Odložiti spremnik u/na skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Uporaba 1 – Kućni miševi i/ili smeđi štakori - neprofesionalni korisnici – u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: *Rattus norvegicus*
Uobičajeno ime: smeđi štakor
Stadij razvoja: odrasli

Znanstveno ime: *Rattus norvegicus*
Uobičajeno ime: smeđi štakor
Stadij razvoja: mladi

Znanstveno ime: *Mus musculus*
Uobičajeno ime: kućni miš
Stadij razvoja: odrasli

Znanstveno ime: *Mus musculus*
Uobičajeno ime: kućni miš
Stadij razvoja: mladi

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U zatvorenom prostoru.

Načini primjene

Metoda: kutija za mamce

Detaljan opis:

Mamac spreman za uporabu u zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije).

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: Miševi: 60 grama mamca po kutiji svakih 5-10 m; Štakori: 100 grama mamca po kutiji svakih 5-10 m

Razrjeđivanje (%): 0

Broj i vremenski raspored primjene:

Kućni miševi

- 60 g mamca po kutiji za mamce. Ako je potrebno koristiti više od jedne kutije, najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).

Štakori

- 100 g mamca po kutiji za mamce. Ako je potrebno koristiti više od jedne kutije, najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).

Kategorije korisnika

široka javnost (amaterska uporaba)

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Najveća veličina pakiranja je 150 g.

Broj pakiranih vrećica po pakiranju: do 150 g.

Količina mamca po pakiranoj vrećici: pojedinačne vrećice od 10 g do 100 g.

Vrste pakiranja: kutije, vreće, kante, cilindrične posude, boce i vrećice.

Materijal: karton ili PE ili PP ili PET ili LDPE ili PET/PETMET/PE ili PET/ALU/PE ili PET/PE ili PA/ PE ili HDPE ili PVC.

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Uporaba 2 – Smeđi štakori – neprofesionalni korisnici – na otvorenom, oko zgrada

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: mladi
Područje primjene	na otvorenom Na otvorenom, oko zgrada.
Načini primjene	Metoda: kutija za mamce Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu u zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije).
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: štakori: 100 grama mamca po kutiji svakih 5-10 m. Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: <u>Štakori</u> - 100 grama mamca po kutiji za mamce. Ako je potrebno koristiti više od jedne kutije, najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).
Kategorije korisnika	široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Najveća veličina pakiranja je 150 g. Broj pakiranih vrećica po pakiranju: do 150 g. Količina mamca po pakiranoj vrećici: pojedinačne vrećice od 10 g do 100 g. Vrste pakiranja: kutije, vreće, kante, cilindrične posude, boce i vrećice. Materijal: karton, PE ili PP ili PET ili LDPE ili PET / PET MET / PE ili PET /ALU / PE ili PET / PE ili PA / PE ili HDPE ili PVC

4.2.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega). Zaštitne kutije s mamcem postaviti na područja koja nisu izložena plavljenju.
Zamijeniti mamce koji su oštećeni vodom ili onečišćeni prljavštinom.
Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamca (deratizacijske kutije) treba obilaziti svakih 5 do 7 dana, a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, nadopuniti mamce u kutiji.
Ukloniti što je prije moguće uginule glodavce i zbrinuti ih u skladu s propisima.

--

4.2.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.2.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.2.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.2.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - Uporaba 3 - Kućni miševi – profesionalni korisnici – u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: kućni miš Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: kućni miš Stadij razvoja: mladi
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U zatvorenom prostoru.
Načini primjene	Metoda: kutija za mamce Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu u zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije).

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: miševi: 60 grama mamca po kutiji svakih 5-10 m
Razrjeđivanje (%): 0
Broj i vremenski raspored primjene:

Kućni miševi

- 60 grama mamca po kutiji za mamce. Ako je potrebno koristiti više od jedne kutije, najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).

Kategorije korisnika

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Broj pakiranih vrećica po pakiranju: do 30 kg.

Količina mamca po pakiranoj vrećici: pojedinačne vrećice od 10 g do 60 g.

Vrste pakiranja: kutije, vreće, kante, cilindrične posude, boce i vrećice.

Materijal: karton ili PE ili PP ili PET ili LDPE ili PET / PET MET / PE ili PET / ALU / PE ili PET / PE ili PA/ PE ili HDPE ili PVC.

Dodatno, proizvod se može isporučiti kao rasuto zrno (u rinfuzi) izravno unutar gore navedene sekundarne ambalaže. U tom slučaju najveća veličina pakiranja je 10 kg.

Minimalna veličina pakiranja u Republici Hrvatskoj za osposobljene profesionalne korisnike i profesionalne korisnike je 5 kg.

4.3.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamca (deratizacijske kutije) treba obilaziti svaka 2 do 3 dana, a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, nadopuniti mamce u kutiji. Ukloniti što je prije moguće uginule glodavce i zbrinuti ih u skladu s propisima.

Vidi i Opće upute za uporabu

4.3.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.3.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Ako se kutija s mamcem postavlja u blizini sustava za odvod vode, osigurati da ne dođe do kontakta mamca i vode.

4.3.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.3.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.4 Opis uporabe

Uporaba 4 - Uporaba 4 – Smeđi štakori – profesionalni korisnici – u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: Rattus norvegicus
Uobičajeno ime: smeđi štakor
Stadij razvoja: odrasli

Znanstveno ime: Rattus norvegicus
Uobičajeno ime: smeđi štakor
Stadij razvoja: mladi

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U zatvorenom prostoru.

Načini primjene

Metoda: kutija za mamce

Detaljan opis:

Mamac spreman za uporabu u zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije).

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: Štakori: 100 grama mamca po kutiji svakih 5-10 m.

Razrjeđivanje (%): 0

Broj i vremenski raspored primjene:

Štakori

- 100 grama mamca po kutiji za mamce. Ako je potrebno koristiti više kutija, najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).

Kategorije korisnika

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Broj pakiranih vrećica po pakiranju: do 30 kg.

Količina mamca po pakiranoj vrećici: pojedinačne vrećice od 10 g do 100 g.

Vrste pakiranja: kutije, vreće, kante, cilindrične posude, boce i vrećice.

Materijal: karton ili PE ili PP ili PET ili LDPE ili PET / PET MET / PE ili PET / ALU / PE ili PET / PE ili PA/ PE ili HDPE ili PVC.

Dodatno, proizvod se može isporučiti kao rasuto zrno (u rinfuzi) izravno unutar gore navedene sekundarne ambalaže. U tom slučaju najveća veličina pakiranja je 10 kg.

Minimalna veličina pakiranja u Republici Hrvatskoj za osposobljene profesionalne korisnike i profesionalne korisnike je 5 kg.

4.4.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamca (deratizacijske kutije) treba obilaziti svakih 5 do 7 dana, a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, nadopuniti mamce u kutiji. Ukloniti što je prije moguće uginule glodavce i zbrinuti ih u skladu s propisima.

Vidi i Opće upute za uporabu

4.4.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.4.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Ako se kutija s mamcem postavlja u blizini sustava za odvod vode, osigurati da ne dođe do kontakta mamca i vode.

4.4.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.4.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.5 Opis uporabe

Uporaba 5 - Uporaba 5 – Kučni miševi i/ili smeđi štakori - profesionalni korisnici – na otvorenom, oko zgrada

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: mladi Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: kućni miš Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: kućni miš Stadij razvoja: mladi
Područje primjene	na otvorenom Na otvorenom, oko zgrada.
Načini primjene	Metoda: kutija za mamce Detaljan opis: - Mamac spreman za uporabu u zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije).
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: štakori: 100 grama mamca po kutiji svakih 5-10 m; miševi: 60 grama mamca po kutiji svakih 5-10 m. Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: <u>Kućni miševi</u> - 60 g mamca po kutiji za mamce. Ako je potrebno koristiti više od jedne kutije, najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije). <u>Štakori</u> - 100 g mamca po kutiji za mamce. Ako je potrebno koristiti više od jedne kutije, najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Broj pakiranih vrećica po pakiranju: do 30 kg. Količina mamca po pakiranoj vrećici: pojedinačne vrećice od 10 g do 100 g. Vrste pakiranja: kutije, vreće, kante, cilindrične posude, boce i vrećice.

Materijal: karton ili PE ili PP ili PET ili LDPE ili PET / PET MET / PE ili PET / ALU / PE ili PET / PE ili PA/ PE ili HDPE ili PVC.

Dodatno, proizvod se može isporučiti kao rasuto zrno (u rinfuzi) izravno unutar gore navedene sekundarne ambalaže. U tom slučaju najveća veličina pakiranja je 10 kg.

Minimalna veličina pakiranja u Republici Hrvatskoj za osposobljene profesionalne korisnike i profesionalne korisnike je 5 kg.

4.5.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega). Zaštitne kutije s mamcem postaviti na područja koja nisu izložena plavljenju.

Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamca (deratizacijske kutije) treba obilaziti svakih 2 do 3 dana (miševi) odnosno svakih 5 do 7 dana (štakori), a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, nadopuniti mamce u kutiji.

Zamijeniti mamce koji su oštećeni vodom ili onečišćeni.

Na kraju provedene deratizacije ukloniti i zbrinuti sve neiskorištene mamce.

Postupati prema svim dodatnim uputama predviđenima odgovarajućim uputama najbolje prakse.

4.5.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Proizvod ne stavljati izravno u jazbine.

4.5.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja kutije s mamcem u blizini vodotokova (npr. rijeka, jezera, kanala za navodnjavanje) ili sustava za odvodnju vode, osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.5.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.5.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.6 Opis uporabe

Uporaba 6 - Uporaba 6 - Kućni miševi i/ili smeđi štakori – osposobljeni profesionalni korisnici – u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: mladi Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: kućni miš Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: kućni miš Stadij razvoja: mladi
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U zatvorenom prostoru.
Načini primjene	Metoda: kutija za mamce Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu u zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije).
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: Štakori: kutije za mamce sa 100-200 g proizvoda po mjestu postavljanja; Miševi: kutije za mamce sa 60-100 g proizvoda po mjestu postavljanja Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Štakori: kutije za mamce sa 100-200 g po mjestu postavljanja Kućni miševi: kutije za mamce sa 60-100 g po mjestu postavljanja
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Količina mamca po pakirnoj vrećici: pojedinačne vrećice od 10 g do 200 g. Broj pakiranih vrećica po pakiranju: do 30 kg. Vrste pakiranja: kutije, vreće, kante, cilindrične posude, boce i vrećice. Materijal: karton ili PE ili PP ili PET ili LDPE ili PET / PET MET / PE ili PET / ALU / PE ili PET / PE ili PA/ PE ili HDPE ili PVC. Dodatno, proizvod se može isporučiti kao rasuto zrno (u rinfuzi) izravno unutar gore navedene sekundarne ambalaže. U tom slučaju najveća veličina pakiranja je 10 kg. Minimalna veličina pakiranja u Republici Hrvatskoj za osposobljene profesionalne korisnike i profesionalne korisnike je 5 kg.

4.6.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Na kraju provedene deratizacije sve neiskorištene mamce ukloniti i zbrinuti u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

Vidi i Opće upute za uporabu

4.6.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ako je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.

- Poduzeti preventivne mjere (npr. zatvoriti otvore, ukloniti potencijalnu hranu i piće u mjeri u kojoj je to moguće) kako bi se poboljšala učinkovitost i smanjila vjerojatnost ponovne pojave glodavaca.

- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce kod svakog pregleda mjesta postavljanja mamaca kako bi se smanjio rizik od sekundarnog trovanja.

- Ne koristiti proizvod kao trajni mamac za sprječavanje pojave glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca.

- Ovaj se proizvod može koristiti samo u zatvorenim prostorima i na mjestima koja nisu dostupna djeci ili neciljanim životinjama.

- Ne koristiti proizvod za pulsno (fazno) izlaganje.

Vidi i Opće upute za uporabu

4.6.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Ako se kutija s mamcem postavlja u blizini sustava za odvod vode, osigurati da ne dođe do kontakta mamca i vode.

4.6.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.6.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.7 Opis uporabe

Uporaba 7 - Uporaba 7 – Kućni miševi i/ili smeđi štakori - osposobljeni profesionalni korisnici – na otvorenom prostoru, oko zgrada

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: mladi Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: kućni miš Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: kućni miš Stadij razvoja: mladi
Područje primjene	na otvorenom Na otvorenom, oko zgrada.
Načini primjene	Metoda: kutija za mamce Detaljan opis: - Mamac spreman za uporabu u zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije). - Izravna primjena mamca spremnog za uporabu u jazbine.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: štakori: kutije za mamce sa 100-200 g proizvoda po mjestu postavljanja; miševi: kutije za mamce sa 60-100 g proizvoda po mjestu postavljanja Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Štakori: kutije za mamce sa 100-200 g po mjestu postavljanja Miševi: kutije za mamce sa 60-100 g po mjestu postavljanja Jazbina: 200 g mamca spremnog za uporabu po jazbini
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Količina mamca po pakiranoj vrećici: pojedinačne vrećice od 10 g do 200 g. Broj pakiranih vrećica po pakiranju: do 30 kg. Vrste pakiranja: kutije, vreće, kante, cilindrične posude, boce i vrećice. Materijal: karton ili PE ili PP ili pet ili LDPE ili PET /pet MET/ PE ili PET / ALU / PE ili PET / PE ili PA / PE ili HDPE ili PVC Dodatno, proizvod se može isporučiti kao rasuto zrno (u rinfuzi) izravno unutar gore navedene sekundarne ambalaže. U tom slučaju najveća veličina pakiranja je 10 kg.

Minimalna veličina pakiranja u Republici Hrvatskoj za osposobljene profesionalne korisnike i profesionalne korisnike je 5 kg.

4.7.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega). Zaštitne kutije s mamcem postaviti na područja koja nisu izložena plavljenju.

Zamijeniti mamce koji su oštećeni vodom ili onečišćeni.

Na kraju provedene deratizacije ukloniti i zbrinuti sve neiskorištene mamce (osim kod izravnog postavljanja u jazbine).

Postupati prema svim dodatnim uputama predviđenima odgovarajućim uputama najbolje prakse.

Za uporabu na otvorenom, mjesta postavljanja mamaca moraju biti natkrivena i smještena na mjesta na kojima je minimalna mogućnost izloženosti neciljnih vrsta.

Potrebno je prekriti ili blokirati ulaze u jazbine u kojima su postavljeni mamci kako bi se smanjio rizik od odbijanja i rasipanja mamaca.

4.7.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ako je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.

- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce kod svakog pregleda mjesta postavljanja mamaca kako bi se smanjio rizik od sekundarnog trovanja.

- Ne koristiti proizvod kao trajni mamac za sprječavanje pojave glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca.

- Ne koristiti proizvod za pulsno (fazno) izlaganje.

4.7.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja kutije s mamcem u blizini vodotokova (npr. rijeka, jezera, kanala za navodnjavanje) ili sustava za odvodnju vode, osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.7.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.7.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.8 Opis uporabe

Uporaba 8 - Uporaba 8 – Smeđi štakori - osposobljeni profesionalni korisnici – na otvorenom prostoru i odlagalištima otpada

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: Rattus norvegicus
Uobičajeno ime: smeđi štakor
Stadij razvoja: odrasli

Znanstveno ime: Rattus norvegicus
Uobičajeno ime: smeđi štakor
Stadij razvoja: mladi

Područje primjene

na otvorenom

Područja na otvorenom
Vanjska odlagališta otpada

Načini primjene

Metoda: kutija za mamce

Detaljan opis:

- Mamac spreman za uporabu u zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije).

- Izravna primjena mamca spremnog za uporabu u jazbine.

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: štakori: kutije za mamce sa 100-200 g po mjestu postavljanja; jazbina:

200 g mamca po jazbini

Razrjeđivanje (%): 0

Broj i vremenski raspored primjene:

Štakori: kutije za mamce sa 100-200 g po mjestu postavljanja

Jazbina: 200 g mamca spremnog za uporabu po jazbini

Kategorije korisnika

osposobljeni profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Količina mamca po pakiranoj vrećici: pojedinačne vrećice od 10 g do 200 g.

Broj pakiranih vrećica po pakiranju: do 30 kg.

Vrste pakiranja: kutije, vreće, kante, cilindrične posude, boce i vrećice.

Materijal: karton ili PE ili PP ili pet ili LDPE ili PET /pet MET/ PE ili PET / ALU / PE ili PET / PE ili PA / PE ili HDPE ili PVC

Dodatno, proizvod se može isporučiti kao rasuto zrno (u rinfuzi) izravno unutar gore navedene sekundarne ambalaže. U tom slučaju najveća veličina pakiranja je 10 kg.

Minimalna veličina pakiranja u Republici Hrvatskoj za osposobljene profesionalne korisnike i profesionalne korisnike je 5 kg.

4.8.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega). Zaštitne kutije s mamcem postaviti na područja koja nisu izložena plavljenju.

Zamijeniti mamce koji su oštećeni vodom ili onečišćeni.

Na kraju provedene deratizacije ukloniti i zbrinuti sve neiskorištene mamce (osim kod izravnog postavljanja u jazbine).

Postupati prema svim dodatnim uputama predviđenima odgovarajućim uputama najbolje prakse.

Za uporabu na otvorenom, mjesta postavljanja mamaca moraju biti natkrivena i smještena na mjesta na kojima je minimalna mogućnost izloženosti neciljnih vrsta.

Potrebno je prekriti ili blokirati ulaze u jazbine u kojima su postavljeni mamci kako bi se smanjio rizik od odbijanja i rasipanja mamaca.

4.8.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ako je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.
- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce kod svakog pregleda mjesta postavljanja mamaca kako bi se smanjio rizik od sekundarnog trovanja.
- Ne koristiti proizvod kao trajni mamac za sprječavanje pojave glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca.
- Ne koristiti proizvod za pulsno (fazno) izlaganje.

4.8.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja kutije s mamcem u blizini vodotokova (npr. rijeka, jezera, kanala za navodnjavanje) ili sustava za odvodnju vode, osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.8.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.8.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

Neprofesionalni korisnici (amaterska uporaba):

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o proizvodu, kao i sve informacije koje su isporučene uz proizvod ili na mjestu prodaje.
- Prije uporabe rodenticida potrebno je uzeti u obzir nekemijske metode suzbijanja (npr. klopke).
- Ukloniti hranu kojoj glodavci mogu lako pristupiti (npr. ostatci hrane ili prosuti zrnati proizvodi). Ne čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda, jer to može uznemiriti populaciju glodavaca i otežati prihvaćanje mamaca kao izvora hrane.
- Zaštitne kutije s mamcem treba postaviti blizu mjesta na kojima je primijećena aktivnost glodavaca (npr. uz putove kretanja, rupe, jazbine).
- Gdje je moguće, zaštitne kutije s mamcem treba pričvrstiti na površinu ili neku konstrukciju/predmet.
- Zaštitne kutije s mamcem postaviti izvan dohvata djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih neciljanih organizama.
- Zaštitne kutije s mamcem postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta te površina koje su u dodiru s njima.
- Zaštitne kutije s mamcem ne smije se postavljati blizu sustava za odvod vode jer mogu doći u dodir s vodom.
- Pri uporabi proizvoda ne smije se jesti, piti ni pušiti.
- Ne otvarati pojedinačne vrećice koje sadrže mamce.
- Oprati ruke i izloženu kožu nakon primjene proizvoda.
- Nakon provedene deratizacije ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcem.

Profesionalni korisnici:

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o proizvodu, kao i sve informacije koje su isporučene uz proizvod ili na mjestu prodaje.
- Pregledati infestirano područje prije postavljanja mamaca i napraviti procjenu lokacije radi određivanja vrste glodavaca, njihovih mjesta aktivnosti i saznati vjerojatan uzrok i brojnost populacije.
- Ukloniti hranu kojoj glodavci mogu lako pristupiti (npr. ostatci hrane ili prosuti zrnati proizvodi). Ne čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda jer to može uznemiriti populaciju glodavaca i otežati prihvaćanje mamaca kao izvora hrane.
- Proizvod treba koristiti kao dio programa integriranog suzbijanja štetnika (IPM), uključujući između ostalog, higijenske mjere i fizičke metode kontrole (ako je moguće).
- Provoditi preventivne mjere (npr. zatvoriti otvore, ukloniti potencijalnu hranu i piće u mjeri u kojoj je to moguće) kako bi se poboljšala učinkovitost i smanjila vjerojatnost ponovne pojave glodavaca.
- Zaštitne kutije s mamcem treba postaviti blizu mjesta na kojima je primijećena aktivnost glodavaca (npr. uz putove kretanja, rupe, jazbine).
- Gdje je moguće, zaštitne kutije s mamcem treba pričvrstiti na površinu ili neku konstrukciju/predmet.
- Zaštitne kutije s mamcem trebaju biti jasno označene kako bi bilo vidljivo da sadrže rodenticide i da ih se ne smije premjestiti ili otvoriti.
- Ako se proizvod koristi na javnim površinama, tretirana područja treba označiti tijekom razdoblja tretiranja te je pored mamaca potrebno postaviti obavijest o rizicima primarnog i sekundarnog otrovanja antikoagulantom, kao i mjerama koje je potrebno poduzeti u slučaju otrovanja.
- Mamac treba postaviti na način da ga glodavci ne mogu odvući iz zaštitne kutije.
- Zaštitne kutije s mamcem postaviti izvan dohvata djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih neciljanih organizama.
- Zaštitne kutije s mamcem postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i opreme ili površina koje su u dodiru s njima.
- Tijekom rukovanja proizvodom nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije.
- Ne otvarati pojedinačne vrećice koje sadrže mamce.
- Za proizvod u rinfuzi (proizvod u obliku zrna) koristiti pribor za doziranje. Odrediti metode koje će se koristiti kako bi se smanjilo nastajanje prašine (npr. brisanje mokrom krpom).
- Pri uporabi proizvoda ne jesti, piti ni pušiti.
- Oprati ruke i izloženu kožu nakon primjene proizvoda.
- Ako se konzumiranje mamaca nastavi i nakon 35 dana i ne primjećuje se smanjenje aktivnosti glodavaca, potrebno je odrediti vjerojatan uzrok tome. Kada se drugi razlozi isključe, postoji sumnja na otpornost glodavaca; tada treba razmotriti primjenu ne-antikogulantnog rodenticida ili klopki kao alternativne mjere za suzbijanje glodavaca.

- Nakon provedene deratizacije ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcem.

Osposobljeni profesionalni korisnici:

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o proizvodu, kao i sve informacije koje su isporučene uz proizvod ili na mjestu prodaje.

- Pregledati infestirano područje prije postavljanja mamaca i napraviti procjenu lokacije radi određivanja vrste glodavaca, njihovih mjesta aktivnosti i saznati vjerojatan uzrok i brojnost populacije.

- Ukloniti hranu kojoj glodavci mogu lako pristupiti (npr. ostaci hrane ili prosuti zrnati proizvodi). Ne čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda jer to može uznemiriti populaciju glodavaca i otežati prihvaćanje mamaca kao izvora hrane.

- Proizvod treba koristiti kao dio programa integriranog suzbijanja štetnika (IPM), uključujući između ostalog, higijenske mjere i fizičke metode kontrole (ako je moguće).

- Zaštitne kutije s mamcem treba postaviti blizu mjesta na kojima je primijećena aktivnost glodavaca (npr. uz putove kretanja, rupe, jazbine).

- Gdje je moguće, zaštitne kutije s mamcem treba pričvrstiti na površinu ili neku konstrukciju/predmet.

- Zaštitne kutije s mamcem trebaju biti jasno označene kako bi bilo vidljivo da sadrže rodenticide i da ih se ne smije premjestiti ili otvoriti.

- Ako se proizvod koristi na javnim površinama, tretirana područja treba označiti tijekom razdoblja tretiranja te je pored mamaca potrebno postaviti obavijest o rizicima primarnog i sekundarnog otrovanja antikoagulantom, kao i mjerama koje je potrebno poduzeti u slučaju otrovanja.

- Mamac treba postaviti na način da ga glodavci ne mogu odvući iz zaštitne kutije.

- Zaštitne kutije s mamcem postaviti izvan dohvata djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne ciljanih organizama.

- Zaštitne kutije s mamcem postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i opreme ili površina koje dolaze u dodir s njima.

- Tijekom rukovanja proizvodom nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije.

- Ne otvarati pojedinačne vrećice koje sadrže mamce.

- Za proizvod u rinfuzi (proizvod u obliku zrna) koristiti pribor za doziranje. Odrediti metode koje će se koristiti kako bi se smanjilo nastajanje prašine (npr. brisanje mokrom krpom).

- Pri uporabi proizvoda ne jesti, piti ni pušiti.

- Oprati ruke i izloženu kožu nakon primjene proizvoda.

- Učestalost posjeta tretiranog područja ovisi o procjeni izvoditelja, u skladu s izvidom provedenim na početku tretiranja. Navedena učestalost treba biti u skladu s preporukama primjenjivog Kodeksa dobre prakse.

- Ako je potrošnja mamca relativno slaba u odnosu na procijenjenu jačinu infestacije, treba razmotriti mogućnost premještanja mamca na druga mjesta ili promijeniti formulaciju mamca.

- Ako se konzumiranje mamaca nastavi i nakon 35 dana i ne primjećuje se smanjenje aktivnosti glodavaca, potrebno je odrediti vjerojatni uzrok tome. Kada se drugi razlozi isključe, postoji sumnja na otpornost glodavaca; tada treba razmotriti primjenu ne-antikogulantnog rodenticida ili klopki kao alternativne mjere za suzbijanje glodavaca.

- Nakon provedene deratizacije ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcem.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Neprofesionalni korisnici (amaterska uporaba)

- Potrebno je provoditi preventivne mjere: održavanje reda i čistoće u zatvorenom prostoru i okolišu kako bi se poboljšala primjena proizvoda i smanjila vjerojatnost ponovne pojave glodavaca.
- Proizvod ne koristiti kao trajni mamac za prevenciju infestacije glodavcima ili nadzor aktivnosti glodavaca.

U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji i/ili letku treba biti jasno navedeno sljedeće:

- Proizvod se koristi u odgovarajućim zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja.
- Zaštitne kutije s mamcem moraju biti jasno označene da sadrže rodenticide te da se ne smiju pomicati ni otvarati.
- Uporaba ovog proizvoda trebala bi suzbiti glodavce u roku od 35 dana.
- Ako proizvod do kraja tretmana ne pokaže učinkovitost, informacije o proizvodu, tj. deklaracija i/ili upute moraju jasno preporučiti da korisnik potraži savjet od dobavljača proizvoda ili nadležne službu za suzbijanje glodavaca (DDD).
- Potrebno je redovito nadzirati mjesta gdje su mamci postavljeni. Pojedeni mamac potrebno je nadomjestiti te ukloniti uginule glodavce.
- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce u skladu s propisima.

Profesionalni korisnici

- Ako je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.
- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce kod svakog pregleda mjesta postavljanja mamaca kako bi se smanjio rizik od sekundarnog trovanja.
- Proizvod ne koristiti kao trajni mamac za prevenciju infestacije glodavcima ili nadzor aktivnosti glodavaca.
- U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji i/ili letku jasno treba biti naznačeno da će se proizvod isporučivati samo profesionalnim korisnicima koji posjeduju certifikat kojim se dokazuje usklađenost s primjenjivim zahtjevima obuke (npr. „samo za profesionalne korisnike“).
- Proizvod se koristi u odgovarajućim zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja.
- Zaštitne kutije s mamcem moraju biti jasno označene da sadrže rodenticide.
- Uporaba ovog proizvoda trebala bi suzbiti glodavce u roku od 35 dana.
- Ako proizvod do kraja tretmana ne pokaže učinkovitost, informacije o proizvodu, tj. deklaracija i/ili upute moraju jasno preporučiti da korisnik potraži savjet od dobavljača proizvoda ili nadležne službu za suzbijanje glodavaca (DDD).
- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce u skladu s propisima.

Osposobljeni profesionalni korisnici

- Ako je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.
- U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji i/ili letku jasno treba biti naznačeno da će se proizvod isporučivati samo osposobljenim profesionalnim korisnicima koji posjeduju certifikat kojim se dokazuje usklađenost s primjenjivim zahtjevima obuke (npr. „samo za osposobljene profesionalne korisnike“).
- Ne koristiti na područjima gdje se sumnja da postoji otpornost na aktivnu tvar.
- Proizvod ne koristiti dulje od 35 dana bez provođenja procjene infestacije i učinkovitosti tretiranja.
- Za sprječavanje pojave otpornosti (rezistentnosti), primjenjivati naizmjenično antikoagulate različitog načina djelovanja ili drugačijeg načina djelovanja.
- Deratizacijske kutije i predmete korištene za prekrivanje mjesta postavljanja ne prati vodom između primjena.
- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce u skladu s propisima.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ovaj proizvod sadržava antikoagulantnu tvar.

Ako se proguta, simptomi se mogu pojaviti s odgodom i mogu uključivati krvarenje iz nosa i desni. U teškim slučajevima, mogu se pojaviti modrice i krv u urinu i stolici.

- Antidot: Vitamin K1 daje samo medicinsko/veterinarsko osoblje.

U slučaju:

- Dodira s kožom, oprati kožu vodom, a zatim vodom i sapunom.

- Dodira s očima, isprati oči odgovarajućom tekućinom ili vodom, držiti kapke otvorenim najmanje 10 minuta.

- Gutanja, oprezno isprati usta vodom. Osobi koja je u nesvijesti nikada ništa ne davati na usta. Ne izazivati povraćanje. Ako se proguta, odmah potražiti savjet liječnika i pokazati spremnik proizvoda ili deklaraciju.

Ako je životinja progutala proizvod, potražiti pomoć veterinaru.

Zaštitne kutije za mamce potrebno je označiti sljedećim informacijama: „ne pomicati i/ili otvarati”; „sadrži rodenticid”; „naziv proizvoda”; „aktivna tvar” i „u slučaju nesreće nazoviti Centar za kontrolu otrovanja na tel. 01/2348-342”.

Opasno za divlje životinje.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Na kraju provedene deratizacije neiskorištene mamce i ambalažu odložiti u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

Tijekom rukovanja proizvodom nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Skladištiti na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Spremnik držati zatvorenim i dalje od izravnog sunčevog svjetla.

Čuvati izvan dohvata djece, ptica, kućnih ljubimaca i domaćih životinja.

Rok uporabe proizvoda je 2 godine.

6. Ostale informacije

Antikoagulantni rodenticidi imaju odgođeni učinak djelovanja koji se može uočiti od 4 do 10 dana nakon konzumiranja mamca.

Glodavci mogu biti prijenosnici bolesti.

Uginule glodavce ne dirati golim rukama, koristiti zaštitne rukavice ili hvataljke kod skupljanja i njihova odlaganja.

Proizvod sadrži goroku tvar i boju.

Postregistracijski uvjeti:

- Studija stabilnosti proizvoda na 2 godine.