

# Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega proizvoda:** FERCE-CMT-10

**Vrsta(-e) proizvoda(-ov):** Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

**Številka dovoljenja:** SI-0030686-0000

**Referenčna številka vnosa v R4BP 3:** SI-0030686-0000

## Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	2
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	2
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	3
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	3
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	20
5.1. Navodila za uporabo	20
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	20
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	20
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	21
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	21
6. Druge informacije	21

## Upravne informacije

### 1.1. Trgovska imena proizvoda

FERCE-CMT-10
WACIP 1000
CYPTEN EC
CIPTEN CE
CMT10EC
EDELIKO CE
KAPUALIA EC
TAPTY 10 EC
SOLCIP 10 EC
SOLCIP 1000
TABULARASA CIP 10 EC
CYPEC
CYPEC 10
DTT CONCENTRATE
FERACTIVE 10 CE
FERTRINA 10 CE

### 1.2. Imetnik dovoljenja

<b>Ime in naslov imetnika dovoljenja</b>	Ime in priimek	FERBI S.r.l.
	Naslov	I Maggio 64023 Mosciano Sant'Angelo Italija
<b>Številka dovoljenja</b>	SI-0030686-0000	
<b>Referenčna številka vnosa v R4BP 3</b>	SI-0030686-0000	
<b>Datum dovoljenja</b>	16/03/2023	

Datum izteka  
veljavnosti dovoljenja

16/02/2033

### 1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca

FERBI S.r.l.

Naslov proizvajalca

Viale I Maggio 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Italija

Lokacije proizvodnje

FERBI S.r.l. - Viale I Maggio 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Italija

### 1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov

1283 - (RS)- $\alpha$ -ciano-3-fenoksibenzil-(1RS)- cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (cipermetrin)

Ime proizvajalca

Limaru NV (acting for Tagros Chemicals India Ltd)

Naslov proizvajalca

Paalsesteenweg 170 Bus 7 B-3583 Beringen Belgija

Lokacije proizvodnje

Tagros Chemicals India Private Ltd, Plant: A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam, Cuddalore 607 005 Tamil Nadu Indija

## 2. Sestava in formulacija proizvoda

### 2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
(RS)- $\alpha$ -ciano-3-fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (cipermetrin)		Aktivna snov	52315-07-8	257-842-9	10,53
DPM – methoxymethyl-ethoxy propanol	2-methoxymethyl-ethoxy propanol	Neaktivna snov	34590-94-8	252-104-2	54,47

## 2.2. Vrsta formulacije

EC - koncentrat za emulzijo

## 3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

### Stavki o nevarnosti

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Lahko škoduje organom živčni system pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti ..

### Previdnostni stavki

Preprečiti sproščanje v okolje.

Prestreči razlito tekočino.

Odstraniti posodo nacionalne ureditve.

Odstraniti vsebino nacionalne ureditve.

Ne vdihavati prahu.

Ne vdihavati dima.

Ne vdihavati plina.

Ne vdihavati meglice.

Ne vdihavati hlapov.

Ne vdihavati razpršila.

Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč.

Ob slabem počutju poiščite zdravniško oskrbo.

## 4. Dovoljena(e) uporaba

### 4.1 Opis uporabe

#### Uporaba 1 - Točkovni nanos proti plazečim žuželkam v zaprtih prostorih -Profesionalni uporabnik

#### Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

#### Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Točkovni nanos

#### Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Blattella germanica  
Splošno ime: Nemški ščurek  
Razvojni stadij: Odrasli osebki

	<p>Znanstveno ime: Blatta orientalis Splošno ime: Orientalški ščurki Razvojni stadij: Odrasli osebki</p> <p>Znanstveno ime: Lasius niger Splošno ime: Vrtna mravlja Razvojni stadij: Odrasli osebki</p>
<b>Področje uporabe</b>	Notranjost, znotraj
<b>Način(-i) uporabe</b>	<p>Metoda: Točkovni nanos s škropljenjem Podroben opis: Za obdelavo poroznih površin, uporabiti 10 g koncentriran izdelkom in razredčimo v 1 L vode (1%); temeljito premešajte in nanesite z ustreznim razpršilcem s količino 50 mL raztopina na 1 m<sup>2</sup></p> <p>Za obdelavo neporozne površine, uporabiti 5 g koncentriran izdelkom in razredčimo v 1 L vode (0.5%); temeljito premešajte in nanesite z ustreznim razpršilcem s količino 40 mL raztopina na 1 m<sup>2</sup>.</p> <p>Preostala količina: 4 tedni</p>
<b>Odmerki in pogostost uporabe</b>	<p>Odmerek: Poroznih površin: odmerek glede na zdravilno učinkovino je 52.7 mg t.g.a.i./m<sup>2</sup>. Neporozne površine: odmerek glede na zdravilno učinkovino je 21 mg t.g.a.i./m<sup>2</sup>. Redčenje (%): Število in časovni razpored uporabe: Zdravljenje se lahko izvaja do 2-krat na leto.</p>
<b>Skupina(-e) uporabnikov</b>	<p>Strokovnjak z licenco</p> <p>Poklicni</p>
<b>Velikosti in material embalaže</b>	<p>HDPE steklenica z merilnim pokrovčkom: 100, 250, 500, 1000, 2000 ml. HDPE steklenica z merilno komoro (steklenica z dvojnim vratom): 500, 1000 ml. HDPE Kanister : 5, 10, 20 L.</p>

#### 4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Izdelkom je treba uporabljati na omejenih območjih na površinah, ki se ne redno čistijo, na primer zadaj ali pod hladilnik, pod kuhinjskih korit, pod pečico ali grelnik vode, kjer se žuželke ponavadi skrivajo.

#### 4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ne uporabljajte na območjih, ki so dovzetna za rutina mokrega čiščenja.

Izogibajte se stiku z obdelanimi površinami.

V fazi ravnanja z izdelkom nosite zaščitne kemijsko odporne rokavice (material rokavic določi imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku).

Nositi je treba zaščitni kombinezon (vsaj tip X, EN XXXXX).

#### 4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

### 4.2 Opis uporabe

#### Uporaba 2 - Točkovni nanos proti plazečim žuželkam v zaprtih prostorih -Splošna javnost

##### Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

##### Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Točkovni nanos

##### Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: *Blattella germanica*  
Splošno ime: Nemški ščurek  
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: *Blatta orientalis*  
Splošno ime: Orientalni ščurki  
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: *Lasius niger*  
Splošno ime: Vrtna mravlja  
Razvojni stadij: Odrasli osebki

##### Področje uporabe

Notranjost, znotraj

## Način(-i) uporabe

Metoda: Točkovni nanos s škropljenjem

Podroben opis:

Pri poroznih površnin (npr. beton, opeka, lesena plastika, itd.) (52.7 mg t.g.a.i./m<sup>2</sup>)

- Steklenica z merilnim okencem: odmerite 1 mL izdelka in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m<sup>2</sup>

- Pakiranje za enkratno uporabo 1 mL: odprite tesnilo in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m<sup>2</sup>

- Sistem je pripravljen za redčenje: Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m<sup>2</sup>

- Kartušni sistem: Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m<sup>2</sup>

Pri non poroznih površnin (npr. plastika, kovina, keramika, itd.) (21 mg t.g.a.i./ m<sup>2</sup>):

- Steklenica z merilnim okencem: odmerite 0.5 mL izdelka in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 32 pršenj na m<sup>2</sup>.

- Pakiranje za enkratno uporabo 1 mL: odprite tesnilo in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 16 pršenj na m<sup>2</sup>.

- Sistem je pripravljen za redčenje: Dobro pretresite in opraviti 16 pršenj na m<sup>2</sup>.

- Kartušni sistem: Dobro pretresite in opraviti 16 pršenj na m<sup>2</sup>.

Preostala količina: 4 tedni:

## Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: Pri poroznih površnin 52.7 mg t.g.a.i./m<sup>2</sup>. Pri non poroznih površnin 21 mg t.g.a.i./ m<sup>2</sup>.

Redčenje (%):

Število in časovni raspored uporabe:

Zdravljenje se lahko izvaja do 2-krat na leto.

## Skupina(-e) uporabnikov

Splošna javnost (nepoklicna)

## Velikosti in material embalaže

Steklenica z merilnim okencem (20 mL)

Pakiranje za enkratno uporabo: 1 mL

Sistem je pripravljen za redčenje: 5 mL

Kartušni sistem: 5 mL



#### 4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Izdelkom je treba uporabljati na omejenih območjih na površinah, ki se ne redno čistijo, na primer zadaj ali pod hladilnik, pod kuhinjskih korit, pod pečico ali grelnik vode, kjer se žuželke ponavadi skrivajo.

Pri sistem je pripravljen za redčenje, odstranite ovrtnik, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljen z ustreznim sprožilcem.

Pri kartušni sistem, v steklenico dodajte 500 ml vode iz pipe, namestite kartušo v vrat steklenice, namestite sprožilec, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljen z ustreznim sprožilcem.

Pri steklenica z merilnim okencem in pakiranje za enkratno uporabo, uporabo se opravi s sprožilni razpršilec z odmerkom 1,25 ml/razpršilo. Ustrezna količina izdelka se doda potrebna količina vode in premeša

Za neprofesionalni uporabnik se predlaga vključitev naslednje omejitve: "Ubijanje ščurkov je predviden 4 ure po izpostavljenosti insektom na obdelane površine".

#### 4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ne uporabljajte na območjih, ki so dovzetna za rutina mokrega čiščenja.

Izogibajte se stiku z obdelanimi površinami

#### 4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

### 4.3 Opis uporabe

#### Uporaba 3 - Točkovni notranji v razpoke in špranje proti plazečim žuželkam -Profesionalni uporabnik

<b>Vrsta proizvoda</b>	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
<b>Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno</b>	Uporaba v razpoke in špranje
<b>Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)</b>	Znanstveno ime: Blattella germanica Splošno ime: Nemški ščurek Razvojni stadij: Odrasli osebki  Znanstveno ime: Blatta orientalis Splošno ime: Orientalski ščurki Razvojni stadij: Odrasli osebki  Znanstveno ime: Lasius niger Splošno ime: Vrtna mravlja Razvojni stadij: Odrasli osebki
<b>Področje uporabe</b>	Notranjost, znotraj
<b>Način(-i) uporabe</b>	Metoda: Obdelava razpoke in špranje s škropljenjem Podroben opis: Pri poroznih površin (npr. beton, opeka, lesena plastika, itd.) (52.7 mg t.g.a.i./m <sup>2</sup> ): uporabiti 10 g koncentriran izdelkom in razredčimo v 1 L vode (1%); temeljito premešajte in nanesite z ustreznim razpršilcem s količino 50 mL raztopina na 1 m <sup>2</sup> .  Pri neporozne površine (npr. plastika, kovina, keramika, itd.) (21 mg t.g.a.i./ m <sup>2</sup> ): uporabiti 5 g koncentriran izdelkom in razredčimo v 1 L vode (0.5%); temeljito premešajte in nanesite z ustreznim razpršilcem s količino 40 mL raztopina na 1 m <sup>2</sup> .  Preostala količina: 4 tedni
<b>Odmerki in pogostost uporabe</b>	Odmerek: Pri poroznih površin 52.7 mg t.g.a.i./m <sup>2</sup> . Pri neporozne površine 21 mg t.g.a.i./ m <sup>2</sup> . Redčenje (%): Število in časovni raspored uporabe: Zdravljenje se lahko izvaja do 2-krat na leto.
<b>Skupina(-e) uporabnikov</b>	Strokovnjak z licenco  Poklicni
<b>Velikosti in material embalaže</b>	HDPE steklenica z merilnim pokrovčkom: 100, 250, 500, 1000, 2000 mL.  HDPE steklenica z merilno komoro (steklenica z dvojnimi vratom): 500, 1000 mL.  HDPE Kanister : 5, 10, 20 L.

#### 4.3.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Nanesite na površine, razpoke in špranje, kot so: keramične ploščice, marmor, granit in druge površine v trd kamen, kovine (jeklo, železo itd.), plastika, steklo (npr. okenska stekla), pobarvane vezane plošče. Izdelkom nanesite neposredno v razpoke in špranje z razdalje 40 cm.

Izdelkom je treba uporabljati na omejenih območjih na površinah, ki se ne redno čistijo, na primer zadaj ali pod hladilnik, pod kuhinjskih korit, pod pečico ali grelnik vode, v vseh razpoke in špranje, ki so lahko zatočišče za ščurke in mravelj.

#### 4.3.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ne uporabljajte na območjih, ki so dovzetna za rutina mokrega čiščenja.

Izogibajte se stiku z obdelanimi površinami.

V fazi ravnanja z izdelkom nosite zaščitne kemijsko odporne rokavice (material rokavic določi imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku).

Nositi je treba zaščitni kombinezon (vsaj tip X, EN XXXXX).

#### 4.3.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.3.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.3.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.4 Opis uporabe

## Uporaba 4 - Točkovni notranji v razpoke in špranje proti plazečim žuželkam -Splošna javnost

### Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

### Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Obdelava razpoke in špranje s škropljenjem

### Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: *Blattella germanica*  
Splošno ime: Nemški ščurek  
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: *Blatta orientalis*  
Splošno ime: Orientalski ščurki  
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: *Lasius niger*  
Splošno ime: Vrtna mravlja  
Razvojni stadij: Odrasli osebki

### Področje uporabe

Notranjost, znotraj

### Način(-i) uporabe

Metoda: Obdelava razpoke in špranje s škropljenjem

Podroben opis:

Pri poroznih površnin (npr. beton, opeka, lesena plastika, itd.) (52.7 mg t.g.a.i./m<sup>2</sup>)

- Steklenica z merilnim okencem: odmerite 1 mL izdelka in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m<sup>2</sup>

- Pakiranje za enkratno uporabo 1 mL: odprite tesnilo in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m<sup>2</sup>

- Sistem je pripravljen za redčenje: Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m<sup>2</sup>

- Kartušni sistem: Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m<sup>2</sup>

Pri non poroznih površnin (npr. plastika, kovina, keramika, itd.) (21 mg t.g.a.i./ m<sup>2</sup>):

- Steklenica z merilnim okencem: odmerite 0.5 mL izdelka in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 32 pršenj na m<sup>2</sup>.

- Pakiranje za enkratno uporabo 1 mL: odprite tesnilo in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 16 pršenj na m<sup>2</sup>.

- Sistem je pripravljen za redčenje: Dobro pretresite in opraviti 16 pršenj na m<sup>2</sup>.

- Kartušni sistem: Dobro pretresite in opraviti 16 pršenj na m<sup>2</sup>.

Preostala količina: 4 tedni

<b>Odmerki in pogostost uporabe</b>	Odmerek: Pri poroznih površin 52.7 mg t.g.a.i./m2. Pri non poroznih površin 21 mg t.g.a.i./m2. Redčenje (%): Število in časovni raspored uporabe: Zdravljenje se lahko izvaja do 2-krat na leto.
<b>Skupina(-e) uporabnikov</b>	Splošna javnost (nepoklicna)
<b>Velikosti in material embalaže</b>	Steklenica z merilnim okencem (20 mL)  Pakiranje za enkratno uporabo: 1 mL  Sistem je pripravljen za redčenje: 5 mL  Kartušni sistem: 5 mL

#### 4.4.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Nanesite v domačih prostorih, razpoke in špranje, kot so: keramične ploščice, marmor, granit in druge površine v trd kamen, kovine (jeklo, železo itd.), plastika, steklo (npr. okenska stekla), pobarvane vezane plošče. Izdelkom nanesite neposredno v razpoke in špranje z razdalje 40 cm.

Izdelkom je treba uporabljati na omejenih območjih na površinah, ki se ne redno čistijo, na primer zadaj ali pod hladilnik, pod kuhinjskih korit, pod pečico ali grelnik vode, v vseh razpoke in špranje, ki so lahko zatočišče za ščurke in mravelj.

Za neprofesionalni uporabnik se predlaga vključitev naslednje omejitve: "Ubijanje ščurkov je predviden 4 ure po izpostavljenosti insektom na obdelane površine".

Pri sistem je pripravljen za redčenje, odstranite ovratnik, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljen z ustreznim sprožilcem.

Pri kartušni sistem, v steklenico dodajte 500 ml vode iz pipe, namestite kartušo v vrat steklenice, namestite sprožilec, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljen z ustreznim sprožilcem

Pri steklenica z merilnim okencem in pakiranje za enkratno uporabo, uporabo se opravi s sprožilni razpršilec z odmerkom 1,25 ml/razpršilo. Ustrezna količina izdelka se doda potrebna količina vode in premeša

#### 4.4.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ne uporabljajte na območjih, ki so dovzetna za rutina mokrega čiščenja  
Izogibajte se stiku z obdelanimi površinami.

#### 4.4.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.4.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.4.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

### 4.5 Opis uporabe

#### Uporaba 5 - Površinske ostanki obdelave okoli stavbe proti tigrasti komar -Profesionalni uporabnik

##### Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev  
(nadzor škodljivcev)

##### Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Izdelkom se uporablja na prostem okoli stavb na podeželju za zatiranje tigrastih komarjev.

##### Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Aedes albopictus  
Splošno ime: tigrasti komar  
Razvojni stadij: Odrasli osebk

##### Področje uporabe

	<p>Zunanost, zunaj</p> <p>Na prostem na podeželju</p>
<p><b>Način(-i) uporabe</b></p>	<p>Metoda: Razprševanje, površinske obdelave  Podroben opis:  Za tretiranje okoli stavbe do višine približno 50 cm do vključno 150 cm, skupina za zdravljenje visok približno en meter.</p> <p>uporabiti 2 g koncentriran izdelkom in razredčimo v 1 L vode (0.2%); temeljito premešajte in nanesite z ustreznim razpršilcem s količino 50 mL raztopina na 1 m<sup>2</sup>.</p> <p>Preostalo delovanje proizvoda traja 3 dni.</p>
<p><b>Odmerki in pogostost uporabe</b></p>	<p>Odmerek: Odmerek glede na zdravilno učinkovino je 10.5 mg t.g.a.i. /m<sup>2</sup>.  Redčenje (%):  Število in časovni raspored uporabe:  Zdravljenje se lahko izvaja do 2-krat na leto.</p>
<p><b>Skupina(-e) uporabnikov</b></p>	<p>Strokovnjak z licenco</p> <p>Poklicni</p>
<p><b>Velikosti in material embalaže</b></p>	<p>HDPE steklenica z merilnim pokrovčkom: 100, 250, 500, 1000, 2000 mL.</p> <p>HDPE steklenica z merilno komoro (steklenica z dvojnimi vratom): 500, 1000 mL.</p> <p>HDPE Kanister: 5, 10, 20 L.</p>

#### 4.5.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Izdelkom razredčite z vodo do 0,2 % w/v, temeljito premešajte in s pomočjo razpršilca v nahrbtniku ali naprave ustrezne nanesite 50 mL insekticid raztopina na m<sup>2</sup>.

Izdelkom je treba enakomerno nanesti na izbrani površini z razdalje 50 cm. Izdelkom deluje proti tigrastih komarjev s stikom in hlapi.

#### 4.5.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Izdelkom ne uporabljajte na območjih, ki so priključene na kanalizacijo, drenažna voda, jaški ali blizu njih

Ne uporabljajte v deževnem ali vetrovnem vremenu. Preprečiti izpostavljenost ne ciljnih organizmov (npr. razmislite o uporabi čez noč, ko oprashaľvalci, vključno s čebelami, niso aktivni, ne tretirajte rastlin v obdobju cvetenja).

V fazi ravnanja z izdelkom nosite zaščitne kemijsko odporne rokavice (material rokavic določi imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku).

Nositi je treba zaščitni kombinezon (vsaj tip X, EN XXXXX).

#### 4.5.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščitno okolja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.5.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.5.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.6 Opis uporabe

##### Uporaba 6 - Površinske ostanki obdelave okoli stavbe proti tigrasti komar -Splošna javnost

###### Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

###### Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Izdelkom se uporablja na prostem okoli stavb na podeželju za zatiranje komarji.

###### Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Aedes albopictus  
Splošno ime: tigrasti komar  
Razvojni stadij: Odrasli osebki

###### Področje uporabe

Zunanost, zunaj

Na prostem na podeželju.



## Način(-i) uporabe

Metoda: Razprševanje, površinske obdelave

Podroben opis:

Za tretiranje okoli stavbe do višine približno 50 cm do vključno 150 cm, skupina za zdravljenje visok približno en meter.

- Steklenica z merilnim okencem: odmerite 2 mL izdelka in prelijte s 1 L vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m<sup>2</sup>
- Pakiranje za enkratno uporabo 2 mL: odprite tesnilo in prelijte s 1 L vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m<sup>2</sup>
- Sistem je pripravljen za redčenje: Dobro pretresite in opraviti 8 pršenj na m<sup>2</sup>
- Kartušni sistem: Dobro pretresite in opraviti 8 pršenj na m<sup>2</sup>

Preostalo delovanje proizvoda traja 3 dni.

## Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: Odmerek glede na zdravilno učinkovino je 10.5 mg t.g.a.i./m<sup>2</sup>

Redčenje (%):

Število in časovni razpored uporabe:

Zdravljenje se lahko izvaja do 2-krat na leto.

## Skupina(-e) uporabnikov

Splošna javnost (nepoklicna)

## Velikosti in material embalaže

Steklenica z merilnim okencem: 20 mL

Pakiranje za enkratno uporabo: 2 mL

Sistem je pripravljen za redčenje: 5 mL

Kartušni sistem: 5 mL

### 4.6.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Izdelkom je treba enakomerno nanesti na izbrani površini z razdalje 50 cm. Izdelkom deluje proti tigrastih komarjev s stikom in hlapi.

Pri sistem je pripravljen za redčenje, odstranite ovrtnik, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljen z ustreznim sprožilcem.

Pri kartušni sistem, v steklenico dodajte 500 ml vode iz pipe, namestite kartušo v vrat steklenice, namestite sprožilec, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljen z ustreznim sprožilcem.

Pri steklenica z merilnim okencem in pakiranje za enkratno uporabo, uporabo se opravi s sprožilni razpršilec z odmerkom 1,25 ml/razpršilo. Ustrezna količina izdelka se doda potrebna količina vode in premeša

#### 4.6.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Izdelkom ne uporabljajte na območjih, ki so priključene na kanalizacijo, drenažna voda, jaški ali blizu njih.

Ne uporabljajte v deževnem ali vetrovnem vremenu. Preprečiti izpostavljenost neciljnih organizmov (npr. razmislite o uporabi čez noč, ko opraševalci, vključno s čebelami, niso aktivni, ne tretirajte rastlin v obdobju cvetenja).

#### 4.6.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.6.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.6.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

### 4.7 Opis uporabe

#### Uporaba 7 - Izkoreninjenje mravljišča -Profesionalni uporabnik

##### Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

##### Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Izdelkom se uporablja na prostem s škropljenjem za izkoreninjenje mravljišča.

##### Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Lasius niger  
Splošno ime: Vrtna mravlja  
Razvojni stadij: Odrasli osebki

<b>Področje uporabe</b>	Zunanost, zunaj
<b>Način(-i) uporabe</b>	Metoda: Uporabiti okoli gnezdo in na vhodu v gnezdo s škropljenjem. Z enim samim nanosom za uničenje gnezdo Podroben opis: Koncentriran izdelkom je treba razredčiti z vodo do 0.5% w/v pred uporabo.  Količina v insekticid raztopina (razredčene), ki jo je treba nanesti na vsako gnezdo je 25 g/gnezdo.
<b>Odmerki in pogostost uporabe</b>	Odmerek: Odmerek glede na zdravilno učinkovino je 13.2 mg t.g.a.i./ gnezdo Redčenje (%): Število in časovni razpored uporabe: Brez omejitev.
<b>Skupina(-e) uporabnikov</b>	Strokovnjak z licenco  Poklicni
<b>Velikosti in material embalaže</b>	HDPE steklenica z merilnim pokrovčkom: 100, 250, 500, 1000, 2000 mL.  HDPE steklenica z merilno komoro (steklenica z dvojnimi vratom): 500, 1000 mL.  HDPE Kanister: 5, 10, 20 L.

#### 4.7.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Izdelkom razredčite z vodo v priporočeni količini, temeljito premešajte in nanašajte s posebnim nebulatorjem za razpršitev raztopina. Izdelkom je treba uporabiti s količino 25 mL insekticid raztopina na gnezdo, nanešen okoli gnezdo in na vhodu v gnezdo at the entrance of the nest. Za optimalno učinkovitost tretiranja ne uporabljajte v primeru vetra ali dežja.

#### 4.7.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Obdelava enega samega gnezdo za nanosom.

V fazi ravnanja z izdelkom nosite zaščitne kemijsko odporne rokavice (material rokavic določi imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku).

Nositi je treba zaščitni kombinezon (vsaj tip X, EN XXXXX).

#### 4.7.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.7.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.7.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

### 4.8 Opis uporabe

#### Uporaba 8 - Izkoreninjenje mravljišča -Splošna javnost

##### Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

##### Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Izdelkom se uporablja na prostem s škropljenjem za izkoreninjenje mravljišča.

##### Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Lasius niger  
Splošno ime: Vrtna mravlja  
Razvojni stadij: Odrasli osebki

##### Področje uporabe

Zunanost, zunaj

##### Način(-i) uporabe

Metoda: Uporabiti okrog gnezdo in na vhodu v gnezdo, s škropljenjem. Z enim samim nanosom za uničenje gnezdo.

Podroben opis:

- Pakiranje za enkratno uporabo 1 mL: odprite tesnilo in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 10 pršenj na gnezdo

- Sistem je pripravljen za redčenje: Dobro pretresite in opraviti 10 pršenj na gnezdo

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartušni sistem: Dobro pretresite in opraviti 10 pršenj na gnezdo.</li> </ul>
<b>Odmerki in pogostost uporabe</b>	<p>Odmerek: Odmerek glede na zdravilno učinkovino je 13.2 mg t.g.a.i./ gnezdo</p> <p>Redčenje (%):</p> <p>Število in časovni raspored uporabe:</p> <p>Brez omejitev.</p>
<b>Skupina(-e) uporabnikov</b>	Splošna javnost (nepoklicna)
<b>Velikosti in material embalaže</b>	<p>Pakiranje za enkratno uporabo: 1 mL</p> <p>Sistem je pripravljen za redčenje: 5 mL</p> <p>Kartušni sistem: 5 mL</p>

#### 4.8.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Pri sistem je pripravljen za redčenje, odstranite ovrtnik, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljen z ustreznim sprožilcem.

Pri kartušni sistem, v steklenico dodajte 500 ml vode iz pipe, namestite kartušo v vrat steklenice, namestite sprožilec, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljen z ustreznim sprožilcem.

Pri pakiranje za enkratno uporabo, uporabo se opravi s sprožilni razpršilec z odmerkom 1,25 ml/razpršilo. Ustrezna količina izdelka se doda potrebna količina vode in premeša

Izdelkom je treba uporabiti v priporočeni količini, okoli gnezdo in na vhodu v gnezdo. Za optimalno učinkovitost tretiranja ne uporabljajte v primeru vetra ali dežja.

#### 4.8.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Obdelava enega samega gnezdo za nanosom.

#### 4.8.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### **4.8.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### **4.8.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja**

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

### **5. Splošna navodila za uporabo**

#### **5.1. Navodila za uporabo**

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa priložena navodila.

#### **5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Izdelkom je treba uporabljati tako, da otroci, rejne živali in hišnih ljubljencev, zlasti mačke, ne pridejo v stik z izdelkom. Mačke držite stran od obdelane površine. Zaradi posebne občutljivosti do piretroidi, izdelkom lahko povzroči pri mačkah hude neželene reakcije.

Pred uporabo odstranite ali pokrijte terarije, akvarije in živalske kletke. Med pršenjem izklopite zračni filter v akvariju

Hranite zunaj dosega otrok in hišnih ljubljencev.

Nezainteresirane osebe, otrok in hišnih ljubljencev držite stran od obdelane površine/območja, dokler se površine ne posušijo.

Ne pršite na ljudi ali hišnih ljubljencev.

Za uporabo v zaprtih prostorih za zatiranje tigrasti komar:

- N-122 Pokrijte vse površine in prostore, ki bodo verjetno prišli v stik z živili, krmo in pitno vodo.

- N-127 Ne nanašajte neposredno na živila, krmo ali pijačo ter ga ne uporabljajte na površinah ali orodjih, ki bi lahko prišla v stik z živili, krmo, pijačo in živino/hišnih ljubljencev.

- N-132 Ne nanašajte neposredno na površine ali prostore, na katerem je shranjeni, pripravljeno ali zaužito hrano ali krmo.

- N-301 Ne shranjujte v bližini hrane, pijače in živalske krme.

Glej zgoraj podrobno opisane ukrepe za zmanjševanje tveganja.

#### **5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

- Piretroidi in piretrini lahko povzročijo parestezijo (pekoč občutek in zbadanje kože brez draženja). Če simptomi ne izginejo, poiščite zdravniško pomoč

- PRI VDIHAVANJU: Če se pojavijo simptomi, takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

- PRI ZAUŽITJU: Če se pojavijo simptomi, takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

- PRI STIKU S KOŽO: Če se pojavijo simptomi, takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

- PRI STIKU Z OČMI: Če se pojavijo simptomi, sperite z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

- Ne izpuščajte izdelkom ali prazne posode v okolje.

#### 5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi predpisi o ravnanju z odpadki.

Ne izprazniti v kanalizacijo. Ne uporabljajte prazne embalaže.

#### 5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hranite zunaj dosega otrok. Shranjujte ločeno od hrane, pijače ali živilo.

Shelf-life: 2 years, in original container at room temperatures. Izogibajte se ekstremne temperature in izpostavljenosti neposredni sončni. Zaščititi pred zmrzaljo.

#### 6. Druge informacije

Vsebuje cypermethrin; lahko povzročijo parestezijo.