

# Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

**Productnaam:** ULTIMA GRAIN

**Productsoort(en):** PT 14 - Rodenticiden

PT 14 - Rodenticiden

PT 14 - Rodenticiden

PT 14 - Rodenticiden

PT 14 - Rodenticiden

PT 14 - Rodenticiden

PT 14 - Rodenticiden

PT 14 - Rodenticiden

PT 14 - Rodenticiden

**Toelatingsnummer:** BE2019-0004

**Referentienummer van de asset  
in R4BP 3:** BE-0019783-0000

## Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	19
5.1. Gebruiksvoorschrift	19
5.2. Risicobeperkende maatregelen	20
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	21
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	22
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	22
6. Overige informatie	22

## Administratieve informatie

### 1.1. Handelsnaam van het product

DIVINA GRAIN
BRODI-KILL
RODI-BRO GRAINS
ULTIMA GRAIN
OPALE GRAIN
RACAN GRAIN BR25
GRAIN BR25

### 1.2. Toelatingshouder

<b>Naam en adres van de toelatingshouder</b>	Naam	LODI S.A.S.
	Adres	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Frankrijk
<b>Toelatingsnummer</b>	BE2019-0004	
<b>Referentienummer van de asset in R4BP 3</b>	BE-0019783-0000	
<b>Toelatingsdatum</b>	15/07/2014	
<b>Vervaldatum</b>	15/03/2023	

### 1.3. Fabrikant(en) van de biociden

<b>Naam van de fabrikant</b>	LODI SAS
<b>Adres van de fabrikant</b>	Parc d'activités des 4 routes 35390 GRAND FOUGERAY Frankrijk
<b>Productielocatie</b>	Parc d'activités du Pays du Grand Fougeray Espace Nord 24 et 26 rue des Pionniers 35390 Grand Fougeray Frankrijk

#### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

<b>Werkzame stof</b>	11 - Brodifacum
<b>Naam van de fabrikant</b>	PELGAR International Ltd
<b>Adres van de fabrikant</b>	Unit 13, Newmann Lane Industrial Estate Alton GU34 2 QR Ampshire Verenigd Koninkrijk
<b>Productielocatie</b>	Prazska 280 02 Kolin Tsjechische Republiek

## 2. Productsamenstelling en -formulering

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Brodifacum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-napthyl]-4-hydroxycoumarin	Werkzame stof	56073-10-0	259-980-5	0,0025

### 2.2. Formuleringstype

RB - Lokmiddel (klaar voor gebruik)

## 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

**Gevarencategorie**

Kan schade aan organen (bloed) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .

**Veiligheidsaanbevelingen**

Stof niet inademen.  
 Bij onwel voelen een arts raadplegen.  
 naar

**4. Toegelaten gebruik****4.1 Omschrijving van het gebruik****Gebruik 1 - Huismuizen en/of ratten – gereserveerd voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid – binnen**

<b>Productsoort</b>	PT 14 - Rodenticiden
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	Niet relevant voor rodenticiden
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	<p>Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus          Triviale naam: Bruine rat          Ontwikkelingsstadia: Adulten en juvenielen</p> <p>Wetenschappelijke naam: Mus musculus          Triviale naam: huismuizen          Ontwikkelingsstadia: Adulten en juvenielen</p> <p>Wetenschappelijke naam: Rattus rattus          Triviale naam: zwarte of dakrat          Ontwikkelingsstadia: Adulten en juvenielen</p>
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	<p>Lokaas toepassing - formulering van het aas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kant-en-klaar lokaas dat moet worden uitgelegd in tamper-resistent lokaasdozen</li> <li>• afgedekte en beschermde lokaas punten</li> </ul>
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	<p>Ratten: 50 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 5 - 10 meter te zijn; MUIZEN: 25 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 2 - 5 meter te zijn. - - -</p> <p>MUIZEN          Geringe plaag – 25 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 5 meter te zijn.          Grote plaag – 25 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 2 meter te zijn.          RATTEN</p>

Geringe plaag – 50 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 10 meter te zijn.  
Grote plaag – 50 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 5 meter te zijn.

#### Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

#### Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

##### Gram verpakt lokaas in zakjes van 25 of 50 g (PE / PP) of los in bulk

##### **Emmer met zakjes (PP, PE):**

25 g: 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg

50 g: 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg

##### **Kartonnen doos met zakjes :**

25 g: 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg

50 g: 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg

##### **Verpakkingsmateriaal (bulk):**

Kartonnen doos / zak met PE binnenwand: 5 kg, 10 kg, 20 kg (min 3 kg)

#### 4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode  
Volg de aanvullende instructies van de bijbehorende code van goede praktijk.

#### 4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Informeel indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke good practice code, indien beschikbaar].

Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.

Om het risico van secundaire vergiftiging te verminderen, moet u regelmatig knaagdierkarkassen zoeken en verwijderen tijdens de behandelingsperiode, in overeenstemming met de overeenkomstige praktijkcode.

Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.

Gebruik het product niet in pulsed baiting lokaasbehandelingen, in overeenstemming met de toepasselijke code van goede praktijk

#### 4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Wanneer lokaaskisten dicht bij afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

#### 4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 5.4

#### 4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie 5.5

### 4.2 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 2 - Muizen en/of ratten – gereserveerd voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid – buiten rond gebouwen

<b>Productsoort</b>	PT 14 - Rodenticiden
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	Niet relevant voor rodenticiden
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: Adulten en juvenielen  Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: huismuizen Ontwikkelingsstadia: Adulten en juvenielen  Wetenschappelijke naam: Rattus rattus Triviale naam: zwarte of dakrat Ontwikkelingsstadia: Adulten en juvenielen
<b>Toepassingsgebied</b>	Buiten  rond gebouwen
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Lokaas toepassing - formulering van het aas <ul style="list-style-type: none"><li>• Kant-en-klaar lokaas dat moet worden uitgelegd in tamper-resistent lokaasdozen</li><li>• afgedekte en beschermd lokaas punten</li></ul>
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	Ratten: 50 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 5 - 10 meter te zijn; MUIZEN: 25 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 2 - 5 meter te zijn. - - -

	<p>MUIZEN  Geringe plaag – 25 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 5 meter te zijn.  Grote plaag – 25 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 2 meter te zijn.</p> <p>RATTEN  Geringe plaag – 50 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 10 meter te zijn.  Grote plaag – 50 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 5 meter te zijn.</p>
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Professioneel
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	<p><b>Gram verpakt lokaas in zakjes van 25 of 50 g (PE / PP) of los in bulk</b></p> <p><b>Emmer met zakjes (PP, PE):</b>  <u>25 g:</u> 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg  <u>50 g:</u> 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg</p> <p><b>Kartonnen doos met zakjes :</b></p> <p><u>25 g:</u> 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg  <u>50 g:</u> 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg</p> <p><b><u>Verpakkingsmateriaal (bulk):</u></b>  Kartonnen doos / zak met PE binnenwand: 5 kg, 10 kg, 20 kg (min 3 kg)</p>

#### 4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Bescherm lokaas tegen weersomstandigheden. Plaats de lokaaspunten in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden. Vervang lokaas in lokaaspunten waar lokaas beschadigd is door water of verontreinigd is door vuil.  
*Voor gebruik buitenshuis moeten lokaaspunten worden bedekt en op locaties worden geplaatst om de blootstelling van niet-doelsoorten tot een minimum te beperken.*  
Volg de aanvullende instructies van de bijbehorende code van goede praktijk.

#### 4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Informeel indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke good practice code, indien beschikbaar].

Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.  
Om het risico van secundaire vergiftiging te verminderen, moet u regelmatig knaagdierkarkassen zoeken en verwijderen tijdens de



behandelingsperiode, in overeenstemming met de overeenkomstige praktijkcode.  
 Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.  
 Gebruik het product niet in pulsed baiting lokaasbehandelingen, in overeenstemming met de toepasselijke code van goede praktijk  
 Dit product niet direct in de holen toepassen.

#### 4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Wanneer lokaaskisten dicht bij afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

#### 4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 5.4

#### 4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie 5.5

### 4.3 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 3 - Muizen en/of ratten – gereserveerd voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid - Open gebieden & vuilstortplaatsen

<b>Productsoort</b>	PT 14 - Rodenticiden
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	Niet relevant voor rodenticiden
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	<p>Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus          Triviale naam: Bruine rat          Ontwikkelingsstadia: Adulten en juvenielen</p> <p>Wetenschappelijke naam: Rattus rattus          Triviale naam: zwarte of dakrat          Ontwikkelingsstadia: Adulten en juvenielen</p> <p>Wetenschappelijke naam: Mus musculus          Triviale naam: Huismuizen          Ontwikkelingsstadia: Adulten en juvenielen</p>
<b>Toepassingsgebied</b>	<p>Buiten</p> <p>Overig</p> <p>Open gebied          Vuilstortplaatsen</p>
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Lokaas toepassing - formulering van het aas

- Kant-en-klaar lokaas dat moet worden uitgelegd in tamper-resistent lokaasdozen
- afgedekte en beschermde lokaas punten

### Dosering en frequentie van de toepassing

Ratten: 50 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 5 - 10 meter te zijn; MUIZEN: 25 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 2 - 5 meter te zijn. - - -

#### MUIZEN

Geringe plaag – 25 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 5 meter te zijn.

Grote plaag – 25 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 2 meter te zijn.

#### RATTEN

Geringe plaag – 50 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 10 meter te zijn.

Grote plaag – 50 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 5 meter te zijn.

### Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

### Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

**Gram verpakt lokaas in zakjes van 25 of 50 g (PE / PP) of los in bulk**

#### **Emmer met zakjes (PP, PE):**

25 g: 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg

50 g: 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg

#### **Kartonnen doos met zakjes :**

25 g: 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg

50 g: 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg

#### **Verpakkingsmateriaal (bulk):**

Kartonnen doos / zak met PE binnenwand: 5 kg, 10 kg, 20 kg (min 3 kg)

### 4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Bescherm lokaas tegen weersomstandigheden. Plaats de lokaaspunten in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden. Vervang lokaas in lokaaspunten waar lokaas beschadigd is door water of verontreinigd is door vuil. Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode. *Voor gebruik buitenshuis moeten lokaaspunten worden bedekt en op locaties worden geplaatst om de blootstelling van niet-doelsoorten tot een minimum te beperken.* Volg de aanvullende instructies van de bijbehorende code van goede praktijk.

### 4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Informeert indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke good practice code, indien beschikbaar].

Om het risico van secundaire vergiftiging te verminderen, moet u regelmatig knaagdierkarkassen zoeken en verwijderen tijdens de behandelingsperiode, in overeenstemming met de overeenkomstige praktijkcode.  
Dit product niet direct in de hollen toepassen.

### 4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Wanneer lokaaskisten dicht bij afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

### 4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 5.4

### 4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie 5.5

## 4.4 Omschrijving van het gebruik

### Gebruik 4 - Huismuizen – professionele gebruiker – binnen

<b>Productsoort</b>	PT 14 - Rodenticiden
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	Niet relevant voor rodenticiden
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Wetenschappelijke naam: <i>Mus musculus</i> Triviale naam: huismuizen Ontwikkelingsstadia: Adulten en juvenielen
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Lokaas toepassing - Kant-en-klaar lokaas dat moet worden uitgelegd in tamper-resistent lokaasdozen

## Dosering en frequentie van de toepassing

25 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 2 - 5 meter te zijn. - - -  
MUIZEN  
Geringe plaag – 25 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 5 meter te zijn.  
Grote plaag – 25 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 2 meter te zijn.

## Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

## Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

**Gram verpakt lokaas in zakjes van 25 of 50 g (PE / PP) of los in bulk**

### **Emmer met zakjes (PP, PE):**

*25 g: 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg*

*50 g: 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg*

### **Kartonnen doos met zakjes :**

*25 g: 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg*

*50 g: 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg*

### **Verpakkingsmateriaal (bulk):**

Kartonnen doos / zak met PE binnenwand: 5 kg, 10 kg, 20 kg (min 3 kg)

## 4.4.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

De lokaasstations dienen aan het begin van de behandeling ten minste om de 2 à 3 dagen te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de lokaasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.  
Volg de aanvullende instructies van de bijbehorende code van goede praktijk.

## 4.4.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie 5.2

## 4.4.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Wanneer lokaaskisten dicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

#### 4.4.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 5.4

#### 4.4.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie 5.5

### 4.5 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 5 - Ratten - Professionele gebruiker - Binnen

<b>Productsoort</b>	PT 14 - Rodenticiden
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	Niet relevant voor rodenticiden
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: Adulten en juvenielen  Wetenschappelijke naam: Rattus rattus Triviale naam: zwarte of dakrat Ontwikkelingsstadia: Adulten en juvenielen
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Lokaas toepassing - Kant-en-klaar lokaas dat moet worden uitgelegd in tamper-resistent lokaasdozen
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	50 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 5 - 10 meter te zijn - - - Rats 50 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 5 - 10 meter te zijn.
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Professioneel
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	<b>Gram verpakt lokaas in zakjes van 25 of 50 g (PE / PP) of los in bulk</b>  <b>Emmer met zakjes (PP, PE):</b> <u>25 g:</u> 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9

kg, 9.5 kg, 10 kg  
50 g: 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg

**Kartonnen doos met zakjes :**

25 g: 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg

50 g: 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg

**Verpakkingsmateriaal (bulk):**

Kartonnen doos / zak met PE binnenwand: 5 kg, 10 kg, 20 kg (min 3 kg)

#### 4.5.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

De lokaasstations dienen pas 5 tot 7 dagen na het begin van de behandeling te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de lokaasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Volg de aanvullende instructies van de bijbehorende code van goede praktijk.

#### 4.5.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie 5.2

#### 4.5.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Wanneer lokaaskisten dicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

#### 4.5.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 5.4

#### 4.5.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie 5.5

#### 4.6 Omschrijving van het gebruik

**Gebruik 6 - Huismuizen en/of ratten - Professionele gebruiker - Buiten rond gebouwen**

<b>Productsoort</b>	PT 14 - Rodenticiden
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	<p>Niet relevant voor rodenticiden</p> <p>Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: Adulten en juvenielen</p> <p>Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: Huismuizen Ontwikkelingsstadia: Adulten en juvenielen</p> <p>Wetenschappelijke naam: Rattus rattus Triviale naam: zwarte of dakrat Ontwikkelingsstadia: Adulten en juvenielen</p>
<b>Toepassingsgebied</b>	<p>Buiten</p> <p>Buiten rond gebouwen</p>
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Lokaas toepassing - Kant-en-klaar lokaas dat moet worden uitgelegd in tamper-resistent lokaasdozen
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	<p>Ratten: 50 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 5 - 10 meter te zijn. MUIZEN: 25 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 2 - 5 meter te zijn. - - -</p> <p>RATTEN: 50 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 5 - 10 meter te zijn. MUIZEN: 25 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 2 - 5 meter te zijn.</p>
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Professioneel
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	<p><b>Gram verpakt lokaas in zakjes van 25 of 50 g (PE / PP) of los in bulk</b></p> <p><b>Emmer met zakjes (PP, PE):</b>  <u>25 g:</u> 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg  <u>50 g:</u> 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg</p> <p><b>Kartonnen doos met zakjes :</b>  <u>25 g:</u> 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg  <u>50 g:</u> 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg</p> <p><b>Verpakkingsmateriaal (bulk):</b> Kartonnen doos / zak met PE binnenwand: 5 kg, 10 kg, 20 kg (min 3 kg)</p>

#### 4.6.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Bescherm lokaas tegen weersomstandigheden. Plaats de lokaaspunten in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden.

De lokaasstations dienen aan het begin van de behandeling [voor ratten – pas 5 tot 7 dagen na het begin van de behandeling] [voor muizen

ten minste om de 2 à 3 dagen] te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de lokaasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.

Vervang lokaas in lokaaspunten waar lokaas beschadigd is door water of verontreinigd is door vuil.

Volg de aanvullende instructies van de bijbehorende code van goede praktijk.

#### 4.6.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Dit product niet direct in de holen toepassen.

#### 4.6.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Wanneer lokaaskisten dicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

#### 4.6.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 5.4

#### 4.6.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie 5.5

#### 4.7 Omschrijving van het gebruik

##### Gebruik 7 - Huismuizen – breed publiek – Binnen

Productsoort

PT 14 - Rodenticiden

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Niet relevant voor rodenticiden



<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: huismuizen Ontwikkelingsstadia: Adulten en juvenielen
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen  Binnen
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Lokaas toepassing - Kant-en-klaar lokaas dat moet worden uitgelegd in tamper-resistent lokaasdozen
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	25 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 2 - 5 meter te zijn. - - - Geringe plaag – 25 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 5 meter te zijn. Grote plaag – 25 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 2 meter te zijn.
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Breed publiek (niet-professioneel)
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	<b>Lokaas in individuele zakjes (PE/PP) van 25, 50 en 100 g in :</b> - voorgevulde lokaasstations (PVC/PP/PS), secundaire verpakking: karton (50, 100, 150 g) - kartonnen doos: 50, 75, 100, 125, 150 g - plastic zak/pot (PE/PP): 50, 75, 100, 125, 150 g - metalen doos: 50, 75, 100, 125, 150 g

#### 4.7.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

De lokaasstations dienen aan het begin van de behandeling ten minste om de 2 à 3 dagen te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de lokaasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.

#### 4.7.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie 5.2

#### 4.7.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie 5.3

#### 4.7.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 5.4

#### 4.7.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie 5.5

### 4.8 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 8 - Ratten – breed publiek – Binnen

<b>Productsoort</b>	PT 14 - Rodenticiden
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	Niet relevant voor rodenticiden
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: Adulten en juvenielen  Wetenschappelijke naam: Rattus rattus Triviale naam: zwarte of dakrat Ontwikkelingsstadia: Adulten en juvenielen
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Lokaas toepassing - Kant-en-klaar lokaas dat moet worden uitgelegd in tamper-resistent lokaasdozen
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	50 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 5 - 10 meter te zijn - - - 50 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 5 - 10 meter te zijn
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Breed publiek (niet-professioneel)
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	<b>Lokaas in individuele zakjes (PE/PP) van 25, 50 en 100 g in :</b> - voorgevulde lokaasstations (PVC/PP/PS), secundaire verpakking: karton (50, 100, 150 g) - kartonnen doos: 50, 75, 100, 125, 150 g - plastic zak/pot (PE/PP): 50, 75, 100, 125, 150 g - metalen doos: 50, 75, 100, 125, 150 g

--

#### 4.8.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

De lokaasstations dienen pas 5 tot 7 dagen na het begin van de behandeling te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de lokaasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen.

#### 4.8.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie 5.2

#### 4.8.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie 5.3

#### 4.8.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 5.4

#### 4.8.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie 5.5

### 4.9 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 9 - Ratten – breed publiek – buiten rond gebouwen

##### Productsoort

PT 14 - Rodenticiden

##### Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Niet relevant voor rodenticiden

##### Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus  
Triviale naam: Bruine rat  
Ontwikkelingsstadia: Adulten en juvenielen

Wetenschappelijke naam: Rattus rattus  
Triviale naam: zwarte of dakrat  
Ontwikkelingsstadia: Adulten en juvenielen

<b>Toepassingsgebied</b>	Buiten  rond gebouwen
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Lokaas toepassing - Kant-en-klaar lokaas dat moet worden uitgelegd in tamper-resistent lokaasdozen
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	50 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 5 - 10 meter te zijn - - - 50 g lokaas per lokaasstation. Als er meer dan één lokaasstation nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasstations 5 - 10 meter te zijn.
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Breed publiek (niet-professioneel)
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	<b>Lokaas in individuele zakjes (PE/PP) van 25, 50 en 100 g in :</b> - voorgevulde lokaasstations (PVC/PP/PS), secundaire verpakking: karton (50, 100, 150 g) - kartonnen doos: 50, 75, 100, 125, 150 g - plastic zak/pot (PE/PP): 50, 75, 100, 125, 150 g - metalen doos: 50, 75, 100, 125, 150 g

#### 4.9.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Bescherm lokaas tegen weersomstandigheden. Plaats de lokaaspunten in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden. Vervang lokaas in lokaaspunten waar lokaas beschadigd is door water of verontreinigd is door vuil. De lokaasstations dienen pas 5 à 7 dagen na het begin van de behandeling te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de lokaasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.

#### 4.9.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie 5.2

#### 4.9.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie 5.3

#### 4.9.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 5.4

#### **4.9.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Zie 5.5

## **5. Algemene gebruiksaanwijzing**

### **5.1. Gebruiksvoorschrift**

**Professionele gebruiker (met met aangetoonde gevorderde bekwaamheid)**

Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken.

Voer voorafgaand aan de behandeling een onderzoek uit in het geïnfesteeerde gebied en een beoordeling ter plekke om te bepalen om welke knaagdiersoort het gaat en waar de knaagdieren actief zijn, en om de waarschijnlijke oorzaak en de ernst van de plaag te achterhalen.

Verwijder voedsel dat bereikbaar is voor knaagdieren (bijvoorbeeld gemorst graan of voedselafval). Maak afgezien daarvan het geïnfesteeerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt.

Het product mag uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd plaagbeheersysteem (IPM), met onder andere hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke bestrijdingsmethoden

Het product dient te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar eerder knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, voerplaatsen, hopen, nesten enz.).

Waar mogelijk moeten de lokaaskisten aan de grond of aan andere structuren worden vastgemaakt.

Lokaaskisten moeten duidelijke etiketten hebben waarop staat dat ze rodenticiden bevatten en dat ze niet verplaatst of geopend mogen worden (zie rubriek 5.3 voor de informatie die op het etiket moet staan).

Wanneer het product wordt gebruikt op openbare plaatsen, moeten de behandelde gebieden worden gemeld tijdens de behandelingsperiode en moet een aantekening worden verstrekt waarin het risico van primaire of secundaire vergiftiging door het anticoagulans wordt uiteengezet, evenals de eerste stappen die moeten worden genomen in geval van vergiftiging. In de buurt van aas worden geplaatst.

Het lokaas dient zo vast gemaakt te worden dat het niet weggesleept kan worden van de lokaaskist.

Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten.

Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee.

Draag beschermende handschoenen bij het uitvoeren van alle taken waarbij contact met het product mogelijk is (materiaal van de handschoenen nader te bepalen door de toelatingshouder in de productinformatie).

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van dit product.

**Professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid** De frequentie van bezoeken aan het behandelde gebied moet worden bepaald naar eigen goeddunken professional of gecertificeerde gebruiker, in het licht van het onderzoek aan het begin van de behandeling, in overeenstemming met de relevante code (code of best practice).

Als de inname van het lokaas laag is ten opzichte van de schijnbare omvang van de plaag, overweeg dan verplaatsing van de lokaaskistennaar verderop gelegen plaatsen en de mogelijkheid om over te gaan op een andere lokaasformulering.

Als het lokaas na een behandelingsperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt en geen afname in knaagdieractiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld. Wanneer andere elementen zijn uitgesloten, is het waarschijnlijk dat er resistente knaagdieren zijn. Overweeg dan het gebruik van een niet-bloedverdünnende rodenticide, als die beschikbaar is, of een sterkere bloedverdünnende rodenticide. Overweeg ook het gebruik van vallen als alternatieve beheersingsmaatregel.

**Professioneel gebruiker:** Overweeg preventieve controlemaatregelen (bijv. Pluggaten, verwijder potentiële voedingsmiddelen en drink zoveel mogelijk) om de inname van producten te verbeteren en het risico op hernieuwde invasie te verkleinen.

**Professioneel gebruiker:** Verwijder aan het einde van de behandelingsperiode de overblijvende lokaas- of lokaasstations. Zakjes met het lokaas niet openen

**Breed publiek**

Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken.

Voorafgaand aan het gebruik van rodenticiden dienen niet-chemische bestrijdingsmethoden (bijvoorbeeld vallen) te worden overwogen.

Verwijder voedsel dat bereikbaar is voor knaagdieren (bijvoorbeeld gemorst graan of afval). Maak afgezien daarvan het geïnfesteeerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt.

Lokaasdozen dienen te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van waar knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, nesten, voerplaatsen, hopen enz.).

Waar mogelijk moeten de lokaasdozen aan de grond of andere structuren worden vastgemaakt.

De zakjes met het lokaas niet openen

Plaats lokaasdozen buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten.

Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee.

Plaats lokaasdozen niet in de buurt van afwateringsystemen waar ze met water in contact kunnen komen.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van het product.

Verwijder het resterende lokaas of de lokaasdozen aan het einde van de behandelingsperiode.

## 5.2. Risicobeperkende maatregelen

**Professioneel gebruiker (met aangetoonde gevorderde bekwaamheid)**

Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstaanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke good practice code, indien beschikbaar]"

In de productinformatie (d.w.z. het etiket en/of de bijsluiter) moet duidelijk worden vermeld dat het product enkel gebruikt mag worden door opgeleide professionele gebruikers die in het bezit zijn van een certificering die aantoont dat ze aan de vereiste opleidingsvereisten voldoen (bijv. "enkel voor professionele gebruikers met aangetoonde gevorderde bekwaamheid").

**Professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid:** Niet gebruiken op plaatsen waar eventueel resistentie tegen de werkzame stof kan voorkomen.

Producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en de doeltreffendheid van de behandeling.

**Professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid:** Gebruik met het oog op resistentiemanagement geen verschillende bloedverdünnende middelen met overeenkomstige of zwakkere potentie door elkaar. Kies voor afwisselend gebruik een niet-bloedverdünnende rodenticide, indien een dergelijk product beschikbaar is, of een krachtiger bloedverdünnend middel. Reinig tussen het toepassen de lokaaskisten niet met water.

Verwijder dode knaagdieren in overeenstemming met lokale vereisten [Dode knaagdieren moeten afgevoerd en vernietigd worden door een hiertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming].

**Professioneel gebruiker:** Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen (bijv. ten minste twee keer per week) dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging tegen te gaan.

**Professioneel gebruiker:** Gebruik lokaas dat werkzame bloedverdünnende stoffen bevat niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.

**Professioneel gebruiker:** De productinformatie (d.w.z. etiket en/of bijsluiter) dient duidelijk te vermelden dat:

- Het product mag niet aan het algemene publiek worden geleverd (bijv. "uitsluitend voor professionals").

- het product dient te worden gebruikt in daarvoor geschikte verzegelde lokaasstations (bijv. "uitsluitend gebruiken in verzegelde lokaasstations");

- gebruikers lokaasstations passend dienen te voorzien van de informatie die in rubriek 5.3 van de samenvatting van de productkenmerken staat (bijv. "etiketteer lokaasstations conform de productaanbevelingen").

**Professioneel gebruiker:** Met behulp van dit product zouden knaagdieren binnen 35 dagen geëlimineerd moeten zijn. De productinformatie (d.w.z. etiket en/of bijsluiter) dient duidelijk aan te bevelen dat de gebruiker in geval van vermoed gebrek aan werkzaamheid aan het eind van de behandeling (d.w.z. er wordt nog steeds knaagdieractiviteit waargenomen) de productleverancier moet raadplegen of een plaagbestrijdingsdienst moet bellen.

**Breed publiek**

Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.

Gebruik bloedverdünnende rodenticiden niet als permanent lokaas (bijv. ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te detecteren).

De productinformatie (d.w.z. etiket en/of bijsluiter) dient duidelijk te vermelden dat:

- het product dient te worden gebruikt in 'tamper resistant' lokdozen (bijvoorbeeld "uitsluitend gebruiken in tamper resistant lokdozen");

- de gebruiker dient de lokdozen te etiketteren met de informatie die in rubriek 5.3 van de samenvatting van productkenmerken staat (bijvoorbeeld "etiketteer lokdozen conform de productaanbevelingen").

- Het gebruik van dit middel moet resulteren in de eliminatie van de knaagdieren binnen 35 dagen. De productinformatie (d.w.z. het etiket en/of de bijsluiter) dient duidelijk aan te bevelen dat de gebruiker in geval van vermoed gebrek aan werkzaamheid aan het eind van de behandeling (d.w.z. er wordt nog steeds knaagdieractiviteit waargenomen) de productleverancier moet raadplegen of een plaagbestrijdingsdienst moet bellen.

Verwijder dode knaagdieren in overeenstemming met lokale vereisten [Dode knaagdieren moeten afgevoerd en vernietigd worden door een hiertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming].

**5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Dit product bevat een antistollingsmiddel. Bij inslikken kunnen, mogelijk met enige vertraging, symptomen optreden zoals een bloedneus en bloedend tandvlees. In ernstige gevallen kunnen bloeduitstorting optreden en kan bloed aanwezig zijn in de ontlasting of urine.

Tegengif: vitamine K1, uitsluitend toe te dienen door medisch/veterinair personeel.

In geval van:

- Blootstelling via de huid: de huid met water wassen en vervolgens met water en zeep.
- Blootstelling van de ogen: de ogen spoelen met oogspoelvloeistof of water, oogleden ten minste tien minuten open houden.
- Blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen. Nooit iets aan een bewusteloze persoon toedienen via de mond. Geen braken opwekken. Na inslikken onmiddellijk medisch advies inwinnen en verpakking of etiket van het product tonen.

Neem in geval van inslikken door een huisdier contact op met een dierenarts [...].

Lokaasstations moeten worden voorzien van de volgende informatie: "niet verplaatsen of openen"; "bevat een rodenticide"; "productnaam of autorisatienummer"; "werkzame stof(fen)" en "bel in geval van een incident het antigifcentrum [070/245.245]".  
Gevaarlijk voor dieren in het wild.

#### 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Verwijder ongegeten lokaas en de verpakking aan het eind van de behandeling in overeenstemming met lokale vereisten [De verpakking en (ongete) restanten van rodenticiden worden beschouwd als gevaarlijke afval. Het afvoeren en vernietigen dient te gebeuren door een hiertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming].

#### 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. De verpakking afgesloten en niet in direct zonlicht bewaren.  
Op een plaats bewaren waartoe kinderen, vogels, huis- en boerderijdieren geen toegang hebben.

Houdbaarheid: 2 jaar

#### 6. Overige informatie

Vanwege de vertraagde werking kan het na consumptie van het lokaas 4 tot 10 dagen duren tot bloedverdünnende rodenticiden effectief zijn.

Knaagdieren kunnen ziekten bij zich dragen. Raak dode knaagdieren niet met blote handen aan, draag handschoenen of gebruik hulpmiddelen zoals een tang bij het verwijderen.

Dit product bevat een bitterstof en een kleurstof.

De P-zinnen zoals weergegeven op deze samenvatting van de productkenmerken, bevatten enkele fouten die niet aangepast kunnen worden. De correcte weergave is de volgende: P501 - Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de geldende nationale/regionale regelgeving.