

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

FON BAIT WHEAT

Τύπος(οι) προϊόντος

PT14: Τρωκτικοκτόνα

Αριθμός άδειας: ΤΠ14-0117

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: GR-0015672-0000

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	FON BAIT WHEAT
-------------------	----------------

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Όνομασία	FARMA-CHEM SA
	Διεύθυνση	SINDOS 57022 THESSALONIKI Ελλάδα
Αριθμός άδειας		ΤΠ14-0117
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		GR-0015672-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		04/10/2016
Ημερομηνία λήξης της άδειας		31/12/2026

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	TRIPLAN
Διεύθυνση παρασκευαστή	BP258 Poste Francaise AD500 Andorra Ανδόρρα
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	SOPHY, 4-8 rue de Romorantin 41300 SALBRIS Γαλλία 41300 SALBRIS Γαλλία

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	Βρωμαδιολόνη
Επωνυμία παρασκευαστή	PM TEZZA SRL
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via tre ponti 22 37050 37050 S. MARIA DI ZEVIO (VR) Italy Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	PM TEZZA Srl Via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio (VR) Ιταλία

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Βρωμαδιολόνη	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	δραστική ουσία	28772-56-7	249-205-9	0,005

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

RB Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H360D: Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.</p> <p>H372: Προκαλεί βλάβες στα όργανα αίμα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση {1:αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης:}.</p>
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.</p> <p>P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης.</p> <p>P260: Μην αναπνέετε σκόνη.</p> <p>P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια.</p> <p>P280: Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.</p> <p>P280: Να φοράτε προστατευτικά ενδύματα.</p> <p>P280: Να φοράτε πρόσωπο.</p> <p>P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε Συμβουλευθείτε.</p> <p>P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε Επισκεφθείτε.</p> <p>P314: Συμβουλευθείτε Συμβουλευθείτε εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.</p> <p>P314: Συμβουλευθείτε Επισκεφθείτε εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.</p> <p>P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.</p> <p>P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.</p> <p>P501: Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.</p>

Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Εσωτερικοί χώροι από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	<p>Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά</p> <p>Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα</p> <p>Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αρουραίος οροφής Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά</p> <p>Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αρουραίος οροφής Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα</p> <p>Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Όλα τα στάδια</p>
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: - Έτοιμο προς χρήση δόλωμα για χρήση σε σταθμούς δόλωσης ανθεκτικών σε παραβίαση. - Καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: Ποντικοί: 40 γρ δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας σταθμοί δόλωσης, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 1 μέτρο. Αρουραίοι: 200 γρ δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας σταθμοί δόλωσης, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 5 μέτρα.</p> <p>Αραίωση (%): 0</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: <u>Ποντικοί:</u></p> <p>40 γρ δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας σταθμοί δόλωσης, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 1 μέτρο.</p> <p><u>Αρουραίοι</u></p>

	: 200 γρ δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας σταθμοί δόλωσης, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 5 μέτρα.
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 κιλά Συσκευασία με χύμα προϊόν σε σακούλες μέχρι 10 κιλά Σακούλακια 20-25-40-50-100γρ., συσκευασμένα σε:</p> <ul style="list-style-type: none"> -σακούλες από χαρτί/ PE(3-5-10-15-20-25κιλά) -κάδοι από PE(3-5-10-15-18-20-25 κιλών) -χαρτοκιβώτια(3-5-10-15-20-25κιλά) -δολωματικοί σταθμοί από PET/PP/PE/PVC) -Μεταλλικά κουτιά (3-5-10-15-20-25κιλά) <p>Χύμα δόλωμα σε</p> <ul style="list-style-type: none"> -σακούλες (χαρτί/ PE) 3-5-10 κιλών -κάδοι (PE) 3-5-10 κιλών - Κουτιά από χαρτόνι (3-5-10 κιλών) - Πλαστική σακούλα (PE/PP) (100-200-300-400-500-500-600-700-800-900-1000γρ) συσκευασμένη σε κουτιά από χαρτόνι (3-5-10κιλά)

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 5 με 7 ημέρες από την πρώτη εφαρμογή και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα στις επόμενες, ώστε να ελέγχεται η αποδοχή του δολώματος, η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και για απομάκρυνση των νεκρών ποντικών. Επαναδολώστε τους αν είναι απαραίτητο.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.1.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.1.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε σταθμούς δόλωσης κοντά σε αποχετευτικά δίκτυα βεβαιωθείτε ότι θα αποφευχθεί κάθε επαφή των δολωμάτων με το νερό.

4.1.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2. Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αρουραίος οροφής Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αρουραίος οροφής Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Όλα τα στάδια
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο άλλο: Autre ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΛΥΜΜΑΤΩΝ
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή

	<p>Λεπτομερής περιγραφή: - Έτοιμο προς χρήση δόλωμα για χρήση σε σταθμούς δόλωσης ανθεκτικών σε παραβίαση. - Καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης.</p>
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: Ποντικοί: 40 γρ δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας σταθμοί δόλωσης, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 1 μέτρο. Αρουραίοι: 200 γρ δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας σταθμοί δόλωσης, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 5 μέτρα</p> <p>Αραίωση (%): 0</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:</p> <p><u>Ποντικοί:</u> 40 γρ δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας σταθμοί δόλωσης, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 1 μέτρο.</p> <p><u>Αρουραίοι:</u> 200 γρ δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας σταθμοί δόλωσης, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 5 μέτρα</p>
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 κιλά</p> <p>Συσκευασία με χύμα προϊόν σε σακούλες μέχρι 10 κιλά Σακουλάκια 20-25-40-50-100γρ., συσκευασμένα σε: -σακούλες από χαρτί/ PE(3-5-10-15-20-25κιλά) -κάδοι από PE(3-5-10-15-18-20-25 κιλών) -χαρτοκιβώτια(3-5-10-15-20-25κιλά) -δολωματικοί σταθμοί από PET/PP/PE/PVC) -Μεταλλικά κουτιά (3-5-10-15-20-25κιλά)</p> <p>Χύμα δόλωμα σε -σακούλες (χαρτί/ PE) 3-5-10 κιλών -κάδοι (PE) 3-5-10 κιλών - Κουτιά από χαρτόνι (3-5-10 κιλών) - Πλαστική σακούλα (PE/PP) (100-200-300-400-500-500-600-700-800-900-1000γρ) συσκευασμένη σε κουτιά από χαρτόνι (3-5-10κιλά) =</p>

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Προστατέψτε το δόλωμα από τις καιρικές συνθήκες. Επιλέξτε σημεία δόλωσης σε χώρους που δεν πλημμυρίζουν. Αντικαταστήστε δολώματα φθαρμένα από νερό ή μολυσμένα από ακαθαρσίες. Αφαιρέστε τα υπόλοιπα προϊόντος στο τέλος των εφαρμογών. Τα σημεία δόλωσης να είναι καλυμμένα και σε χώρους τετοιους ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε ζώα μη στόχους

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.2.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Όπου είναι δυνατόν, πριν από την εφαρμογή ενημερώστε τους πιθανούς παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της περιοχής και του περιβάλλοντός τους) σχετικά με την μυοκτονία.- Εξετάστε τα μέτρα προληπτικού ελέγχου (οπές, απομακρύνετε πιθανά τρόφιμα και ποτά όσο το δυνατόν περισσότερο), για να βελτιώσετε την πρόσληψη του προϊόντος και να μειώσετε την πιθανότητα επανεμφάνισης.- Για να μειώσετε τον κίνδυνο δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής σε συχνές χρονικές περιόδους.- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των τρωκτικών.- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε παλμικές θεραπείες.

4.2.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε σταθμούς δόλωσης κοντά σε επιφανειακά ύδατα (ποτάμι, κανάλια, κτλ.) και σε αποχετευτικά δίκτυα
βεβαιωθείτε ότι θα αποφευχθεί κάθε επαφή των δολωμάτων με το νερό.

4.2.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.3. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 3. Εξωτερικοί ανοιχτοί χώροι από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Όλα τα στάδια Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Όλα τα στάδια Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αρουραίος οροφής Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Όλα τα στάδια
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο Εξωτερικοί ανοιχτοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) ή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Ποντικοί: 40 γρ δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας σταθμοί δόλωσης, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 1 μέτρο. Αρουραίοι: 200 γρ δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας σταθμοί δόλωσης, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 5 μέτρα. Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: <u>Ποντικοί:</u>

	<p>40 γρ δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας σταθμοί δόλωσης, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 1 μέτρο.</p> <p><u>Αουραίοι:</u></p> <p><u>200 γρ δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας σταθμοί δόλωσης, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 5 μέτρα.</u></p> <p>-</p>
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 κιλά</p> <p>Συσκευασία με χύμα προϊόν σε σακούλες μέχρι 10 κιλά Σακουλάκια 20-25-40-50-100γρ., συσκευασμένα σε:</p> <ul style="list-style-type: none"> -σακούλες από χαρτί/ PE(3-5-10-15-20-25κιλά) -κάδοι από PE(3-5-10-15-18-20-25 κιλών) -χαρτοκιβώτια(3-5-10-15-20-25κιλά) -δολωματικοί σταθμοί από PET/PP/PE/PVC) -Μεταλλικά κουτιά (3-5-10-15-20-25κιλά) <p>Χύμα δόλωμα σε</p> <ul style="list-style-type: none"> -σακούλες (χαρτί/ PE) 3-5-10 κιλών -κάδοι (PE) 3-5-10 κιλών - Κουτιά από χαρτόνι (3-5-10 κιλών) - Πλαστική σακούλα (PE/PP) (100-200-300-400-500-500-600-700-800-900-1000γρ) συσκευασμένη σε κουτιά από χαρτόνι (3-5-10κιλά)

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.3.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.3.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

4.3.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

4.3.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

Επαγγελματική χρήση:

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν τη χρήση.
 - επιθεωρήστε τον χώρο πριν τη δόλωση της μολυσμένης περιοχής και πραγματοποιήστε επιτόπια αξιολόγηση προκειμένου να εντοπιστούν τα είδη τρωκτικών, οι τόποι δραστηριότητάς του και να προσδιορισθεί η πιθανή αιτία και η έκταση της προσβολής.
 - Αφαιρέστε τα τρόφιμα τα οποία είναι εύκολα προσβάσιμα για τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Εκτός από αυτό, μην καθαρίσετε τη μολυσμένη περιοχή ακριβώς πριν από την εφαρμογή, καθώς αυτό ενοχλεί μόνο τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσχεραίνει την αποδοχή των δολωμάτων.
 - Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM), συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των μέτρων υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικών μεθόδων ελέγχου.
 - Εξετάστε τα μέτρα προληπτικού ελέγχου (π.χ. βούλωμα τρυπών, απομάκρυνση πιθανών τροφίμων και πόσιμο νερού όσο το δυνατόν περισσότερο) για να βελτιώσετε την πρόσληψη του προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας επανεμφάνισης.
 - Σταθμοί δόλωσης πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γεινίαση με τα μέρη όπου έχει παρατηρηθεί προηγουμένως δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. μονοπάτια, φωλιές, τρύπες, λαγούμια, κλπ.).
 - Όπου είναι δυνατόν, οι σταθμοί δόλωσης πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
 - Οι σταθμοί δόλωσης πρέπει να φέρουν σαφή επισήμανση ώστε να δείχνουν ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται.
 - Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε κοινόχρηστους χώρους, οι περιοχές που υποβάλλονται σε θεραπεία θα πρέπει να σημειώνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας με ειδική σήμανση που να εξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και τα πρώτα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης και πρέπει να διατίθεται παράλληλα με τα δολώματα.
 - Το δόλωμα πρέπει να ασφαρίζεται έτσι ώστε να μην μπορεί να απομακρυνθεί από το σταθμό δόλωσης.
 - Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια ζώα, ζώα εκτροφής και άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο.
 - Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έχουν επαφή με αυτά.
 - Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
 - Εάν η πρόσληψη δολώματος είναι χαμηλή σε σχέση με το εμφανές μέγεθος της μόλυνσης, σκεφτείτε την μετεγκατάσταση των σταθμών δόλωσης σε διαφορετικές θέσεις και την δυνατότητα αλλαγής της συνταγή δολώματος.
 - Εάν μετά από μια περίοδο θεραπείας 35 ημερών τα δολώματα συνεχίζουν να καταναλώνονται και δεν παρατηρείται μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, πρέπει να καθοριστεί η πιθανή αιτία. Εκεί που έχουν εξαιρεθεί άλλες πιθανότητες, είναι πιθανό να υπάρχουν ανθεκτικά τρωκτικά γι' αυτό συστήνουμε τη χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου υπάρχει, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, εξετάστε τη χρήση παγίδων ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
 - Αφαιρέστε το υπόλοιπο δόλωμα ή τους σταθμούς δόλωσης στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.
 - Τοποθετήστε το δόλωμα στο σταθμό δολώματος χρησιμοποιώντας δοσομετρητή.
- Γενική χρήση του κοινού:
- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν τη χρήση του.
 - Πριν από τη χρήση προϊόντων τρωκτικοκτόνου, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μη χημικές μέθοδοι ελέγχου (π.χ. παγίδες).

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

-
- Αφαιρέστε τα τρόφιμα τα οποία είναι εύκολα προσβάσιμα για τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Εκτός από αυτό, μην καθαρίζετε τη μολυσμένη περιοχή ακριβώς πριν από την εφαρμογή, καθώς αυτό ενοχλεί μόνο τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσχεραίνει την αποδοχή των δολωμάτων.
 - Οι σταθμοί δόλωσης πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γειννίαση όπου παρατηρείται δραστηριότητα τρωκτικού (π.χ. διαδρομές, τρύπες, λαγούμια, αυλάκια κλπ.).
 - Όπου είναι δυνατόν, οι σταθμοί δόλωσης πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
 - Μην ανοίγετε τα σακουλάκια που περιέχουν το δόλωμα
 - Τοποθετήστε τους σταθμούς δόλωσης μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια ζώα, ζώα εκμετάλλευσης και άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο.
 - Τοποθετήστε τους σταθμούς δόλωσης μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έχουν επαφή με αυτά.
 - Μην τοποθετείτε σταθμούς δόλωσης κοντά σε συστήματα αποστράγγισης όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με το νερό.
 - Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
 - Αφαιρέστε το υπόλοιπο δόλωμα ή τους σταθμούς δόλωσης στο τέλος της περιόδου εφαρμογής

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Για επαγγελματική χρήση:

- Μη χειρίζεστε μέχρι να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
- Όπου είναι δυνατόν, πριν από την εφαρμογή ενημερώστε τους πιθανούς παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της θεραπευόμενης περιοχής και του περιβάλλοντός τους) περίπου για την εφαρμογή καταπολέμησης τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει]".
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά σε συχνά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής (π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα). [Προσδιορίστε εάν απαιτείται συχνότερη ή καθημερινή επιθεώρηση].
- Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μετά από 35 ημέρες χωρίς αξιολόγηση της κατάστασης της μόλυνσης και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.
- Μη χρησιμοποιείτε δολώματα που περιέχουν αντιπηκτικές δραστικές ουσίες ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των τρωκτικών.
- Οι πληροφορίες για το προϊόν (ήτοι η ετικέτα ή / και το φύλλο οδηγιών) πρέπει να δείχνουν σαφώς ότι:

το προϊόν δεν πρέπει να παραδίδεται στο ευρύ κοινό (π.χ. "μόνο για επαγγελματίες").

το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επαρκείς σταθμούς δόλωσης με αντοχή σε παραβίαση (π.χ. "χρήση μόνο σε σταθμούς δόλωσης ανθεκτικών σε παραβίαση").

οι χρήστες πρέπει να επισημαίνουν σωστά τους σταθμούς δόλωσης με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο τμήμα 5.3 της SPC (π.χ. συστάσεις προϊόντος").

- Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (ήτοι η ετικέτα ή / και το φύλλο οδηγιών) πρέπει να συστήνουν με σαφήνεια ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της θεραπείας (δηλαδή εξακολουθεί να παρατηρείται η δραστηριότητα των τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ή να καλέσει υπηρεσία ελέγχου παρασίτων.

- Μην πλένετε τους σταθμούς δολωμάτων με νερό μεταξύ των εφαρμογών.

- Απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Για γενική χρήση του κοινού:

- Μη χειρίζεστε μέχρι να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

-
- Εξετάστε τα μέτρα προληπτικού ελέγχου (κλείσιμο οπών, απομάκρυνση πιθανών τροφίμων και ποτών όσο το δυνατόν περισσότερο) για να βελτιώσετε την πρόσληψη του προϊόντος και να μειωθεί η πιθανότητα επανεμφάνισης.
 - Μη χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για την ανίχνευση της δραστηριότητας των τρωκτικών).
 - Οι πληροφορίες για το προϊόν (ήτοι η ετικέτα ή / και το φύλλο οδηγιών) πρέπει να συστήνουν με σαφήνεια ότι:
το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επαρκείς σταθμούς δόλωσης με αντοχή σε παραβίαση (π.χ. "χρήση μόνο σε σταθμούς δόλωσης ανθεκτικών σε παραβίαση").
οι χρήστες πρέπει να επισημαίνουν σωστά τους σταθμούς δόλωσης με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο τμήμα 5.3 του SPC (π.χ. "σήμανση σύμφωνα με το σημείο 5.3 συστάσεις προϊόντος").
 - Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (ήτοι η ετικέτα ή / και το φύλλο οδηγιών) πρέπει να συστήνουν με σαφήνεια ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της θεραπείας (δηλαδή εξακολουθεί να παρατηρείται η δραστηριότητα των τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ή να καλέσει υπηρεσία ελέγχου παρασίτων.
 - Αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας, τουλάχιστον όσο συχνά ελέγχονται οι σταθμοί δόλωσης.
 - Απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Για επαγγελματική και ευρεία χρήση:

- Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, συμπτώματα, τα οποία μπορεί να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και ματωμένα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα.
 - Αντίδοτο: Η βιταμίνη K1 χορηγείται μόνο από ιατρικό / κτηνιατρικό προσωπικό.
 - Σε περίπτωση που:
 - Δερματική έκθεση: πλύση του δέρματος με νερό και στη συνέχεια με νερό και σαπούνι.
 - Έκθεση οφθαλμών: ξεβγάλετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης των οφθαλμών ή νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά τουλάχιστον 10 λεπτά.
 - Έκθεση από το στόμα: ξεπλύνετε προσεκτικά το στόμα με νερό. Ποτέ μην δίνετε τίποτα από το στόμα στο άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Μην προκαλείτε εμετό.
- Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο σε περίπτωση κατάποσης από ένα κατοικίδιο ζώο.
- Περαιτέρω οδηγίες για επαγγελματική χρήση:
- Οι σταθμοί δόλωσης πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις: "Μη μετακινείτε ή ανοίγετε". "περιέχει ένα τρωκτικοκτόνο"? "όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης", "δραστική ουσία (-ες) "και" σε περίπτωση συμβάντος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων.
 - Επικίνδυνο για την άγρια φύση.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Στο τέλος της εφαρμογής , απορρίψτε το μη φαγωμένο δόλωμα και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Φυλάσσετε σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν επιτρέπεται η πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων ζώων και ζώων εκτροφής.
- Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα χρειάζονται από 4 έως 10 ημέρες για να είναι αποτελεσματικά μετά την κατανάλωση του δολώματος.

- Τα τρωκτικά μπορούν να είναι φορείς ασθένειας. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή χρησιμοποιείτε εργαλεία όπως λαβίδες όταν τα απομακρύνετε.

- Αυτό το προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και βαφή.