

# Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

**Naziv proizvoda:** IMIDASECT

**Vrsta(e) proizvoda:** Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

**Broj odobrenja:** KLASA:UP/I-543-04/21-12/43

**Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3):** HR-0017413-0000

## Sadržaj

|   |    |
|---|----|
| Administrativne informacije   | 1  |
| 1.1. Trgovački naziv proizvoda  | 1  |
| 1.2. Nositelj odobrenja   | 1  |
| 1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda  | 1  |
| 1.4. Proizvođači aktivnih tvari   | 1  |
| 2. Sastav i formulacija proizvoda   | 2  |
| 2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda   | 2  |
| 2.2. Vrsta formulacije  | 2  |
| 3. Oznake opasnosti i obavijesti  | 2  |
| 4. Odobrena uporaba   | 3  |
| 5. Opće upute za uporabu  | 10 |
| 5.1. Upute za uporabu   | 10 |
| 5.2. Mjere za smanjenje rizika  | 10 |
| 5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša | 10 |
| 5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže  | 10 |
| 5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja  | 10 |
| 6. Ostale informacije   | 11 |

## Administrativne informacije

### 1.1. Trgovački naziv proizvoda

|           |
|-----------|
| IMIDASECT |
|-----------|

### 1.2. Nositelj odobrenja

|  |                            |                                 |
|--|----------------------------|---------------------------------|
| Naziv i adresa nositelja odobrenja                             | Naziv                      | Sharda Europe B.V.B.A           |
|  | Adresa                     | Heedstraat 58 1730 Asse Belgija |
| Broj odobrenja   | KLASA:UP/I-543-04/21-12/43 |                                 |
| Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3) | HR-0017413-0000            |                                 |
| Datum odobrenja  | 29/06/2016                 |                                 |
| Datum isteka odobrenja   | 14/12/2026                 |                                 |

### 1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Naziv proizvođača           | Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd  |
| Adresa proizvođača          | Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Indija                                   |
| Lokacija proizvodnih pogona | Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Indija                                   |
|                             | DTS OABE S.L., Polígono Industrial Zabale, Parcela 3 48410 Orozco (Vizcaya) Španjolska |

### 1.4. Proizvođači aktivnih tvari

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Aktivna tvar</b>                | 37 - Imidaklopid  |
| <b>Naziv proizvođača</b>           | Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd                                     |
| <b>Adresa proizvođača</b>          | Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Indija                  |
| <b>Lokacija proizvodnih pogona</b> | HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD 393 East Heping Road Shijizhang Kina |

## 2. Sastav i formulacija proizvoda

### 2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

| Uobičajeni naziv | IUPAC naziv  | Funkcija     | CAS broj    | EC broj   | Sadržaj (%) |
|------------------|--|--------------|-------------|-----------|-------------|
| Imidaklopid      | (2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine | Aktivna tvar | 138261-41-3 | 428-040-8 | 2,194       |

### 2.2. Vrsta formulacije

|                              |
|------------------------------|
| GD - Gel za izravnu primjenu |
|------------------------------|

## 3. Oznake opasnosti i obavijesti

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Oznaka upozorenja</b> | Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.<br>Sadrži 1,2 - benzotiazol-3 (2H)-on. Može izazvati alergijsku reakciju.  |
| <b>Oznake obavijesti</b> | Izbjegavati ispuštanje u okoliš.<br>Sakupiti proliveno/rasuto.<br>Odložiti sadržaj u/na skladu s nacionalnim propisima.<br>Odložiti spremnik u/na skladu s nacionalnim propisima. |

## 4. Odobrena uporaba

### 4.1 Opis uporabe

#### Uporaba 1 - Zatvoreni prostori, primjena u pukotinama i procjepima, smeđi žohar, profesionalna upotreba

|  |   |
|--|---|
| Vrsta proizvoda                                  | Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)   |
| Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe   | Insekticid  |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | Znanstveno ime: Blattella germanica<br>Uobičajeno ime: Smeđi žohar<br>Stadij razvoja: nimfe, odrasli  |
| Područje primjene                                | u zatvorenom prostoru<br><br>Zatvoreni prostori   |
| Načini primjene                                  | Metoda: Primjena u pukotinama i procjepima<br>Detaljan opis:<br>Primjena u pukotinama i procjepima  |
| Broj i vremenski raspored primjena               | Stopa primjene: Niska stopa zaraze 0.1 g/m <sup>2</sup> ; visoka stopa zaraze 0.2 g/m <sup>2</sup> . Jedna kap gela promjera 5 mm odgovara 0.1 g biocidnog proizvoda.<br>Razrjeđivanje (%): -<br>Broj i vremenski raspored primjene:<br>Maksimalno 6 primjena tijekom godine. |
| Kategorije korisnika                             | profesionalac   |
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal         | Patrona, Plastika (HDPE) , 30g; 35g, 50g, 100g  |

#### 4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

- 1) Proizvod se može nanositi samo na ograničena područja na površinama koje se ne čiste redovito, na primjer iza ili ispod hladnjaka, ispod sudopera, pećnice ili bojlera, u svim pukotinama i procjepima gdje se mogu skrivati žohari.
- 2) Kapljice mamaca ne izlagati sunčevom svjetlu ili izvoru topline (npr. radiator).
- 3) Ne nanositi na porozne površine. U slučaju da to nije moguće, nanesite proizvod na plastičnu ploču.

#### 4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte opće upute za uporabu

#### 4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte opće upute za uporabu

#### 4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte opće upute za uporabu

#### 4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte opće upute za uporabu

## 4.2 Opis uporabe

### Uporaba 2 - Zatvoreni prostori, primjena u pukotinama i procjepima, neprofesionalna upotreba

#### Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

#### Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Insekticid

#### Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: Blattella germanica  
Uobičajeno ime: Smeđi žohar  
Stadij razvoja: nimfe, odrasli

Znanstveno ime: Blatta orientalis  
Uobičajeno ime: Crni žohar  
Stadij razvoja: nimfe, odrasli

#### Područje primjene

u zatvorenom prostoru

Zatvoreni prostori

#### Načini primjene

Metoda: Primjena u pukotinama i procjepima  
Detaljan opis:  
Primjena u pukotinama i procjepima

#### Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: Niska stopa zaraze 0.2 g/m<sup>2</sup>; visoka stopa zaraze 0.3 g/m<sup>2</sup>. Jedna kap gela promjera 5 mm odgovara 0.1 g biocidnog proizvoda.  
Razrjeđivanje (%): -  
Broj i vremenski raspored primjene:  
Maksimalno 6 primjena tijekom godine.

**Kategorije korisnika**

široka javnost (amaterska uporaba)

**Veličine pakiranja i ambalažni materijal**

Šprica, plastična (HDPE), 3g, 5g, 10g, 15g

**4.2.1 Upute za uporabu specifične za uporabu**

- 1) Proizvod se može nanositi samo na ograničena područja na površinama koje se ne čiste redovito, na primjer iza ili ispod hladnjaka, ispod sudopera, pećnice ili bojlera, u svim pukotinama i procjepima gdje se mogu skrivati žohari.
- 2) Ako se sumnja ili je uočen veliki broj žohara, primijeniti aplikaciju (dozu) za visoku stopu zaraze. Ako je uočeno samo nekoliko ili pojedinačnih žohara, primijeniti aplikaciju (dozu) za nisku stopu zaraze.
- 3) Kapljice mamaca ne izlagati sunčevom svjetlu ili izvoru topline (npr. radiator).
- 4) Ne nanositi na porozne površine. U slučaju da to nije moguće, nanosite proizvod na plastičnu ploču.

**4.2.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu**

Pogledajte opće upute za uporabu

**4.2.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Pogledajte opće upute za uporabu

**4.2.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Pogledajte opće upute za uporabu

**4.2.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja**

Pogledajte opće upute za uporabu

**4.3 Opis uporabe****Uporaba 3 - Zatvoreni prostori, primjena u pukotinama i procjepima, crni žohar, profesionalna upotreba****Vrsta proizvoda**

Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

|   |   |
|---|---|
| <b>Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe</b>   | Insekticid  |
| <b>Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)</b> | Znanstveno ime: Blatta orientalis<br>Uobičajeno ime: Crni žohar<br>Stadij razvoja: nimfe, odrasli   |
| <b>Područje primjene</b>                                | u zatvorenom prostoru<br><br>Zatvoreni prostori   |
| <b>Načini primjene</b>                                  | Metoda: Primjena u pukotinama i procjepima<br>Detaljan opis:<br>Primjena u pukotinama i procjepima  |
| <b>Broj i vremenski raspored primjena</b>               | Stopa primjene: Niska stopa zaraze 0.2 g/m <sup>2</sup> ; visoka stopa zaraze 0.3 g/m <sup>2</sup> . Jedna kap gela promjera 5 mm odgovara 0.1 g biocidnog proizvoda.<br>Razrjeđivanje (%): -<br>Broj i vremenski raspored primjene:<br>Maksimalno 6 primjena tijekom godine. |
| <b>Kategorije korisnika</b>                             | profesionalac   |
| <b>Veličine pakiranja i ambalažni materijal</b>         | Patrona, Plastika (HDPE) , 30 g, 35 g, 50 g, 100 g  |

#### 4.3.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

- 1) Proizvod se može nanositi samo na ograničena područja na površinama koje se ne čiste redovito, na primjer iza ili ispod hladnjaka, ispod sudopera, pećnice ili bojlera, u svim pukotinama i procjepima gdje se mogu skrivati žohari.
- 2) Kapljice mamaca ne izlagati sunčevom svjetlu ili izvoru topline (npr. radijator).
- 3) Ne nanositi na porozne površine. U slučaju da to nije moguće, nanesite proizvod na plastičnu ploču.

#### 4.3.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte opće upute za uporabu

#### 4.3.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte opće upute za uporabu

#### 4.3.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte opće upute za uporabu

#### 4.3.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte opće upute za uporabu

#### 4.4 Opis uporabe

##### Uporaba 4 - Zatvoreni prostori, klopke s mamcima

|   |  |
|---|--|
| <b>Vrsta proizvoda</b>                                  | Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)  |
| <b>Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe</b>   | Insekticid   |
| <b>Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)</b> | Znanstveno ime: Blattella germanica<br>Uobičajeno ime: Smeđi žohar<br>Stadij razvoja: nimfe, odrasli<br><br>Znanstveno ime: Blatta orientalis<br>Uobičajeno ime: Crni žohar<br>Stadij razvoja: nimfe, odrasli  |
| <b>Područje primjene</b>                                | u zatvorenom prostoru<br><br>Zatvoreni prostori  |
| <b>Načini primjene</b>                                  | Metoda: Klopke s mamcima<br>Detaljan opis:<br>Postavljanje klopki s mamcima  |
| <b>Broj i vremenski raspored primjena</b>               | Stopa primjene: Niska stopa zaraze 0.2g/m <sup>2</sup> (klopka s 0.75g mamca na 4 m <sup>2</sup> ; klopka s 1g mamca na 5m <sup>2</sup> ; klopka s 1.2g mamca na 6 m <sup>2</sup> , klopka s 1.4g mamca na 7 m <sup>2</sup> ).<br>Visoka stopa zaraze 0.3g/m <sup>2</sup> (klopka s 0.75g mamca na 2.5 m <sup>2</sup> ; klopka s 1g mamca na 3 m <sup>2</sup> ; klopka s 1.2g mamca na 4 m <sup>2</sup> , klopka s 1.4g mamca na 5 m <sup>2</sup> ).<br>Razrjeđivanje (%): -<br>Broj i vremenski raspored primjene:<br>Maksimalno 6 primjena tijekom godine. |
| <b>Kategorije korisnika</b>                             | profesionalac<br><br>široka javnost (amaterska uporaba)  |
| <b>Veličine pakiranja i ambalažni materijal</b>         | Klopka s mamcima, Plastika (HDPE) , 0.75 g, 1 g, 1.2 g, 1.4 g  |

#### 4.4.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Ako se sumnja ili je uočen veliki broj žohara, primijeniti aplikaciju (dozu) primjene za visoku stopu zaraze. Ako je uočeno samo nekoliko ili pojedinačnih žohara, primijeniti aplikaciju (dozu) primjene za nisku stopu zaraze.

#### 4.4.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

1) Primjenjene klopke s mamcima trebaju biti otporne na manipuliranje.  
2) Ne otvarati na silu klopku s mamcima.

#### 4.4.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte opće upute za uporabu

#### 4.4.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte opće upute za uporabu

#### 4.4.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte opće upute za uporabu

### 4.5 Opis uporabe

#### Uporaba 5 - Na otvorenom, klopke s mamcima

##### Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

##### Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Insekticid

##### Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: *Blattella germanica*  
Uobičajeno ime: Smeđi žohar  
Stadij razvoja: nimfe, odrasli

Znanstveno ime: *Blatta orientalis*  
Uobičajeno ime: Crni žohar  
Stadij razvoja: nimfe, odrasli

##### Područje primjene

na otvorenom

Primjena na otvorenom kao barijera oko zgrada na potencijalnim mjestima ulaska žohara

|   |  |
|---|--|
| <b>Načini primjene</b>                          | Metoda: Klopke s mamcima<br>Detaljan opis:<br>Postavljanje klopki s mamcima  |
| <b>Broj i vremenski raspored primjena</b>       | Stopa primjene: Ukupni opseg od 0.3 g/m (klopka s 0.75g mamca na 2.5 m <sup>2</sup> ; klopka s 1g mamca na 3 m <sup>2</sup> ; klopka s 1.2g mamca na 4 m <sup>2</sup> , klopka s 1.4g mamca na 5m <sup>2</sup> )<br>Razrjeđivanje (%): -<br>Broj i vremenski raspored primjene:<br>Maksimalno 6 primjena tijekom godine. |
| <b>Kategorije korisnika</b>                     | profesionalac<br><br>široka javnost (amaterska uporaba)  |
| <b>Veličine pakiranja i ambalažni materijal</b> | Klopka s mamcima, Plastika (HDPE), 0.75 g, 1 g, 1.2 g, 1.4 g   |

#### 4.5.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Klopke s mamcima primijeniti samo na tvrdim površinama poput terasa i otvorenih dvorišta.

#### 4.5.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- 1) Primjenjene klopke s mamcima trebaju biti otporne na manipuliranje.
- 2) Ne otvarati na silu klopku s mamcem.
- 3) Nanesite samo na područjima koja nisu podložna potapanju ili vlaženju, tj. zaštićena od kiše, poplava i vode za čišćenje.
- 4) Nemojte koristiti proizvod tamo gdje se ne može spriječiti ispuštanje u odvođe (kanalizaciju).

#### 4.5.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte opće upute za uporabu

#### 4.5.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte opće upute za uporabu

#### 4.5.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte opće upute za uporabu

## 5. Opće upute za uporabu

### 5.1. Upute za uporabu

- 1) Pridržavajte se uputa za uporabu.
- 2) Prije primjene, ukloniti sve prirodne izvore hrane za žohare (otpad, ostatke hrane...) iz zaraženog područja kako bi se potaknuo unos gela.
- 3) Tijekom pregleda provjeriti tretirano područje i ako je potrebno, zamijeniti gel jer isti može biti prekriven izlučevinama i fekalijama žohara kako bi privukli iste vrste.
- 4) Proizvod se može koristiti kontinuirano 3 mjeseca bez zamjene klopki za mamac ili nepotrošenih mamaca.
- 5) Obavijestiti nositelja odobrenja ako je primjena neučinkovita.
- 6) Kako bi se zaštitile ptice, kućni ljubimci i sisavci, uginule žohare potrebno je svakodnevno uklanjati s tretiranog područja.
- 7) Jednom tjedno provjeravajte klopke s mamcima.
- 8) Ako zaraza potraje unatoč poštivanju uputa na naljepnici, obratiti se profesionalnoj službi za dezinfekciju. Izbjegavajte kontinuiranu upotrebu proizvoda.
- 9) Na kraju tretmana sakupite klopke s mamcima za zbrinjavanje.

### 5.2. Mjere za smanjenje rizika

- 1) Čuvati izvan dohvata djece.
- 2) Postavite mamac izvan dohvata djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih neciljanih životinja.
- 3) Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
- 4) Ne koristiti izravno na ili blizu hrane, hrane za životinje ili pića, niti na površinama ili priboru koji bi mogli biti u izravnom kontaktu s hranom, hranom za životinje, pićima i životinjama.

### 5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- 1) Ako je potreban liječnički savjet, imajte pri ruci spremnik ili etiketu proizvoda.
- 2) NAKON DODIRA S KOŽOM: Skinite svu kontaminiranu odjeću i operite ju prije ponovne upotrebe. Operite kožu vodom. Ako dođe do iritacije kože ili osipa: potražite savjet liječnika.
- 3) NAKON DODIRA S OČIMA: Ako se pojave simptomi isperite vodom. Uklonite kontaktne leće, ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
- 4) NAKON GUTANJA: Ako se pojave simptomi, nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
- 5) NAKON UDISANJA: Nije primjenjivo.
- 6) Ovaj biocidni proizvod sadrži imidakloprid koji je opasan za pčele.

Za daljnje informacije u slučaju sumnje na otrovanje nazvati broj 112 ili Centar za kontrolu otrovanja: 01 23-48-342

### 5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

- 1) Nemojte ispuštati neiskorišteni proizvod na tlo, u vodotoke, u cijevi (umivaonik, WC...) niti u odvodne kanale.
- 2) Odložite neiskorišteni proizvod, njegovu ambalažu, klopke s mamcima i sav ostali otpad (npr. uginule kukce) u skladu s lokalnim propisima.
- 3) Ne čistiti klopku s mamcima prije odlaganja.

### 5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

- 1) Ne skladištiti u blizini hrane, pića i stočne hrane. Čuvati izvan dohvata djece.
- 2) Rok trajanja: 24 mjeseca
- 3) Proizvod ne izlagati sunčevom svjetlu.

## 6. Ostale informacije

Proizvod sadrži gorku tvar.