

# Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

**Denumirea produsului:** FERPASTA BRODI 25

**Tipul (tipurile) de produs (produse):** TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

**Numărul curent:** RO/2022/0329/MRS/ IT/2018/00480/AUT

**Numărul curent R4BP 3:** RO-0029389-0000

## Cuprins

|   |    |
|---|----|
| Informații administrative   | 1  |
| 1.1. Denumirea comercială a produsului  | 1  |
| 1.2. Detinatorul autorizației   | 1  |
| 1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide   | 1  |
| 1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active   | 2  |
| 2. Compoziția și formularea produsului  | 2  |
| 2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid   | 2  |
| 2.2. Tipul preparatului   | 2  |
| 3. Fraze de pericol și de precauție   | 3  |
| 4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)  | 3  |
| 5. Direcții generale de utilizare   | 12 |
| 5.1. Instrucțiuni de utilizare  | 12 |
| 5.2. Măsuri de reducere a riscurilor  | 14 |
| 5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului | 16 |
| 5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia   | 16 |
| 5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare  | 16 |
| 6. Alte informații  | 16 |

## Informații administrative

### 1.1. Denumirea comercială a produsului

|                   |
|-------------------|
| FERPASTA BRODI 25 |
| APTIRAT PASTA     |
| BRODIFAST PASTA   |
| ENDERAT PASTA     |
| FIGHTER PASTA     |
| IKURAT PASTA      |
| BROM ESCA NEW     |
| STARKORAT PASTA   |
| XTREME RAT PASTA  |

### 1.2. Detinatorul autorizației

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| <b>Numele și adresa detinatorului autorizației</b> | Numele                              | FERBI S.r.l.                               |
|  | Adresa                              | I Maggio 64023 Mosciano Sant'Angelo Italia |
| <b>Numărul curent</b>                              | RO/2022/0329/MRS/ IT/2018/00480/AUT |  |
| <b>Numărul curent R4BP 3</b>                       | RO-0029389-0000                     |  |
| <b>Data autorizației</b>                           | 05/02/2014                          |  |
| <b>Data de expirare a autorizației</b>             | 01/07/2024                          |  |

### 1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Numele producatorului</b>         | FERBI S.r.l.  |
| <b>Adresa producătorului</b>         | Viale I Maggio 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Italia |
| <b>Adresa locurilor de producție</b> | Viale I Maggio 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Italia |

#### 1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Substanța activa</b>              | 11 - Brodifacum  |
| <b>Numele producatorului</b>         | Activa S.rl  |
| <b>Adresa producătorului</b>         | via Feltre 32 20132 milano Italia                            |
| <b>Adresa locurilor de producție</b> | Tezza S.r.l.-via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio Italia |

## 2. Compoziția și formularea produsului

### 2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

| Denumirea comună | Denumirea IUPAC   | Funcția          | Numărul CAS | Numărul CE | Continut (%) |
|------------------|---|------------------|-------------|------------|--------------|
| Brodifacum       | 3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin | Substanța activă | 56073-10-0  | 259-980-5  | 0,0025       |

### 2.2. Tipul preparatului

|                               |
|-------------------------------|
| RB - Bait (gata de utilizare) |
|-------------------------------|

### 3. Fraze de pericol și de precauție

#### Fraze de pericol

Poate provoca leziuni ale organelor sanguine în caz de expunere prelungită sau repetată.

#### Fraze de precauție

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați imediat sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/....

ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: Consultați medicul.

Aruncați conținutul la în conformitate cu reglementările naționale și internaționale.

### 4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

#### 4.1 Modul de utilizare

##### Utilizarea 1 - Șoareci de casă – profesional – interior

#### Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

#### Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Nu se aplică pentru rodenticide

#### Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Mus musculus  
denumirea comună: House mouse  
etapă de dezvoltare: de la tineri la adulți

#### Domeniul de utilizare

de interior

#### Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: cerere momeală  
Descriere detaliată:  
Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și deteriorării.

#### Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: 20 g - 40 g momeală pasta per capcană.  
Diluare (%):  
Numărul și calendarul de aplicare:  
Dacă sunt necesare mai multe capcane, atunci distanța minimă dintre acestea ar trebui să fie 5 metri.

#### Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

## **Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare**

Formularea momelii: 10 - 20 g plicuri de hârtie filtrată.

Tipul ambalajului: flacoane, pungi, saci, găleți, cutii, cutii de carton, canistre. Ambalajele pot fi etichetate, tipărite sau serigrafiate.

Dimensiunea / volumul ambalajului: de la 1,5 kg la 25 kg. Ambalarea este limitată la ambalajul individual care conține maximum 10 kg de produs per sac. Pachetele conțin momeli în vrac sau ambalaje secundare mai mici de până la 1,5 kg, care nu pot fi vândute separat.

Materialul ambalajului: plastic sau compozit din plastic (HDPE, PP, PET), hârtie.

### **4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare**

Capcanele se verifică la fiecare 2 - 3 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a înlătura rozătoarele prinse. Re-umpleți cu momeală când este necesar

### **4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare**

### **4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

### **4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia**

#### 4.1.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

|  |
|--|
|  |
|--|

#### 4.2 Modul de utilizare

##### Utilizarea 2 - Șobolani- profesional - interior

|   |   |
|---|---|
| <b>Tipul produsului</b>   | TP 14 - Rodenticide   |
| <b>Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz</b>        | Nu se aplică pentru rodenticide.  |
| <b>Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)</b> | denumirea științifică: Rattus norvegicus<br>denumirea comună: Brown rat<br>etapă de dezvoltare: de la tineri la adulți  |
| <b>Domeniul de utilizare</b>                                      | de interior   |
| <b>Metoda (metodele) de aplicare</b>                              | Metoda: cerere momeală<br>Descriere detaliată:<br>Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și deteriorării.   |
| <b>Doza (dozele) și frecvența de aplicare</b>                     | Frecvența de aplicare: 100 g - 200 g per capcană.<br>Diluare (%):<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Dacă sunt necesare mai multe capcane, atunci distanța minimă dintre acestea ar trebui să fie 5 metri.  |
| <b>Categoria (categoriile) de utilizatori</b>                     | profesional   |
| <b>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</b>         | Formularea momelii: 20 g plicuri de hârtie filtrată.<br>Tipul ambalajului: flacoane, pungi, saci, găleți, cutii, cutii de carton, canistre. Ambalajele pot fi etichetate, tipărite sau serigrafiate.<br>Dimensiunea / volumul ambalajului: de la 1,5 kg la 25 kg. Ambalarea este limitată la ambalajul individual care conține maximum 10 kg de produs per sac. Pachetele conțin momeli în vrac sau ambalaje secundare mai mici de până la 1,5 kg, care nu pot fi vândute separat.<br>Materialul ambalajului: plastic sau compozit din plastic (HDPE, PP, PET), hârtie. |

#### 4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Capcanele se inspectează după fiecare 5 - 7 zile de la începerea tratamentului și apoi cel puțin săptămânal pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a înlătura rozătoarele prinse. Re-umpleți cu momeală când este necesar.

#### 4.2.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Când amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

#### 4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

|  |
|--|
|  |
|--|

#### 4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

|  |
|--|
|  |
|--|

#### 4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

|  |
|--|
|  |
|--|

#### 4.3 Modul de utilizare

##### Utilizarea 3 - Șoareci de casă și șobolani - profesional - exterior, în jurul clădirilor

Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Nu este relevant pentru rodenticide

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: *Mus musculus*  
denumirea comună: House mouse  
etapă de dezvoltare: de la tineri la adulți

denumirea științifică: *Rattus norvegicus*  
denumirea comună: Brown rat  
etapă de dezvoltare: de la tineri la adulți

Domeniul de utilizare

în aer liber

exterior, în jurul clădirilor



|   |  |
|---|--|
| <b>Metoda (metodele) de aplicare</b>                      | Metoda: cerere momeală<br>Descriere detaliata:<br>Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și deteriorării.  |
| <b>Doza (dozele) și frecvența de aplicare</b>             | Frecvența de aplicare: Șoarecele de casă: 20 – 40 g momeală pastă per capcană<br>Șobolanul maro: 100 g - 200 g momeală pastă per capcană<br>Diluare (%): 0,0025<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Capcanele ar trebui vizitate [pentru șoareci - la cel puțin 2 - 3 zile] [pentru șobolani - numai după 5 - 7 zile după] începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momelile sunt acceptate și dacă capcanele sunt intacte și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Re-umpleți cu momeli de câte ori este necesar.                         |
| <b>Categoria (categoriile) de utilizatori</b>             | profesional  |
| <b>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</b> | Formularea momelii: 10 - 20 g plicuri de hârtie filtrată.<br><br>Tipul ambalajului: flacoane, pungi, saci, găleți, cutii, cutii de carton, canistre. Ambalajele pot fi etichetate, tipărite sau serigrafiate.<br><br>Dimensiunea / volumul ambalajului: de la 1,5 kg la 25 kg. Ambalarea este limitată la ambalajul individual care conține maximum 10 kg de produs per sac. Pachetele conțin momeli în vrac sau ambalaje secundare mai mici de până la 1,5 kg, care nu pot fi vândute separat.<br><br>Materialul ambalajului: plastic sau compozit din plastic (HDPE, PP, PET), hârtie. |

#### 4.3.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protejați momeala de intemperii (ex. ploaie, zăpadă, etc.). Amplasați capcanele în zone fără risc de inundare.</li> <li>- Capcanele se inspectează cel puțin (pentru șoareci) la fiecare 2- 3 zile, (pentru șobolani) la fiecare 5-7 zile de la începerea tratamentului și apoi cel puțin săptămânal pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a înlătura rozătoarele prinse. Re-umpleți cu momeală când este necesar.</li> <li>- Înlocuiți momelile deteriorate de apă sau contaminate cu mizerie.</li> </ul> |
|--|

#### 4.3.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

|  |
|--|
| Nu introduceți produsul direct în vizuini. |
|--|

#### 4.3.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

|  |
|--|
| Când amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei (ex. râuri, iazuri, canale navigabile, diguri, canale de irigație) sau a sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa. |
|--|

#### 4.3.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

|  |
|--|
|  |
|--|

#### 4.3.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

|  |
|--|
|  |
|--|

#### 4.4 Modul de utilizare

##### Utilizarea 4 - Șoareci de casă – populație – interior

|   |   |
|---|---|
| <b>Tipul produsului</b>   | TP 14 - Rodenticide   |
| <b>Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz</b>        | Nu este relevant pentru rodenticide   |
| <b>Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)</b> | denumirea științifică: Mus musculus<br>denumirea comună: House mouse<br>etapă de dezvoltare: de la tineri la adulți   |
| <b>Domeniul de utilizare</b>                                      | de interior   |
| <b>Metoda (metodele) de aplicare</b>                              | Metoda: cerere momeală<br>Descriere detaliată:<br>Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și deteriorării.   |
| <b>Doza (dozele) și frecvența de aplicare</b>                     | Frecvența de aplicare: 20 – 40 g momeală pastă per capcană<br>Diluare (%): 0<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Dacă sunt necesare mai multe capcane, atunci distanța minimă dintre acestea ar trebui să fie 5 metri.   |
| <b>Categoria (categoriile) de utilizatori</b>                     | Publicul larg (neprofesionist)  |
| <b>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</b>         | Până la 150 g (conține momeală rodenticidă de 10-20 g în plicuri de momeală sub formă de pastă).<br>Tipul ambalajului: flacoane, pungi, saci, găleți, cutii, cutii de carton, canistre. Ambalajele pot fi etichetate, tipărite sau serigrafiate.<br>Materialul ambalajului: plastic sau compozit din plastic (HDPE, PP, PET), hârtie. |

#### 4.4.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Capcanele se inspectează cel puțin la fiecare 2- 3 zile de la începerea tratamentului și apoi cel puțin săptămânal pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a înlătura rozătoarele prinse. Re-umpleți cu momeală când este necesar.

#### 4.4.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

|  |
|--|
|  |
|--|

#### 4.4.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

|  |
|--|
|  |
|--|

#### 4.4.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

|  |
|--|
|  |
|--|

#### 4.4.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

|  |
|--|
|  |
|--|

#### 4.5 Modul de utilizare

##### Utilizarea 5 - Șobolani –Populație – interior

|   |   |
|---|---|
| <b>Tipul produsului</b>   | TP 14 - Rodenticide   |
| <b>Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz</b>        | Nu este relevant pentru rodenticide.  |
| <b>Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)</b> | denumirea științifică: Rattus norvegicus<br>denumirea comună: Brown rat<br>etapă de dezvoltare: de la tineri la adulți                  |
| <b>Domeniul de utilizare</b>                                      | de interior   |
| <b>Metoda (metodele) de aplicare</b>                              | Metoda: cerere momeală<br>Descriere detaliată:<br>Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și deteriorării. |

**Doza (dozele) și frecvența de aplicare**

Frecvența de aplicare: 100 g - 200 g per capcană  
Diluare (%):  
Numărul și calendarul de aplicare:  
Dacă sunt necesare mai multe capcane, atunci distanța minimă dintre acestea ar trebui să fie 5 metri.

**Categoria (categoriile) de utilizatori**

Publicul larg (neprofesionist)

**Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare**

Până la 150 g (conține momeală rodenticidă de 10-20 g în plicuri de momeală sub formă de pastă).  
Tipul ambalajului: flacoane, pungi, saci, găleți, cutii, cutii de carton, canistre. Ambalajele pot fi etichetate, tipărite sau serigrafiate.  
Materialul ambalajului: plastic sau compozit din plastic (HDPE, PP, PET), hârtie.

**4.5.1 Instrucțiuni specifice de utilizare**

Capcanele se inspectează după fiecare 5 - 7 zile de la începerea tratamentului și apoi cel puțin săptămânal pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a înlătura rozătoarele prinse. Re-umpleți cu momeală când este necesar.

**4.5.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare**

**4.5.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

**4.5.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia**

**4.5.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

## 4.6 Modul de utilizare

### Utilizarea 6 - Șobolani – profesional și populație – în jurul clădirilor

|   |   |
|---|---|
| <b>Tipul produsului</b>   | TP 14 - Rodenticide   |
| <b>Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz</b>        | Nu este relevant pentru rodenticide   |
| <b>Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)</b> | denumirea științifică: Rattus norvegicus<br>denumirea comună: Brown rat<br>etapă de dezvoltare: de la tineri la adulți  |
| <b>Domeniul de utilizare</b>                                      | Other<br><br>În jurul clădirilor.   |
| <b>Metoda (metodele) de aplicare</b>                              | Metoda: cerere momeală<br>Descriere detaliată:<br>Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și deteriorării.   |
| <b>Doza (dozele) și frecvența de aplicare</b>                     | Frecvența de aplicare: 100 g - 200 g momeală sub formă de pastă per capcană<br>Diluare (%): 0<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Dacă sunt necesare mai multe capcane, atunci distanța minimă dintre acestea ar trebui să fie 5 metri.  |
| <b>Categoria (categoriile) de utilizatori</b>                     | Publicul larg (neprofesionist)  |
| <b>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</b>         | Până la 150 g (conține momeală rodenticidă de 10-20 g în plicuri de momeală sub formă de pastă).<br><br>Tipul ambalajului: flacoane, pungă, saci, găleți, cutii, cutii de carton, canistre. Ambalajele pot fi etichetate, tipărite sau serigrafiate.<br><br>Materialul ambalajului: plastic sau compozit din plastic (HDPE, PP, PET), hârtie. |

#### 4.6.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

- Amplasați capcanele în zone fără risc de inundare.  
- Înlocuiți momelele deteriorate de apă sau contaminate cu mizerie  
- Capcanele se inspectează după fiecare 5 - 7 zile de la începerea tratamentului și apoi cel puțin săptămânal pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a înlătura rozătoarele prinse. Re-umpleți cu momeală când este necesar.

#### **4.6.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare**

Pentru uz profesional, în jurul clădirilor. Nu introduceți produsul direct în vizuini.

#### **4.6.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Pentru uz profesional: când amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei (ex. râuri, iazuri, canale navigabile, diguri, canale de irigație) sau a sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

#### **4.6.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia**

#### **4.6.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

### **5. Direcții generale de utilizare**

#### **5.1. Instrucțiuni de utilizare**

Uz profesional:

- Înainte de utilizare, citiți și respectați informațiile despre produs și toate informațiile care îl însoțesc sau care sunt furnizate la vânzare

- Studiați și evaluați în prealabil zona infestată, pentru a identifica speciile de rozătoare și locurile de activitate ale acestora și pentru a determina cauzele posibile și amploarea infestării.

- Îndepărtați hrana la care rozătoarele pot ajunge ușor (ex. boabe de cereale sau resturi de mâncare)). Pe lângă acestea, nu curățați zona infestată imediat înainte de tratament, deoarece astfel veți deranja populația de rozătoare și veți îngreuna acceptarea momelii.

- Produsul trebuie să fie utilizat numai în cadrul unui sistem de combatere integrată a dăunătorilor (IPM), care include, printre altele, măsuri de asigurare a igienei și atunci când este posibil, metode fizice de combatere.

- Analizați posibilitatea de a lua măsuri de combatere preventivă (ex. astupați găurile, îndepărtați cât mai mult posibil eventualele surse de hrană și băutură) pentru a crește șansa de consum al produsului și pentru a reduce riscul de reinvadare.

- Capcanele trebuie amplasate în imediata apropiere a locurilor în care s-au observat prezența rozătoarelor (ex. căi de acces, locuri de cuibărit, jgheaburi de hrănire, găuri, vizuini, etc).

- Dacă este posibil, capcanele trebuie să fie fixate pe sol sau pe alte structuri.

- Capcanele trebuie să fie etichetate cu avertismente clare privind informațiile înscrise la punctul 5.3 de pe etichetă.

- Atunci când produsul este utilizat în zone publice, zonele tratate trebuie să fie marcate pe toată perioada tratamentului, iar în apropierea momelii trebuie să se amplaseze avertismentele privind riscul de intoxicare primară sau secundară cu anticoagulant, precum și măsurile de prim-ajutor, care se iau în caz de intoxicare.

- Momeala trebuie să fie fixată pentru a nu putea fi îndepărtată de capcană.

- Amplasați produsul la distanță de îndemâna copiilor, păsări, animale de companie sau alte specii de animale neavizate.

- Amplasați produsul la distanță de alimente, băuturi și alte lucruri pentru animale, ustensile sau suprafețe cu care ar putea intra în contact.

- În timpul manipulării produsului, nu mâncați, beți sau fumați. Spălați-vă mâinile și pielea expusă direct după utilizarea produsului.

- Dacă asimilarea momelii este redusă comparativ cu dimensiunea aparentă a infestării, luați în considerare mutarea capcanelor în alte locuri și eventual o nouă schimbare a formulei momelii.

- Dacă după 35 zile după tratament momeala continuă să fie consumată și nu se observă o diminuare a activității rozătoarelor, trebuie să se determine cauza posibilă. Dacă s-au exclus alte cauze, este posibil ca rozătoarele să aibă un grad înalt de rezistență, astfel încât poate fi necesară utilizarea unui rodenticid anticoagulant, dacă este disponibil sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic. De asemenea, luați în considerare și utilizarea de curse-capcane, ca și măsură de combatere alternativă.

- Îndepărtați momeala rămasă la finalul tratamentului.

Uz - Populație:

- Înainte de utilizare, citiți și respectați informațiile despre produs și toate informațiile care îl însoțesc sau care sunt furnizate la vânzare

- Înainte de a folosi produse rodenticide, ar trebui să luați în considerare și utilizarea unor metode non-chimice (ex. curse)

- Îndepărtați hrana la care rozătoarele pot ajunge ușor (ex. boabe de cereale sau resturi de mâncare)). Pe lângă acestea, nu curățați zona infestată imediat înainte de tratament , deoarece astfel veți deranja populația de rozătoare și veți îngreuna acceptarea momelei.

- Purtați mănuși de protecție (cauciuc) rezistente la substanțele chimice în timpul manipulării produsului.
- Frecvența vizitelor în zona tratată rămâne la discreția operatorului, în funcție de rezultatele studiului efectuat la începutul perioadei de tratament. Această frecvență trebuie să fie conformă cu recomandările cuprinse în codul de bune practici.
- Capcanele trebuie amplasate în imediata apropiere a locurilor în care s-au observat prezența rozătoarelor (ex. căi de acces, locuri de cuibărit, jgheaburi de hrănire, găuri, vizuini, etc).
- Dacă este posibil, capcanele trebuie să fie fixate pe sol sau pe alte structuri.
- Amplasați produsul la distanță de îndemâna copiilor, păsări, animale de companie sau alte specii de animale neavizate.
- Amplasați produsul la distanță de alimente, băuturi și alte lucruri pentru animale, ustensile sau suprafețe cu care ar putea intra în contact.
- Nu amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei unde ar putea intra în contact cu apa.
- În timpul manipulării produsului, nu mâncați, beți sau fumați. Spălați-vă mâinile și pielea expusă direct după utilizarea produsului.
- Îndepărtați momeala rămasă la finalul tratamentului.

## 5.2. Măsuri de reducere a riscurilor



#### Uz profesional:

- Dacă este posibil, înainte de tratament, informați persoanele (utilizatorii zonei tratate și împrejurimile acestora) care s-ar putea afla în preajma capcanelor ce au legătură cu campania de combatere a rozătoarelor (dacă e cazul).
- Pentru a reduce riscul de intoxicație secundară, căutați și îndepărtați frecvent rozătoarele moarte pe perioada tratamentului (ex. cel puțin de două ori pe săptămână). [Dacă este relevant, specificați dacă este necesară o inspecție mai frecventă sau zilnică]
- Produsele nu se utilizează pe o durată mai mare de 35 zile fără o evaluare a stării de infestare a eficacității tratamentului.
- Nu utilizați momeli care conțin substanțe active anticoagulante ca momeli permanente pentru prevenirea infestării cu rozătoare sau monitorizarea activităților rozătoarelor.
- Informațiile despre produs (adică eticheta și / sau prospectul) trebuie să arate clar că:
  - produsul nu va fi furnizat publicului larg (de ex. „numai pentru uz profesional”). produsul trebuie utilizat în stații de momeli adecvate, rezistente la manipulare (de exemplu, „se utilizează numai în stații de momeli rezistente la manipulare”) utilizatorii trebuie să eticheteze în mod corespunzător stațiile de momelă cu informațiile menționate în secțiunea 5.3 din RCP (de exemplu, etichetați stațiile de momelă conform recomandărilor produsului”).
  - Utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în termen de 35 de zile. Informațiile despre produs (ex. eticheta și / sau prospectul) recomandă în mod clar că, în cazul lipsei de eficacitate suspectată până la sfârșitul tratamentului (dacă se mai observă activitatea rozătoarelor), utilizatorul trebuie să solicite sfatul furnizorului produsului sau să apeleze un serviciu de control împotriva dăunătorilor.
- Nu spălați stațiile de momelă cu apă între aplicații.
- Eliminați rozătoarele moarte în conformitate cu cerințele locale.

#### Uz- Populație:

- Analizați posibilitatea de a lua măsuri de combatere preventive (ex. astupați găurile, îndepărtați cât mai mult posibil eventualele surse de hrană și băutură) pentru a crește șansa de consum al produsului și pentru a reduce riscul de reinvadare.
- Nu utilizați prin rodenticide anticoagulante ca momeli permanente (ex. pentru prevenirea infestării cu rozătoare sau pentru a detecta activitatea rozătoarelor) .
- Informațiile despre produs (ex. eticheta și / sau prospectul) trebuie să arate în mod clar că:
  - produsul trebuie utilizat în stații de momeli adecvate rezistente la manipulare (de exemplu, „se utilizează numai în stațiile de momelă rezistente la manipulare”).
  - utilizatorii trebuie să eticheteze în mod corespunzător stațiile de momelă cu informațiile menționate în secțiunea 5.3 din RCP (de exemplu, „etichetați stațiile de momelă conform recomandărilor produsului”).
  - utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în termen de 35 de zile. Informațiile despre produs (ex. eticheta și / sau prospectul) recomandă în mod clar că, în cazul lipsei de eficacitate suspectată până la sfârșitul tratamentului (adică se mai observă activitatea rozătoarelor), utilizatorul trebuie să solicite sfatul furnizorului produsului sau să apeleze un serviciu de control pentru combaterea dăunătorilor.
- Căutați și eliminați rozătoarele moarte în timpul tratamentului, cel puțin atât de des cât sunt inspectate stațiile de momelă.
- Eliminați rozătoarele moarte conform cu cerințele locale.

### 5.3. Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Pentru uz profesional și populație:

Acest produs conține o substanță anticoagulantă. În caz de ingestie, simptomele, care pot apărea cu întârziere, pot să includă sângerări nazale și gingivale. În cazuri severe, pot să apară echimoze pe suprafața pielii și sânge în fecale sau urină.

- Antidot: Vitamina K1 administrată numai de personal medical/ veterinar.

- În caz de:

- Expunere cutanată, spălați pielea cu apă, apoi cu apă și săpun.

- Expunere oculară, clătiți ochii cu lichid de uz ocular, țineți pleoapele deschise timp de cel puțin 10 minute.

- Expunere orală, clătiți atent gura cu apă. Nu administrați niciodată substanțe pe cale orală unei persoane incoștiente. Nu provocați vomă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul și prezentați ambalajul sau eticheta produsului. Contactați un medic veterinar specializat dacă produsul a fost înghițit de vreun animal.

- Capcanele trebuie să fie etichetate cu următoarele informații: "a nu se muta sau deschide", "conține rodenticid", "denumirea produsului sau numărul autorizației", "substanța activă" și "în caz de incident, sunați la un centru de informare toxicologică".

- Periculos pentru animalele sălbatice.

### 5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

La sfârșitul perioadei de tratament, eliminați momeala neconsumată și ambalajul în conformitate cu cerințele locale.

### 5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Depozitați în locuri uscate, răcoroase și bine ventilate. Păstrați ambalajele închise departe de razele soarelui. Depozitați în locuri unde nu au acces copiii, păsările, animalele de companie și animalele de fermă.  
Termen de valabilitate: 2 ani

## 6. Alte informații

Din cauza modului lent de acțiune, rodenticidele anticoagulante își produc efectul după 4 la 10 zile de la consumul momelii. Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâinile neprotejate, folosiți mănuși sau instrumente, ca și clești, atunci când le îndepărtați.  
Acest produs conține un agent amar și colorant.

