

**PT**

*ANEXO*

**RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO BIOCIDA (SPC BP)**

Vebitox Facum Creme

**Tipo(s) de produto**

PT14: Rodenticidas

**Número de autorização:** PT/DGS mrp171/2019

**Número da decisão de autorização R4BP:** PT-0021193-0000

---

## Capítulo 1. INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

### 1.1. Nome(s) comercial(ais) do produto

Nome(s) comercial(ais) do produto	Vebitox Facum Creme
-----------------------------------	---------------------

### 1.2. Titular da autorização

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
	Endereço	via Desman, 43 35010 Borgoricco Itália
Número de autorização	PT/DGS mrp171/2019	
<i>Número da decisão de autorização R4BP</i>	PT-0021193-0000	
Data da autorização	11/10/2018	
Data de caducidade da autorização	31/12/2026	

### 1.3. Fabricante(s) do produto

Nome do fabricante	Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
Endereço do fabricante	Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD) Itália
Localização das instalações de fabrico	Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD) Itália

### 1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

Substância ativa	Brodifacume
Nome do fabricante	Activa s.r.l.
Endereço do fabricante	Via Feltre 32 20132 Milano Itália
Localização das instalações de fabrico	Via tre ponti, 22 37050 Zevio (VR) Itália

---

## Capítulo 2. COMPOSIÇÃO E FORMULAÇÃO DO PRODUTO

### 2.1. Informação qualitativa e quantitativa sobre a composição do produto

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Brodifacume	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro -1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	substância ativa	56073-10-0	259-980-5	0,005

### 2.2. Tipo(s) de formulação

RB isco (pronto a usar)

---

### Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA

Advertências de perigo	H360D: Pode afetar o nascituro.  H373: Pode afetar os órgãos (sangue) após exposição prolongada ou repetida {1:indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição:}.
Recomendações de prudência	P201: Pedir instruções específicas antes da utilização.  (P202): Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.  P280: Usar luvas de proteção.  P314: Get medical advice/attention if you feel unwell.  P405: Armazenar em local fechado à chave.  P501: Eliminar conteúdo em conformidade com a legislação nacional.



---

#### **4.1.1. Instruções específicas de utilização**

- As estações de isco devem ser visitadas, pelo menos, a cada 2 ou 3 dias no início do tratamento e posteriormente, pelo menos, uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para retirar corpos de roedores. Recarregar o isco quando necessário.
- [Quando disponível] Seguir as instruções suplementares fornecidas pelo código de boas práticas pertinente.

#### **4.1.2. Medidas de mitigação do risco específicas**

#### **4.1.3. Medidas de mitigação do risco específicas**

Consulte "Instruções para uso".

#### **4.1.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Ao colocar pontos de isco nas imediações de águas de superfície (por exemplo, rios, lagos, canais de água, diques, canais de irrigação) ou sistemas de drenagem de águas, certificar-se de que é evitado o contacto do isco com água.

#### **4.1.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Consulte "Instruções para uso".

#### **4.1.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Consulte "Instruções para uso".

### **4.2. Descrição de utilizações**

**Tabela 2. Ratazanas (ratos) – profissionais – interior**

Tipo de produto	PT14: Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-

Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	<p>Nome científico: Rattus norvegicus Nome comum: brown rat Estadio de desenvolvimento: adultos</p> <p>Nome científico: Rattus norvegicus Nome comum: brown rat Estadio de desenvolvimento: jovens</p> <p>Nome científico: Rattus rattus Nome comum: roof rat Estadio de desenvolvimento: adultos</p> <p>Nome científico: Rattus rattus Nome comum: roof rat Estadio de desenvolvimento: jovens</p>
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	<p>Método: Aplicação de isco</p> <p>Descrição detalhada: VI.2 pontos de isco cobertos e protegidos VI.2.1 em estações de isco invioláveis VI.2.2 Outra cobertura</p>
Frequência de aplicação e dosagem	<p>Taxa de aplicação: 200 g</p> <p>Diluição (%): 100</p> <p>Número e calendário da aplicação: 200 g de isco por estação de isco. Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros, em caso de nível de infestação baixo. Em caso de elevado nível de infestação, a distância entre as estações deve ser de 2 metros.</p> <p>E' sugerido um tratamento de 5 semanas (35 dias).</p>
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	<p>Dimensão da embalagem: de 1,5 Kg a 25Kg</p> <p>Cartucho : 200- 300-400-500 g (PE or HDPE) Tubo: 50-75-100-200-250-300 g (PE or HDPE) Bandeja plástica: 25-30-40-50-75-80-100 g (PVC) Balde: 2-3-5-10-15-20 kg (PE, PP or HDPE)</p>

---

#### **4.2.1. Instruções específicas de utilização**

- As estações de isco devem ser visitadas, pelo menos, a cada 5 ou 7 dias no início do tratamento e posteriormente, pelo menos, uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para retirar corpos de roedores. Recarregar o isco quando necessário.
- [Quando disponível] Seguir as instruções suplementares fornecidas pelo código de boas práticas pertinente.

#### **4.2.2. Medidas de mitigação do risco específicas**

#### **4.2.3. Medidas de mitigação do risco específicas**

Consulte "Instruções para uso".

#### **4.2.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Ao colocar pontos de isco nas imediações de águas de superfície (por exemplo, rios, lagos, canais de água, diques, canais de irrigação) ou sistemas de drenagem de águas, certificar-se de que é evitado o contacto do isco com água.

#### **4.2.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Consulte "Instruções para uso".

#### **4.2.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Consulte "Instruções para uso".

### **4.3. Descrição de utilizações**

#### **Tabela 3. Ratos domésticos e ratazanas (ratos) – profissionais – exterior em redor de edifícios**

Tipo de produto	PT14: Rodenticidas
-----------------	--------------------

Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	<p>Nome científico: Rattus norvegicus  Nome comum: brown rat  Estadio de desenvolvimento: adultos</p> <p>Nome científico: Rattus norvegicus  Nome comum: brown rat  Estadio de desenvolvimento: jovens</p> <p>Nome científico: Rattus rattus  Nome comum: roof rat  Estadio de desenvolvimento: adultos</p> <p>Nome científico: Rattus rattus  Nome comum: roof rat  Estadio de desenvolvimento: jovens</p> <p>Nome científico: Mus musculus  Nome comum: house mouse  Estadio de desenvolvimento: adultos</p> <p>Nome científico: Mus musculus  Nome comum: house mouse  Estadio de desenvolvimento: jovens</p>
Campo(s) de utilização	<p>outro: Other</p> <p>redor de edifícios</p>
Método(s) de aplicação	<p>Método: Aplicação de isco</p> <p>Descrição detalhada: VI.2 pontos de isco cobertos e protegidos  VI.2.1 em estações de isco invioláveis VI.2.2 Outra cobertura</p>
Frequência de aplicação e dosagem	<p>Taxa de aplicação: Ratazanas: 200g - Ratos domésticos : 20g</p> <p>Diluição (%): 100</p> <p>Número e calendário da aplicação:  Ratazanas: 200 g de isco por estação de isco. Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros, em caso de nível de infestação baixo. Em caso de elevado nível de infestação, a distância entre as estações deve ser de 2 metros.</p> <p>E' sugerido um tratamento de 5 semanas (35 dias).</p> <p>Ratos domésticos: 20 g de isco por estação de isco. Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros, em caso de nível de infestação baixo. Em caso de elevado nível de infestação, a distância entre as estações deve ser de 2 metros.</p> <p>E' sugerido um tratamento de 5 semanas (35 dias).</p>

Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	<p>Dimensão da embalagem: de 1,5 Kg a 25Kg</p> <p>Cartucho : 200- 300-400-500 g (PE or HDPE)  Tubo: 50-75-100-200-250-300 g (PE or HDPE)  Bandeja plástica: 25-30-40-50-75-80-100 g (PVC)  Balde: 2-3-5-10-15-20 kg (PE, PP or HDPE)</p>

#### 4.3.1. Instruções específicas de utilização

- Proteger o isco das condições atmosféricas (por exemplo, chuva, neve, etc.). Colocar as estações de isco em áreas não sujeitas a inundações.
- As estações de isco devem ser visitadas [no caso de ratos - pelo menos, 2 a 3 dias no] [no caso de ratazanas - apenas 5 a 7 dias após o] início do tratamento e posteriormente, pelo menos, uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para retirar os corpos de roedores. Recarregar o isco quando necessário.
- Substituir o isco nas estações em que este tenha sido danificado por água ou contaminado por sujidade.
- [Quando disponível] Seguir as instruções suplementares fornecidas pelo código de boas práticas pertinente.

#### 4.3.2. Medidas de mitigação do risco específicas

#### 4.3.3. Medidas de mitigação do risco específicas

Não aplicar este produto diretamente nas tocas.

#### 4.3.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ao colocar pontos de isco nas imediações de águas de superfície (por exemplo, rios, lagos, canais de água, diques, canais de irrigação) ou sistemas de drenagem de águas, certificar-se de que é evitado o contacto do isco com água.

#### 4.3.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Consulte "Instruções para uso".

#### 4.3.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Consulte "Instruções para uso".

#### 4.4. Descrição de utilizações

**Tabela 4. Ratos domésticos e/ou ratazanas (ratos) – profissionais especializados – interior**

Tipo de produto	PT14: Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: Mus musculus Nome comum: house mouse Estadio de desenvolvimento: adultos  Nome científico: Mus musculus Nome comum: house mouse Estadio de desenvolvimento: jovens
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação de isco  Descrição detalhada: VI.2 pontos de isco cobertos e protegidos VI.2.1 em estações de isco invioláveis VI.2.2 Outra cobertura
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Ratazanas: 200g - Ratos domésticos : 20g  Diluição (%): 100  Número e calendário da aplicação:  Ratazanas: 200 g de isco por estação de isco. Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros, em caso de nível de infestação baixo. Em caso de elevado nível de infestação, a distância entre as estações deve ser de 2 metros.  E' sugerido um tratamento de 5 semanas (35 dias).  Ratos domésticos: 20 g de isco por estação de isco. Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros, em caso de nível de infestação baixo. Em caso de elevado nível de infestação, a distância entre as estações deve ser de 2 metros.

	E' sugerido um tratamento de 5 semanas (35 dias).
Categoria(s) de utilizadores	profissional com formação
Capacidade e material da embalagem	<p>Dimensão da embalagem: de 1,5 Kg a 25Kg</p> <p>Cartucho : 200- 300-400-500 g (PE or HDPE)  Tubo: 50-75-100-200-250-300 g (PE or HDPE)  Bandeja plástica: 25-30-40-50-75-80-100 g (PVC)  Balde: 2-3-5-10-15-20 kg (PE, PP or HDPE)</p>

#### 4.4.1. Instruções específicas de utilização

- Remover o produto remanescente no final do período de tratamento.
- [Quando disponível] Seguir as instruções suplementares fornecidas pelo código de boas práticas pertinente.

#### 4.4.2. Medidas de mitigação do risco específicas

#### 4.4.3. Medidas de mitigação do risco específicas

- Sempre que possível, antes do tratamento, informar os possíveis transeuntes (por exemplo, utilizadores da área tratada e das suas imediações) sobre a campanha de controlo de roedores.
- Ponderar a aplicação de medidas de controlo preventivas (tapar furos, remover possíveis alimentos e bebidas, tanto quanto possível) para melhorar a ingestão do produto e reduzir a probabilidade de novas invasões.
- [Quando disponível] Para reduzir o risco de envenenamento secundário, procurar e remover os roedores mortos durante o tratamento a intervalos frequentes, de acordo com as recomendações fornecidas pelo código de boas práticas pertinente
- Não utilizar o produto como isco permanente para a prevenção de infestações de roedores ou para a monitorização de atividades de roedores.
- Não utilizar o produto em tratamentos por pulsed baiting.

#### 4.4.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

---

Ao colocar estações de isco nas imediações de sistemas de drenagem de águas, certificar-se de que é evitado o contacto do isco com a água.

#### **4.4.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Consulte "Instruções para uso".

#### **4.4.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Consulte "Instruções para uso".

### **4.5. Descrição de utilizações**

**Tabela 5. Ratos domesticos e/ou ratazanas (ratos)- profissionais especializados - exterior em redor de edifícios**

Tipo de produto	PT14: Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: Mus musculus Nome comum: house mouse Estadio de desenvolvimento: adultos  Nome científico: Mus musculus Nome comum: house mouse Estadio de desenvolvimento: jovens
Campo(s) de utilização	outro: Other  Redor de edifícios
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação de isco  Descrição detalhada: VI.2 pontos de isco cobertos e protegidos VI.2.1 em estações de isco invioláveis VI.2.2 Outra cobertura
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Ratazanas: 200g - Ratos domésticos : 20g  Diluição (%): 100  Número e calendário da aplicação:

	<p>Ratazanas: 200 g de isco por estação de isco. Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros, em caso de nível de infestação baixo. Em caso de elevado nível de infestação, a distância entre as estações deve ser de 2 metros.</p> <p>E' sugerido um tratamento de 5 semanas (35 dias).</p> <p>Ratos domésticos: 20 g de isco por estação de isco. Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros, em caso de nível de infestação baixo. Em caso de elevado nível de infestação, a distância entre as estações deve ser de 2 metros.</p> <p>E' sugerido um tratamento de 5 semanas (35 dias).</p>
Categoria(s) de utilizadores	profissional com formação
Capacidade e material da embalagem	<p>Dimensão da embalagem: de 1,5 Kg a 25Kg</p> <p>Cartucho : 200- 300-400-500 g (PE or HDPE)  Tubo: 50-75-100-200-250-300 g (PE or HDPE)  Bandeja plástica: 25-30-40-50-75-80-100 g (PVC)  Balde: 2-3-5-10-15-20 kg (PE, PP or HDPE)</p>

#### 4.5.1. Instruções específicas de utilização

- Proteger o isco das condições atmosféricas. Colocar os pontos de isco em áreas não sujeitas a inundações.
- Substituir o isco nos pontos em que este tenha sido danificado por água ou contaminado por sujidade.
- Remover o produto remanescente no final do período de tratamento
- [Quando disponível] Seguir as instruções suplementares fornecidas pelo código de boas práticas pertinente.

#### 4.5.2. Medidas de mitigação do risco específicas

#### 4.5.3. Medidas de mitigação do risco específicas

- 
- Sempre que possível, antes do tratamento, informar os possíveis transeuntes (por exemplo, utilizadores da área tratada e das suas imediações) sobre a campanha de controlo de roedores [em conformidade com o código de boas práticas aplicável, se existir].
  - Ponderar a aplicação de medidas de controlo preventivas (tapar furos, remover possíveis alimentos e bebidas, tanto quanto possível) para melhorar a ingestão do produto e reduzir a probabilidade de novas invasões.
  - Para reduzir o risco de envenenamento secundário, procurar e remover os roedores mortos durante o tratamento a intervalos frequentes, de acordo com as recomendações fornecidas pelo código de boas práticas pertinente.
  - Não utilizar o produto como isco permanente para a prevenção de infestações de roedores ou para a monitorização de atividades de roedores.
  - Não utilizar o produto em tratamentos por pulsed baiting.
  - Não aplicar este produto diretamente nas tocas.

#### **4.5.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Ao colocar pontos de isco nas imediações de águas de superfície (por exemplo, rios, lagos, canais de água, diques, canais de irrigação) ou sistemas de drenagem de águas, certificar-se de que é evitado o contacto do isco com água.

#### **4.5.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Consulte "Instruções para uso".

#### **4.5.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Consulte "Instruções para uso".

---

## Capítulo 5. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A UTILIZAÇÃO<sup>1</sup>

### 5.1. Instruções de utilização

#### PROFISSIONAIS

- Antes da utilização, ler e seguir as informações do produto, bem como quaisquer informações que o acompanhem ou sejam fornecidas no ponto de venda.
  - Efetuar uma inspeção preliminar da área infestada e uma avaliação no local a fim de identificar as espécies de roedores e os seus locais de atividade e determinar a causa provável e a dimensão da infestação.
  - Remover os alimentos que estejam ao alcance dos roedores (por exemplo, grãos soltos ou resíduos alimentares). Além disso, não limpar a área infestada imediatamente antes do tratamento, uma vez que tal apenas perturba a população de roedores e torna mais difícil a aceitação do isco.
  - O produto deve ser utilizado apenas como parte de um sistema de gestão integrada de pragas, incluindo, nomeadamente, medidas de higiene e, se possível, métodos físicos de controlo.
  - Ponderar a aplicação de medidas de controlo preventivas (tapar furos, remover possíveis alimentos e bebidas, tanto quanto possível) para melhorar a ingestão do produto e reduzir a probabilidade de novas invasões.
  - As estações de isco devem ser colocadas na vizinhança imediata de locais onde tenha sido observada anteriormente atividade de roedores (por exemplo, trilhos, locais de nidificação, explorações de criação, buracos, tocas, etc.).
  - Se possível, as estações de isco devem ser fixadas ao solo ou a outras estruturas.
  - Os rótulos das estações de isco devem mostrar claramente que as estações contêm rodenticidas e que não devem ser movidas ou abertas
  - Quando o produto for utilizado em áreas públicas, as áreas tratadas devem ser marcadas durante o período de tratamento e deve existir junto aos iscos um aviso explicativo do risco de envenenamento primário ou secundário através do anticoagulante, bem como a indicação das primeiras medidas a tomar em caso de envenenamento.
  - O isco deve ser protegido de modo a não poder ser arrastado da estação de isco.
  
  - Colocar o produto fora do alcance de crianças, aves, animais de companhia e de criação e outros animais não visados.
  
  - Colocar o produto longe de géneros alimentícios, bebidas e alimentos para animais, bem como de utensílios ou superfícies que tenham contacto com os mesmos.
  
  - Usar luvas de proteção resistentes a produtos químicos durante a fase de manuseamento do produto (o material das luvas deve ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto)
  - Durante a utilização do produto, não comer, beber ou fumar. Lavar as mãos e a pele exposta diretamente depois de utilizar o produto.
  - Se a dosagem do isco for baixa relativamente à dimensão aparente da infestação, considerar a colocação de estações de isco em mais locais e a possibilidade de mudar para outra formulação de isco.
  - Se, após um período de tratamento de 35 dias, os iscos continuarem a ser consumidos e não se registar um declínio na atividade dos roedores, a causa provável deve ser determinada.
- Nos casos em que tenham sido excluídos outros elementos, é provável que existam roedores resistentes, pelo que deve ser considerada a utilização de um rodenticida não anticoagulante, se possível, ou de um rodenticida anticoagulante mais potente. Considerar ainda a utilização de ratoeiras como uma medida de controlo alternativa.

#### PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS

- Antes da utilização, ler e seguir as informações do produto, bem como quaisquer informações que o acompanhem ou sejam fornecidas no ponto de venda.
- Efetuar uma inspeção preliminar da área infestada e uma avaliação no local a fim de identificar as espécies de roedores e os seus locais de atividade e determinar a causa provável e a dimensão da infestação.

---

<sup>1</sup>As instruções de utilização, as medidas de redução do risco e outras instruções de utilização ao abrigo da presente secção são válidas para todas as utilizações autorizadas.

- 
- Remover os alimentos que estejam ao alcance dos roedores (por exemplo, grãos soltos ou resíduos alimentares). Além disso, não limpar a área infestada imediatamente antes do tratamento, uma vez que tal apenas perturba a população de roedores e torna mais difícil a aceitação do isco.
  - O produto deve ser utilizado apenas como parte de um sistema de gestão integrada de pragas, incluindo, nomeadamente, medidas de higiene e, se possível, métodos físicos de controlo.
  - O produto deve ser colocado na proximidade imediata de locais onde foi detetada atividade de roedores (por exemplo, trilhos, locais de nidificação, explorações de criação, buracos, tocas, etc.).
  - Se possível, as estações de isco devem ser fixadas ao solo ou a outras estruturas.
  - Os rótulos das estações de isco devem mostrar claramente que as estações contêm rodenticidas e que não devem ser movidas ou abertas (para as informações que devem constar no rótulo, ver a secção 5.3).
  - Quando o produto for utilizado em áreas públicas, as áreas tratadas devem ser marcadas durante o período de tratamento e deve existir junto aos iscos um aviso explicativo do risco de envenenamento primário ou secundário através do anticoagulante, bem como a indicação das primeiras medidas a tomar em caso de envenenamento.
  - O isco deve ser protegido de modo a não poder ser arrastado da estação de isco.
  - Colocar o produto fora do alcance de crianças, aves, animais de companhia e de criação e outros animais não visados.
  - Colocar o produto longe de géneros alimentícios, bebidas e alimentos para animais, bem como de utensílios ou superfícies que tenham contacto com os mesmos.
  - Usar luvas de proteção resistentes a produtos químicos durante a fase de manuseamento do produto (o material das luvas deve ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto).
  - Durante a utilização do produto, não comer, beber ou fumar. Lavar as mãos e a pele exposta diretamente depois de utilizar o produto.
  - A frequência das visitas à área tratada deve ser determinada pelo operador, tendo em conta o inquérito realizado no início do tratamento. Essa frequência deve respeitar as recomendações formuladas pelo código de boas práticas aplicável.
  - Se a dosagem do isco for baixa relativamente à dimensão aparente da infestação, considerar a colocação de estações de isco em mais locais e a possibilidade de mudar para outra formulação de isco.
  - Se, após um período de tratamento de 35 dias, os iscos continuarem a ser consumidos e não se registar um declínio na atividade dos roedores, a causa provável deve ser determinada.
- Nos casos em que tenham sido excluídos outros elementos, é provável que existam roedores resistentes, pelo que deve ser considerada a utilização de um rodenticida não anticoagulante, se possível, ou de um rodenticida anticoagulante mais potente. Considerar ainda a utilização de ratoeiras como uma medida de controlo alternativa.

## **5.2. Medidas de redução do risco**

### **PROFISSIONAIS**

- O produto não deve ser fornecido ao público em geral (por exemplo, «reservado a profissionais»).
- Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Sempre que possível, antes do tratamento, informar os possíveis transeuntes (por exemplo, utilizadores da área tratada e das suas imediações) sobre a campanha de controlo de roedores [em conformidade com o código de boas práticas aplicável, se existir].
- Para reduzir o risco de envenenamento secundário, procurar e remover roedores mortos a intervalos frequentes durante o tratamento (por exemplo, pelo menos, duas vezes por semana).
- Os produtos não devem ser utilizados durante mais de 35 dias sem uma avaliação do estado da infestação e da eficácia do tratamento.
- Não utilizar iscos que contenham substâncias ativas anticoagulantes como iscos permanentes para a prevenção de infestações de roedores ou para a monitorização de atividades de roedores.
- A informação do produto (ou seja, o rótulo e/ou o folheto) devem mostrar claramente que:
  - produto não deve ser fornecido ao público em geral (por exemplo, «reservado a profissionais»).

- 
- o produto deve ser utilizado em estações de isco invioláveis adequadas (por exemplo, «utilizar apenas em estações de isco invioláveis»).
  - os utilizadores devem rotular adequadamente as estações de isco com as informações referidas na secção 5.3 do Resumo das Características do Produto (SPC) (por exemplo, «rotular as estações de isco em conformidade com as recomendações do produto»).
- Este produto deve eliminar os roedores no prazo de 35 dias. As informações do produto (ou seja, o rótulo e/ou o folheto) devem recomendar claramente que, em caso de suspeita de falta de eficácia no final do tratamento (ou seja, ainda é observável atividade de roedores), o utilizador deve aconselhar-se junto do fornecedor do produto ou contactar um serviço de controlo de pragas.
  - Não lavar as estações de isco com água entre as aplicações.
  - Eliminar os roedores mortos em conformidade com os requisitos locais.

## PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS

- O produto não deve ser fornecido ao público em geral (por exemplo, «reservado a profissionais especializados»).
- Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Whenever possible, prior to treatment, inform potential passers-by on the rodent control campaign [in accordance with the applicable code of practice, if any].
- A informação relativa ao produto (por exemplo, rótulo e/ou folheto) deve indicar claramente que o produto deve ser fornecido apenas a utilizadores profissionais qualificados que possam comprovar através de certificação que cumprem os requisitos de formação aplicáveis (por exemplo, «apenas para profissionais qualificados»).
- Não usar em locais onde a resistência à substância ativa pode ser suspeita.
- Os produtos não devem ser utilizados durante mais de 35 dias sem uma avaliação do estado da infestação e da eficácia do tratamento
- Não alternar a utilização de anticoagulantes diferentes, de potência comparável ou mais fraca, para efeitos de gestão da resistência. Para utilização alternada recorra-se antes a um rodenticida não-anticoagulante, caso esteja disponível, ou a um anticoagulante mais potente.
- Não lavar com água, entre as aplicações, as estações de isco ou utensílios usados em pontos de engodo cobertos e protegidos.
- Eliminar os roedores mortos em conformidade com os requisitos locais

### **5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

-Este produto contém uma substância anticoagulante. Em caso de ingestão, os sintomas, que podem demorar a manifestar-se, podem incluir hemorragia nasal e sangramento das gengivas. Em casos graves, podem surgir hematomas e presença de sangue nas fezes ou na urina.

- Antídoto: Vitamina K1 administrada apenas por pessoal médico/veterinário. - Em caso de:- -Exposição cutânea, lavar a pele com água e depois com água e sabão.

---

- Exposição ocular, lavar os olhos com água ou solução para lavar os olhos, manter as pálpebras abertas durante, pelo menos, 10 minutos.

-Exposição oral, lavar cuidadosamente a boca com água. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Não provocar o vômito.Em caso de ingestão, consultar imediatamente um médico e mostrar o recipiente ou o rótulo do produto. Contatar um cirurgião veterinário, em caso de ingestão por um animal doméstico.-Em caso de ingestão, procurar imediatamente aconselhamento médico e mostrar o recipiente ou o rótulo do produto. Contactar um cirurgião veterinário, em caso de ingestão por um animal de

companhia.

-As estações de iscodevem ser rotuladas com as seguintes informações: “não mover ou abrir”,“contém rodenticida”,“Vebitox facum pasta ou número de autorização”,“substância(s) ativa(s)” e “em caso de incidente, contatarum centro de intoxicações”.

- Perigoso para a vida selvagem.

#### **5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

No final do tratamento, eliminar o isco não consumido e a embalagem, em conformidade com os requisitos locais .

Recomenda-se a utilização de luvas.

#### **5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

- Armazenado a temperatura  $<35^{\circ}\text{C}$  .

- Manter o recipiente fechado e ao abrigo da luz solar direta.

- Armazenar em locais inacessíveis a crianças, pássaros, animais de companhia e animais de criação.

-Prazo de validade: 2 anos.

---

## **Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES**

-Devido ao seu modo de ação retardado, os rodenticidas anticoagulantes demoram 4 a 10 dias a ser eficazes após o consumo do isco.

-Os roedores podem ser portadores de doenças

. Não tocar em roedores mortos com as mãos nuas, utilizar luvas ou utilizar ferramentas (por exemplo, pinças) ao eliminá-los.

- Este produto contém um agente amargante e um corante.