

LV

PIELIKUMS

PRODUKTA APRAKSTA KOPSAVILKUMS BIOCĪDAM

Insect Repellent Lotion IR3535 10%

Produkta tips(-i)

PT19: Repelenti un atraktanti

Licences numurs: LV/2019/MR/015

R4BP vienuma numurs: LV-0013293-0000

1. ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA	3
1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums(-i)	3
1.2. Licences turētājs	3
1.3. Produkta ražotājs(-i)	3
1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)	3
2. PRODUKTA SASTĀVS UN FORMULĒŠANA	4
2.1. Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par produkta sastāvu	4
2.2. Formulēšanas tips(-i)	4
3. BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI	5
4. LICENCĒTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)	6
4.1. Lietošanas veidu apraksts	6
4.2. Lietošanas veidu apraksts	7
5. VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU	9
5.1. Lietošanas pamācība	9
5.2. Riska mazināšanas pasākumi	9
5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai	9
5.4. Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu	9
5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos	10
6. CITA INFORMĀCIJA	11

Nodaļa 1. ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums(-i)

Tirdzniecības nosaukums(-i)	Insect Repellent Lotion IR3535 10%
-----------------------------	------------------------------------

1.2. Licences turētājs

Licences turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	Merck KGaA
	Adrese	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Vācija
Licences numurs		LV/2019/MR/015
<i>R4BP vienuma numurs</i>		LV-0013293-0000
Licences piešķiršanas datums		07/11/2019
Licences derīguma termiņš		04/11/2029

1.3. Produkta ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums	Merck KGaA
Ražotāja adrese	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Vācija
Ražotņu atrašanās vietas	Merck KGaA site 1 Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Vācija

1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

Aktīvā viela	Etilbutilacetilaminopropionāts
Ražotāja nosaukums	Merck S.L.U.
Ražotāja adrese	Calle Maria de Molina 28006 Madrid Spānija
Ražotņu atrašanās vietas	Merck S.L.U. site 1 Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Spānija

Aktīvā viela	Etilbutilacetilaminopropionāts
Ražotāja nosaukums	Merck KGaA
Ražotāja adrese	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Vācija
Ražotņu atrašanās vietas	Merck KGaA site 1 Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Spānija

Nodaļa 2. PRODUKTA SASTĀVS UN FORMULĒŠANA

2.1. Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par produkta sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EC numurs	Saturs (%)
Etilbutilacetilamīns	propionāts	aktīvā viela	52304-36-6	257-835-0	10

2.2. Formulēšanas tips(-i)

EW Emulsija, eļļa ūdenī

Nodaļa 3. BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējumi	
Drošības prasību apzīmējumi	P102: Sargāt no bērniem. P103: Rūpīgi izlasiet un izpildiet visus norādījumus.

Nodaļa 4. LICENCĒTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1. Lietošanas veidu apraksts

Tabula 1. Līdzeklis uzklāšanai uz cilvēka ādas odu atvairīšanai – lietošanai gatavs – plašai sabiedrībai

Produkta tips	PT19: Repelenti un atraktanti
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Repellents
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: cita: Culicidae: Culex spp. Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Odi Attīstības stadija: pieaugušie Zinātniskais nosaukums: cita: Culicidae: Aedes spp. Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Odi Attīstības stadija: pieaugušie Zinātniskais nosaukums: cita: Culicidae: Anopheles spp. Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Odi Attīstības stadija: pieaugušie
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās lietošanai ārā Izmantojiet ārpus telpām un tikai labi vēdināmās iekštelpās. Produkts ir lietošanai gatavs kukaiņu atvairīšanas līdzeklis, lai aizsargātu cilvēkus no moskītiem mērena klimata apgabalos.
Lietošanas metode(-es)	Metode: Manuāla lietošana sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 1.16 µl/cm ² Atšķaidīšana (%): - Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Uzklāšana aizsardzībai pret moskītiem (1,16 µl/cm ²) — aizsardzības ilgums 8 stundas Pieaugušajiem: 10,58 ml/uzklāšanai uz ķermeņa daļām, ko nenosedz apģērbs*. Nelielu līdzekļa daudzumu uzklājiet tā, lai tas vienmērīgi noklātu vietas, kuras nenosedz apģērbs: sejau, plaukstas, rokas, kājas un pēdas. Produktu var uzklāt atkārtoti ne vairāk kā 2 reizes dienā. Bērniem (6-12 gadi): 5,87 ml/uzklāšanai uz ķermeņa daļām, ko nenosedz apģērbs*. Maksimums viena lietošanas reize dienā. Bērniem (2-6 gadi): 4,33 ml/uzklāšanai uz ķermeņa daļām, ko nenosedz apģērbs*. Maksimums viena lietošanas reize dienā. Maziem bērniem (1-2 gadi): 3,06 ml/uzklāšanai uz ķermeņa daļām, ko nenosedz apģērbs*. Maksimums viena lietošanas reize dienā. Zidaiņiem (0-1 gads): 2,61 ml/uzklāšanai uz ķermeņa daļām, ko nenosedz apģērbs*. Maksimums viena lietošanas reize dienā. * Uzklājiet produktu tikai ķermeņa vietās, ko nenosedz apģērbs: uz sejas, rokām, kājām, pēdām. Neuzklājiet uz visa ķermeņa.
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)

Iepakojuma izmēri un materiāls	<p>Tūbiņa — ar uzspiežamu vāciņu, skrūvējamu vāciņu, noņemamu vāciņu vai atlokāmu vāciņu (PP) - (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA)</p> <p>Tūbiņa — ar uzspiežamu vāciņu, skrūvējamu vāciņu, noņemamu vāciņu vai atlokāmu vāciņu (PP) - (alumīnijā ar iekšējo slāni: PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA)</p> <p>Pudeliņa — ar skrūvējamu vāciņu, noņemamu vāciņu vai dozatoru - (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA)</p>
--------------------------------	--

4.1.1. Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi

Skatiet sadaļu 5.1

4.1.2. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

Skatiet sadaļu 5.2

4.1.3. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatiet sadaļu 5.3

4.1.4. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatiet sadaļu 5.4

4.1.5. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatiet sadaļu 5.5

4.2. Lietošanas veidu apraksts

Tabula 2. Līdzeklis uzklāšanai uz cilvēka ādas ērcu atvairīšanai – lietošanai gatavs – plašai sabiedrībai

Produkta tips	PT19: Repelenti un atraktanti
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Repellents
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	<p>Zinātniskais nosaukums: cita: <i>Ixodes ricinus</i> Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Ērces Attīstības stadija: cita: Nīmfas un pieaugušie</p> <p>Zinātniskais nosaukums: cita: <i>Ixodes scapularis</i> Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Ērces Attīstības stadija: cita: Nīmfas un pieaugušie</p>
Lietošanas joma(-as)	<p>lietošanai telpās lietošanai ārā</p> <p>"Izmantojiet ārpus telpām un tikai labi vēdināmās iekštelpās. Produkts ir lietošanai gatavs kukaiņu atvairīšanas līdzeklis, lai aizsargātu cilvēkus no ērcēm mērena klimata apgabalos."</p>
Lietošanas metode(-es)	<p>Metode: Manuāla lietošana</p> <p>sīks apraksts: -</p>

Lietošanas deva(-as) un biežums	<p>Lietošanas deva: 1.01 µl/cm²</p> <p>Atšķaidīšana (%): -</p> <p>Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Uzklāšana aizsardzībai pret ērcēm (1,01 µl/cm²) — aizsardzības ilgums 7 stundas Pieaugušajiem: 9,20 ml/uzklāšanai uz ķermeņa daļām, ko nenosedz apģērbs*. Produktu var uzklāt atkārtoti ne vairāk kā 2 reizes dienā. Bērniem (6-12 gadi): 5,10 ml/uzklāšanai uz ķermeņa daļām, ko nenosedz apģērbs*. Maksimums viena lietošanas reize dienā. Bērniem (2-6 gadi): 3,77 ml/uzklāšanai uz ķermeņa daļām, ko nenosedz apģērbs*. Maksimums viena lietošanas reize dienā. Maziem bērniem (1-2 gadi): 2,66 ml/uzklāšanai uz ķermeņa daļām, ko nenosedz apģērbs*. Maksimums viena lietošanas reize dienā. Zīdaiņiem (0-1 gads): 2,27 ml/uzklāšanai uz ķermeņa daļām, ko nenosedz apģērbs*. Maksimums viena lietošanas reize dienā. * Uzklājiet produktu tikai ķermeņa vietās, ko nenosedz apģērbs: uz sejas, rokām, kājām, pēdām. Neuzklājiet uz visa ķermeņa.</p>
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	<p>Tūbiņa — ar uzspiežamu vāciņu, skrūvējamu vāciņu, noņemamu vāciņu vai atlokāmu vāciņu (PP) - (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA)</p> <p>Tūbiņa — ar uzspiežamu vāciņu, skrūvējamu vāciņu, noņemamu vāciņu vai atlokāmu vāciņu (PP) - (alumīnijā ar iekšējo slāni: PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA)</p> <p>Pudelīte — ar skrūvējamu vāciņu, noņemamu vāciņu vai dozatoru - (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA)</p> <p>Izmērs visiem iepakojuma veidiem: 25-250 ml, ar 5 ml intervāliem izmēros</p>

4.2.1. Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi

Skatiet sadaļu 5.1

4.2.2. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

Skatiet sadaļu 5.2

4.2.3. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatiet sadaļu 5.3

4.2.4. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatiet sadaļu 5.4

4.2.5. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatiet sadaļu 5.1

Nodaļa 5. VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU¹

5.1. Lietošanas pamācība

Lietojo repelentu, ievērojot drošību. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visas norādītās instrukcijas.

Sargāt no bērniem.

Paņemiet plaukstā atbilstošu losjona apjomu un izlīdziniet līdzekli pa nenosegto ādu. Uzklājiet TIKAI ķermeņa vietās, ko nenosedz apģērbs: uz sejas, rokām, kājām un pēdām. Neuzklājiet uz visa ķermeņa. Aizsargājiet acis. Neuzklājiet zonā ap acīm.

Neuzklājiet produktu uz ievainojumiem, brūcēm, tikko skūtas vai iekaisušas ādas. Nelietojiet zem apģērba. Tikai ārīgai lietošanai.

Saules aizsarglīdzekļu vai kosmētikas līdzekļu lietošana pēc repelenta uzklāšanas ievērojami ietekmēs tā efektivitāti. Ja līdzekli lietojat reizē ar saules aizsarglīdzekli, vispirms uzklājiet saules aizsarglīdzekli un uzgaidiet 20 minūtes, tad uzklājiet produktu.

Stipras svīšanas gadījumā un pēc peldēšanās līdzekļa efektivitāte samazināsies. Produktu var uzklāt līdz divām reizēm dienā pieaugušajiem un bērniem, kas vecāki par 12 gadiem, un vienu reizi dienā bērniem, līdz 12 gadu vecumam.

Lietojot šos produktus uz zīdaiņiem, jāievēro piesardzība, un priekšroka jādod mehāniskai aizsardzībai (apģērbs, moskītu tīkli).

Izvairieties no saskarsmes ar sintētiskiem materiāliem. Uzklāšanas laikā sintētiskajiem materiāliem jābūt pasargātiem.

Lietotājiem nekavējoties jāziņo, ja līdzeklis nedarbojas, un jāsaazinās tieši ar atļaujas turētāju.

Nav ieteicams šo līdzekli lietot kopā ar citiem repelentiem.

8 stundu aizsardzības laiks ir tikai orientējoša. Apkārtējās vides faktori (piem., augsta temperatūra, vēja ātrums) to var mainīt.

5.2. Riska mazināšanas pasākumi

Uzklājiet TIKAI ķermeņa vietās, ko nenosedz apģērbs: uz sejas, rokām, kājām un pēdām.

Neuzklājiet uz bērnu rokām. Ja bērns ir jaunāks par 12 gadiem, līdzeklis jāuzklāj pieaugušajam un pēc tam jānomazgā plaukstas. Neuzklājiet uz bērnu rokām.

Pirms pieskaraties pārtikas produktiem nomazgājiet plaukstas. Neuzklājiet līdzekli uz pārtikas, ēdieniem vai dzērieniem vai to tuvumā, kā arī neuzklājiet uz virsmām vai piederumiem, kas, iespējams, nonāks saskarē ar pārtiku, ēdieniem, dzērieniem. Lai novērstu pārtikas piesārņošanu, izvairieties no apstrādātas ādas saskares ar pārtiku.

Uzklājiet tikai ārpus telpām vai labi vēdināmās vietās.

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Ieelpošanas gadījumā: nogādāt svaigā gaisā.

Ja nonāk saskarē ar acīm: pārbaudiet un izņemiet acu lēcas, ja tas ir viegli paveicams. Izskalojiet ar lielu ūdens daudzumu. Sazinieties ar oftalmologu.

Ja nonāk saskarē ar ādu: ādas bojājumu, apsārtuma vai pastāvīgu sāpju gadījumā pēc uzklāšanas, konsultējaties ar ārstu.

Norišanas gadījumā: nekavējoties lieciet cietušajam dzert ūdeni (ne vairāk kā divas glāzes) Konsultējaties ar ārstu.

Svarīgākie simptomi un ietekme, akūti un aizkavēti: nav toksisku simptomu aprakstu.

Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi: informācija nav pieejama.

Vides drošības pasākumi Neizlejiet liekos šķidrumus kanalizācijas sistēmā.

5.4. Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

No atkritumiem jāatbrīvojas saskaņā ar Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem, kā arī citiem valsts un vietējiem noteikumiem. Atstājiet ķīmiskās vielas to oriģinālajos iepakojumos. Nesajauciet ar citiem atkritumiem. Ar neizmazgātiem iepakojumiem rīkojieties tāpat kā ar produktu.

Neizlejiet liekos šķidrumus kanalizācijas sistēmā.

¹Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem atļautajiem lietošanas veidiem.

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Uzglabāšanas noteikumi: uzglabāt cieši noslēgtu sausā un labi vēdinātā vietā.

Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra: istabas temperatūra (18-25 °C). Produktu nedrīkst ilglaicīgi uzglabāt temperatūrā, kas augstāka par 40 °C.

Glabāšanas laiks: 18 mēneši

Vides bīstamības kontroles pasākumi: neļaujiet produktam nokļūt kanalizācijas sistēmā.

Nodaļa 6. CITA INFORMĀCIJA