

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega
proizvoda:** DETIA Wax blocks + Wax Tablets

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 14 - Rodenticidi (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 14 - Rodenticidi (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 14 - Rodenticidi (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 14 - Rodenticidi (nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja: SI-0004994-0000

**Referenčna številka vnosa v
R4BP 3:** SI-0004994-0000

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	1
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	2
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	11
5.1. Navodila za uporabo	11
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	12
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	13
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	13
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	13
6. Druge informacije	14

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

DETIA Wax blocks + Wax Tablets

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja

Ime in priimek	Detia Freyberg GmbH
Naslov	Dr.-Werner-Freyberg-Str.11 69514 Laudenbach Nemčija
Številka dovoljenja	SI-0004994-0000
Referenčna številka vnosa v R4BP 3	SI-0004994-0000
Datum dovoljenja	26/03/2012
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	01/07/2024

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca

Ime proizvajalca	Detia Freyberg Produktion GmbH
Naslov proizvajalca	Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11 69514 Laudenbach Nemčija
Lokacije proizvodnje	Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11 69514 Laudenbach Nemčija

Naslov proizvajalca

Lokacije proizvodnje

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	26 - Difenakum
Ime proizvajalca	PelGar international Limited
Naslov proizvajalca	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hampshire Združeno kraljestvo
Lokacije proizvodnje	This information is confidential This information is confidential This information is confidential Evropska unija

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Difenakum	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4- tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin	Aktivna snov	56073-07-5	259-978-4	0,005
3-iodo-2-propynylbutylcarbamate	3-iodo-2-propynylbutylcarbamate	Neaktivna snov	55406-53-6	259-627-5	0,04

2.2. Vrsta formulacije

RB - gotova vaba

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti	Lahko škoduje nerojenemu otroku. Lahko škoduje organom krvi pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti .
Previdnostni stavki	Pred uporabo pridobiti posebna navodila. Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. Hraniti zaklenjeno. Ne vdihavati prahu. Ne vdihavati dima. Ne vdihavati plina.

Ne vdihavati meglice.

Ne vdihavati hlapov.

Ne vdihavati razpršila.

Nositi zaščitne rokavice.

Nositi zaščitno obleko.

Nositi zaščito za oči.

Nositi zaščito za obraz.

PR1 izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč.

PR1 izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško oskrbo.

Odstraniti vsebino v skladu s predpisi za nevarne odpadke.

Odstraniti posodo v skladu s predpisi za nevarne odpadke.

4. Dovoljena(e) uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - podgane – poklicni uporabniki – v notranjih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 14 - Rodenticidi (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni pomembno za rodenticide
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Splošno ime: rjava podgana Razvojni stadij: Mladiči Znanstveno ime: Rattus norvegicus Splošno ime: rjava podgana Razvojni stadij: Odrasli osebki
Področje uporabe	Notranjost, znotraj V notranjih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki. Pokrite in zaščitena mesta nastavitve vab so dovoljene, če ne ciljnim vrstam in ljudem zagotavljajo enako raven zaščite kot zavarovani deratizacijski zabojčki. Mesta vab morajo pokrita in nastavljena na strateških mestih z namenom zmanjšanja izpostavljenosti ne ciljnim vrstam.

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 200 g vabe na postajo Redčenje (%): Število in časovni razpored uporabe: 200 g vabe na postajo. Če je potrebnih več postaj, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5-10 metrov.
Skupina(-e) uporabnikov	Strokovnjak z licenco
Velikosti in material embalaže	Plastična vrečka (PE; vabe vsaka 100g ali 200g): 100g, 200g, 500g, največ 12,5 kg Zložena škatla (PE vrečka; vabe 100g ali 200g): 200g; Plastično vedro (PP; vabe vsaka 20g; 100g ali 200g): največ 10 kg; Karton / PE vreča (vabe vsaka 20g; 100g ali 200g): največ 10kg Karton z PE (vabe vsaka 20g, 100g ali 200g): največ 10 kg

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

V skladu s priporočili iz ustreznega kodeksa najboljše prakse za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve med tretiranjem dovolj pogosto preglejte tretirano območje in poginule glodavce odstranite.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- 1) V skladu s priporočili iz ustreznega kodeksa najboljše prakse za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve med tretiranjem dovolj pogosto preglejte tretirano območje in poginule glodavce odstranite
- 2) Na začetku nadzora mesta nastavitve vab pregledujemo najpozneje vsakih pet dni, nato pa nadalje najmanj enkrat tedensko. Enako velja za tretiranja, ki trajajo več kot 35 dni.
- 3) Uporabiti moramo deratizacijske zaboječke. Postavljanje vab brez deratizacijskih zaboječkov je dovoljeno samo na področjih (npr.

zaprti kabelski vodi, pod - konstrukcije npr. električne naprave, visokonapetostne omare, odprtine v zidovih in oblogah), ki so nedostopna otrokom in nečilnim živalim.

4) V izogib ponovitvene infestacije po učinkovitem nadzoru upoštevamo naslednje ukrepe:

- Odstranite morebitne vire hrane in vode za glodavce (hrano, krmo, smeti, itd.), ali pa glodavcem v čim večji možni meri onemogočite dostop do njih.
- Odstranite ostanke in odpadke, ki bi jih lahko glodavci uporabljali za skrivanje in zavetišče. Prav tako mora biti odstranjena vsa vegetacija v neposredni bližini objektov.
- V čim večji možni meri morajo biti vsi za glodavce obstoječi možni vhodi v objekt (npr. razpoke, line, nihalna vrata za mačke, drenaže) nedostopna oz. neprehodna.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pri nameščanju postaj za nastavljanje vab blizu površinskih vod (npr. rek, ribnikov, vodnih kanalov, jezov, namakalnih jarkov) ali sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - podgane – poklicni uporabniki – zunaj okrog stavb

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 14 - Rodenticidi (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni pomembno za rodenticide
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: rjava podgana Razvojni stadij: Mladiči Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: rjava podgana Razvojni stadij: Odrasli osebki
Področje uporabe	Zunanost, zunaj Zunaj okrog stavb
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki.

	Pokrite in zaščitena mesta nastavitve vab so dovoljene, če ne ciljnim vrstam in ljudem zagotavljajo enako raven zaščite kot zavarovani deratizacijski zabojčki. Mesta vab morajo pokrita in nastavljena na strateških mestih z namenom zmanjšanja izpostavljenosti ne ciljnim vrstam.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 200 g vabe na postajo Redčenje (%): Število in časovni razpored uporabe: 200 g vabe na postajo. Če je potrebnih več postaj, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5-10 metrov.
Skupina(-e) uporabnikov	Strokovnjak z licenco
Velikosti in material embalaže	Plastična vrečka (PE; vabe vsaka 100g ali 200g): 100g, 200g, 500g, največ 12,5 kg Zložena škatla (PE vrečka; vabe 100g ali 200g): 200g; Plastično vedro (PP; vabe vsaka 20g; 100g ali 200g): največ 10 kg; Karton / PE vreča (vabe vsaka 20g; 100g ali 200g): največ 10kg Karton z PE (vabe vsaka 20g, 100g ali 200g): največ 10 kg

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

- 1) Zavarujte vabo pred vremenskimi vplivi. Vabe namestite na območja, ki niso izpostavljena poplavljanju.
- 2) Zamenjajte morebitne vabe v postajah, ki so bile poškodovane zaradi vode ali zamazane z umazanijo.
- 3) Odstranite preostali proizvod ob koncu obdobja tretiranja

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- 1) V skladu s priporočili iz ustreznega kodeksa najboljše prakse za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve med tretiranjem dovolj pogosto preglejte tretirano območje in poginule glodavce odstranite
- 2) Na začetku nadzora mesta nastavitve vab pregledujemo najpozneje vsakih pet dni, nato pa nadalje najmanj enkrat tedensko.

Enako velja za tretiranja, ki trajajo več kot 35 dni.

3) Uporabiti moramo deratizacijske zaboječke. Postavljanje vab brez deratizacijskih zaboječkov je dovoljeno samo na področjih (npr. zaprti kabelski vodi, pod - konstrukcije npr. električne naprave, visokonapetostne omare, odprtine v zidovih in oblogah), ki so nedostopna otrokom in nečilnim živalim.

4) V izogib ponovitvene infestacije po učinkovitem nadzoru upoštevamo naslednje ukrepe:

a) Odstranite morebitne vire hrane in vode za glodavce (hrano, krmo, smeti, itd.), ali pa glodavcem v čim večji možni meri onemogočite dostop do njih.

b) Odstranite ostanke in odpadke, ki bi jih lahko glodavci uporabljali za skrivanje in zavetišče. Prav tako mora biti odstranjena vsa vegetacija v neposredni bližini objektov.

c) V čim večji možni meri morajo biti vsi za glodavce obstoječi možni vhodi v objekt (npr. razpoke, line, nihalna vrata za mačke, drenaže) nedostopna oz. neprehodna.

5) Proizvoda ne nastavljajte neposredno v rove.

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Pri nameščanju postaj za nastavljanje vab blizu površinskih vod (npr. rek, ribnikov, vodnih kanalov, jezov, namakalnih jarkov) ali sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - podgane – usposobljeni poklicni uporabniki – odprta zunanja območja in odlagališča odpadkov

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 14 - Rodenticidi (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Ni pomembno za rodenticide

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: *Rattus norvegicus*
Splošno ime: rjava podgana
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: *Rattus norvegicus*
Splošno ime: rjava podgana
Razvojni stadij: Mladiči

Področje uporabe

Zunanost, zunaj

Drugo

Odprta zunanja območja
Zunanja odlagališča odpadkov

Metoda: Uporaba vabe

Način(-i) uporabe

Podroben opis:

Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki.

Pokrite in zaščitena mesta nastavitve vab so dovoljene, če ne ciljnim vrstam in ljudem zagotavljajo enako raven zaščite kot zavarovani deratizacijski zabojčki. Mesta vab morajo pokrita in nastavljena na strateških mestih z namenom zmanjšanja izpostavljenosti ne ciljnim vrstam.

Neposredna namestitve vabe, pripravljene za uporabo, v rov

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: 200 g vabe na postajo

Redčenje (%):

Število in časovni razpored uporabe:

200 g vabe na postajo. Če je potrebnih več postaj, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5-10 metrov.

Skupina(-e) uporabnikov

Strokovnjak z licenco

Velikosti in material embalaže

Plastična vrečka (PE; vabe vsaka 100g ali 200g): 100g, 200g, 500g, največ 12,5 kg

Zložena škatla (PE vrečka; vabe 100g ali 200g): 200g;

Plastično vedro (PP; vabe vsaka 20g; 100g ali 200g): največ 10 kg;

Karton / PE vreča (vabe vsaka 20g; 100g ali 200g): največ 10kg

Karton z PE (vabe vsaka 20g, 100g ali 200g): največ 10 kg

4.3.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

- 1) Zavarujte vabo pred vremenskimi vplivi. Vabe namestite na območja, ki niso izpostavljene poplavi.
- 2) Zamenjajte morebitne vabe v postajah za nastavljanje vab, ki so bile poškodovane zaradi vode ali zamazane z umazanijo. Odstranite preostali proizvod ob koncu tretiranja
- 3) V skladu s priporočili iz ustreznega kodeksa najboljše prakse za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve med tretiranjem dovolj pogosto preglejte tretirano območje in poginule glodavce odstranite.

Za neposredno aplikacijo vabe za takojšnjo uporabo v rovih:

- 4) Vabe je treba nastaviti tako, da se čim bolj zmanjša izpostavljenost neciljnih vrst in otrok.
- 5) Pokrijte ali zablokirajte vhode v rove, kjer ste nastavili vabo, da zmanjšate tveganje, da jo žival zavrne in da se vaba raztrese.
- 6) V skladu s priporočili iz ustreznega kodeksa najboljše prakse za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve med tretiranjem dovolj pogosto pregledajte tretirano območje in poginule glodavce odstranite.
- 7) Imetnik dovoljenja priporoči ukrepe za odstranitev posledic nenamernega razsutja vabe.
- 8) Vabe morajo biti ročno vstavljene globoko v rove v katerih so glodavci, kasneje, po končani aplikaciji moramo vsak rov zagrniti z zemljo, ki smo jo odstranili ob odprtju rova. Za zmanjšanje tveganja glede morebitnega zaužitja vabe s strani drugih živali ali otrok lahko za stabilizacijo prekrivnega materiala uporabimo travo, slamo, karton, ipd.
- 9) Biocidnega proizvoda se ne uporablja v deževnem obdobju.

4.3.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- 1) Na začetku nadzora mesta nastavitve vab pregledujemo najpozneje vsakih pet dni, nato pa nadalje najmanj enkrat tedensko. Enako velja za tretiranja, ki trajajo več kot 35 dni (Odstopanje v Nemčiji).
 - 2) Uporabiti moramo deratizacijske zabojčke. Postavljanje vab brez deratizacijskih zabojčkov je dovoljeno samo na področjih, ki so nedostopna otrokom in ne ciljnim živalim. (Odstopanje v Nemčiji).
 - 3) Ne uporabljajte antikoagulacijskih rodenticidov kot stalne vabe za preprečevanje napada glodavcev ali odkrivanje njihove aktivnosti.
 - 4) Proizvoda ne uporabljajte kot stalno vabo za preprečevanje napada glodavcev ali odkrivanje njihove aktivnosti.
- Zunanje odprte površine:
- 5) V izogib ponovitvene infestacije po učinkovitem nadzoru upoštevamo naslednje ukrepe (Odstopanje v Nemčiji):
 - a) Odstranite morebitne vire hrane in vode za glodavce (hrano, krmo, smeti, itd.), ali pa glodavcem v čim večji možni meri onemogočite dostop do njih.
 - b) Odstranite ostanke in odpadke, ki bi jih lahko glodavci uporabljali za skritje in zavetišče. Prav tako mora biti odstranjena vsa vegetacija v neposredni bližini objektov.
 - c) V čim večji možni meri morajo biti vsi za glodavce obstoječi možni vhodi v objekt (npr. razpoke, line, nihalna vrata za mačke, drenaže) nedostopna oz. neprehodna.

4.3.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pri nameščanju postaj za nastavljanje vab blizu površinskih vod (npr. rek, ribnikov, vodnih kanalov, jezov, namakalnih jarkov) ali sistemov za odtok vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.3.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

4.3.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

4.4 Opis uporabe

Uporaba 4 - podgane – usposobljeni poklicni uporabniki – kanalizacija

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 14 - Rodenticidi (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni pomembno za rodenticide
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: rjava podgana Razvojni stadij: Mladiči Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: rjava podgana Razvojni stadij: Odrasli osebki
Področje uporabe	Drugo Kanalizacija
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena za pritrditev ali uporabo v postajah, vendar vaba ne sme priti v stik z odpadno vodo.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 200g vabe na postajo Redčenje (%): Število in časovni raspored uporabe: 200 g vabe na postajo.
Skupina(-e) uporabnikov	Strokovnjak z licenco
Velikosti in material embalaže	Plastična vrečka (PE; vabe vsaka 100g ali 200g): 100g, 200g, 500g, največ 12,5 kg Zložena škatla (PE vrečka; vabe 100g ali 200g): 200g; Plastično vedro (PP; vabe vsaka 20g; 100g ali 200g): največ 10 kg; Karton / PE vreča (vabe vsaka 20g; 100g ali 200g): največ 10kg Karton z PE (vabe vsaka 20g, 100g ali 200g): največ 10 kg

4.4.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

- 1) Vabe je treba nastaviti tako, da ne pridejo v stik z vodo in jih voda ne odplakne.
- 2) Mesta postavitve v kanalizacijskih sistemih morajo biti prvič pregledane po štirinajstih dnevih in potem vsake 2 do 3 tedne.
- 3) Odstranite ostanek proizvoda ob koncu tretiranja.

4.4.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Proizvoda ne uporabljajte v pulzirajoči vabi.

4.4.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

-

4.4.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

4.4.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

- 1) Preden začnete uporabljati proizvod, preberite in upoštevajte navodila za uporabo proizvoda in druge informacije, ki so priložene proizvodu ali so na voljo na prodajnem mestu.
 - 2) Izvedite pregled prizadetega območja pred nastavljanjem vabe in oceno na mestu uporabe, da opredelite vrste glodavcev in njihova mesta aktivnosti ter da določite verjeten razlog in obseg napada škodljivcev.
 - 3)) V dogovoru z naročnikom storitve določite obseg relevantne dokumentacije. Minimalne zahteve glede dokumentacije za skladišča, živilske trgovine, markete zajemajo tlorise objektov z vrisanimi mest postavitve vab in zapise o rednih pregledih. V vsakem primeru mora dokumentacija vsebovati kraj, namen, navedbo uporabljenega biocidnega proizvoda (vključno z specifično količino) in osebo/ izvajalca deratizacije. Dokumentacijo se hrani najmanj 5 let.
 - 4) Namen ukrepov nadzora glodavcev je zatrtje ciljnih glodavcev na infestiranem področju/ objektu.
 - 5) Odstranite hrano, ki je glodavcem na dosegu (npr. razsuto zrnje ali odpadki hrane). Razen tega pred nastavljanjem vabe prizadetega območja ne čistite, saj to zmoti populacijo glodavcev in vabo težje sprejmejo.
 - 6) Proizvod se sme uporabljati samo kot del celostnega sistema zatiranja škodljivcev, ki med drugim vključuje higienske ukrepe in, kjer je mogoče, fizične metode nadzora.
 - 7) Proizvod nastavite v neposredno bližino območij, kjer je bila opažena aktivnost glodavcev (npr. poti premikanja, legla, krmišča, luknje, rovi itd.).
 - 8) Kjer je mogoče, pritrdite postaje na tla ali druge strukture.
 - 9) Deratizacijski zabojčki morajo biti mehanično čvrsti in zavarovani.
 - 10) Deratizacijski zabojčki morajo biti oblikovani tako, da je v čim večji meri ne ciljnim organizmom dostop do vabe onemogočen.
 - 11) Postaje morajo vsebovati jasno oznako, da vsebujejo rodenticide in da jih ni dovoljeno premikati ali odpirati (za informacije, ki morajo biti navedene na etiketi, glejte poglavje 5.3).
 - 12) Vsa mesta namestitve morajo biti označena z ustreznimi opozorili. Naročniku mora biti izvajani ukrep temeljito predstavljen. Naročnik mora o tem seznaniti tudi svoje zaposlene in zunanje izvajalce storitev. V primeru potrebe namesti dodatna opozorila. Izvajalec ukrepa deratizacije mora naročniku predstaviti zadostne informacije in splošno razumljena opozorila glede tveganj povezanih z primarnimi in sekundarnimi zastrupitvami. Naročnik in izvajalec deratizacije morata uskladiti in dogovoriti glede odgovornosti za postavitve opozoril.
- Minimalne zahteve glede informativne dokumentacije oz. upoštevanja opozoril morajo vključevati:
- a) Prvi ukrepi v primeru zastrupitve
 - b) Ukrepi v primeru razsutja vabe in odkritja poginulih glodavcev.
 - c) Ime proizvoda in aktivne snovi vključno s koncentracijo,
 - d) Kontaktna informacija izvajalca deratizacije
 - e) Telefonska številka Centra za zastrupitve in ime antidota,
 - f) Datum začetka nadzora/ izvajanja ukrepa deratizacije, kdaj so bile vabe prvič postavljene.
- 13) Vaba mora biti pritrjena, da je ni možno odvleči iz postaje.
 - 14) Proizvod namestite zunaj dosega otrok, ptic, hišnih in domačih živali ter drugih neciljnih živali.
 - 15) Proizvod namestite stran od hrane, pijače in krme za živali, in tudi stran od pripomočkov ali površin, ki so v stiku z njimi.
 - 16) Med rokovanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic mora navesti imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).
 - 17) Med uporabo proizvoda ne jejte, pijte ali kadite. Po uporabi proizvoda si umijte roke in kožo, ki je bila neposredno izpostavljena.
 - 18) Ob vsakem pregledu zamenjati načeto vabo; količina zaužitja mora biti dokumentirana.
 - 19) Če je zaužitje vabe relativno nizko glede na velikost napada škodljivcev, razmislite o premestitvi postaj za nastavljanje vab ali zamenjavi pripravka v vabi.
 - 20) Če se uživanje pripravka iz vab po obdobju učinkovanja 35 dni nadaljuje in ni opaziti zmanjšanja aktivnosti glodavcev, je treba ugotoviti verjeten razlog. Če so bili drugi elementi izključeni, obstaja verjetnost, da so glodavci odporni, zato, kjer je mogoče, uporabite rodenticid, ki ni antikoagulacijski, ali močnejši antikoagulacijski rodenticid.
 - 21) Imetnik avtorizacije mora na etiketi oz. letaku določiti kako se mora oprema (npr. deratizacijski zabojček) čistiti in način zbiranja in odlaganja ostankov vab. Priporočene metode morajo stremeti k minimalni izpostavljenosti.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

- 1) Informacije o proizvodu (npr. etiketa in/ali letak) morajo jasno kazati, da lahko proizvod uporabljajo usposobljeni poklicni uporabniki, ki izpolnjujejo zahteve za poklicnega uporabnika (npr. »samo za poklicno uporabo«).
- 2) V izogib sekundarnih zastrupitev moramo ob vsakem obisku temeljito preiskati področje glede poginulih glodavcev.
- 3) Ne uporabljati na področjih kjer se domneva odpornost na aktivno snov.
- 4) Zaradi tveganja odpornosti ne rotirajte polaganja vab z uporabo različnih antikoagulantov s primerljivo oziroma šibkejšo učinkovitostjo. Za rotacijsko uporabo upoštevajte uporabo ne antikoagulantnega rodenticida, če je ta na voljo ali pa učinkovitejši antikoagulant.
- 5) Deratizacijskih zaboječkov oziroma pripomočkov za pokritje in zaščito postavljenih vab med posameznimi aplikacijami ne peremo z vodo.
- 6) Nepoškodovane, nedotaknjene vabe lahko ponovno uporabimo.
- 7) Učinkovitost nadzora mora biti dokumentirana in dokazljiva.
- 8) Naročnik mora biti obveščen o morebitnih preventivnih ukrepih za preprečitev ponovitve infestacije.
- 9) Na njihovo zahtevo morajo biti vsi relevantni dokumenti na voljo naročniku oz. odgovornim organom.
- 10) Proizvoda ne uporabljajte v pulzirajoči vabi..

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- 1) Ta proizvod vsebuje antikoagulant. Če ga zaužijete, se lahko, tudi z zakasnitvijo, pojavijo simptomi, ki lahko vključujejo krvavitve iz nosu in dlesni. V resnih primerih lahko nastanejo podplutbe ali se pojavi kri v blatu ali urinu.
- 2) Antidot: Vitamin K1, ki ga sme dajati samo zdravstveno/veterinarsko osebje.
- 3) V primeru:
 - izpostavljenosti kože umijte kožo z vodo in nato z vodo in milom.
 - izpostavljenosti oči izpirajte oči s tekočino za izpiranje oči ali vodo, veke držite odprte najmanj 10 minut.
 - oralne izpostavljenosti previdno izperite usta z vodo.Nezavestni osebi ne dajajte ničesar v usta. Ne izzivajte bruhanja. Če proizvod pogoltnete, nemudoma poiščite zdravniško pomoč in pokažite škatlo ali etiketo proizvoda. Če proizvod zaužije žival, se obrnite na veterinarja.
- 4) Postaje morajo biti označene z naslednjimi informacijami: „Ne premikajte in ne odpirajte.“; „Vsebuje rodenticid.“; „Ime proizvoda in številka odobritve“; „aktivne snovi“ in „V primeru zaužitja poiščite zdravniško pomoč ali pokličite 112.“.
- 5) Nevarno za divje živali.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Ob koncu tretiranja odstranite nezaužito vabo in embalažo v skladu z nacionalno zakonodajo

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

- Hranite na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hranite v zaprti posodi stran od direktne sončne svetlobe.
- Hranite na mestih, kamor nimajo dostopa otroci, ptice, hišne in domače živali.
- Rok uporabe: 24 mesecev

6. Druge informacije

- Zaradi zakasnitve delovanja se učinkovitost antikoagulacijskih rodenticidov pokaže v obdobju od štiri do 10 dni od zaužitja vabe.
- Glodavci so lahko prenašalci bolezni. Ne dotikajte se poginulih glodavcev z golimi rokami, ampak pri njihovem odstranjevanju uporabite rokavice ali orodje, npr. klešče.
- Ta proizvod vsebuje grenko snov in barvilo.