



Luxembourg, le 04/02/2020

LA MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT

Vu le règlement (UE) N° 528/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;

Vu la loi du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides ;

Conformément à l'article 33 (MRs) du règlement précité ;

Vu l'autorisation FR-2016-0019 (Asset: FR-0012709-0000) du 10/03/2016 dans l'Etat-membre de référence France, portant autorisation de mise sur le marché du produit biocide dénommé « FANGA B+ SUPREME » ;

Conformément au rapport d'évaluation et au résumé des caractéristiques du produit biocide y relatifs ;

Vu la demande de reconnaissance mutuelle présentée le 28/08/2019 par TRIPLAN SA, BP 258 LA POSTE FRANCAISE, AD500 ANDORRA LA VELLA, Andorre tendant à obtenir l'autorisation de mise sur le marché pour le produit biocide dénommé «FANGA B+ SUPREME»;

Vu la procédure de reconnaissance mutuelle BC-CL053585-35;

Arrête :

Art. 1^{er} – En application de l'article 19, paragraphes (1) à (4), du Règlement (EU) N° 528/2012, l'autorisation du produit biocide «**FANGA B+ SUPREME**» est accordée conformément au dossier produit à l'appui de la demande de reconnaissance mutuelle.

Le dossier de demande fait partie intégrante de la présente autorisation.

L'autorisation porte le N° **13/20/L-000** (R4BP asset LU-0021545-0000) et couvre la mise sur le marché sous les noms commerciaux:

FANGA B+ SUPREME

- EXTRA RONGEURS
- SUPER RONGEURS
- TOP RONGEURS
- ERADIK RONGEURS
- CRACK RONGEURS

Art.2 – Conformément à l'article 23 du règlement (UE) N° 528/2012, la période de validité de l'autorisation N° **13/20/L-000** prend fin le **04/02/2024**.

Art.3 – La mise sur le marché et l'utilisation du produit sont soumises aux conditions et restrictions énoncées par le résumé des caractéristiques du produit annexé.

La classification, l'étiquetage et, s'il y a lieu, la notice explicative doivent répondre aux exigences de l'article 69 du règlement 528/2012¹. Les langues officielles éligibles sont les langues allemande ou française. L'étiquetage, l'emballage et, s'il y a lieu, la notice explicative doivent en particulier porter les mentions figurant à l'annexe, qui fait partie intégrante de la présente autorisation.

Art.4 – Le cas échéant, le dossier de demande doit être complété par la soumission d'études complémentaires, postérieures à l'autorisation, conformément aux conditions énoncées par l'Etat membre de référence.

Le détenteur de l'autorisation doit fournir la preuve que les susdites données, requises par l'Etat membre de référence, ont été introduites dans les délais prédéfinis et doit informer l'autorité compétente luxembourgeoise du résultat de l'évaluation de ces données.

Art.5 – Les produits dont les conditions de mise sur le marché sont modifiées par la présente autorisation ne peuvent plus être mis à disposition sur le marché six mois après la date de la présente autorisation.

Leur utilisation est interdite douze mois après la date de la présente autorisation.

Art.6 – Une demande de renouvellement d'une autorisation doit être présentée auprès de l'autorité compétente au moins 550 jours avant l'expiration de l'autorisation.

Art.7 – Le titulaire de l'autorisation effectue la déclaration des données pertinentes au Centre Antipoisons² préalablement à la mise à disposition du produit sur le marché et conformément aux instructions jointes en annexe.

Les appelants à partir du Luxembourg peuvent joindre le Centre Antipoisons 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sous le numéro de téléphone (+352) 8002 5500. Ce numéro doit normalement aussi apparaître sous la section 1.4 «Numéro de téléphone d'appel d'urgence» de la fiche de données de sécurité du produit.

Art.8 – L'autorisation pourra être retirée en cas de non-respect des dispositions de la présente autorisation. Les conditions afférentes à la présente autorisation pourraient être changées suivant les conclusions relatives aux études requises.

Informations :

- Depuis le 1^{er} septembre 2015, aucun produit biocide ne peut être mis à disposition sur le marché européen si le fabricant ou l'importateur de chaque substance active contenue dans le produit ou, le cas échéant, l'importateur du produit biocide, n'est inscrit sur la liste visée à l'article 95 du Règlement UE n° 528/2012.
- En vertu de la loi du 4 septembre 2015, une obligation d'enregistrement s'applique **aux vendeurs de produits biocides dont l'usage est réservé à l'utilisateur professionnel**. Cette obligation s'applique aussi bien aux vendeurs de produits biocides sis au Luxembourg, qu'aux vendeurs étrangers qui vendent de tels produits biocides directement à l'utilisateur final luxembourgeois à partir de l'étranger.

¹ Règlement (UE) N° 528/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides

² Selon l'article 73 du règlement (UE) N° 528/2012, l'article 45 du règlement (CE) N° 1272/2008² s'applique aux produits qui tombent sous l'égide du règlement (UE) N° 528/2012. Au Luxembourg, la mise en œuvre du susdit article 45 est une compétence du Ministère de la Santé. Ce dernier a confié l'exécution des tâches découlant de l'article 45 au *Centre Antipoisons de Bruxelles* par le biais d'une convention.

La déclaration peut être introduite moyennant un formulaire disponible sur simple demande à l'adresse : biocides@aev.etat.lu. Toutes questions peuvent également être adressées à cette adresse e-mail. Le titulaire d'autorisation est prié de diffuser la présente information en aval de sa chaîne de distribution.

**Pour la Ministre de l'Environnement, du
Climat et du Développement durable**



Joëlle Welfring

directrice-adjointe de l'Administration de
l'environnement

Annexe(s) :

- 1) résumé des caractéristiques d'un produit biocide
- 2) instructions pour la déclaration auprès du centre Antipoisons

Un recours contre la présente décision peut être introduit par ministère d'avocat auprès du Tribunal administratif dans un délai de 40 jours à partir de la notification de la présente.



Annexe à l'autorisation N° 13/20/L-000

- VERSION DU 04/02/2020 -

RESUME DES CARACTERISTIQUES D'UN PRODUIT BIOCIDÉ

Nom(s) : FANGA B+ SUPREME

- EXTRA RONGEURS
- SUPER RONGEURS
- TOP RONGEURS
- ERADIK RONGEURS
- CRACK RONGEURS

Type de produit(s) : 14

N° d'autorisation : 13/20/L-000

R4BP Asset number : LU-0021545-0000

| | | |
|--------|---|----|
| 1. | Informations administratives..... | 4 |
| 1.1. | Nom commercial du produit | 4 |
| 1.2. | Détenteur de l'autorisation | 4 |
| 1.3. | Fabricant(s) du produit..... | 4 |
| 1.4. | Fabricant(s) de la substance active | 6 |
| 2. | Composition et formulation du produit | 7 |
| 2.1. | Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit..... | 7 |
| 2.2. | Type de formulation | 7 |
| 3. | Mentions de danger et conseils de prudence..... | 7 |
| 4. | Utilisation(s) autorisée(s)..... | 7 |
| 4.1. | Descriptions de l'utilisation N°1 | 7 |
| 4.1.1. | Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 1 | 8 |
| 4.1.2. | Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 1 :..... | 8 |
| 4.1.3. | Si spécifique à l'utilisation N° 1: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement..... | 9 |
| 4.1.4. | Si spécifique à l'utilisation N° 1: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage | 9 |
| 4.1.5. | Si spécifique à l'utilisation N° 1: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales..... | 9 |
| 5. | Utilisation(s) autorisée(s)..... | 9 |
| 5.1. | Descriptions de l'utilisation N°2 | 9 |
| 5.1.1. | Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 2 | 10 |
| 5.1.2. | Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 2 :..... | 10 |
| 5.1.3. | Si spécifique à l'utilisation N° 2: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement..... | 11 |
| 5.1.4. | Si spécifique à l'utilisation N° 2: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage | 11 |
| 5.1.5. | Si spécifique à l'utilisation N° 2: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales..... | 11 |
| 6. | Utilisation(s) autorisée(s)..... | 11 |
| 6.1. | Descriptions de l'utilisation N°3 | 11 |

| | | |
|---------|--|----|
| 6.1.1. | Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 3 | 12 |
| 6.1.2. | Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 3 : | 12 |
| 6.1.3. | Si spécifique à l'utilisation N° 3: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement | 13 |
| 6.1.4. | Si spécifique à l'utilisation N° 3: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage | 13 |
| 6.1.5. | Si spécifique à l'utilisation N° 3: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales..... | 13 |
| 7. | Utilisation(s) autorisée(s)..... | 13 |
| 7.1. | Descriptions de l'utilisation N°4 | 13 |
| 7.1.1. | Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 4 | 14 |
| 7.1.2. | Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 4 : | 14 |
| 7.1.3. | Si spécifique à l'utilisation N° 4: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement | 14 |
| 7.1.4. | Si spécifique à l'utilisation N° 4: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage | 14 |
| 7.1.5. | Si spécifique à l'utilisation N° 4: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales..... | 14 |
| 8. | Utilisation(s) autorisée(s)..... | 14 |
| 8.1. | Descriptions de l'utilisation N°5 | 14 |
| 8.1.1. | Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 5 | 16 |
| 8.1.2. | Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 5 : | 16 |
| 8.1.3. | Si spécifique à l'utilisation N° 5: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement..... | 16 |
| 8.1.4. | Si spécifique à l'utilisation N° 5: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage | 16 |
| 8.1.5. | Si spécifique à l'utilisation N° 5: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales..... | 16 |
| 9. | Utilisation(s) autorisée(s)..... | 16 |
| 9.1. | Descriptions de l'utilisation N°6 | 16 |
| 9.1.1. | Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 6 | 17 |
| 9.1.2. | Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 6 : | 17 |
| 9.1.3. | Si spécifique à l'utilisation N° 6: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement | 18 |
| 9.1.4. | Si spécifique à l'utilisation N° 6: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage | 18 |
| 9.1.5. | Si spécifique à l'utilisation N° 6: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales..... | 18 |
| 10. | Utilisation(s) autorisée(s)..... | 18 |
| 10.1. | Descriptions de l'utilisation N°7 | 18 |
| 10.1.1. | Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 7 | 19 |
| 10.1.2. | Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 7 : | 19 |
| 10.1.3. | Si spécifique à l'utilisation N° 7: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement..... | 19 |
| 10.1.4. | Si spécifique à l'utilisation N° 7: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage | 19 |
| 10.1.5. | Si spécifique à l'utilisation N° 7: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales | 19 |
| 11. | Utilisation(s) autorisée(s)..... | 19 |
| 11.1. | Descriptions de l'utilisation N°8 | 19 |
| 11.1.1. | Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 8 | 20 |
| 11.1.2. | Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 8 : | 20 |
| 11.1.3. | Si spécifique à l'utilisation N° 8: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour | |

| | |
|---|----|
| protéger l'environnement..... | 20 |
| 11.1.4. Si spécifique à l'utilisation N° 8: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage | 20 |
| 11.1.5. Si spécifique à l'utilisation N° 8: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales | 20 |
| 12. Utilisation(s) autorisée(s)..... | 20 |
| 12.1. Descriptions de l'utilisation N°9 | 20 |
| 12.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 9 | 21 |
| 12.1.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 9 : | 21 |
| 12.1.3. Si spécifique à l'utilisation N° 9: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement..... | 22 |
| 12.1.4. Si spécifique à l'utilisation N° 9: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage | 22 |
| 12.1.5. Si spécifique à l'utilisation N° 9: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales | 22 |
| 13. Instructions d'utilisation générales..... | 22 |
| 13.1. Consignes d'utilisation | 22 |
| 13.2. Mesures de gestion des risques | 24 |
| 13.3. Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement | 25 |
| 13.4. Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage..... | 25 |
| 13.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales | 25 |
| 14. Autres informations | 26 |

1. Informations administratives

1.1. Nom commercial du produit

| |
|--|
| FANGA B+ SUPREME - EXTRA RONGEURS - SUPER RONGEURS - TOP RONGEURS - ERADIK RONGEURS - CRACK RONGEURS |
|--|

1.2. Détenteur de l'autorisation

| | |
|-------------------------------------|---|
| Nom et adresse du détenteur | TRIPLAN 1, place Saint Silain 24000 Périgueux France |
| Numéro d'autorisation | 13/20/L-000 |
| R4BP Asset number | LU-0021545-0000 |
| Date de l'autorisation | 04/02/2020 |
| Date d'expiration de l'autorisation | 04/02/2024 |

1.3. Fabricant(s) du produit

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nom(s) et adresse(s) du fabricant | AGROLOGY SA P.O. BOX 1089 Industrial Area of Thessaloniki 57022 THESSALONIKI Grèce |
| Adresse(s) du site de production | AGROLOGY SA P.O. BOX 1089 Industrial Area of Thessaloniki 57022 THESSALONIKI Grèce |
| Nom(s) et adresse(s) du fabricant | AGGRESS EL. VENIZELOU 158 A GR- 16341 Athènes Grèce |
| Adresse(s) du site de production | ARMA THEBES 32200 Voiotia Grèce |
| Nom(s) et adresse(s) du fabricant | FARMACHEM Industrial Area of Sindos P.O. BOX 1026 Block 53 Zone C 57022 THESSALONIKI Grèce |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Adresse(s) du site de production | FARMACHEM Industrial Area of Sindos P.O. BOX 1026 Block 53 Zone C 57022 THESSALONIKI Grèce |
| Nom(s) et adresse(s) du fabricant | PROFARM SA Industrial Area of Thessaloniki, Entrance A, O.T. 20, Buildings 30 and 53 57022 Sindos Grèce |
| Adresse(s) du site de production | PROFARM SA Industrial Area of Thessaloniki, Entrance A, O.T. 20, Buildings 30 and 53 57022 Sindos Grèce |
| Nom(s) et adresse(s) du fabricant | AEDES PROTECTA 75 RUE D'ORGEMONT F-95210 SAINT GRATIEN France |
| Adresse(s) du site de production | AEDES PROTECTA LIEU-DIT DOUILLAC F-81310 PARISOT France |
| Nom(s) et adresse(s) du fabricant | NOXIMA CARREFOUR JEAN MONNET - LACROIX SAINT OUEN 60201 COMPIEGNE France |
| Adresse(s) du site de production | NOXIMA CARREFOUR JEAN MONNET - LACROIX SAINT OUEN 60201 COMPIEGNE France |
| Nom(s) et adresse(s) du fabricant | FARMAVIT OOD BUL. TSAR BORIS III, N°63, OFFICE 1 BG-1612 SOFIA Bulgarie |
| Adresse(s) du site de production | FARMAVIT OOD INDUSTRIALNA 2 STR - PLEVEN DISTRICT BG-5960 GULIANTSI Bulgarie |
| Nom(s) et adresse(s) du fabricant | INDUSTRIAL CHIMICA S.r.l Via Sorgaglia 40 IT-35020 Arre (PO) Italie |
| Adresse(s) du site de production | INDUSTRIAL CHIMICA S.r.l Via Sorgaglia 40 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | IT-35020 Arre (PO) Italie |
| Nom(s) et adresse(s) du fabricant | IRIS 1126A, avenue du Moulinas - Route de Saint Privat 30340 SALINDRES France |
| Adresse(s) du site de production | IRIS 1126A, avenue du Moulinas - Route de Saint Privat 30340 SALINDRES France |
| Nom(s) et adresse(s) du fabricant | HDA ZA LA CHARME MENETROL 63200 Riom France |
| Adresse(s) du site de production | HDA ZA LA CHARME MENETROL 63200 Riom France |
| Nom(s) et adresse(s) du fabricant | RATOUCY SAS 29 AV. DE LA FORET - LOOZE - BP 145 89303 JOIGNY France |
| Adresse(s) du site de production | RATOUCY SAS 29 AV. DE LA FORET - LOOZE - BP 145 89303 JOIGNY France |
| Nom(s) et adresse(s) du fabricant | SOFAR France ZA DU DREVERS BP 02 F-29190 PLEYBEN France |
| Adresse(s) du site de production | SOFAR France ZA DU DREVERS BP 02 F-29190 PLEYBEN France |

1.4. Fabricant(s) de la substance active

| | |
|-----------------------------|---|
| Substance active | Brodifacoum (CAS: 56073-10-0) |
| Nom et adresse du fabricant | Activa S.r.l. Via Feltre, 32 20132 Milano Italie |

| | |
|----------------------------------|--|
| Adresse(s) du site de production | PM TEZZA SRL Via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio (VR) Italie |
|----------------------------------|--|

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit

| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro EINECS | Teneur |
|------------------|---|------------------------|------------|---------------|--------------|
| Brodifacoum | 4-hydroxy-3-(3-(4'-bromo-4-biphenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin | Substance active | 56073-10-0 | 259-980-5 | 0.001 % m/m |
| Propylene Glycol | propane-1,2-diol | Substance préoccupante | 57-55-6 | 200-338-0 | 2.4836 % m/m |
| Triethanolamine | 2,2',2-nitrioltriéthanol | Substance préoccupante | 102-71-6 | 203-049-8 | 0.0172 % m/m |

2.2. Type de formulation

| |
|-----------------------|
| Appât prêt à l'emploi |
|-----------------------|

3. Mentions de danger et conseils de prudence

| | |
|----------------------|---|
| Mentions de danger | / |
| Conseils de prudence | |
| Note | |

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1. Descriptions de l'utilisation N°1

Tableau 1: Souris domestiques, rats, campagnols communs, mulots - professionnels formés - intérieur

| | |
|--|--|
| Type de produit | PT14-Rodenticides |
| Le cas échéant, description détaillée de l'utilisation autorisée | Ne s'applique pas aux rodenticides. |
| Organismes ciblés | <ul style="list-style-type: none"> - Mus musculus, Souris domestique, grise - Juvéniles et adultes. - Rattus norvegicus, Rat brun/gris, Rat surmulot - Juvéniles et adultes. - Rattus rattus, Rat noir - Juvéniles et adultes. - Apodemus sylvaticus, Mulots - Juvéniles et adultes. |

| | |
|---|---|
| | - <i>Microtus arvalis</i> , Microtidés - Juvéniles et adultes. |
| Domaine d'utilisation | A l'intérieur. |
| Méthode d'application | Formulations de l'appât: - Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés. - Points d'appâts couverts et protégés. |
| Dose prescrite et fréquence d'application | Produits d'appât: - Rats (<i>R. norvegicus</i> , <i>R. rattus</i>): 100 g de produit par point d'appât espacés de 5 à 10 mètres. - Souris domestiques (<i>M. musculus</i>): 30-40 g de produit par point d'appât espacés de 1 à 2 mètres. - Mulots (<i>A. sylvaticus</i>): 50 g de produit par point d'appât espacés de 1 à 2 mètres. - Campagnols communs (<i>M. arvalis</i>): 50 g de produit par point d'appât espacés de 1 à 2 mètres. |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | Utilisateur professionnel qualifié |
| Emballage et Conditionnements | Conditionnement minimum de 3 kg. Le produit FANGA B+ SUPREME est fourni dans des sachets en polyéthylène/ polypropylène (PE/PP) (20-25-30-40-50-100g) ou en vrac. Les sachets sont conditionnés dans des: - Sacs en papier (avec ou sans PE film) de 5-10-15-20-25 kg; - Seaux PE de 5-10-15-18-20 kg; - Boîtes en carton de 5-10-12-15-20-50 kg. Le produit fourni en vrac est conditionné dans des: - Sachets en PE/PP (100-200-300-400-500-600-700-800-900-1000g) conditionnés dans des boîtes en carton (5-10-12-15-18-20kg); - Sachets en papier (avec ou sans film PE) de 5-10-15-20-25 kg; - Seaux en PE de 5-10-15-18-20-25 kg; - Boîtes en carton contenant un film PE à l'intérieur de 5-10-12-15-20-50 kg. |

4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 1

- Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement.
- (Suivez toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné).

4.1.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 1 :

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation [conformément au

code de bonnes pratiques en vigueur, le cas échéant].

- Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.
- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement, conformément aux recommandations formulées par le code de bonnes pratiques applicable.
- Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.
- Ne pas utiliser le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé.

4.1.3. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

- Lorsque des points d'appât sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

4.1.4. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

/

4.1.5. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales

/

5. Utilisation(s) autorisée(s)

5.1. Descriptions de l'utilisation N°2

Tableau 2: Souris domestiques, rats, campagnols communs, mulots - professionnels formés - extérieur autour des bâtiments

| | |
|--|--|
| Type de produit | PT14-Rodenticides |
| Le cas échéant, description détaillée de l'utilisation autorisée | Ne s'applique pas aux rodenticides. |
| Organismes cibles | <ul style="list-style-type: none">- Mus musculus, Souris domestique, grise - Juvéniles et adultes.- Rattus norvegicus, Rat brun/gris, Rat surmulot - Juvéniles et adultes.- Rattus rattus, Rat noir - Juvéniles et adultes.- Apodemus sylvaticus, Mulots - Juvéniles et adultes.- Microtus arvalis, Microtidés - Juvéniles et adultes. |
| Domaine d'utilisation | Extérieur autour des bâtiments. |
| Méthode d'application | Formulations de l'appât: <ul style="list-style-type: none">- Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes |

| | |
|---|--|
| | <p>d'appâtage sécurisés.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Points d'appâts couverts et protégés. |
| Dose prescrite et fréquence d'application | <p>Produits d'appât:</p> <p>Rats (<i>R. norvegicus</i>, <i>R. rattus</i>): 100 g de produit par point d'appât espacés de 5 à 10 mètres.</p> <p>Souris domestiques (<i>M. musculus</i>): 30-40 g de produit par point d'appât espacés de 1 à 2 mètres.</p> <p>Mulots (<i>A. sylvaticus</i>): 50 g de produit par point d'appât espacés de 1 à 2 mètres.</p> <p>Campagnols communs (<i>M. arvalis</i>): 50 g de produit par point d'appât espacés de 1 à 2 mètres.</p> |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | Utilisateur professionnel qualifié |
| Emballage et Conditionnements | <p>Conditionnement minimum de 3 kg.</p> <p>Le produit FANGA B+ SUPREME est fourni dans des sachets en polyéthylène/ polypropylène (PE/PP) (20-25-30-40-50-100g) ou en vrac.</p> <p>Les sachets sont conditionnés dans des:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sacs en papier (avec ou sans PE film) de 5-10-15-20-25 kg; - Seaux PE de 5-10-15-18-20 kg; - Boîtes en carton de 5-10-12-15-20-50 kg. <p>Le produit fourni en vrac est conditionné dans des:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sachets en PE/PP (100-200-300-400-500-600-700-800-900-1000g) conditionnés dans des boîtes en carton (5-10-12-15-18-20kg); - Sachets en papier (avec ou sans film PE) de 5-10-15-20-25 kg; - Seaux en PE de 5-10-15-18-20-25 kg; - Boîtes en carton contenant un film PE à l'intérieur de 5-10-12-15-20-50 kg. |

5.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 2

- Protéger l'appât des conditions atmosphériques. Placer les points d'appât dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.
- Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.
- Suivez toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.
- Pour l'utilisation à l'extérieur, les points d'appâtage doivent être couverts et placés dans des sites permettant de minimiser l'exposition des espèces non cibles.

5.1.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 2 :

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation [conformément au code de bonnes pratiques en vigueur, le cas échéant].

- Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (comblers les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.
- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement, conformément aux recommandations formulées par le code de bonnes pratiques applicable.
- Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.
- Ne pas utiliser le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé.
- Ne pas utiliser ce produit dans les terriers.

5.1.3. Si spécifique à l'utilisation N° 2: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

- Lorsque des points d'appât sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

5.1.4. Si spécifique à l'utilisation N° 2: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

/

5.1.5. Si spécifique à l'utilisation N° 2: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales

/

6. Utilisation(s) autorisée(s)

6.1. Descriptions de l'utilisation N°3

Tableau 3: Souris domestiques, rats, campagnols communs, mulots - professionnels formés - zones ouvertes extérieures et décharges

| | |
|--|--|
| Type de produit | PT14-Rodenticides |
| Le cas échéant, description détaillée de l'utilisation autorisée | Ne s'applique pas aux rodenticides. |
| Organismes cibles | <ul style="list-style-type: none"> - Mus musculus, Souris domestique, grise - Juvéniles et adultes. - Rattus norvegicus, Rat brun/gris, Rat surmulot - Juvéniles et adultes. - Rattus rattus, Rat noir - Juvéniles et adultes. - Apodemus sylvaticus, Mulots - Juvéniles et adultes. - Microtus arvalis, Microtidés - Juvéniles et adultes. |
| Domaine d'utilisation | Zones ouvertes extérieures et décharges. |
| Méthode d'application | <p>Formulations de l'appât:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés. |

| | |
|---|---|
| | - Points d'appâts couverts et protégés. |
| Dose prescrite et fréquence d'application | Produits d'appât: Rats (<i>R. norvegicus</i> , <i>R. rattus</i>): 100 g de produit par point d'appât espacés de 5 à 10 mètres. Souris domestiques (<i>M. musculus</i>): 30-40 g de produit par point d'appât espacés de 1 à 2 mètres. Mulots (<i>A. sylvaticus</i>): 50 g de produit par point d'appât espacés de 1 à 2 mètres. Campagnols communs (<i>M. arvalis</i>): 50 g de produit par point d'appât espacés de 1 à 2 mètres. |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | Utilisateur professionnel qualifié |
| Emballage et Conditionnements | Conditionnement minimum de 3 kg. Le produit FANGA B+ SUPREME est fourni dans des sachets en polyéthylène/ polypropylène (PE/PP) (20-25-30-40-50-100g) ou en vrac. Les sachets sont conditionnés dans des: - Sacs en papier (avec ou sans PE film) de 5-10-15-20-25 kg; - Seaux PE de 5-10-15-18-20 kg; - Boîtes en carton de 5-10-12-15-20-50 kg. Le produit fourni en vrac est conditionné dans des: - Sachets en PE/PP (100-200-300-400-500-600-700-800-900-1000g) conditionnés dans des boîtes en carton (5-10-12-15-18-20kg); - Sachets en papier (avec ou sans film PE) de 5-10-15-20-25 kg; - Seaux en PE de 5-10-15-18-20-25 kg; - Boîtes en carton contenant un film PE à l'intérieur de 5-10-12-15-20-50 kg. |

6.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 3

- Protéger l'appât des conditions atmosphériques. Placer les points d'appât dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.
- Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.
- Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement
- Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.
- Pour l'utilisation à l'extérieur, les points d'appâtage doivent être couverts et placés dans des sites permettant de minimiser l'exposition des espèces non cibles.

6.1.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 3 :

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation [conformément au code de bonnes pratiques en vigueur, le cas échéant].
- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les

cadavres de rongeurs pendant la période de traitement, conformément aux recommandations formulées par le code de bonnes pratiques applicable.
- Ne pas placer les appâts dans les terriers.

6.1.3. Si spécifique à l'utilisation N° 3: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

- Lorsque des postes d'appâtage sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, assurez-vous que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

6.1.4. Si spécifique à l'utilisation N° 3: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

/

6.1.5. Si spécifique à l'utilisation N° 3: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales

/

7. Utilisation(s) autorisée(s)

7.1. Descriptions de l'utilisation N°4

Tableau 4: Souris domestiques - professionnels - intérieur

| | |
|--|---|
| Type de produit | PT14-Rodenticides |
| Le cas échéant, description détaillée de l'utilisation autorisée | Ne s'applique pas aux rodenticides. |
| Organismes cibles | - Mus musculus, Souris domestique, grise - Juvéniles et adultes. |
| Domaine d'utilisation | A l'intérieur. |
| Méthode d'application | Formulations de l'appât: - Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés. - Points d'appâts couverts et protégés. |
| Dose prescrite et fréquence d'application | Produits d'appât: Souris domestiques (M. musculus): 30-40 g de produit par point d'appât espacés de 1 à 2 mètres |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | Utilisateur professionnel. |
| Emballage et Conditionnements | Conditionnement minimum de 3 kg. Le produit FANGA B+ SUPREME est fourni dans des sachets en polyéthylène/ polypropylène (PE/PP) (20-25-30-40-50-100g) ou en vrac. Les sachets sont conditionnés dans des: |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Sacs en papier (avec ou sans PE film) de 5-10-15-20-25 kg; - Seaux PE de 5-10-15-18-20 kg; - Boîtes en carton de 5-10-12-15-20-50 kg. <p>Le produit fourni en vrac est conditionné dans des:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sachets en PE/PP (100-200-300-400-500-600-700-800-900-1000g) conditionnés dans des boîtes en carton (5-10-12-15-18-20kg); - Sachets en papier (avec ou sans film PE) de 5-10-15-20-25 kg; - Seaux en PE de 5-10-15-18-20-25 kg; - Boîtes en carton contenant un film PE à l'intérieur de 5-10-12-15-20-50 kg. |
|--|---|

7.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 4

- Les postes d'appâtage doivent être inspectées au minimum tous les 2 à 3 jours au début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs.
- Recharger le poste d'appâtage si besoin.
- Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.

7.1.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 4 :

/

7.1.3. Si spécifique à l'utilisation N° 4: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

- Lorsque des postes d'appâtage sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

7.1.4. Si spécifique à l'utilisation N° 4: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

/

7.1.5. Si spécifique à l'utilisation N° 4: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales

/

8. Utilisation(s) autorisée(s)

8.1. Descriptions de l'utilisation N°5

Tableau 5: Rats, mulots, campagnols communs – professionnels – intérieur

| | |
|-----------------|-------------------|
| Type de produit | PT14-Rodenticides |
|-----------------|-------------------|

| | |
|--|--|
| Le cas échéant, description détaillée de l'utilisation autorisée | Ne s'applique pas aux rodenticides. |
| Organismes cibles | <ul style="list-style-type: none"> - Rattus norvegicus, Rat brun/gris, Rat surmulot - Juvéniles et adultes. - Rattus rattus, Rat noir - Juvéniles et adultes. - Apodemus sylvaticus, Mulots - Juvéniles et adultes. - Microtus arvalis, Microtidés - Juvéniles et adultes. |
| Domaine d'utilisation | A l'intérieur. |
| Méthode d'application | <p>Formulations de l'appât:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés. - Points d'appâts couverts et protégés. |
| Dose prescrite et fréquence d'application | <p>Produits d'appât:</p> <p>Rats (<i>R. norvegicus</i>, <i>R. rattus</i>): 100 g de produit par point d'appât espacés de 5 à 10 mètres</p> <p>Mulots (<i>A. sylvaticus</i>): 50 g de produit par point d'appât espacés de 1 à 2 mètres</p> <p>Campagnols communs (<i>M. arvalis</i>): 50 g de produit par point d'appât espacés de 1 à 2 mètres</p> |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | Utilisateur professionnel. |
| Emballage et Conditionnements | <p>Conditionnement minimum de 3 kg.</p> <p>Le produit FANGA B+ SUPREME est fourni dans des sachets en polyéthylène/ polypropylène (PE/PP) (20-25-30-40-50-100g) ou en vrac.</p> <p>Les sachets sont conditionnés dans des:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sacs en papier (avec ou sans PE film) de 5-10-15-20-25 kg; - Seaux PE de 5-10-15-18-20 kg; - Boîtes en carton de 5-10-12-15-20-50 kg. <p>Le produit fourni en vrac est conditionné dans des:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sachets en PE/PP (100-200-300-400-500-600-700-800-900-1000g) conditionnés dans des boîtes en carton (5-10-12-15-18-20kg); - Sachets en papier (avec ou sans film PE) de 5-10-15-20-25 kg; - Seaux en PE de 5-10-15-18-20-25 kg; - Boîtes en carton contenant un film PE à l'intérieur de 5-10-12-15-20-50 kg. |

8.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 5

- Les postes d'appâtage doivent être inspectées au minimum tous les 5 à 7 jours au début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs.
- Recharger le poste d'appâtage si besoin.
- Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.

8.1.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 5 :

/

8.1.3. Si spécifique à l'utilisation N° 5: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

- Lorsque des postes d'appâtage sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

8.1.4. Si spécifique à l'utilisation N° 5: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

/

8.1.5. Si spécifique à l'utilisation N° 5: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales

/

9. Utilisation(s) autorisée(s)

9.1. Descriptions de l'utilisation N°6

Tableau 6: Souris domestiques, rats, mulots, campagnols communs – professionnels – extérieur autour des bâtiments

| | |
|--|--|
| Type de produit | PT14-Rodenticides |
| Le cas échéant, description détaillée de l'utilisation autorisée | Ne s'applique pas aux rodenticides. |
| Organismes cibles | <ul style="list-style-type: none">- Mus musculus, Souris domestique, grise - Juvéniles et adultes.- Rattus norvegicus, Rat brun/gris, Rat surmulot - Juvéniles et adultes.- Rattus rattus, Rat noir - Juvéniles et adultes.- Apodemus sylvaticus, Mulots - Juvéniles et adultes.- Microtus arvalis, Microtidés - Juvéniles et adultes. |
| Domaine d'utilisation | Extérieur autour des bâtiments. |
| Méthode d'application | Formulations de l'appât: <ul style="list-style-type: none">- Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes |

| | |
|---|---|
| | d'appâtage sécurisés. - Points d'appâts couverts et protégés. |
| Dose prescrite et fréquence d'application | Produits d'appât: Rats (<i>R. norvegicus</i> , <i>R. rattus</i>): 100 g de produit par point d'appât espacés de 5 à 10 mètres. Souris domestiques (<i>M. musculus</i>): 30-40 g de produit par point d'appât espacés de 1 à 2 mètres. Mulots (<i>A. sylvaticus</i>): 50 g de produit par point d'appât espacés de 1 à 2 mètres. Campagnols communs (<i>M. arvalis</i>): 50 g de produit par point d'appât espacés de 1 à 2 mètres. |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | Utilisateur professionnel |
| Emballage et Conditionnements | Conditionnement minimum de 3 kg. Le produit FANGA B+ SUPREME est fourni dans des sachets en polyéthylène/ polypropylène (PE/PP) (20-25-30-40-50-100g) ou en vrac. Les sachets sont conditionnés dans des: - Sacs en papier (avec ou sans PE film) de 5-10-15-20-25 kg; - Seaux PE de 5-10-15-18-20 kg; - Boîtes en carton de 5-10-12-15-20-50 kg. Le produit fourni en vrac est conditionné dans des: - Sachets en PE/PP (100-200-300-400-500-600-700-800-900-1000g) conditionnés dans des boîtes en carton (5-10-12-15-18-20kg); - Sachets en papier (avec ou sans film PE) de 5-10-15-20-25 kg; - Seaux en PE de 5-10-15-18-20-25 kg; - Boîtes en carton contenant un film PE à l'intérieur de 5-10-12-15-20-50 kg. |

9.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 6

- Les postes d'appâtage doivent être inspectés [pour les souris - au minimum tous les 2 à 3 jours au] [pour les rats - seulement 5 à 7 jours après le] début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres des rongeurs.
- Recharger le poste d'appâtage si besoin.
- Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.

9.1.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 6 :

| |
|---|
| / |
|---|

9.1.3. Si spécifique à l'utilisation N° 6: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

- Lorsque des postes d'appâtage sont placés à proximité d'eaux de surface (par exemple, de rivières, d'étangs, de cours d'eau, de digues ou de canaux d'irrigation) ou de systèmes d'évacuation des eaux, assurez-vous que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

9.1.4. Si spécifique à l'utilisation N° 6: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

/

9.1.5. Si spécifique à l'utilisation N° 6: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales

/

10. Utilisation(s) autorisée(s)

10.1. Descriptions de l'utilisation N°7

Tableau 7: Souris domestiques – grand public – intérieur

| | |
|--|--|
| Type de produit | PT14-Rodenticides |
| Le cas échéant, description détaillée de l'utilisation autorisée | Ne s'applique pas aux rodenticides. |
| Organismes cibles | - Mus musculus, Souris domestique, grise - Juvéniles et adultes. |
| Domaine d'utilisation | A l'intérieur. |
| Méthode d'application | Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisées. |
| Dose prescrite et fréquence d'application | Produits d'appât: Souris domestiques (M. musculus): 30-40 g de produit par point d'appât espacés de 1 à 2 mètres. |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | Utilisateur non-professionnel (Grand public). |
| Emballage et Conditionnements | Le produit est fourni par paquet contenant la quantité maximale d'appât de 50 grammes pour les souris et 150 g pour les souris et les rats. Le produit FANGA B+ SUPREME est fourni dans des sachets en polyéthylène/ polypropylène (PE/PP) (20-25-30-40-50-100g) conditionnés dans des: - Seaux en PE - Boîtes en carton - Boîtes en métal sans laque - Emballages en HDPE - Boîtes d'appâts (PET / PP / PE / PVC) avec une capacité de 135cm ³ et 235cm ³ . |

10.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 7

- Les postes d'appâtage doivent être inspectées au minimum tous les 2 à 3 jours au début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres des rongeurs.
- Recharger le poste d'appâtage si besoin.

10.1.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 7 :

/

10.1.3. Si spécifique à l'utilisation N° 7: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

/

10.1.4. Si spécifique à l'utilisation N° 7: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

/

10.1.5. Si spécifique à l'utilisation N° 7: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales

/

11. Utilisation(s) autorisée(s)

11.1. Descriptions de l'utilisation N°8

Tableau 8: Rats, mulots, campagnols communs – grand public – intérieur

| | |
|--|---|
| Type de produit | PT14-Rodenticides |
| Le cas échéant, description détaillée de l'utilisation autorisée | Ne s'applique pas aux rodenticides. |
| Organismes cibles | <ul style="list-style-type: none">- Rattus norvegicus, Rat brun/gris, Rat surmulot - Juvéniles et adultes.- Rattus rattus, Rat noir - Juvéniles et adultes.- Apodemus sylvaticus, Mulots - Juvéniles et adultes.- Microtus arvalis, Microtidés - Juvéniles et adultes. |
| Domaine d'utilisation | A l'intérieur. |
| Méthode d'application | Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisées. |
| Dose prescrite et fréquence d'application | Produits d'appât: Rats (R. norvegicus, R. rattus): 100 g de produit par point d'appât espacés de 5 à 10 mètres Mulots (A. sylvaticus): 50 g de produit par point d'appât espacés de 1 à 2 mètres |

| | |
|-------------------------------|---|
| | Campagnols communs (<i>M. arvalis</i>): 50 g de produit par point d'appât espacés de 1 à 2 mètres |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | Utilisateur non-professionnel (Grand public). |
| Emballage et Conditionnements | <p>Le produit est fourni par paquet contenant la quantité maximale d'appât de 50 grammes pour les souris et 150 g pour les souris et les rats.</p> <p>Le produit FANGA B+ SUPREME est fourni dans des sachets en polyéthylène/ polypropylène (PE/PP) (20-25-30-40-50-100g) conditionnés dans des:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seaux en PE - Boîtes en carton - Boîtes en métal sans laque - Emballages en HDPE - Boîtes d'appâts (PET / PP / PE / PVC) avec une capacité de 135cm³ et 235cm³. |

11.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 8

-Les postes d'appâtage ne doivent être inspectés que 5 à 7 jours après le début du traitement puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs.
 -Recharger le poste d'appâtage si besoin.

11.1.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 8 :

/

11.1.3. Si spécifique à l'utilisation N° 8: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

/

11.1.4. Si spécifique à l'utilisation N° 8: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

/

11.1.5. Si spécifique à l'utilisation N° 8: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales

/

12. Utilisation(s) autorisée(s)

12.1. Descriptions de l'utilisation N°9

Tableau 9: Rats, mulots, campagnols communs - grand public - extérieur autour des bâtiments.

| | |
|-----------------|-------------------|
| Type de produit | PT14-Rodenticides |
|-----------------|-------------------|

| | |
|--|--|
| Le cas échéant, description détaillée de l'utilisation autorisée | Ne s'applique pas aux rodenticides. |
| Organismes cibles | - Rattus norvegicus, Rat brun/gris, Rat surmulot - Juvéniles et adultes. - Rattus rattus, Rat noir - Juvéniles et adultes. - Apodemus sylvaticus, Mulots - Juvéniles et adultes. - Microtus arvalis, Microtidés - Juvéniles et adultes. |
| Domaine d'utilisation | Extérieur autour des bâtiments. |
| Méthode d'application | Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisées. |
| Dose prescrite et fréquence d'application | Produits d'appât: Rats (R. norvegicus, R. rattus): 100 g de produit par point d'appât espacés de 5 à 10 mètres Mulots (A. sylvaticus): 50 g de produit par point d'appât espacés de 1 à 2 mètres Campagnols communs (M. arvalis): 50 g de produit par point d'appât espacés de 1 à 2 mètres |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | Utilisateur non-professionnel (Grand-public) |
| Emballage et Conditionnements | Le produit est fourni par paquet contenant la quantité maximale d'appât de 50 grammes pour les souris et 150 g pour les souris et les rats. Le produit FANGA B+ SUPREME est fourni dans des sachets en polyéthylène/ polypropylène (PE/PP) (20-25-30-40-50-100g) conditionnés dans des: - Seaux en PE - Boîtes en carton - Boîtes en métal sans laque - Emballages en HDPE - Boîtes d'appâts (PET / PP / PE / PVC) avec une capacité de 135cm ³ et 235cm ³ . |

12.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 9

- Placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.
- Remplacez tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.
- Les postes d'appâtage ne doivent être inspectés que 5 à 7 jours après le début du traitement puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs.
- Recharger le poste d'appâtage si besoin.

12.1.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 9 :

/

12.1.3. Si spécifique à l'utilisation N° 9: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

/

12.1.4. Si spécifique à l'utilisation N° 9: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

/

12.1.5. Si spécifique à l'utilisation N° 9: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales

/

13. Instructions d'utilisation générales

13.1. Consignes d'utilisation

UTILISATEURS PROFESSIONNELS ET PROFESSIONNELS FORMES

- Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser.
- Avant de placer un appât, faire un diagnostic préalable et une évaluation sur site de la zone infestée pour identifier les espèces de rongeurs, leurs lieux d'activité et déterminer la cause probable ainsi que l'ampleur de l'infestation.
- Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela perturbe la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile.
- Le produit ne doit être utilisé que dans le cadre d'un système de lutte intégrée incluant notamment des mesures d'hygiène et, si possible, des méthodes physiques de contrôle.
- Le produit doit être placé à proximité immédiate des endroits où une activité de rongeurs a été observée (par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers, etc.)
- Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures.
- Les postes d'appâtage doivent être clairement étiquetés pour indiquer qu'ils contiennent des rodenticides et qu'ils ne doivent être ni déplacés ni ouverts (se reporter à la section 5.3 pour connaître les informations devant figurer sur l'étiquette).
- Lorsque le produit est utilisé dans des lieux publics, les zones traitées doivent être signalées pendant la période de traitement et une note expliquant le risque d'empoisonnement primaire ou secondaire par l'anticoagulant ainsi que les premières mesures à adopter en cas d'empoisonnement doit être apposée à proximité des appâts.
- L'appât doit être sécurisé de façon à ce qu'il ne puisse pas être déplacé à l'extérieur du poste d'appâtage.
- Placer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non cibles.
- Placer le produit à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces entrant en contact avec ces derniers.
- Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute

zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit.

UNIQUEMENT POUR PROFESSIONNELS FORMES

- L'utilisateur détermine lui-même la fréquence des inspections de la zone traitée, à la lumière des résultats de l'étude réalisée au début du traitement. Cette fréquence doit être compatible avec les recommandations contenues dans le code de bonnes pratiques applicable.
- Si la consommation de l'appât est faible par rapport à l'étendue apparente de l'infestation, envisager de placer des postes d'appâtage à d'autres endroits et d'opter pour une autre formulation d'appât.
- Si, après une période de traitement de 35 jours, les appâts continuent d'être consommés et qu'aucune réduction de l'activité des rongeurs n'est observée, il convient d'en déterminer la cause probable. Si d'autres éléments ont été exclus, il est probable que vous ayez affaire à des rongeurs résistants: dans ce cas, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, le cas échéant, ou d'un rodenticide anticoagulant plus puissant.
- Envisager également l'utilisation de pièges à titre de mesure de contrôle alternative.

UNIQUEMENT POUR PROFESSIONNELS

- Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (comblers les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.
- Retirer tout appât restant ou les postes d'appâtage au terme de la période de traitement.
- Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

UTILISATEURS NON PROFESSIONNELS

- Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser.
- Avant d'utiliser des produits rodenticides, envisager la possibilité de recourir à des méthodes de contrôle non chimiques (des pièges par exemple).
- Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela ne fait que perturber la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile.
- Les postes d'appâtage doivent être placés à proximité immédiate de l'endroit où l'activité de rongeurs a été observée (par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers, etc.).
- Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures.
- Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.
- Placer les postes d'appâtage hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non cibles.
- Placer les postes d'appâtage à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces qui entrent en contact avec ces derniers.
- Ne pas placer les postes d'appâtage à proximité de systèmes d'évacuation des eaux où ils pourraient entrer en contact avec de l'eau.
- Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit.
- Retirer tout appât restant ou les postes d'appâtage au terme de la période de traitement.

13.2. Mesures de gestion des risques

UTILISATEURS PROFESSIONNELS ET PROFESSIONNELS FORMES

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels de la campagne de dératisation.
- Les informations sur le produit (c'est-à-dire, l'étiquette et/ou la brochure) doivent indiquer clairement que le produit ne doit être délivré qu'à des utilisateurs professionnels formés, disposant d'une certification attestant qu'ils respectent les exigences applicables en matière de formation (par exemple «à l'usage des professionnels formés uniquement»).

UNIQUEMENT PROFESSIONNELS FORMES

- Ne pas utiliser dans des zones où l'on peut suspecter une résistance à la substance active.
- Les produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 35 jours sans évaluation du statut de l'infestation et de l'efficacité du traitement.
- Ne pas alterner l'utilisation de différents anticoagulants d'efficacité comparable ou inférieure aux fins de la gestion de la résistance. Pour une utilisation alternée, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, si disponible, ou d'un anticoagulant plus puissant.
- Ne pas laver à l'eau les postes d'appâtage entre les applications ou les ustensiles utilisés dans les postes d'appâtage.
- Éliminer les cadavres des rongeurs dans un circuit de collecte approprié.

UNIQUEMENT PROFESSIONNELS

- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement (par exemple, au moins deux fois par semaine).
- Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.
- Les informations sur le produit (c'est-à-dire, l'étiquette et/ou la notice) doivent clairement indiquer les éléments suivants:
 - le produit ne doit pas être fourni au grand public (par exemple, «à usage professionnel uniquement»).
 - le produit doit être utilisé dans des postes d'appâtage sécurisés (par exemple, «à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés uniquement»).
 - l'utilisation de ce produit devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours.
- Les informations sur le produit (c'est-à-dire, l'étiquette et/ou la notice) doivent recommander de façon claire qu'en cas de soupçon d'inefficacité à la fin du traitement (en d'autres termes, si l'activité des rongeurs continue d'être observée), l'utilisateur doit demander conseil au fournisseur du produit ou contacter un service de contrôle des organismes nuisibles.

UTILISATEUR NON PROFESSIONNELS

- Envisager l'adoption de mesures de contrôle préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.
- Ne pas utiliser de rodenticides anticoagulants en guise d'appâts permanents (par exemple, pour éviter toute infestation de rongeurs ou pour détecter l'activité de rongeurs).
- Les informations sur le produit (c'est-à-dire, l'étiquette et/ou la notice) doivent clairement indiquer les éléments suivants:
 - le produit doit être utilisé dans des postes d'appâtage sécurisés (par exemple, «à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés uniquement»).

- les utilisateurs doivent convenablement étiqueter les postes d'appâtage avec les informations visées à la section 5.3 du RCP (par exemple, «étiqueter les postes d'appâtage conformément aux recommandations relatives au produit»).

- l'utilisation de ce produit devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours.

- Les informations sur le produit (c'est-à-dire, l'étiquette et/ou la notice) doivent recommander de façon claire qu'en cas de soupçon d'inefficacité à la fin du traitement (en d'autres termes, si l'activité des rongeurs continue d'être observée), l'utilisateur doit demander conseil au fournisseur du produit ou contacter un service de contrôle des organismes nuisibles.

- Rechercher et éliminer les cadavres de rongeurs pendant le traitement, au minimum chaque fois que les postes d'appâtage sont inspectés.

- Éliminer les cadavres de rongeurs dans un circuit de collecte approprié.

13.3. Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

- Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang dans les selles ou les urines peuvent être observées.

- Antidote: Administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement.

- En cas:

- d'exposition cutanée, nettoyer la peau à l'eau puis à l'eau savonneuse;

- d'exposition oculaire, rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l'eau en gardant les paupières ouvertes au moins 10 minutes;

- d'exposition orale, rincer soigneusement la bouche avec de l'eau.

- Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente.

- Ne pas provoquer de vomissement.

- En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin et présentez-lui le contenant du produit ou l'étiquette. Contacter un vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique.

- Chaque poste d'appâtage doit être muni d'une étiquette mentionnant les informations suivantes: «ne pas déplacer ni ouvrir»; «contient un rodenticide»; «nom du produit ou numéro d'autorisation»; «substance(s) active(s)» et «en cas d'incident, contacter le centre antipoison (Tél.: 8002-5500)».

- Dangereux pour la faune.

13.4. Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

- Une fois le traitement terminé, éliminer l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, dans un circuit de collecte approprié.

13.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales

- Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil.

- Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage.

- Durée de conservation: 24 mois.

14. Autres informations

- En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât.
- Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues ; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pinces pour les éliminer.
- Ce produit contient un agent amérisant et un colorant.