

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

Denumirea produsului: DERATION PELLETT

Tipul (tipurile) de produs (produse): TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

Numărul curent: RO/2013/0004/MRA/ IT/2012/00072 AUT

Numărul curent R4BP 3: RO-0001505-0000

Cuprins

| | |
|---|----|
| Informații administrative | 1 |
| 1.1. Denumirea comercială a produsului | 1 |
| 1.2. Detinatorul autorizației | 1 |
| 1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide | 1 |
| 1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active | 1 |
| 2. Compoziția și formularea produsului | 2 |
| 2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid | 2 |
| 2.2. Tipul preparatului | 2 |
| 3. Fraze de pericol și de precauție | 2 |
| 4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate) | 3 |
| 5. Direcții generale de utilizare | 12 |
| 5.1. Instrucțiuni de utilizare | 12 |
| 5.2. Măsuri de reducere a riscurilor | 13 |
| 5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului | 13 |
| 5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia | 13 |
| 5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare | 13 |
| 6. Alte informații | 14 |

Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului

DERATION PELLET

1.2. Detinatorul autorizației

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Numele și adresa detinatorului autorizației | Numele | COLKIM S.R.L. |
| | Adresa | Via Piemonte, 50 40064 Ozzano dell'Emilia Italia |
| Numărul curent | RO/2013/0004/MRA/ IT/2012/00072 AUT | |
| Numărul curent R4BP 3 | RO-0001505-0000 | |
| Data autorizației | 14/12/2012 | |
| Data de expirare a autorizației | 01/07/2024 | |

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

| | |
|--------------------------------------|---|
| Numele producatorului | COLKIM S.R.L. |
| Adresa producătorului | VIA PIEMONTE, 50 40064 OZZANO DELL'EMILIA (BO) Italia |
| Adresa locurilor de producție | VIA PIEMONTE, 50 40064 OZZANO DELL'EMILIA (BO) Italia |

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

| | |
|--------------------------------------|--|
| Substanța activă | 12 - Bromodiolonă |
| Numele producătorului | ACTIVA S.R.L. |
| Adresa producătorului | Via Feltre, 32 20132 MILAN Italia |
| Adresa locurilor de producție | Dr. Tezza S.r.l. - via Tre Ponti, 22 37050 S.Maria di Zevio Italia |

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Continut (%) |
|------------------|---|------------------|-------------|------------|--------------|
| Bromodiolonă | 3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one | Substanța activă | 28772-56-7 | 249-205-9 | 0,005 |

2.2. Tipul preparatului

| |
|-------------------------------|
| RB - Bait (gata de utilizare) |
|-------------------------------|

3. Fraze de pericol și de precauție

| | |
|---------------------------|---|
| Fraze de pericol | Poate dăuna fătului. Provoacă leziuni ale organelor SANGE în caz de expunere prelungită sau repetată . |
| Fraze de precauție | A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. Purtați mănuși de protecție. ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere:Consultați medicul. Nu inspirați praful. Aruncați conținutul la reglementarilor nationale si internationale. |

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare

Utilizarea 1 - Soareci de casa- interior – profesioniști

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 14 - Rodenticide |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | nu este relevant pentru rodenticide |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: Mus musculus denumirea comună: House mouse etapă de dezvoltare: de la tineri la adulți |
| Domeniul de utilizare | de interior INTERIOR |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: În cutii cu momeală Descriere detaliată: momeala gata de utilizare – statii momeala rezistente |
| Doza (dozele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 40 gr de produs pentru punct de momeala Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: daca sunt necesare mai multe puncte de momeala, distanta minima a acestora trebuie sa fie de 5 metri. |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | industrial profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Dimensiune material de ambalare: pachetele minime sunt de 1,5 kg pana la 25 kg Material de ambalare: compozitie de plastic – strat triplu (Poliester PET met/polietilna); plastic; carton |

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Statiile de momeala trebuie sa fie vizitate cel putin la 2-3 zile la inceputul tratamentului si cel putin saptamanal dupa aceea, pentru a verifica daca momeala este acceptata, daca statiile de momeala sunt intacte si pentru a indeparta rozatoarele moarte. Reumpleti cand este necesar.

4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

| |
|--|
| |
|--|

4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

| |
|---|
| Când Amplasarea stațiilor de momeala este aproape de sistemele de scurgere, asigurați-vă ca momeala nu este în contact cu apa. |
|---|

4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

| |
|--|
| |
|--|

4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

| |
|-----------------------------------|
| Viata de raft: până la 24 de luni |
|-----------------------------------|

4.2 Modul de utilizare

Utilizarea 2 - Sobolani - profesioniști - interior

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 14 - Rodenticide |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | nu este relevant pentru rodenticide |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: de la tineri la adulți denumirea științifică: Rattus rattus denumirea comună: Roof rat etapă de dezvoltare: de la tineri la adulți |
| Domeniul de utilizare | de interior INTERIOR |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: În cutii cu momeală Descriere detaliată: momeala gata de utilizare – stații momeala rezistente |
| Doza (dozele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 60-100 gr de produs pentru punct de momeala |

| | |
|---|--|
| | Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: daca sunt necesare mai multe puncte de momeala, distanta minima a acestora trebuie sa fie de 5 metri. |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | industrial profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Dimensiune material de ambalare: pachetele minime sunt de 1,5 kg pana la 25 kg Material de ambalare: compozitie de plastic – strat triplu (Poliester PET met/polietilna); plastic; carton |

4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Statiile de momeala trebuie vizitate intre 5 – 7 zile la inceputul tratamentului si cel putin saptamana dupa aceea, pentru a verifica daca momeala este acceptata, daca statiile de momeala sunt intacte si pentru a indeparta sobolanii morti. Reumpleti , cand este necesar.

4.2.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Cand
Amplasarea statiilor de momeala este aproape de sistemele de scurgere, asigurati-va ca momeala nu este in contact cu apa.

4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Viata de raft: pana la 24 de luni

4.3 Modul de utilizare

Utilizarea 3 - Soareci de casa si sobolani – profesionisti - in exterior in jurul cladirilor

| | |
|---|--|
| Tipul produsului | TP 14 - Rodenticide |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | nu este relevant pentru rodenticide |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: Mus musculus denumirea comună: House mouse etapă de dezvoltare: de la tineri la adulti denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: de la tineri la adulti denumirea științifică: Rattus rattus denumirea comună: Roof rat etapă de dezvoltare: de la tineri la adulti |
| Domeniul de utilizare | în aer liber in exterior in jurul cladirilor |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: În cutii cu momeală Descriere detaliata: momeala gata de utilizare – statii momeala rezistente |
| Doza (dozele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: Soareci de casa: 40 gr de produs pentru punct de momeala; Sobolani: 60-100 gr de produs pentru punct de momeala Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: daca sunt necesare mai multe puncte de momeala, distanta minima a acestora trebuie sa fie de 5 metri. |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | industrial profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Dimensiune material de ambalare: pachetele minime sunt de 1,5 kg pana la 25 kg Material de ambalare: compozitie de plastic – strat triplu (Poliester PET met/polietilna); plastic; carton |

4.3.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

- protejati momeala de conditiile atmosferice (de ex. ploaie, zapada,etc.) Amplasati statiile de momeala in zone care nu se inunda.
- statiile de momeala trebuie sa fie vizitate (pentru soareci cel putin la fiecare 2-3 zile), (pentru sobolani numai 5 – 7 zile dupa inceputul tratamentului si cel putin saptamanal dupa aceea, pentru a verifica daca momeala este acceptata, daca statiile de momeala sunt intacte si pentru a indeparta animalele moarte. Reumpleti, cand este necesar.
- Inlocuiti momeala din statiile de momeala in care momeala a fost deteriorata de apa sau contaminata de murdarie.

4.3.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Nu aplicați acest produs direct în zonele de locuințe

4.3.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Când

Amplasarea stațiilor de momeală este aproape de suprafețele de apă: canale, diguri, canale /santuri de irigație) sau sistemele de scurgere, asigurați-vă ca momeala nu este în contact cu apa.

4.3.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

4.3.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Viata de raft: 24 luni

4.4 Modul de utilizare

Utilizarea 4 - Soareci de casă și sobolani – profesioniști instruiți - în interior

| | |
|---|--|
| Tipul produsului | TP 14 - Rodenticide |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | nu este relevant pentru rodenticide |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: Mus musculus denumirea comună: House mouse etapă de dezvoltare: de la tineri la adulți denumirea științifică: Rattus rattus denumirea comună: Roof rat etapă de dezvoltare: de la tineri la adulți denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: de la tineri la adulți |
| Domeniul de utilizare | de interior interior |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: În cutii cu momeală Descriere detaliată: momeala gata de utilizare – stații momeala rezistente sau puncte de momeala |

| | |
|---|---|
| | acoperite si protejate , cat timp ofera acelasi nivel de protectie pentru speciile care nu sunt tinta si pentru oameni , ca statii fixe rezistente de momeala. |
| Doza (dozele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: SOARECI: 20-40 gr produs pentru punct de momeala; SOBOLANI - Infestare ridicata : 60-100 gr produs pentru punct de momeala; infestare scazuta de 40-60 gr de momeala pentru punct de momeala, Momeala permanenta 60-100 gr momeala pentru punct de momeala Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: This page contains the following errors:error on line 1 at column 280: Entity 'nbsp' not defined Below is a rendering of the page up to the first error. SOARECI 20-40 gr produs pentru punct de momeala SOBOLANI |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | industrial instruiți profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Dimensiune material de ambalare: pachetele minime sunt de 1,5 kg pana la 25 kg Material de ambalare: compozitie de plastic – strat triplu (Poliester PET met/polietilna); plastic; carton |

4.4.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Indepartati produsul ramas la finalul perioadei de folosire
Pentru momeala permanenta :

4.4.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

- Unde este posibil, anterior tratamentului , informati orice trecatori posibili (de ex. utilizari ai zonei tratate si imprejurimilor, cu privire la campania de control a rozatoarelor.
- Luati in considerare masurile de preventie (de ex., gauri de intrare, indepartati hrana potentiala si bauturile cat mai departe posibil), pentru a imbunatati consumul si a reduce riscul de reinvazie.
- Pentru a reduce riscul de otravire secundara, cautati si indepartati rozatoarele moarte in timpul tratamentului la intervale frecvente, conform recomandarilor furnizate de codul de buna practica.
- Produsele pot fi folosite la tratamente permanente in locurile specifice, cu un risc potential de reinvazie , cand alte metode de control s-au dovedit insuficiente.
- Nu folositi produsul pentru tratamente de pompare.
In cazul unei momeli permanente:

4.4.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Cand se amplaseaza puncte de momeala aproape sistemul de canalizare si scurgere , asigurati-va ca momeala nu intra in contact cu apa.

4.4.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

| |
|--|
| |
|--|

4.4.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

| |
|---|
| Viata de raft: 24 luni |
| Folositi conditiile specifice de depozitare si de viata a raft a produsului, in conditii normale de depozitare care nu sunt necesare , cand conditiile de depozitare si viata de raft ale produsului in conditii normale de depozitare sunt implementate, asa cum este detaliat in sectiunea " Indicatii generale de utilizare (profesionisti pregatiti). |

4.5 Modul de utilizare

Utilizarea 5 - Soareci de casa și sobolani – profesioniști instruiți - în exterior în jurul clădirilor

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 14 - Rodenticide |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | nu este relevant pentru rodenticide |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: Mus musculus denumirea comună: House mouse etapă de dezvoltare: de la tineri la adulți denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: de la tineri la adulți denumirea științifică: Rattus rattus denumirea comună: Roof rat etapă de dezvoltare: de la tineri la adulți |
| Domeniul de utilizare | în aer liber în exterior în jurul clădirilor |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: În cutii cu momeală Descriere detaliată: momeala gata de utilizare – stații momeala rezistente sau puncte de momeala acoperite și protejate , cât timp oferă același nivel de protecție pentru speciile care nu sunt ținta și pentru oameni , ca stații fixe rezistente de momeala. |
| Doza (dozele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: SOARECI: 20-40 gr produs pentru punct de momeala; SOBOLANI - Infestare ridicată : 60-100 gr produs pentru punct de momeala; infestare scăzută de 40-60 gr de momeala pentru punct de momeala, Momeala permanentă 60-100 gr momeala pentru punct de momeala Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: This page contains the following errors:error on line 1 at column 287: Entity 'nbsp' not defined Below is a rendering of the page up to the first error. |

| | |
|---|--|
| | SOARECI 20-40 gr produs pentru punct de momeala SOBOLANI |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | industrial instruiți profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Dimensiune material de ambalare: pachetele minime sunt de 1,5 kg pana la 25 kg Material de ambalare: compozitie de plastic – strat triplu (Poliester PET met/polietilna); plastic; carton |

4.5.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Indepartati produsul ramas, la finalul perioadei de folosire
Pentru momeala permanenta :

4.5.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

- Unde este posibil, anterior tratamentului, informati orice trecatori posibili (de ex. utilizari ai zonei tratate si imprejurimilor, cu privire la campania de control a rozatoarelor.
- Luati in considerare masurile de preventie (de ex., gauri de intrare, indepartati hrana potentiala si bauturile cat mai departe posibil) pentru a imbunatati consumul si a reduce riscul de reinvazie.
- Pentru a reduce riscul de otravire secundara, cautati si indepartati rozatoarele moarte in timpul tratamentului la intervale frecvente, conform recomandarilor furnizate de codul de buna practica.
- Produsele pot fi folosite la tratamente permanente in locurile specifice, cu un risc potential de reinvazie cand alte metode de control s-au dovedit insuficiente.
- Nu folositi produsul pentru tratamente de pompare.
- Nu aplicati produsul direct in cartiere.

In cazul unei momeli permanente:

4.5.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Cand se amplaseaza puncte de momeala aproape sistemul de canalizare si scurgere , asigurati-va ca momeala nu intra in contact cu apa.

4.5.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

4.5.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Viata de raft:24 luni

Folositi conditii specifice de depozitare si de viata a raft a produsului, in conditii normale de depozitare care nu sunt necesare , cand conditiile de depozitare si viata de raft ale produsului in conditii normale de depozitare sunt implementate, asa cum este detaliat in sectiunea " Indicatii generale de utilizare (profesionisti pregatiti).

4.6 Modul de utilizare

Utilizarea 6 - Sobolani – profesionisti instruiti - in exterior zone deschise

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 14 - Rodenticide |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | nu este relevant pentru rodenticide |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea stiintifica: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: de la tineri la adulti denumirea stiintifica: Rattus rattus denumirea comună: Roof rat etapă de dezvoltare: de la tineri la adulti |
| Domeniul de utilizare | în aer liber in exterior zone deschise |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: În cutii cu momeală Descriere detaliata: momeala gata de utilizare – statii momeala rezistente sau puncte de momeala acoperite si protejate , cat timp ofera acelasi nivel de protectie pentru speciile care nu sunt tinta si pentru mamen, ca statii fixe rezistente de momeala. |
| Doza (dozele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 60-100 gr produs pentru punct de momeala; infestare scazuta de 40-60 gr de momeala pentru punct de momeala, Momeala permanenta 60-100 gr momeala pentru punct de momeala Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: Infestare ridicata : 60-100 gr produs pentru punct de momeala; infestare scazuta de 40-60 gr de momeala pentru punct de momeala, Momeala permanenta 60-100 gr momeala pentru punct de momeala daca sunt necesare mai multe puncte de momeala, distanta minima a acestora trebuie sa fie de 5 metri. |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | industrial instruiți profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Dimensiune material de ambalare: pachetele minime sunt de 1,5 kg pana la 25 kg Material de ambalare: compozitie de plastic – strat triplu (Poliester PET met/polietilna); plastic; carton |

4.6.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Indepartati produsul ramas la finalul perioadei de folosire:

4.6.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

- Unde este posibil, anterior tratamentului informati orice trecatori posibili (de ex. utilizari ai zonei tratate si imprejurimilor, cu privire la campania de control a rozatoarelor.
- Luati in considerare masurile de preventie (de ex., gauri de intrare, indepartati hrana potentiala si bauturile cat mai departe posibil) pentru a imbunatati consumul si a reduce riscul de reinvazie.
- Pentru a reduce riscul de otravire secundara, cautati si indepartati rozatoarele moarte in timpul tratamentului la intervale frecvente, conform recomandarilor furnizate de codul de buna practica.
- Produsele pot fi folosite la tratamente permanente in locurile specifice, cu un risc potential de reinvazie cand alte metode de control s-au dovedit insuficiente.
- Nu folositi produsul pentru tratamente de pompare.
- Nu aplicati produsul direct in cartiere.
In cazul unei momeli permanente:

4.6.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Cand se amplaseaza puncte de momeala aproape sistemul de canalizare si scurgere , asigurati-va ca momeala nu intra in contact cu apa

4.6.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

4.6.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Viata de raft:24 luni

Folositi conditii specifice de depozitare si de viata a raft a produsului, in conditii normale de depozitare care nu sunt necesare , cand conditiile de depozitare si viata de raft ale produsului in conditii normale de depozitare sunt implementate, asa cum este detaliat in sectiunea " Indicatii generale de utilizare (profesionisti pregatiti).

5. Direcții generale de utilizare

5.1. Instrucțiuni de utilizare

- Cititi si urmati informatiile despre produs ca si orice alte informatii care insotesc produsul sau care sunt furnizate la punctul de vanzare inainte de a-l folosi.
- realizati un sondaj, inainte de a pune momeala, asupra zonei infestata si o evaluare in acele locuri pentru a identifica speciile de rozatoare, locul lor de activitate si pentru a determina cauza si extinderea infestarii.
- Indepartati hrana , care poate fi gasita usor de rozatoare (grau imprastiat sau resturi de mancare). In afara de acest aspect, nu curatati zona infestata chiar inainte de tratament, pentru ca aceasta face ca populatia de rozatoare sa fie deranjata si , in acest caz, acceptarea momelii devine mai dificila.
- Produsul trebuie sa fie folosit ca parte a unui sistem de management al infestarii (IPM), care include printre altele, masuri de igiena si, unde este posibil, metode fizice de control.
- Luati in considerare masuri preventive (de ex. gauri de intrare, indepartati mancarea si bautura), pentru a imbunatati inghitirea produsului si pentru a reduce posibilitatea unei reinvazii. Statiile de momeala trebuie sa fie amplasate in imediata vecinatate a locurilor unde a fost observata anterior activitatea rozatoarelor (alei , locuri in care isi fac cuibul, loturi de hrana pentru animale, gauri, cartiere, etc.).
- Produsul trebuie amplasat in imediata vecinatate a locurilor in care rozatoarele au fost observate anterior, locuri unde isi au cuibul, locuri de hrana pentru animale, gauri, cartiere, etc.).
- Unde se poate, momeala trebuie asezata pe sol sau pe alte structuri.
- Momeala trebuie sa aiba o eticheta clar scrisa, ca sa se vada ca contine rodenticide si ca nu trebuie mutata sau deschisa (vezi sectiunea 5.3 pentru informatii care trebuie prezentate pe eticheta.).
- Cand produsul este folosit in zone publice, zonele tratate trebuie marcate int impul perioadei tratamentului si trebuie sa existe o notificare , care sa explice riscul de otravire primara sau secundara prin naticoagulant, ca si sa se indice primele masuri care trebuie luate in caz de otravire, care sa fie disponibile impreuna cu momeala.
- Momeala trebuie sa fi securizata, incat sa nu poata fi trasa din statia de momeala.
- Amplasati produsul incat sa nu poata fi atins de copii, pasari, animale de companie si animale de ferma si alte animale care nu sunt tinta.
- Amplasati produsul departe de hrana pentru consum, bauturi si hrana pentru animale, ca si departe de ustensile sau suprafete care intra in contact cu acestea.
- Purtati manusi de protectie rezistente la substante chimice (cauciuc) in timpul manuirii produsului.
- Cand folositi produsul, nu mancati, nu beti si nici nu fumati. Spalati-va pe maini si pe pielea direct expusa , dupa ce ati folosit produsul.
- Frecventa vizitelor in zonele tratate trebuie sa fie la discretia operatorului, conform sondajelor efectuate la inceputul tratamentului. Aceasta frecventa trebuie sa fie conforma cu recomandarile furnizate de codul valabil de buna practica.
- Daca ingerarea momelii este scazuta , fata de dimensiunea aparenta a infestarii, considerati inlocuirea punctelor de momeala in alte locuri si posibilitatea de a schimba formula momelii.
- Daca dupa o perioada de 35 de zile de tratament , momeala continua sa fie consumata si activitatea rozatoarelor nu este micsorata, atunci trebuie stabilita cauza. Daca se exclude alte elemente , se pare ca rozatoarele sunt rezistente si trebuie luat in considerare un rodenticid non-anticoagulant, acolo unde se poate, sau se va folosi un rodenticid mai puternic. De asemenea, considerati folosirea de capcane ca o alterantiva a masurii de control.
- Indepartati momeala care ramane in statiile de momeala dupa terminarea tratamentului.
- Amplasati momeala in statiile de momeala folosind un dispozitiv de dozare.

5.2. Măsurile de reducere a riscurilor

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Produsul contine substante anticoagulante, daca sunt ingerate, simptomele, care pot fi intarziate, includ sangerari nazale si ale gingiilor. In cazuri severe, pot aparea invinetirea si aparitia sangelui in materiile fecale si in urina.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

La finalul tratamentului, aruncati momeala, care nu a fost consumata, si ambalajul, conform cerintelor locale.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Depozitati intr-un loc uscat, racoros si bine ventilat. Tineti containerul inchis si departe de lumina directa a soarelui. Depozitati in locuri departe de accesul copiilor, pasarilor, animalelor de companie si animalelor de ferma. Viata de raft: 24 de luni.

6. Alte informații

Din cauza modului tarziu de actionare, rodenticidul anticoagulant poate dura de la 4 la 10 zile ca sa fie eficient dupa consumul efectiv al momelii.
Rozatoarele sunt purtatoare de boli. Un atingeti rozatoarele moarte cu mainile goale, folositi manusi sau folositi unelte, cum sunt clestii, cand le aruncati.
Produsul contine un agent amar si o vopsea.