



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
Ufficio I- Affari generali e Prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

I.5.i.d.2/672



Spett.le
BABOLNA BIO Ltd.
Szállas u.6
H-1107 BUDAPEST (HU)

OGGETTO: Prodotto biocida: PROTECT BLOCCHI PER LA FOGNATURA
Trasmissione decreto di autorizzazione

Si trasmette, in allegato, il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio del biocida indicato in oggetto n. IT/2018/00 *510* /MRS del ~~_____~~ **-7 SET. 2018**.

Si richiama l'attenzione in merito a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione del 19 luglio 2016 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che troverà applicazione nei tempi previsti dall'articolo 2 del medesimo regolamento.

“Si rammenta, inoltre, che codesta Società ha l'obbligo, ex art.5 del decreto del Ministero della Salute del 10 febbraio 2015 recante: “Disciplina dell'iter procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell'autorità competente previsti dal Regolamento (UE) n.528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi” (G.U.Serie Generale, n.106 del 09/05/2015), di adeguare autonomamente gli stampati del prodotto alla vigente normativa in materia di etichettatura e alle sue eventuali modifiche”.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dr.ssa Paola D'Amico

Referente tecnico: **Raffaella Perrone** 06.5994 2520
email: r.perrone@sanita.it

Referente amministrativo: **D'Amico Nina** 06.5994 3806
email: n.damico@sanita.it



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Ufficio I Affari generali e Prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici

I.S.i.d.2/2015/672

IT/2018/00510 /MRS

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 15 della Legge n. 97 del 06 agosto 2013 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013";

VISTO il Regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

VISTO, in particolare, l'articolo 33, del suddetto Regolamento riguardante il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e delle registrazioni di prodotti biocidi in sequenza;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1380 della Commissione del 25 luglio 2017 che rinnova l'approvazione del **BROMADIOLONE** come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14;

VISTA la domanda di autorizzazione acquisita su Registro europeo R4BP3 case number BC-SS018549-04 e ulteriori integrazioni, con cui la società **BABOLNA Bio Ltd** con sede legale in 1107 Budapest, ha chiesto il riconoscimento reciproco in sequenza dell'autorizzazione del prodotto biocida denominato **Protect blocchi per la fognatura** che sarà prodotto presso l'officina: Babolna Bio Ltd. - Budapest;

VISTA la documentazione presentata dalla suddetta società;

VISTO il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, acquisito con prot. n.0023303 del 26/04/2018;

RITENUTA la conformità di detta documentazione alla normativa vigente in materia di immissione sul mercato di biocidi;

DECRETA:

La Società BABOLNA Bio Ltd è autorizzata a mettere in commercio il prodotto biocida con le seguenti caratteristiche:

DENOMINAZIONE	PROTECT BLOCCHI PER LA FOGNATURA
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO	BABOLNA BIO Ltd Szállás u.6 H-1107 Budapest Ungheria
OFFICINE DI PRODUZIONE	BABOLNA BIO Ltd 1107 Budapest, Szállás u.6 - Ungheria
SOSTANZA ATTIVA	BROMADIOLONE n.CAS 28772-56-7
PT	14 rodenticida
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	Esca (pronta per l'uso)
CONFEZIONI/TAGLIE	Per uso professionale e per uso addestrato: 100g blocchi in confezione plastica in cartone, fino a 15 kg.



CATEGORIA DI UTILIZZATORI	Professionisti e professionisti formati
STABILITÀ DEL PRODOTTO	2 anni
NUMERO DI AUTORIZZAZIONE	IT/2018/00 510 /MRS - 7 SET. 2018
SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	31 agosto 2020

E' approvato e fa parte integrante del presente decreto il sommario delle caratteristiche del prodotto (**allegato 1**).

Si allega l'etichetta con la quale il biocida **PROTECT BLOCCHI PER LA FOGNATURA** è distribuito sul territorio nazionale (**allegato 2**). Le modifiche a tali etichette non rientranti tra quelle indicate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n.354/2013 della Commissione del 18 aprile 2013 possono essere apportate dalla società titolare autonomamente e sotto la propria responsabilità.

L'esatta denominazione del biocida suddetto dovrà comunque essere individuabile attraverso una colorazione e un carattere unici in contrasto con le altre eventuali colorazioni e caratteri usati nel testo degli stampati autorizzati.

A far data dalla notifica del presente decreto, la ditta è tenuta a produrre e commercializzare il prodotto esclusivamente come biocida alle condizioni sopra riportate.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto viene redatto in duplice originale, di cui un esemplare è notificato in via amministrativa alla ditta interessata e l'altro è conservato agli atti di questo Ufficio.

Roma, li

- 7 SET. 2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Dr.ssa Paola D'Alessandro



ND/RP

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

1. Informazioni amministrative

1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Area di mercato	Denominazione commerciale
Italia	Protect Sewer Block
Italia	Protect blocchi per la fognatura

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Numero di autorizzazione	Non definito	
Data di rilascio dell'autorizzazione	Non definito	
Data di scadenza dell'autorizzazione	Non definito	
Nome e Indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome Indirizzo	Non definito Non definito

1.3. Fabbricante/i del prodotto

Nome del produttore	Babolna Bio Ltd			
Indirizzo del fabbricante	Szállás utca 6	1107	Budapest	Ungheria
Ubicazione dei siti produttivi	Koves J ut 1-3	2843	Babolna	Ungheria

1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

numero BAS: 12				
Nome del produttore	Di Tezza			
Indirizzo del fabbricante	Via Tre Ponti	37050	S. Maria di Zevio	Italia
Ubicazione dei siti produttivi	Via Tre Ponti	37050	S. Maria di Zevio	Italia

2. Composizione e formulazione

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

numero BAS	Numero CE	Numero CAS	Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Contenuto (%)
12	249-205-9	28772-56-7	Bromadolone	3-[3-(4-Bromo)1,1-biphenyl]-4-yl]-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Principio attivo	0,005

2.2. Tipo di formulazione

RB - Esca (pronta per l'uso)

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Indicazioni di pericolo	Puo nuocere al feto Provoca danni agli organi sanguigni in caso di esposizione prolungata o ripetuta .
Consigli di prudenza	Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso Lavare le mani accuratamente dopo l'uso
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso	
Indossare guanti	
IN CASO di esposizione o di possibile esposizione: Consultare un medico	
Conservare sotto chiave.	
Smaltire il prodotto in conformità con le disposizioni locali.	

4. Uso/i autorizzato/i

4.1. Ratti – professionisti – all'interno di edifici

Tipi di prodotto	Tipo di prodotto 14 - Rodenticidi		
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non applicabile per i rodenticidi		
Campo di applicazione	In ambiente chiuso All'interno di edifici		
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale		
Organismi bersaglio	Nome scientifico	Nome comune	Fase di sviluppo
	Rattus norvegicus	Brown rat	i giovani e gli adulti
Metodi di applicazione			
Metodo	applicazione esca		
Descrizione	Esca pronta per l'uso per impiego in contenitori per esche a prova di manomissione		

Tasso: infestazione/	75-100 g di esca per contenitore. Se fossero necessari più contenitori per esche, posizionarli ad una distanza minima di 10 metri l'uno dall'altro /bassa infestazione/ o 5 metri l'uno dall'altro /alta
Diluizione:	-%
Tempistica:	-

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	75, 100, 120 o 200 g blocchi in confezione plastica, in cartone Fino a 25 kg materiale di imballaggio polietilene (PE) + cartone
---	--

4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente in seguito, al fine di controllare se l'esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori. Riempire nuovamente il contenitore quando necessario.

- Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

In caso di posizionamento di contenitori con l'esca in prossimità di sistemi di drenaggio delle acque, prevenire che l'esca entri in contatto con l'acqua.

4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

4.2. ratti – professionisti – intorno agli edifici

Tipi di prodotto	Tipo di prodotto 14 - Rodenticidi		
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non applicabile per i rodenticidi		
Campo di applicazione	All'aperto intorno agli edifici		
Categoria di utilizzatori	Utilizzatore professionale		
Organismi bersaglio	Nome scientifico Rattus norvegicus	Nome comune Brown rat	Fase di sviluppo i giovani e gli adulti
Metodi di applicazione	applicazione esca		
Metodo	applicazione esca		
Descrizione	Esca pronta per l'uso per impiego in contenitori per esche a prova di manomissione		
Tasso: infestazione/	75-100 g di esca per contenitore. Se fossero necessari più contenitori per esche, posizionarli ad una distanza minima di 10 metri l'uno dall'altro /bassa infestazione/ o 5 metri l'uno dall'altro /alta		
Diluizione:	-%		
Tempistica:	-		

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	75, 100, 120 o 200 g blocks in plastic wrapping in carton box Up to 25 kg packaging material, polyethylene (PE) + carton paper
---	--

4.2.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Proteggere l'esca dalle condizioni atmosferiche (ad es. pioggia, neve, ecc). Posizionare i contenitori con l'esca in zone non soggette ad allagamenti.

- I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni, per ratti 5-7 giorni all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente in seguito, al fine di controllare se l'esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori. Riempire nuovamente il contenitore quando necessario
- Sostituire le esche nei contenitori se danneggiati dall'acqua o contaminate dalla sporcizia
- Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti

4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Non applicare questo prodotto direttamente nelle tane

4.2.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

In caso di posizionamento di punti esca in prossimità di acque superficiali (ad esempio fiumi, stagni, canali d'acqua, dighe, canali di irrigazione) o di sistemi di drenaggio delle acque, prevenire che l'esca entri in contatto con l'acqua

4.2.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

4.2.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

4.3. ratti – professionisti formati – all'interno di edifici

Tipi di prodotto	Tipo di prodotto 14 - Rodenticidi		
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non applicabile per i rodenticidi		
Campo di applicazione	In ambiente chiuso All'interno d'edifici		
Categoria di utilizzatori	Utilizzatore professionale addestrato		
Organismi bersaglio	Nome scientifico Rattus norvegicus	Nome comune Brown rat	Fase di sviluppo i giovani e gli adulti
Metodi di applicazione	applicazione esca		
Metodo	applicazione esca		
Descrizione	Esca pronta per l'uso per impiego in contenitori per esche a prova di manomissione		
	o		
	per l'uso in punti esca coperti e protetti, purché questi forniscano lo stesso livello di protezione per le specie non bersaglio e l'uomo delle stazioni esca a prova di manomissione		

Tasso:	75-100 g di esca per punto esca
Diluzione:	-%
Templistica:	-

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	75, 100, 120 o 200 g blocchi in confezione plastica, in cartone Fino a 25 kg materiale di imballaggio: polietilene (PE) + cartone
---	---

4.3.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

- Raccogliere il prodotto rimanente alla fine del periodo di trattamento

per l'uso in esche permanenti:

Ove possibile, si raccomanda di rivisitare l'area trattata al più tardi ogni 4 settimane al fine di evitare la possibile selezione di una popolazione resistente

- Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti

4.3.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili astanti (ad esempio coloro che frequentano l'area trattata ed i dintorni) della campagna di derattizzazione in corso

- Al fine di ridurre il rischio di avvelenamento secondario, durante il trattamento e ad intervalli frequenti, ricercare e raccogliere i roditori morti, conformemente alle raccomandazioni previste dalle buone pratiche pertinenti

- Non usare il prodotto in trattamenti dove viene usata la tecnica di 'pulsed baiting'

per l'uso in esche permanenti:

Il trattamento con la tecnica di 'permanent baiting' è strettamente limitato a quei luoghi con alto potenziale di reinfestazione qualora altri metodi di controllo si siano dimostrati insufficienti.

- La strategia di 'permanent baiting' deve essere rivalutata periodicamente nel contesto di una strategia di Gestione Integrata delle Infestazioni (IPM) e della valutazione del rischio di una possibile reinfestazione

4.3.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

In caso di posizionamento di punti esca in prossimità di acque superficiali (ad esempio fiumi, stagni, canali d'acqua, dighe, canali di irrigazione) o di sistemi di drenaggio delle acque, prevenire che l'esca entri in contatto con l'acqua

4.3.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

4.3.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

4.4. ratti – professionisti formati – intorno agli edifici

Tipoli di prodotto	Tipo di prodotto 14 - Rodenticidi		
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non applicabile per i rodenticidi		
Campo di applicazione	All'aperto intorno agli edifici		
Categoriale di utilizzatori	Utilizzatore professionale addestrato		
Organismi bersaglio	Nome scientifico	Nome comune	Fase di sviluppo
	Rattus norvegicus	Brown rat	i giovani e gli adulti
Metodi di applicazione			
Metodo	applicazione esca		
Descrizione	Esca pronta per l'uso per impiego in contenitori per esche a prova di manomissione		
	o		
	o per l'uso in punti esca coperti e protetti, purché questi forniscano lo stesso livello di protezione per le specie non bersaglio e fuomo delle stazioni esca a prova di manomissione		
Tasso:	75-100 g di esca per punto esca		
Diluzione:	-%		
Templistica:	-		
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	75, 100, 120 o 200 g blocks in plastic wrapping in carton box Up to 25 kg packaging material: polyethylene (PE) + carton paper		

4.4.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Proteggere l'esca dalle condizioni atmosferiche. Posizionare i punti esca in zone non soggette ad allagamenti

- Sostituire le esche nei punti esca se danneggiate dall'acqua o contaminate dallo sporco

- Raccogliere il prodotto rimanente alla fine del periodo di trattamento.

- Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.

per l'uso in esche permanenti:

Ove possibile, si raccomanda di rivisitare l'area trattata al più tardi ogni 4 settimane al fine di evitare la possibile selezione di una popolazione resistente

- Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.

per l'uso in punti esca coperti e protetti

- Per uso esterno (intorno agli edifici, aree aperte, discariche), i punti esca devono essere coperti e posizionati in luoghi strategici al fine di minimizzare l'esposizione nei confronti delle specie non bersaglio

- Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.

4.4.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili astanti (ad esempio coloro che frequentano l'area trattata ed i dintorni) della campagna di derattizzazione in corso

- Al fine di ridurre il rischio di avvelenamento secondario, durante il trattamento e ad intervalli frequenti, ricercare e raccogliere i roditori morti, conformemente alle raccomandazioni previste dalle buone pratiche pertinenti

- Non usare il prodotto in trattamenti dove viene usata la tecnica di 'pulsed baiting'.

per l'uso in esche permanenti:

Il trattamento con la tecnica di 'permanent baiting' è strettamente limitato a quei luoghi con alto potenziale di reinfestazione qualora altri metodi di controllo si siano dimostrati insufficienti.

- La strategia di 'permanent baiting' deve essere rivalutata periodicamente nel contesto di una strategia di Gestione Integrata delle Infestazioni (IPM) e della valutazione del rischio di una possibile reinfestazione

4.4.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

In caso di posizionamento di punti esca in prossimità di acque superficiali (ad esempio fiumi, stagni, canali d'acqua, dighe, canali di irrigazione) o di sistemi di drenaggio delle acque, prevenire che l'esca entri in contatto con l'acqua

4.4.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

4.4.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

4.5. Ratti – professionisti formati – in aree aperte & discariche di rifiuti

Tipoli di prodotto	Tipo di prodotto 14 - Rodenticidi		
--------------------	-----------------------------------	--	--

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non applicabile per i rodenticidi		
Campo di applicazione	All'aperto In aree aperte		
In discariche di rifiuti			
Categoria di utilizzatori	Utilizzatore professionale addestrato		
Organismi bersaglio	Nome scientifico Rattus norvegicus	Nome comune Brown rat	Fase di sviluppo i giovani e gli adulti
Metodi di applicazione			
Metodo	applicazione esca		
Descrizione	Esca pronta per l'uso per impiego in contenitori per esche a prova di manomissione o per l'uso in punti esca coperti e protetti, purché questi forniscano lo stesso livello di protezione per le specie non bersaglio e l'uomo dalle stazioni esca a prova di manomissione		
Tasso:	75-100 g di esca per punto esca		
Diluizione:	-%		
Tempistica:	-		
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	75, 100, 120 o 200 g blocchi in confezione plastica, in cartone Fino a 25 kg materiale di imballaggio: polietilene (PE) + cartone		

4.5.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Proteggere l'esca dalle condizioni atmosferiche. Posizionare i punti esca in zone non soggette ad allagamenti.
- Sostituire le esche nei punti esca se danneggiate dall'acqua o contaminate dalla sporizia
- Raccogliere il prodotto rimanente alla fine del periodo di trattamento
- Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti

per l'uso in esche permanenti:

Ove possibile, si raccomanda di rivisitare l'area trattata al più tardi ogni 4 settimane al fine di evitare la possibile selezione di una popolazione resistente.
- Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.

per l'uso in punti esca coperti e protetti:

- Per uso esterno (intorno agli edifici, aree aperte, discariche), i punti esca devono essere coperti e posizionati in luoghi strategici al fine di minimizzare l'esposizione nei confronti delle specie non bersaglio
- Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti

4.5.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili abitanti (ad esempio coloro che frequentano l'area trattata ed i dintorni) della campagna di derattizzazione in corso
- Al fine di ridurre il rischio di avvelenamento secondario, durante il trattamento e ad intervalli frequenti, ricercare e raccogliere i roditori morti, conformemente alle raccomandazioni previste dalle buone pratiche pertinenti.
- Non usare il prodotto in trattamenti dove viene usata la tecnica di 'pulsed baiting'

per l'uso in esche permanenti

Il trattamento con la tecnica di 'permanent baiting' è strettamente limitato a quei luoghi con alto potenziale di reinfestazione qualora altri metodi di controllo si siano dimostrati insufficienti
- La strategia di 'permanent baiting' deve essere rivalutata periodicamente nel contesto di una strategia di Gestione Integrata delle Infestazioni (IPM) e della valutazione del rischio di una possibile re-infestazione

4.5.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

In caso di posizionamento di punti esca in prossimità di acque superficiali (ad esempio fiumi, stagni, canali d'acqua, dighe, canali di irrigazione) o di sistemi di drenaggio delle acque, prevenire che l'esca entri in contatto con l'acqua.

4.5.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

4.5.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

4.6. Ratti – professionisti formati – fognature

Tipi di prodotto	Tipo di prodotto 14 - Rodenticidi		
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non applicabile per i rodenticidi		
Campo di applicazione	Other Fognature		
Categoria di utilizzatori	Utilizzatore professionale addestrato		
Organismi bersaglio	Nome scientifico Rattus norvegicus	Nome comune Brown rat	Fase di sviluppo i giovani e gli adulti
Metodi di applicazione			
Metodo	applicazione esca		
Descrizione	Esca pronta per l'uso da ancorare o applicare in contenitori per esche a prova di manomissione al fine di prevenire che l'esca entri in contatto con l'acqua di scarico I prodotti sono anche autorizzati per l'uso in punti esca coperti e protetti, purché questi forniscano lo stesso livello di protezione per le specie non bersaglio e l'uomo dalle stazioni esca a prova di manomissione		
Tasso:	75-200 grammi per tombino		
Diluizione:	-%		
Tempistica:	-		
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	75, 100, 120 o 200 g blocchi in confezione plastica, in cartone Fino a 25 kg materiale di imballaggio: polietilene (PE) + cartone		

4.6.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Applicare le esche in modo che non vengano in contatto con l'acqua e siano trascinata via.
- Seguire ogni ulteriore istruzione previste dalle buone pratiche pertinenti

4.6.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Posizionare le esche solo in quei sistemi fognari collegati all'impianto di trattamento delle acque reflue.
- Non usare il prodotto in trattamenti dove viene usata la tecnica di 'pulsed baiting'.

4.6.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

4.6.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

4.6.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

5. Indicazioni generali per l'uso

5.1. Istruzioni d'uso

Leggere e seguire le istruzioni sul prodotto prima dell'uso così come le informazioni in accompagnamento al prodotto o fornite presso il punto vendita

- Prima del posizionamento delle esche, procedere ad un sopralluogo dell'area infestata e ad una valutazione in loco al fine d'identificare la specie di roditori, i luoghi d'attività e determinare la probabile cause e l'entità dell'infestazione
- Rimuovere le fonti di cibo facilmente raggiungibili da parte dei roditori (ad esempio granaglie fuoriuscite o scarti di cibo). Inoltre, non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento, dato che ciò disturba solamente la popolazione di roditori e rende più difficile ottenere l'accettazione dell'esca.
- Il prodotto deve essere usato unicamente all'interno del sistema di gestione integrata delle infestazioni (IPM), che include, fra l'altro, anche misura d'igiene e, dove possibile, metodi fisici di controllo
- Il prodotto deve essere posizionato nelle immediate vicinanze di luoghi in cui l'attività dei roditori è stata verificata in precedenza (ad esempio camminamenti, nid, recinti d'entrata di bestiame, aperture, tane, ecc.)
- Dove possibile, fissare i contenitori per esca al suolo o ad altre strutture
- I contenitori per esche devono essere chiaramente etichettati segnalando che contengono rodenticidi e che non devono essere rimossi o aperti (si veda sezione 5.3 relativa alle informazioni da riportare in etichetta)
- Quando il prodotto è utilizzato in aree pubbliche, le zone trattate devono essere segnalate durante il periodo di trattamento. Accanto alle esche, deve essere reso disponibile un avviso indicante il rischio di avvelenamento primario e secondario da anticoagulante e le misure di primo soccorso da seguire in caso di avvelenamento
- L'esca deve essere fissata in modo da non essere trasciata fuori dal contenitore per esche
- Posizionare il prodotto fuori dalla portata di bambini, uccelli, animali domestici, animali da fattoria e altri animali non bersaglio
- Posizionare il prodotto lontano da cibi, bevande e alimenti per animali, nonché da utensili o superfici che possono entrare in contatto con il prodotto
- Durante la fase di manipolazione del prodotto, indossare guanti di protezione resistenti alle sostanze chimiche
- Dove appropriato, specificare qualsiasi altro tipo di dispositivo di protezione (ad esempio occhiali di protezione o maschera) richiesto per la manipolazione del prodotto)
- Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso del prodotto. Lavare le mani e la pelle direttamente esposta dopo l'utilizzo del prodotto
- La frequenza delle visite all'area trattata è a discrezione dell'operatore, alla luce del sopralluogo condotto all'inizio del trattamento. La frequenza deve essere conforme alle raccomandazioni previste dalle buone pratiche pertinenti
- Se il consumo dell'esca è basso rispetto alla dimensione evidente dell'infestazione, valutare il riposizionamento dei punti esca in altri luoghi e la possibilità di cambiare tipo formulazione d'esca
- Se, trascorso un periodo di trattamento di 35 giorni, le esche vengono ancora consumate e non si osserva una diminuzione nell'attività dei roditori, è necessario determinarne la causa più probabile. Qualora altri elementi siano stati già esclusi, è probabile che vi siano roditori resistenti; considerare, quindi, ove disponibile, l'uso di un rodenticida non-anticoagulante o di un rodenticida anticoagulante più efficace. Considerare, inoltre, l'uso di trappole quale misura alternativa di controllo

Alla fine del periodo di trattamento rimuovere le esche rimaste o i contenitori contenenti le esche

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili assistenti della campagna di derattizzazione in corso [conformemente alle buone pratiche pertinenti, se disponibili]

- Le informazioni sul prodotto (etichetta e/o foglio illustrativo) devono chiaramente indicare che il prodotto deve essere unicamente fornito ad utilizzatori professionali formati in possesso della certificazione dimostrante la conformità con i requisiti formativi pertinenti (ad esempio "per soli professionisti formati")
- Non impegnare in aree dove vi è il sospetto di resistenza alla sostanza attiva
- Non usare il prodotto oltre 35 giorni senza una valutazione del livello dell'infestazione e dell'efficacia del trattamento [fatta eccezione se autorizzati per trattamenti di "perennial baiting"]
- Per un'appropriata gestione delle resistenze, non alternare l'uso di anticoagulanti differenti ma con efficacia paragonabile o inferiore. Considerare l'uso di rodenticidi non-anticoagulanti, se disponibili, oppure di un anticoagulante più efficace
- Fra un'applicazione e la successiva, non lavare con acqua i contenitori per esche o gli utensili usati in punti esca coperti e protetti.
- Smaltire i roditori morti secondo la normativa vigente

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Questo prodotto contiene una sostanza anticoagulante. Se ingerito, i sintomi, che possono essere ritardati, possono includere sanguinamento dal naso o dalle gengive. In casi gravi, possono manifestarsi ematomi e presenza di sangue nelle feci ed urine

- Antidoto: Vitamina K1 somministrabile solo da personale medico/veterinario

- In caso di

- Esposizione cutanea, lavare la pelle con acqua e poi con acqua e sapone.

- Esposizione oculare, risciacquare gli occhi con acqua o con liquido per lavaggio oculare, tenere le palpebre aperte per almeno 10 minuti

- Esposizione orale, sciacquare accuratamente la bocca con acqua. Non somministrare nulla per bocca ad una persona priva di sensi. Non provocare il vomito. In caso d'ingestione, contattare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta del prodotto [inserire l'informazione specifica richiesta dalla legislazione nazionale]. Contattare un medico veterinario in caso di ingestione da parte di un animale domestico [inserire l'informazione specifica richiesta dalla legislazione nazionale]

- I contenitori d'esche devono essere etichettati con le seguenti informazioni "non spostare o aprire", "contiene un rodenticida", "nome del prodotto o numero di autorizzazione", "sostanza (e) attiva (e)" e "in caso di incidente, consultare un Centro Antiveneni" [inserire il numero di telefono nazionale]

- Pericoloso per la fauna selvatica.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Alla fine del trattamento, smaltire l'esca non consumata e la confezione secondo la normativa vigente

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

- Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Conservare il contenitore chiuso e al riparo dalla luce diretta del sole.

- Conservare in un luogo inaccessibile per bambini, uccelli, animali domestici e da fattoria

- Data di scadenza 2 anni dalla data di produzione

6. Altre informazioni

A causa della loro modalità d'azione ritardata, i rodenticidi anticoagulanti possono richiedere dai 4 ai 10 giorni dopo l'assunzione dell'esca per essere efficaci

- I roditori possono essere portatori di malattie. Non toccare i roditori morti con le mani nude; per il loro smaltimento, utilizzare guanti o strumenti quali pinze.
- Questo prodotto contiene un agente amaro ed un colorante

Protect blocchi per la fognatura rodenticida

CATEGORIA DI UTILIZZATORI *professionisti*

AREA DI UTILIZZO: *all'interno ed intorno edifici, in aree aperte, in discariche e in fognature contro il ratto grigio (Rattus norvegicus)*

Composizione (Composition):

100 g di prodotto contengono:

bromadiolone

(N. CE: 249-205-9, N. CAS: 28772-56-7) 0.005 g

Coformulanti q. b. a 100 g



Pericolo!

INDICAZIONI DI PERICOLO

H372 *Provoca danni agli organi /sangue/ in caso di esposizione prolungata o ripetuta.*

H360D *Può nuocere al feto.*

CONSIGLI DI PRUDENZA

P202 *Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.*

P264 *Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.*

P270 *Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.*

P280 *Indossare guanti protettivi.*

P308+P313 *In caso di esposizione o di possibile esposizione: Consultare un medico.*

P405 *Conservare sotto chiave.*

P501 – *Smaltire il prodotto in: conformità con le disposizioni locali.*

Titolare dell'autorizzazione

Babolna Bio Ltd. 1107 Budapest, Szállás u.6.

Tel.: 06-1 43-20-400. Fax: 06-1 43-20-401

info@babolna-bio.com, www.babolna-bio.com

Officine di produzione

Babolna Bio Ltd. 1107 Budapest, Szállás u.6.

Confezione: 100g blocchi in confezione plastica, in cartone, Fino a 15 kg

Validità : Può essere utilizzata per 2 anni dalla data della produzione nelle confezioni originali, chiuse, conservate in luogo asciutto e fresco, protetto da raggi del sole.

Lotto n. **del**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO (Medical advices)

Il prodotto comprende una sostanza attiva anticoagulante, il bromadiolone. L'ingestione dell'esca rodenticida può causare la riduzione della capacità coagulativa e un'emorragia interna. Fra l'avvelenamento/esposizione e la comparsa dei sintomi possono passare anche più giorni. Fra i sintomi ritardati sono l'epistassi ed il sanguinamento delle gengive. In casi più gravi si vede sangue nell'urina e nelle feci.

In caso di avvelenamento o il suo sospetto consultare un medico mostrandogli l'etichetta.

Nel caso di ingestione:

- Consultare subito un medico mostrandogli il contenitore, l'etichetta o la scheda di sicurezza.
- Provocare vomito solo su indicazione del medico.
- Sciacquare la bocca con acqua. Non mangiare e non bere, riposarsi in un luogo caldo e consultare un medico.

- Non somministrare nulla a persone incoscienti.

Contatto cutaneo:

- Togliere gli indumenti e lavarli prima del prossimo utilizzo.

Pericolo! Lavare la pelle con acqua abbondante e sapone.

Pericolo! Se l'irritazione persiste chiamare un medico.

VALIDITÀ: 11/2018-10/2020
IP.

Contatto con gli occhi:

- Lavare immediatamente e abbondantemente gli occhi con acqua corrente, per qualche minuto, tenendo le palpebre aperte.
- Eliminare gli eventuali lenti a contatto e continuare a lavare gli occhi.
- Se l'irritazione persiste chiamare un medico.

Antidoto: Vitamina K1 somministrata dal medico o dal veterinario o dal loro personale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

esca rodenticida pronta all'uso in blocchi paraffinati da 100 grammi cadauno. L'esca rodenticida comprende un amaro (denatonium benzoate) che aiuta a prevenire ingestioni accidentali da parte dell'uomo.

ORGANISMO TARGET

Efficace contro Ratto grigio (Rattus norvegicus) adulto e giovane.

MODALITÀ APPLICATIVE

Modalità d'impiego: Il prodotto deve essere utilizzato in luoghi in cui si presenta l'infestazione da ratti. Valutare la quota dell'infestazione dei roditori in base ai segni di presenza ed ai danni causati, poi fare il trattamento in base alle informazioni ottenute.

DOSI DI APPLICAZIONE:

La dose da applicare all'interno ed intorno edifici, in aree aperte ed in discariche: 100 grammi (1 blocco) ogni 5-10 metri

INDICAZIONI PER L'USO

Prima di posizionare le esche si deve valutare se l'infestazione da ratti può essere eliminata senza l'utilizzo dell'esca rodenticida. Usare l'esca rodenticida solo in casi motivati!

Prima di posizionare le esche, procedere ad un sopralluogo della zona e prendere le misure necessarie per migliorare l'efficienza del trattamento e prevenire le nuove infestazioni.

Prima di iniziare il trattamento si deve valutare se esiste una resistenza contro la sostanza attiva (bromadiolone) dell'esca rodenticida nella zona interessata. Nelle zone in cui c'è la resistenza, è consigliato l'utilizzo di un prodotto con diversa sostanza attiva.

Il posizionamento delle esche rodenticide dipende prima di tutto dalle condizioni locali. L'obiettivo primario è impedire

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)
Autorizzazione del Ministero della Salute n. ...

11/2018/00510HRS

Quercia

l'accesso al prodotto alle persone non autorizzate ed agli animali non bersaglio.

I blocchi di esche rodenticidi vanno esposte in luoghi visitati da ratti, lungo i loro percorsi e presso le loro tane supposte

- prima di tutto in adeguati contenitori protetti contro l'apertura, oppure in scatole
- o in luoghi di alimentazione coperti e protetti se offrono la stessa protezione per le specie non bersaglio e gli uomini come i contenitori per esche a prova di manomissione.

Si consiglia l'utilizzo di contenitore per esche MULTIBAITER® distribuito dalla Bábolna Bio Kft. In un contenitore per esche si può porre solo la quantità massima adeguata alla dose di utilizzo.

Si deve fissare i contenitori per esche.

I blocchi di esche rodenticidi devono essere posti negli sbocchi di acqua piovana e nei pozzetti di pulizia delle fognature, e negli scarichi di acqua nei cortili con un filo metallico di fissaggio in tal modo che siano ad un'altezza superiore alla superficie dell'acqua ma ad un posto facilmente accessibile dai roditori. Se è possibile, porre i blocchi in un contenitore con gambe adeguato alle fognature.

I contenitori per esche rodenticidi devono essere etichettati - in conformità al Decreto nr. 16/2017 (7.VIII.) del Ministero delle Risorse Umane - e ci devono essere indicati la denominazione, la sostanza attiva, l'antidoto dell'esca rodenticida, ed il nome, l'indirizzo e il telefono dell'utilizzatore.

Si deve definire la frequenza delle ispezioni dei contenitori per esche prendendo in considerazione i risultati del sopralluogo effettuato prima del trattamento.

Durante le ispezioni si deve reintegrare le esche già consumate. Cambiare le esche se sono deteriorate o ammuffite.

Se le esche poste vengono continuamente consumate, posizionare più esche ma non aumentare la quantità delle esche già poste nella zona. Se le esche rimangono intatte ma si vede ancora la presenza dei roditori, le esche rodenticidi devono essere riposizionate.

A causa dell'effetto ritardato della sostanza attiva anticoagulante l'inizio della morte dei roditori è previsto dopo 3-5 giorni dal consumo. Le esche rodenticidi devono essere esposte fino a quando è motivato dall'attività dei roditori. Non utilizzare le esche con posizionamenti permanenti senza motivo. E' consigliato l'utilizzo del prodotto insieme all'introduzione del programma di gestione

integrata delle infestazioni (IPM/IPC). Se dopo il periodo di trattamento di 35 giorni le esche si consumano ancora e non si diminuisce l'attività dei roditori, si deve determinare i probabili motivi e prendere le misure necessarie. Se viene escluso ogni altro motivo, è possibile che nella zona si sia formata la resistenza contro la sostanza attiva. In questo caso valutare l'opportunità dell'utilizzo di un altro prodotto.

AVVERTENZE Nell'interesse di prevenire le minacce sanitarie e gli avvelenamenti secondari si deve procedere ad eliminare i corpi dei roditori morti durante le ispezioni e dopo il termine del trattamento. La rimozione delle carcasse dovrà essere effettuato conformemente alle legislazione corrente locale. Alla fine del trattamento si deve eliminare i luoghi di alimentazione. Raccogliere le esche rodenticidi ed anche i contenitori. Procedere alla pulizia/raccolta delle esche rodenticidi eventualmente sparse. Le esche rodenticidi inutilizzabili allo scopo originale, diventate rifiuti devono essere trattate come rifiuti pericolosi e devono essere consegnate ai centri di raccolta di rifiuti pericolosi (p.es. siti di riciclaggio pubblici).

ALTRE INFORMAZIONI

Utilizzare esclusivamente per la derattizzazione e rispettando le istruzioni dell'utilizzo. Le esche rodenticidi devono essere esposte nei luoghi in cui i bambini, gli animali domestici, gli uccelli ed altri animali non bersaglio non possono accederci. Non utilizzare esche contaminate o danneggiate. Le esche rodenticidi devono essere conservate lontano da alimenti, bevande e mangimi, in luoghi inaccessibili da bambini ed animali non bersaglio. Il prodotto è nocivo per i mammiferi e gli uccelli. I cani, i gatti, i maiali, i predatori e gli animali necrofagi possono essere avvelenati in quanto mangiano i ratti morti o indeboliti a causa dell'esca rodenticida. E' proibito utilizzare il prodotto per uccidere animali non bersaglio. Non disperdere il prodotto nelle acque.

Bábolna Bio Ltd.

B-1107 Budapest, Szállás u. 6.
Hungary
VAT No.: HU10767692
18.

Milgi

Protect blocchi per la fognatura rodenticida

CATEGORIA DI UTILIZZATORI

professionisti formati

AREA DI UTILIZZO: all'interno ed intorno edifici, in aree aperte, in discariche e in fognature contro il ratto grigio (*Rattus norvegicus*)

Composizione (Composition):

100 g di prodotto contengono:

bromadiolone

(N. CE: 249-205-9, N. CAS: 28772-56-7) 0,005 g

Coformulanti q. b. a 100 g



Pericolo!

INDICAZIONI DI PERICOLO

H372 Provoca danni agli organi /sangue/ in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H360D Può nuocere al feto.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P280 Indossare guanti protettivi.

P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione: Consultare un medico.

P405 Conservare sotto chiave.

P501 - Smaltire il prodotto in: conformità con le disposizioni locali.

Autorizzazione del Ministero della Salute n. ...

Titolare dell'autorizzazione

Babolna Bio Ltd. 1107 Budapest, Szállás u.6.

Tel.: 06-1 43-20-400, Fax: 06-1 43-20-401

info@babolna-bio.com, www.babolna-bio.com

Officine di produzione

Babolna Bio Ltd. 1107 Budapest, Szállás u.6.

Confezione: 100g blocchi in confezione plastica, in cartone. Fino a 15 kg

Validità : Può essere utilizzata per 2 anni dalla data della produzione nelle confezioni originali, chiuse, conservate in luogo asciutto e fresco, protetto da raggi del sole.

Lotto n. del

INFORMAZIONI PER IL MEDICO (Medical advices)

Il prodotto comprende una sostanza attiva anticoagulante, il bromadiolone. L'ingestione dell'esca rodenticida può causare la riduzione della capacità coagulativa e un'emorragia interna. Fra l'avvelenamento/esposizione e la comparsa dei sintomi possono passare anche più giorni. Fra i sintomi ritardati sono l'epistassi ed il sanguinamento delle gengive. In casi più gravi si vede sangue nell'urina e nelle feci.

In caso di avvelenamento o il suo sospetto consultare un medico mostrandogli l'etichetta.

Nel caso di ingestione:

- Consultare subito un medico mostrandogli il contenitore, l'etichetta o la scheda di sicurezza.
- Provocare vomito solo su indicazione del medico.
- Sciacquare la bocca con acqua. Non mangiare e non bere, riposarsi in un luogo caldo e consultare un medico.
- Non somministrare nulla a persone incoscienti.

Contatto cutaneo:

- Togliere gli indumenti e lavarli prima del prossimo

- Lavare la pelle con acqua abbondante e sapone.
 - Se l'irritazione persiste chiamare un medico.
- Contatto con gli occhi:
- Lavare immediatamente e abbondantemente gli occhi con acqua corrente, per qualche minuto, tenendo le palpebre aperte.
 - Eliminare gli eventuali lenti a contatto e continuare a lavare gli occhi.
 - Se l'irritazione persiste chiamare un medico.

Antidoto: Vitamina K1 somministrata dal medico o dal veterinario o dal loro personale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

esca rodenticida pronta all'uso in blocchi paraffinati da 100 grammi cadauno. L'esca rodenticida comprende un amaro (denatonium benzoate) che aiuta a prevenire ingestioni accidentali da parte dell'uomo.

ORGANISMO TARGET

Efficace contro Ratto grigio (*Rattus norvegicus*)) adulto e giovane.

MODALITÀ APPLICATIVE

Modalità d'impiego: Il prodotto deve essere utilizzato in luoghi in cui si presenta l'infestazione da ratti. Valutare la quota dell'infestazione dei roditori in base ai segni di presenza ed ai danni causati, poi fare il trattamento in base alle informazioni ottenute.

DOSI DI APPLICAZIONE:

La dose da applicare all'interno ed intorno edifici, in aree aperte ed in discariche: 100 grammi (1 blocco) ogni 5-10 metri

La dose da applicare in sbocchi di acque ed in canali: 100-200 grammi (1-2 blocchi) ogni tombino.

INDICAZIONI PER L'USO

Prima di posizionare le esche si deve valutare se l'infestazione da ratti può essere eliminata senza l'utilizzo dell'esca rodenticida. Usare l'esca rodenticida solo in casi motivati!

Prima di posizionare le esche, procedere ad un sopralluogo della zona e prendere le misure necessarie per migliorare l'efficienza del trattamento e prevenire le nuove infestazioni.

Prima di iniziare il trattamento si deve valutare se esiste una resistenza contro la sostanza attiva (bromadiolone)

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)

Babolna Bio Ltd.

AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA

SALUTE N. 118018/00510MRS

VAL No: 10/67692

18.

dell'esca rodenticida nella zona interessata. Nelle zone in cui c'è la resistenza, è consigliato l'utilizzo di un prodotto con diversa sostanza attiva.

Il posizionamento delle esche rodenticidi dipende prima di tutto dalle condizioni locali. L'obiettivo primario è impedire l'accesso al prodotto alle persone non autorizzate ed agli animali non bersaglio.

I blocchi di esche rodenticidi vanno esposte in luoghi visitati da ratti, lungo i loro percorsi e presso le loro tane supposte

- prima di tutto in adeguati contenitori protetti contro l'apertura, oppure in scatole
- o in luoghi di alimentazione coperti e protetti se offrono la stessa protezione per le specie non bersaglio e gli uomini come i contenitori per esche a prova di manomissione.

Si consiglia l'utilizzo di contenitore per esche MULTIBAITER® distribuito dalla Bábolna Bio Kft. In un contenitore per esche si può porre solo la quantità massima adeguata alla dose di utilizzo.

Si deve fissare i contenitori per esche.

I blocchi di esche rodenticidi devono essere posti negli sbocchi di acqua piovana e nei pozzetti di pulizia delle fognature, e negli scarichi di acqua nei cortili con un filo metallico di fissaggio in tal modo che siano ad un'altezza superiore alla superficie dell'acqua ma ad un posto facilmente accessibile dai roditori. Se è possibile, porre i blocchi in un contenitore con gambe adeguato alle fognature.

I contenitori per esche rodenticidi devono essere etichettati - in conformità al Decreto nr. 16/2017 (7.VIII.) del Ministero delle Risorse Umane - e ci devono essere indicati la denominazione, la sostanza attiva, l'antidoto dell'esca rodenticida, ed il nome, l'indirizzo e il telefono dell'utilizzatore.

Si deve definire la frequenza delle ispezioni dei contenitori per esche prendendo in considerazione i risultati del sopralluogo effettuato prima del trattamento.

Durante le ispezioni si deve reintegrare le esche già consumate. Cambiare le esche se sono deteriorate o ammuffite.

Se le esche poste vengono continuamente consumate, posizionare più esche ma non aumentare la quantità delle esche già poste nella zona. Se le esche rimangono intatte ma si vede ancora la presenza dei roditori, le esche rodenticidi devono essere riposizionate.

A causa dell'effetto ritardato della sostanza attiva anticoagulante l'inizio della morte dei roditori è previsto dopo 3-5 giorni dal consumo. Le esche rodenticidi devono essere esposte fino a quando è motivato dall'attività dei roditori. Non utilizzare le esche con posizionamenti permanenti senza motivo. E' consigliato l'utilizzo del prodotto insieme all'introduzione del programma di gestione integrata delle infestazioni (IPM/IPC). Se dopo il periodo di trattamento di 35 giorni le esche si consumano ancora e non si diminuisce l'attività dei roditori, si deve determinare i probabili motivi e prendere le misure necessarie. Se viene escluso ogni altro motivo, è possibile che nella zona si sia formata la resistenza contro la sostanza attiva. In questo caso valutare l'opportunità dell'utilizzo di un altro prodotto.

AVVERTENZE Nell'interesse di prevenire le minacce sanitarie e gli avvelenamenti secondari si deve procedere ad eliminare i corpi dei roditori morti durante le ispezioni e dopo il termine del trattamento. La rimozione delle carcasse dovrà essere effettuato conformemente alle legislazione corrente locale. Alla fine del trattamento si deve eliminare i luoghi di alimentazione. Raccogliere le esche rodenticidi ed anche i contenitori. Procedere alla pulizia/raccolta delle esche rodenticidi eventualmente sparse. Le esche rodenticidi inutilizzabili allo scopo originale, diventate rifiuti devono essere trattate come rifiuti pericolosi e devono essere consegnate ai centri di raccolta di rifiuti pericolosi (p.es. siti di riciclaggio pubblici).

ALTRE INFORMAZIONI

Utilizzare esclusivamente per la derattizzazione e rispettando le istruzioni dell'utilizzo. Le esche rodenticidi devono essere esposte nei luoghi in cui i bambini, gli animali domestici, gli uccelli ed altri animali non bersaglio non possono accederci. Non utilizzare esche contaminate o danneggiate. Le esche rodenticidi devono essere conservate lontano da alimenti, bevande e mangimi, in luoghi inaccessibili da bambini ed animali non bersaglio. Il prodotto è nocivo per i mammiferi e gli uccelli. I cani, i gatti, i maiali, i predatori e gli animali necrofagi possono essere avvelenati in quanto mangiano i ratti morti o indeboliti a causa dell'esca rodenticida. E' proibito utilizzare il prodotto per uccidere animali non bersaglio. Non disperdere il prodotto nelle acque.

Bábolna Bio Ltd.

H-1107 Budapest, Szállás u. 6.
Hungary
VAT No.: HU10767692
18.

M. G.