

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: MAXIMON 5 SVJEŽI MAMAC

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA:UP/I-543-04/19-12/13

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3): HR-0014347-0000

Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	1
2. Sastav i formulacija proizvoda	2
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Oznake opasnosti i obavijesti	2
4. Odobrena uporaba	3
5. Opće upute za uporabu	16
5.1. Upute za uporabu	16
5.2. Mjere za smanjenje rizika	19
5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	21
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	21
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja	21
6. Ostale informacije	21

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

MAXIMON 5 SVJEŽI MAMAC

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	LODI S.A.S.
	Adresa	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Francuska
Broj odobrenja	KLASA:UP/I-543-04/19-12/13	
Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)	HR-0014347-0000	
Datum odobrenja	07/02/2012	
Datum isteka odobrenja	01/07/2024	

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača	Lodi SAS
Adresa proizvođača	Parc d'activités des quatre routes 35390 Grand Fougeray Francuska
Lokacija proizvodnih pogona	Lodi SAS, Parc d'activités des quatre routes 35390 Grand Fougeray Francuska
	Parc d'activités du Pays du Grand Fougeray Espace Nord 24 et 26 rue des Pionniers 35390 GRAND FOUGERAY Francuska

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	12 - Bromadiolon
Naziv proizvođača	PelGar International Ltd.
Adresa proizvođača	Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Ujedinjeno Kraljevstvo
Lokacija proizvodnih pogona	Prazska 280 02 Kolin Češka

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Bromadiolon	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Aktivna tvar	28772-56-7	249-205-9	0,005

2.2. Vrsta formulacije

RB - mamac (pripremljen za uporabu)

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja	<p>Uzrokuje oštećenje organa (krv) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti .</p> <p>Može naškoditi nerođenom djetetu.</p>
Oznake obavijesti	<p>Prije uporabe pribaviti posebne upute.</p> <p>Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti.</p> <p>Nakon uporabe temeljito oprati ruke</p> <p>Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.</p> <p>Nositi zaštitne rukavice.</p> <p>U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost:Zatražiti pomoć liječnika.</p>

U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet liječnika.

Skladištiti pod ključem.

Odložiti spremnik u/na mjesto predviđeno za sakupljanje opasnog otpada, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim odredbama.

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - kućni miševi – profesionalni korisnici – u zatvorenom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: kućni miševi Stadij razvoja: odrasle i mlade jedinke
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U zatvorenom
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamci (spremni za uporabu) su namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: 20-30 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji) na svaka 2 metra u slučaju jake infestacije ili svakih 5 metara u slučaju blage infestacije Razrjeđivanje (%): Broj i vremenski raspored primjene: 20-30 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji) na svaka 2 metra u slučaju jake infestacije ili svakih 5 metara u slučaju blage infestacije. Redovito treba provjeravati konzumaciju mamaca i zamijeniti pojedene ili oštećene mamce, sve dok potrošnja ne prestane.
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Minimalna veličina pakiranja 5 kg. Pojedinačno unutarnje pakiranje mamca u vrećici od 10 g - PE/PP kanta: 5 kg (500x10 g), 5,5 kg (550x10 g), 6 kg (600x10 g), 6,5 kg (650x10 g), 7 kg (700x10 g), 7,5 kg (750x10 g), 8 kg (800x10 g), 8,5 kg (850x10 g), 9 kg (900x10 g),

9,5 kg (950x10 g), 10 kg (1000x10 g).

- Kartonska kutija s unutarnjom plastičnom oblogom: 5 kg (500x10 g), 5,5 kg (550x10 g), 6 kg (600x10 g), 6,5 kg (650x10 g), 7 kg (700x10 g), 7,5 kg (750x10 g), 8 kg (800x10 g), 8,5 kg (850x10 g), 9 kg (900x10 g), 9,5 kg (950x10 g), 10 kg (1000x10 g).

- Patrone u PP: 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 260 g, 270 g, 280 g, 310 g, 500 g

Vanjska ambalaža - kartonska kutija s veličinama pakiranja od: 5 kg do 25 kg (18 patrona od 280 g, 18 patrona od 310 g)

- Prethodno napunjena zaštitna kutija za mamce (PP, PS, PVC): 2x10 g ili 3x10 g u kartonskoj kutiji u ukupnoj količini od 5 kg.

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

• Kutije s mamcem treba provjeriti barem svaka 2 do 3 dana u početku tretmana i nakon toga najmanje jednom tjedno te provjeriti je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela uginulih glodavaca. Mamac treba ponovno napuniti prema potrebi.

• Slijediti svaku dodatnu uputu predloženu u relevantnom Kodeksu najbolje prakse.

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

-

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja mamca u blizini sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - štakori – profesionalni korisnici– u zatvorenom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: odrasle i mlade jedinke Znanstveno ime: Rattus rattus Uobičajeno ime: crni štakor Stadij razvoja: odrasle i mlade jedinke
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U zatvorenom
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamci (spremni za uporabu) su namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: 60 - 100 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji) na svakih 5 metara u slučaju jake infestacije ili svakih 10 metara u slučaju blage infestacije Razrjeđivanje (%): Broj i vremenski raspored primjene: 60 - 100 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji) na svakih 5 metara u slučaju jake infestacije ili svakih 10 metara u slučaju blage infestacije. Redovito treba provjeravati konzumaciju mamaca i zamijeniti pojedene ili oštećene mamce, sve dok potrošnja ne prestane.

Kategorije korisnika

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Minimalna veličina pakiranja 5 kg.
Pojedinačno unutarnje pakiranje mamca u vrećici od 10 g
- PE/PP kanta: 5 kg (500x10 g), 5,5 kg (550x10 g), 6 kg (600x10 g), 6,5 kg (650x10 g), 7 kg (700x10 g), 7,5 kg (750x10 g), 8 kg (800x10 g), 8,5 kg (850x10 g), 9 kg (900x10 g), 9,5 kg (950x10 g), 10 kg (1000x10 g).
- Kartonska kutija s unutarnjom plastičnom oblogom: 5 kg (500x10 g), 5,5 kg (550x10 g), 6 kg (600x10 g), 6,5 kg (650x10 g), 7 kg (700x10 g), 7,5 kg (750x10 g), 8 kg (800x10 g), 8,5 kg (850x10 g), 9 kg (900x10 g), 9,5 kg (950x10 g), 10 kg (1000x10 g).
- Patrone u PP: 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 260 g, 270 g, 280 g, 310 g, 500 g
Vanjska ambalaža - kartonska kutija s veličinama pakiranja od: 5 kg do 25 kg (18 patrona od 280 g, 18 patrona od 310 g)

- Prethodno napunjena zaštitna kutija za mamce (PP, PS, PVC): 2x10 g ili 3x10 g u kartonskoj kutiji u ukupnoj količini od 5 kg.

4.2.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

- Kutije s mamcem treba provjeriti 5 do 7 dana nakon početka tretmana i nakon toga najmanje jednom tjedno te provjeriti je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela uginulih glodavaca. Mamac treba ponovno napuniti prema potrebi.
- Slijediti svaku dodatnu uputu navedenu u relevantnom Kodeksu najbolje prakse.

4.2.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

-

4.2.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja mamca u blizini sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.2.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.2.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - kućni miševi i/ili štakori –profesionalni korisnici – na otvorenom, oko zgrada

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: odrasle i mlade jedinke Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: kućni miševi Stadij razvoja: odrasle i mlade jedinke Znanstveno ime: Rattus rattus Uobičajeno ime: crni štakor Stadij razvoja: odrasle i mlade jedinke
Područje primjene	na otvorenom Na otvorenom, oko zgrada
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamci (spremni za uporabu) su namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: Suzbijanje miševa: 20-30 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji) na svaka 2 metra u slučaju jake infestacije ili svakih 5 metara u slučaju blage infestacije; suzbijanje štakora: 60 - 100 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji) na svakih 5 metara u slučaju jake infestacije ili svakih 10 metara u slučaju blage infestacije. Razrjeđivanje (%): Broj i vremenski raspored primjene: Suzbijanje miševa: 20-30 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji) na svaka 2 metra u slučaju jake infestacije ili svakih 5 metara u slučaju blage infestacije; suzbijanje štakora: 60 - 100 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji) na svakih 5 metara u slučaju jake infestacije ili svakih 10 metara u slučaju blage infestacije.

Redovito treba provjeravati konzumaciju mamaca i zamijeniti pojedene ili oštećene mamce, sve dok potrošnja ne prestane.

Kategorije korisnika

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Minimalna veličina pakiranja 5 kg.
Pojedinačno unutarnje pakiranje mamca u vrećici od 10 g
- PE/PP kanta: 5 kg (500x10 g), 5,5 kg (550x10 g), 6 kg (600x10 g), 6,5 kg (650x10 g), 7 kg (700x10 g), 7,5 kg (750x10 g), 8 kg (800x10 g), 8,5 kg (850x10 g), 9 kg (900x10 g), 9,5 kg (950x10 g), 10 kg (1000x10 g).
- Kartonska kutija s unutarnjom plastičnom oblogom: 5 kg (500x10 g), 5,5 kg (550x10 g), 6 kg (600x10 g), 6,5 kg (650x10 g), 7 kg (700x10 g), 7,5 kg (750x10 g), 8 kg (800x10 g), 8,5 kg (850x10 g), 9 kg (900x10 g), 9,5 kg (950x10 g), 10 kg (1000x10 g).
- Patrone u PP: 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 260 g, 270 g, 280 g, 310 g, 500 g

Vanjska ambalaža - kartonska kutija s veličinama pakiranja od: 5 kg do 25 kg (18 patrona od 280 g, 18 patrona od 310 g)

- Prethodno napunjena zaštitna kutija za mamce (PP, PS, PVC): 2x10 g ili 3x10 g u kartonskoj kutiji u ukupnoj količini od 5 kg.

4.3.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

- Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega, itd.). Mjesta postavljanja mamca ne smiju se nalaziti u zoni poplavlivanja.
- Kutije s mamcem treba provjeriti barem svaka 2 do 3 dana u početku tretmana (za miševe); 5 do 7 dana nakon početka tretmana (za štakore) i nakon toga najmanje jednom tjedno te provjeriti je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela uginulih glodavaca. Mamac treba ponovno napuniti prema potrebi.
- Zamijeniti postavljeni mamac ako ga je oštetila voda ili je kontaminiran zemljom.
- Slijediti svaku dodatnu uputu predloženu u mjerodavnom Kodeksu najbolje prakse.

4.3.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ne postavljati ovaj proizvod izravno u jazbine.

4.3.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja mamca u blizini vodotoka (npr. rijeka, jezera, kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.3.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.3.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

4.4 Opis uporabe

Uporaba 4 - kućni miš i/ili štakor - osposobljeni profesionalni korisnici - u zatvorenom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: kućni miš Stadij razvoja: odrasle i mlade jedinke Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: odrasle i mlade jedinke Znanstveno ime: Rattus rattus Uobičajeno ime: crni štakor Stadij razvoja: odrasle i mlade jedinke
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U zatvorenom
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamci (spremni za uporabu) su namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja ili na prekrivena mjesta postavljanja mamca.

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: Suzbijanje miševa: 20-30 g mamca po mjestu postavljanja na svaka 2 metra u slučaju jake infestacije ili svakih 5 metara u slučaju blage infestacije; suzbijanje štakora: 60 - 100 g mamca po mjestu postavljanja na svakih 5 metara u slučaju jake infestacije ili svakih 10 metara u slučaju blage infestacije.

Razrjeđivanje (%): 0

Broj i vremenski raspored primjene:

Suzbijanje miševa: 20-30 g mamca po mjestu postavljanja na svaka 2 metra u slučaju jake infestacije ili svakih 5 metara u slučaju blage infestacije; suzbijanje štakora: 60 - 100 g mamca po mjestu postavljanja na svakih 5 metara u slučaju jake infestacije ili svakih 10 metara u slučaju blage infestacije.

Redovito treba provjeravati konzumaciju mamaca i zamijeniti pojedene ili oštećene mamce, sve dok potrošnja ne prestane.

Kategorije korisnika

osposobljeni profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Minimalna veličina pakiranja 5 kg.

Pojedinačno unutarnje pakiranje mamca u vrećici od 10 g

- PE/PP kanta: 5 kg (500x10 g), 5,5 kg (550x10 g), 6 kg (600x10 g), 6,5 kg (650x10 g), 7 kg (700x10 g), 7,5 kg (750x10 g), 8 kg (800x10 g), 8,5 kg (850x10 g), 9 kg (900x10 g), 9,5 kg (950x10 g), 10 kg (1000x10 g).

- Kartonska kutija s unutarnjom plastičnom oblogom: 5 kg (500x10 g), 5,5 kg (550x10 g), 6 kg (600x10 g), 6,5 kg (650x10 g), 7 kg (700x10 g), 7,5 kg (750x10 g), 8 kg (800x10 g), 8,5 kg (850x10 g), 9 kg (900x10 g), 9,5 kg (950x10 g), 10 kg (1000x10 g).

- Patrone u PP: 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 260 g, 270 g, 280 g, 310 g, 500 g

Vanjska ambalaža - kartonska kutija s veličinama pakiranja od: 5 kg do 25 kg (18 patrona od 280 g, 18 patrona od 310 g)

- Prethodno napunjena zaštitna kutija za mamce (PP, PS, PVC): 2x10 g ili 3x10 g u kartonskoj kutiji u ukupnoj količini od 5 kg.

4.4.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

- Na kraju deratizacije treba ukloniti preostali mamac.
- Kod postavljanja mamca na otvorenom, mjesto postavljanja mamca treba biti prekriveno i postavljeno na strateško mjesto na način da se izloženost ne-ciljnih vrsta svede na najmanju moguću mjeru.
- Slijediti svaku dodatnu uputu predloženu u relevantnom Kodeksu najbolje prakse.

4.4.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijestiti sve moguće prolaznike o provođenju deratizacijskih mjera.
- Razmotriti mogućnost primjene preventivnih mjera (zatvoriti rupe, uklonite hranu i piće što je dalje moguće) da bi se poboljšala konzumacija mamaca i smanjila vjerojatnost ponovne invazije.
- Kako bi se umanjio rizik od sekundarnog otrovanja, često treba tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretmana u skladu s preporukama relevantnog Kodeksa najbolje prakse.
- Ne koristiti pripravak u pulsnom režimu.

4.4.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja mamca u blizini sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.4.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.4.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

4.5 Opis uporabe

Uporaba 5 - miševi i/ili štakori – osposobljeni profesionalni korisnici – na otvorenom oko zgrada

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije mjerodavno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: odrasle i mlade jedinke Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: kućni miš Stadij razvoja: odrasle i mlade jedinke Znanstveno ime: Rattus rattus Uobičajeno ime: crni štakor Stadij razvoja: odrasle i mlade jedinke

Područje primjene

na otvorenom

Na otvorenom oko zgrada

Načini primjene

Metoda: primjena mamaca

Detaljan opis:

Mamci (spremni za uporabu) su namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja ili na prekrivena mjesta postavljanja mamca.

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: Suzbijanje miševa: 20-30 g mamca po mjestu postavljanja na svaka 2 metra u slučaju jake infestacije ili svakih 5 metara u slučaju blage infestacije; suzbijanje štakora: 60 - 100 g mamca po mjestu postavljanja na svakih 5 metara u slučaju jake infestacije ili svakih 10 metara u slučaju blage infestacije.

Razrjeđivanje (%):

Broj i vremenski raspored primjene:

Suzbijanje miševa: 20-30 g mamca po mjestu postavljanja na svaka 2 metra u slučaju jake infestacije ili svakih 5 metara u slučaju blage infestacije; suzbijanje štakora: 60 - 100 g mamca po mjestu postavljanja na svakih 5 metara u slučaju jake infestacije ili svakih 10 metara u slučaju blage infestacije.

Redovito treba provjeravati konzumaciju mamaca i zamijeniti pojedene ili oštećene mamce, sve dok potrošnja ne prestane.

Kategorije korisnika

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Minimalna veličina pakiranja 5 kg.

Pojedinačno unutarnje pakiranje mamca u vrećici od 10 g

- PE/PP kanta: 5 kg (500x10 g), 5,5 kg (550x10 g), 6 kg (600x10 g), 6,5 kg (650x10 g), 7 kg (700x10 g), 7,5 kg (750x10 g), 8 kg (800x10 g), 8,5 kg (850x10 g), 9 kg (900x10 g), 9,5 kg (950x10 g), 10 kg (1000x10 g).

- Kartonska kutija s unutarnjom plastičnom oblogom: 5 kg (500x10 g), 5,5 kg (550x10 g), 6 kg (600x10 g), 6,5 kg (650x10 g), 7 kg (700x10 g), 7,5 kg (750x10 g), 8 kg (800x10 g), 8,5 kg (850x10 g), 9 kg (900x10 g), 9,5 kg (950x10 g), 10 kg (1000x10 g).

- Patrone u PP: 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 260 g, 270 g, 280 g, 310 g, 500 g

Vanjska ambalaža - kartonska kutija s veličinama pakiranja od: 5 kg do 25 kg (18 patrona od 280 g, 18 patrona od 310 g)

- Prethodno napunjena zaštitna kutija za mamce (PP, PS, PVC): 2x10 g ili 3x10 g u kartonskoj kutiji u ukupnoj količini od 5 kg.

4.5.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

- Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega, itd.). Mjesta postavljanja mamca ne smiju se nalaziti u zoni poplavlivanja.
- Zamijeniti postavljeni mamac ako ga je oštetila voda ili je kontaminiran zemljom.
- Na kraju deratizacije treba ukloniti preostali mamac.
- Slijediti svaku dodatnu uputu predloženu u relevantnom Kodeksu najbolje prakse.
- Kod postavljanja mamca na otvorenom, mjesto postavljanja mamca treba biti prekriveno i postavljeno na strateško mjesto na način da se izloženost ne-ciljnih vrsta svede na najmanju moguću mjeru.
- Slijediti svaku dodatnu uputu predloženu u relevantnom Kodeksu najbolje prakse.
- Za izravno postavljanje u jazbine:
 - Mamac treba biti postavljen na način da se izloženost djece i ne-ciljnih vrsta svede na najmanju mjeru.
 - Ulaz u jazbinu s mamcem treba biti prekriven ili blokiran da se umanjí odbacivanje ili rasipanje mamaca.
 - Slijediti svaku dodatnu uputu predloženu u mjerodavnom Kodeksu najbolje prakse.

4.5.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijestiti sve moguće prolaznike o provođenju deratizacijskih mjera.
- Razmotriti mogućnost primjene preventivnih mjera (zatvoriti rupe, uklonite hranu i piće što je dalje moguće) da bi se poboljšala konzumacija mamaca i smanjila vjerojatnost ponovne invazije.
- Kako bi se umanjio rizik od sekundarnog otrovanja, često treba tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretmana u skladu s preporukama relevantnog Kodeksa najbolje prakse.
- Ne koristiti pripravak u pulsnom režimu.

4.5.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja mamca u blizini vodotoka (npr. rijeka, jezera, kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.5.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.5.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

4.6 Opis uporabe

Uporaba 6 - štakori – osposobljeni profesionalni korisnici – vanjska otvorena područja i odlagališta otpada

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: odrasle i mlade jedinke Znanstveno ime: Rattus rattus Uobičajeno ime: crni štakor Stadij razvoja: odrasle i mlade jedinke
Područje primjene	na otvorenom drugo Vanjska otvorena područja Odlagališta otpada
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamci (spremni za uporabu) su namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja ili na prekrivena mjesta postavljanja mamca ili izravno u jazbine.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: Suzbijanje štakora: 60 - 100 g mamca po mjestu postavljanja na svakih 5 metara u slučaju jake infestacije ili svakih 10 metara u slučaju blage infestacije. Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Suzbijanje štakora: 60 - 100 g mamca po mjestu postavljanja na svakih 5 metara u slučaju jake infestacije ili svakih 10 metara u slučaju blage infestacije. Redovito treba provjeravati konzumaciju mamaca i zamijeniti pojedene ili oštećene mamce, sve dok potrošnja ne prestane.
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Minimalna veličina pakiranja 5 kg. Pojedinačno unutarnje pakiranje mamca u vrećici od 10 g - PE/PP kanta: 5 kg (500x10 g), 5,5 kg (550x10 g), 6 kg (600x10 g), 6,5 kg (650x10 g), 7 kg (700x10 g), 7,5 kg (750x10 g), 8 kg (800x10 g), 8,5 kg (850x10 g), 9 kg (900x10 g), 9,5 kg (950x10 g), 10 kg (1000x10 g). - Kartonska kutija s unutarnjom plastičnom oblogom: 5 kg (500x10 g), 5,5 kg (550x10 g), 6 kg (600x10 g), 6,5 kg (650x10 g), 7 kg (700x10 g), 7,5 kg (750x10 g), 8 kg (800x10 g)

g), 8,5 kg (850x10 g), 9 kg (900x10 g), 9,5 kg (950x10 g), 10 kg (1000x10 g).
- Patrone u PP: 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 260 g, 270 g, 280 g, 310 g, 500 g
Vanjska ambalaža - kartonska kutija s veličinama pakiranja od: 5 kg do 25 kg
(18 patrona od 280 g, 18 patrona od 310 g)

- Prethodno napunjena zaštitna kutija za mamce (PP, PS, PVC): 2x10 g ili 3x10 g u kartonskoj kutiji u ukupnoj količini od 5 kg.

4.6.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

- Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega, itd.). Mjesta postavljanja mamca ne smiju se nalaziti u zoni poplavlivanja.
- Zamijeniti postavljeni mamac ako ga je oštetila voda ili je kontaminiran zemljom.
- Na kraju deratizacije treba ukloniti preostali mamac.
- Slijediti svaku dodatnu uputu predloženu u relevantnom Kodeksu najbolje prakse.
- Kod postavljanja mamca na otvorenom, mjesto postavljanja mamca treba biti prekriveno i postavljeno na strateško mjesto na način da se izloženost ne-ciljnih vrsta svede na najmanju moguću mjeru.
- Slijediti svaku dodatnu uputu predloženu u relevantnom Kodeksu najbolje prakse.
- Za izravno postavljanje u jazbine:
 - Mamac treba biti postavljen na način da se izloženost djece i ne-ciljnih vrsta svede na najmanju mjeru.
 - Ulaz u jazbinu s mamcem treba biti prekriven ili blokiran da se umanju odbacivanje ili rasipanje mamaca.
 - Slijediti svaku dodatnu uputu predloženu u relevantnom Kodeksu najbolje prakse.

4.6.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijestiti sve moguće prolaznike o provođenju deratizacijskih mjera.
 - Kako bi se umanjio rizik od sekundarnog otrovanja, često treba tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretmana u skladu s preporukama relevantnog Kodeksa najbolje prakse.
 - Ne koristiti pripravak u pulsnom režimu.
- Za izravno postavljanje u jazbine:
- Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijestiti sve moguće prolaznike o provođenju deratizacijskih mjera.

4.6.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja mamca u blizini vodotoka (npr. rijeka, jezera, kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.6.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.6.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

Profesionalni korisnici:

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o uporabi proizvoda, kao i sve informacije koje prate proizvod ili su dostupne na mjestu prodaje.
- Pregledati detaljno infestirano područje i provesti procjenu lokacije prije postavljanja mamca kako bi se utvrdile vrste glodavaca, mjesta na kojima se primjećuje njihova aktivnost, najvjerojatniji uzrok i jačina infestacije.
- Ukloniti izvore hrane koji su dostupni glodavcima (npr. rasuto žito ili otpatke od hrane). Osim toga, ne treba čistiti infestirano područje neposredno prije tretiranja, jer to može uznemiriti populaciju glodavaca i otežati da glodavci prihvate postavljeni mamac kao izvor hrane.
- Proizvod treba koristiti kao dio programa integriranog suzbijanja štetnika (IPM) koji treba uključivati, između ostalog, higijenske mjere te, gdje je to moguće, i fizikalne mjere suzbijanja.
- Razmotriti mogućnost primjene preventivnih mjera (zatvoriti rupe, uklonite hranu i piće što je dalje moguće) da bi se poboljšala konzumacija mamaca i smanjila vjerojatnost ponovne invazije.
- Proizvod postaviti na mjesta u neposrednoj blizini mjesta gdje su uočene aktivnosti glodavaca (npr. staze kretanja, mjesta skrivanja, hranjenja, rupe glodavaca, itd.).
- Ako je moguće, kutije s mamcem treba učvrstiti na tlo ili druge površine.
- Kutije s mamcem trebaju biti jasno označene da sadrže rodenticide te da se ne smiju premješati ili otvarati.
- Ako se proizvod koristi na javnim površinama, tretirana područja trebaju se označiti tijekom deratizacije te je pored mamaca potrebno postaviti obavijest o rizicima od primarnog i sekundarnog otrovanja antikoagulantnim rodenticidom, kao i navesti mjere koje je potrebno poduzeti u slučaju otrovanja, sve mora biti vidljivo na cijelom području na kojem se provodi deratizacija.
- Mamac treba učvrstiti kako se ne bi mogao odvući iz kutije s mamcem.
- Proizvod postaviti izvan dosega djece, ptica, ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne-ciljnih životinja.
- Proizvod postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta i površina koje su u kontaktu s navedenim.
- Tijekom rukovanja s pripravkom treba nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije.
- Pri uporabi proizvoda ne jesti, piti ni pušiti. Nakon uporabe proizvoda operite ruke i izravno izloženu kožu.
- Ako je potrošnja mamaca relativno mala u odnosu na veličinu infestacije, treba razmotriti premještanje mamca na druge lokacije ili promijeniti formulaciju mamca.
- Ako se konzumiranje mamaca nastavi i nakon perioda od 35 dana i ne primjećuje se smanjenje aktivnosti glodavaca, potrebno je utvrditi vjerojatni uzrok tome. Kada se drugi razlozi isključe, postoji sumnja na otpornost glodavaca; tada treba razmotriti primjenu ne-antikoagulantnog rodenticida ili jačih antikoagulantnih rodenticida, ili zamke kao alternativne mjere za suzbijanje glodavaca.
- Na kraju deratizacije treba ukloniti preostali mamac ili kutije za mamce.
- Upute za uporabu koje su "specifične za mamce": • Mamci u vrećicama: [Za vrećice koje se ne mogu isprazniti - Ne otvarajte vrećice koje sadrže mamac].
- Pasta: a) Postavite mamac u obliku paste s dovoljno izduženim aplikatorom (špatulom) kako biste smanjili izlaganje ruku -

izbjegavajte zahvaćanje u kantu. b) Navedite kako se oprema (npr. lopatica) treba očistiti i kako se može izbjeći kontakt s ostacima mamca.

Osposobljeni profesionalni korisnici

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o uporabi proizvoda, kao i sve informacije koje prate proizvod ili su dostupne na mjestu prodaje.

- Pregledati detaljno infestirano područje i provesti procjenu lokacije prije postavljanja mamca kako bi se utvrdile vrste glodavaca, mjesta na kojima se primjećuje njihova aktivnost, najvjerojatniji uzrok i jačina infestacije.

- Ukloniti izvore hrane koji su dostupni glodavcima (npr. rasuto žito ili otpatke od hrane). Osim toga, ne treba čistiti infestirano područje neposredno prije tretiranja, jer to može uznemiriti populaciju glodavaca i otežati da glodavci prihvate postavljeni mamac kao izvor hrane.

- Proizvod treba koristiti kao dio programa integriranog suzbijanja štetnika (IPM) koji treba uključivati, između ostalog, higijenske mjere te, gdje je to moguće, i fizikalne mjere suzbijanja.

- Razmotriti mogućnost primjene preventivnih mjera (zatvoriti rupe, uklonite hranu i piće što je dalje moguće) da bi se poboljšala konzumacija mamaca i smanjila vjerojatnost ponovne invazije.

- Proizvod postaviti na mjesta u neposrednoj blizini mjesta gdje su uočene aktivnosti glodavaca (npr. staze kretanja, mjesta skrivanja, hranjenja, rupe glodavaca, itd.).

- Ako je moguće, kutije s mamcem treba učvrstiti na tlo ili druge površine.

- Kutije s mamcem trebaju biti jasno označene da sadrže rodenticide te da se ne smiju premještati ili otvarati.

- Ako se proizvod koristi na javnim površinama, tretirana područja trebaju se označiti tijekom deratizacije te je pored mamaca potrebno postaviti obavijest o rizicima od primarnog i sekundarnog otrovanja antikoagulantnim rodenticidom, kao i navesti mjere koje je potrebno poduzeti u slučaju otrovanja, sve mora biti vidljivo na cijelom području na kojem se provodi deratizacija.

- Mamac treba učvrstiti kako se ne bi mogao odvući iz kutije s mamcem.

- Proizvod postaviti izvan dosega djece, ptica, ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne-ciljnih životinja.

- Proizvod postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta i površina koje su u kontaktu s navedenim.


- Tijekom rukovanja s pripravkom treba nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije.

- Pri uporabi proizvoda ne jesti, piti ni pušiti. Nakon uporabe proizvoda operite ruke i izravno izloženu kožu.

- O učestalosti pregleda tretiranog području odlučuje izvođač na temelju provedene procjene početkom primjene. Ta bi učestalost trebala biti usklađena s preporukama iz mjerodavnog kodeksa najboljeg iskustva.

- Ako je potrošnja mamaca relativno mala u odnosu na veličinu infestacije, treba razmotriti premještanje mamca na druge lokacije ili promijeniti formulaciju mamca.

- Ako se konzumiranje mamaca nastavi i nakon perioda od 35 dana i ne primjećuje se smanjenje aktivnosti glodavaca, potrebno je utvrditi vjerojatni uzrok tome. Kada se drugi razlozi isključe, postoji sumnja na otpornost glodavaca; tada treba razmotriti primjenu ne-antikoagulantnog rodenticida ili jačih antikoagulantnih rodenticida, ili zamke kao alternativne mjere za suzbijanje glodavaca.



5.2. Mjere za smanjenje rizika

Profesionalni korisnici:

- Ako je moguće, prije tretiranja obavijestiti sve moguće prolaznike (na primjer korisnike) o kampanji za suzbijanje glodavaca.
- Kako bi se smanjio rizik od sekundarnog otrovanja, redovito treba tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretiranja (barem dva puta tjedno).
- Proizvode ne koristiti dulje od 35 dana bez provođenja procjene infestacije i učinkovitosti tretiranja.
- Ne koristiti mamce koji sadrže antikoagulantne aktivne tvari kao trajne mamce za sprječavanje infestacije glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca.
- Informacije o proizvodu (tj. uputa za uporabu i/ili deklaracija) moraju jasno navoditi da proizvod nije namijenjen za opću uporabu (npr. "samo za profesionalne korisnike") i za postavljanje u odgovarajuće zaštitne kutije osigurane od neovlaštenog otvaranja (npr. "koristiti u zaštitnim kutijama za mamce osiguranim od neovlaštenog otvaranja").
- Uporaba ovog proizvoda trebala bi suzbiti glodavce u roku od 35 dana. Ako proizvod do kraja deratizacijskog postupka nije učinkovit (aktivnost glodavaca je i dalje primjetna), informacije o proizvodu (tj. uputa za uporabu i/ili deklaracija) trebaju jasno uputiti korisnika da potraži savjet od dobavljača proizvoda ili nazove službu za suzbijanje glodavaca (DDD).
- Kutije za mamce ne prati vodom između primjena.
- Uginule glodavce zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.

Osposobljeni profesionalni korisnici

- Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijestiti sve moguće prolaznike o provođenju deratizacijskih mjera.
- Informacije o proizvodu (tj. uputa za uporabu i/ili deklaracija) moraju jasno navoditi da je proizvod namijenjen samo za osposobljene profesionalne korisnike koji imaju certifikat o završenoj odgovarajućoj edukaciji (npr. "samo za osposobljene profesionalne korisnike").
- Ne upotrebljavati u područjima gdje se može očekivati pojava rezistencije na aktivnu tvar.
- Proizvode ne koristiti dulje od 35 dana bez provođenja procjene infestacije i učinkovitosti tretiranja.
- Za sprječavanje pojave otpornosti, ne izmjenjivati proizvod sa drugim antikoagulantnim rodenticidom slične ili slabije jačine. Za zamjenu proizvoda razmotriti primjenu ne-antikoagulantnog rodenticida ako je moguće ili jačeg antikoagulantnog rodenticida.
- Između primjena ne prati vodom deratizacijske kutije ili posuđe koje se upotrebljavalo na prekrivenim i zaštićenim mjestima s mamcima.
- Uginule glodavce zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Ovaj proizvod sadrži antikoagulantnu tvar. Ako se proguta, simptomi se mogu pojaviti s odgodom i mogu uključivati krvarenje iz nosa i desni. U teškim slučajevima, mogu se pojaviti modrice i krv u urinu i fecesu.
- Antidot: Vitamin K1 - primjenjuje samo medicinsko/veterinarsko osoblje.
- U slučaju:
 - Dodira s kožom - oprati kožu vodom, a zatim sapunom i vodom.
 - Dodira s očima - isprati oči tekućinom za ispiranje očiju ili vodom, držati kapke otvorenima, ispirati najmanje 10 minuta.
 - Gutanja - oprezno isprati usta vodom. Osobi koja je u nesvijesti nikada ništa ne davati na usta. Ne izazivati povraćanje. Ako se proguta, odmah potražiti savjet liječnika i pokazati spremnik proizvoda ili deklaraciju. Ako je životinja progutala proizvod, potražiti pomoć veterinaru.
- Zaštitne kutije moraju biti označene sa sljedećim informacijama: "ne pomicati; ne otvarati"; "sadrži rodenticid"; "MAXIMON 5 SVJEŽI MAMAC ili broj odobrenja"; "aktivna tvar: bromadiolon" i "u slučaju nesreće, nazvati Centar za kontrolu otrovanja na tel. 01/2348-342".
- Opasno za divlje životinje.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Na kraju provedene deratizacije treba neiskorištene mamce i ambalažu ukloniti u skladu sa Zakonom o otpadu i Uredbom za postupanje s opasnim otpadom.

Preporuča se nošenje rukavica.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Čuvati na suhom, hladnom i dobro ventiliranom mjestu. Spremnik čuvati zatvoren i dalje od izravnog sunčevog svjetla.
Čuvati izvan dohvata djece, ptica, kućnih ljubimaca i domaćih životinja.
Držati samo u originalnom spremniku.
Rok valjanosti: 24 mjeseca.

6. Ostale informacije

- Antikoagulantni rodenticidi imaju odgođeni početak djelovanja koji se može uočiti od 4 do 10 dana nakon konzumiranja mamca.
- Glodavci mogu prenositi bolesti. Uginule glodavce ne dirati golim rukama, koristiti rukavice ili hvataljke kod sakupljanja i zbrinjavanja lešina.
- Proizvod sadrži goru tvar i boju.