

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID****Nr. RO/2022/0325/MRS/ES/MR (NA) -2018-14-00494**

In conformitate cu prevederilor REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind punerea la dispozitie pe piata și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRĂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data **11.04.2022**, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. TIPUL AUTORIZATIEI

autorizația prin recunoașterea reciprocă succesivă eliberată în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

- Statul membru al Uniunii Europene emitent: **FR**
- Nr. Autorizației din statul membru emitent Nr.: **ES/MR (NA) -2018-14-00494**

II. Data emiterii autorizatiei: 03.05.2022**III. Data expirării autorizatiei: 14.01.2023****IV.****DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: RODEX CONTROL PASTA BAIT**

Alta denumire comerciala: Rodex Pasta, RODEX PASTA PLUS; MURIDOX BROMA-P25 PASTA;BROMRAT fresh pasta; RODEX PASTA BAIT;RODEX 25 PASTA BAIT

V.**NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI: PELGAR INTERNATIONAL LIMITED,****Adresa: 18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon, Franța****NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc:****PELGAR INTERNATIONAL LIMITED,**

Adresa : 18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon, Franța

NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID:**1.PELGAR INTERNATIONAL LIMITED**

Adresa: Unit 13, Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, Marea Britanie

Loc de fabricatie : Unit 13, Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, Marea Britanie

2. GMB Internacional SA,

Adresa : Calle Aurora Boreal, 6 Nave 35 (Pol. Ind. San Jose Valderas II – Comunidad Alameda)

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



28918. Leganes (Madrid) SPANIA

Loc de fabricatie : Avenida del Mas de l'Oli 144, 46940 Manises, (Valencia), 46940 Manises, (Valencia) Spania


NUMELE FABRICANTULUI SUBSTANTEI ACTIVE: PELGAR INTERNATIONAL LIMITED (*Bromodiolonă în concentrație de 0,0025 %*)

Adresa: Unit 13, Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, Marea Britanie

Loc de productie : **PelGar International Limited**, Prazska 54, 280 02, Kolin, Republica Ceha**VI.****TIPUL DE PRODUS** : TP 14-Rodenticide**VII.****CATEGORIILE DE UTILIZATORI**: Publicul larg, profesioniști, profesioniști instruiti.**VIII.****TIPUL PREPARATULUI**: Momeală gata de utilizare: pastă**IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ****1) Substanta activă**

Denumirea comună	Bromadiolone
Denumirea IUPAC	3-[3-[4-(4-Bromophenyl)phenyl]-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-2-hydroxychromen-4-one
Numar CAS	28772-56-7
Numar CE	249-205-9
Continut de substanță activă	0,0025%

2) Substanta inactivă/nonactivă – nu se specifica**X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI****Produs biocid cu substanțe active - substanțe chimice**

Simboluri si pictograme	 GHS08 ATENȚIE
Fraze de pericol (H)	H373 Poate provoca leziuni ale organelor (SÂNGE) prin expunerea prelungită sau repetată.
Fraze de prudenta (P)	P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103 Citiți eticheta înainte de utilizare. P262 Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P273 Evitați dispersarea în mediu. P280 Purtați mănuși de protecție.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic.
P314 Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.
P404 A se depozita într-un recipient închis.
P405 A se depozita sub cheie.
P501 Aruncați conținutul/ recipientul în conformitate cu reglementările naționale.

XI. AMBALAREA**Utilizare # 1 - Șoareci - Publicul larg - Interior**

Dimensiune ambalaj: până la 50 g.

Grame de momeală per stație de intoxicare și/sau reumplere: 10, 12, 15 sau 20 g pliculețe din hârtie, tăvi de 25 sau 30 g și 30 g de pastă învelită în plastic sub formă de batoane.

Material de ambalare: găleți, cutii, pungi și stații preumplute. Carton, HDPE, aluminiu, polietilenă.

Utilizare # 2 - Șobolani - Public larg - Interior

Dimensiune ambalaj: până la 150 g.

Număr de reumpleri de momeală per recipient: până la 150 g.

Grame de momeală per stație de intoxicare și/sau reumplere: 10, 12, 15 sau 20 g pliculețe din hârtie, tăvi de 25, 30, 50, 75, 100 sau 150 g și 30, 50, 75, 100 sau 150 g de pastă învelită în plastic sub formă de batoane.

Material de ambalare: găleți, cutii, pungi și stații preumplute. Carton, HDPE, aluminiu, polietilenă.

Utilizare # 3 - Șobolani - Publicul larg - în jurul clădirilor

Dimensiune ambalaj: până la 150 g.

Număr de reumpleri de momeală per recipient: până la 150 g.

Grame de momeală per stație de intoxicare și/sau reumplere: 10, 12, 15 sau 20 g pliculețe din hârtie, tăvi de 25, 30, 50, 75 sau 150 g și 30, 50, 75, 100 sau 150 g de pastă învelită în plastic sub formă de batoane.

Material de ambalare: găleți, cutii, pungi și stații preumplute. Carton, HDPE, aluminiu.

Utilizare # 4 - Șoareci și/sau Șobolani - Personal profesionist - interior

Dimensiunea minimă a recipientului - 3 Kg.

Număr de pungi individuale per pachet: până la 20 kg

Grame de momeală per stație de intoxicare și/sau reumplere: 10, 12, 15 sau 20 g pliculețe din hârtie, tăvi de 25, 30, 50, 75, 150 sau 200 g și 30, 50, 75, 100, 150 sau 200 g de pastă învelită în plastic sub formă de batoane. Tuburi de 100, 150, 200 sau 300 g pentru aplicare cu pistolul aplicator.

Material de ambalare: găleți, cutii, pungi și stații preumplute. Carton, HDPE, aluminiu, polietilenă.

Utilizare # 5 - Șobolani - Personal profesionist - în jurul cladirilor.

Dimensiunea minimă a recipientului - 3 Kg.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Număr de pungi individuale per pachet: până la 20 kg
Grame de momeală per stație de intoxicare și/sau reumplere: 10, 12, 15 sau 20 g pliculețe din hârtie, tăvi de 25, 30, 50, 75, 150 sau 200 g și 30, 50, 75, 100, 150 sau 200 g de pastă învelită în plastic sub formă de batoane. Tuburi de 100, 150, 200 sau 300 g pentru aplicare cu pistolul aplicator
Material de ambalare: găleți, cutii, pungi și stații preumplute. Carton, HDPE, aluminiu, polietilenă.

Utilizare # 6 - Șoareci și/sau șobolani - Personal calificat - interior

Dimensiunea minimă a recipientului - 3 Kg.

Număr de pungi individuale per pachet: până la 20 kg

Grame de momeală per stație de intoxicare și/sau reumplere: 10, 12, 15 sau 20 g pliculețe din hârtie, tăvi de 25, 30, 50, 75, 150 sau 200 g și 30, 50, 75, 100, 150 sau 200 g de pastă învelită în plastic sub formă de batoane. Tuburi de 100, 150, 200 sau 300 g pentru aplicare cu pistolul aplicator.

Material de ambalare: găleți, cutii, pungi și stații preumplute. Carton, HDPE, aluminiu, polietilenă.

Utilizare # 7 - Șoareci și/sau Șobolani - Personal calificat - în jurul cladirilor

Dimensiunea minimă a recipientului - 3 Kg.

Număr de pungi individuale per pachet: până la 20 kg

Grame de momeală per stație de intoxicare și/sau reumplere: 10, 12, 15 sau 20 g pliculețe din hârtie, tăvi de 25, 30, 50, 75, 150 sau 200 g și 30, 50, 75, 100, 150 sau 200 g de pastă învelită în plastic sub formă de batoane. Tuburi de 100, 150, 200 sau 300 g pentru aplicare cu pistolul aplicator.

Material de ambalare: găleți, cutii, pungi și stații preumplute. Carton, HDPE, aluminiu, polietilenă.

Utilizare # 8 - Șobolani - Personal calificat - zone deschise și gropi de gunoi

Dimensiunea minimă a recipientului - 3 Kg.

Număr de pungi individuale per pachet: până la 20 kg

Grame de momeală per stație de intoxicare și/sau reumplere: 10, 12, 15 sau 20 g pliculețe din hârtie, tăvi de 25, 30, 50, 75, 150 sau 200 g și 30, 50, 75, 100, 150 sau 200 g de pastă învelită în plastic sub formă de batoane. Tuburi de 100, 150, 200 sau 300 g pentru aplicare cu pistolul aplicator.

Material de ambalare: găleți, cutii, pungi și stații preumplute. Carton, HDPE, aluminiu, polietilenă.

XII. INSTRUCȚIUNILE SI DOZELE DE APLICARE :**Publicul larg**

A se citiți și urma informațiile despre produs, precum și orice alte informații care însoțesc produsul sau furnizate la punctul de vânzare înainte de utilizare.

Înainte de a utiliza produse rodenticide se recomandă folosirea unor metode nechimice (ex. capcane).

A se îndepărta alimentele disponibile rozătoarelor (de exemplu cereale vrac sau deșeuri alimentare). În afară de aceasta, nu se curăță zona de tratat chiar înainte de tratament, acest lucru nu va face decât să enerveze rozătoarele și va fi mai greu de realizat acceptarea momelii.

Cutiile de momeală trebuie amplasate în apropierea locurilor în care a fost observată activitatea rozătoarelor (zone de plimbare, locuri de cuibărit, hrănituri, găuri, vizuini...)

Ori de câte ori este posibil, cutia de momeală trebuie fixată pe pământ sau pe alte structuri.

Nu se deschide punga care conține momeala.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

A nu se lăsa cutiile de momeală la îndemâna copiilor, păsărilor, animalelor de companie, animalelor de fermă și altor animale cărora produsul nu este destinat.

Nu trebuie aplicat în zonele în care alimentele/furajele, băuturile, ustensilele de gătit sau suprafețele de prelucrare a alimentelor pot intra în contact cu produsul sau pot fi contaminate de acesta.

Nu se așează cutii de momeală lângă sistemele de drenaj a apei unde momeala poate intra în contact cu apa.

În timpul utilizării produsului, nu se ca mănca, bea sau fuma. Se vor spăla mâinile și zonele expuse ale pielii după utilizarea produsului.

Se va scoate momeala rămasă și suportul pentru momeală la sfârșitul tratamentului

Profesional

Se vor citi și urma informațiile despre produs, precum și orice alte informații care însoțesc produsul sau furnizate la punctul de vânzare înainte de utilizare.

Se va efectua un studiu de pretratare a zonei infestată și o evaluare la fața locului pentru a identifica speciile de rozătoare, zonele lor de activitate și pentru a determina cauza și amploarea infestării.

A se îndepărta alimentele disponibile rozătoarelor (de exemplu cereale vrac sau deșeuri alimentare). În afară de aceasta, nu se curăță zona de tratat chiar înainte de tratament, acest lucru nu va face decât să enerveze rozătoarele și va fi mai greu de realizat acceptarea momelii.

Produsul trebuie utilizat ca parte a unui plan cuprinzător de combatere a dăunătorilor, incluzând, dar fără a se limita la, măsuri de igienă și, acolo unde este posibil, metode fizice de control.

Se vor aplica măsuri preventive de control (de exemplu, astuparea găurilor, îndepărtarea alimentelor și băuturilor pe cât posibil) pentru a îmbunătăți aportul de momeală și pentru a reduce probabilitatea de reinvasie.

Cutiile de momeală trebuie amplasate în vecinătatea locurilor în care a fost observată activitatea rozătoarelor (zone de plimbare, locuri de cuibărit, hrănitivi, găuri, vizuini...).

Ori de câte ori este posibil, cutia de momeală trebuie fixată pe pământ sau pe alte structuri

Cutiile de momeală trebuie să fie etichetate clar, indicând că conțin un produs rodenticid și că nu trebuie mutate sau deschise (vezi secțiunea 5.3. pentru a vedea informațiile care trebuie incluse pe etichetă).

Atunci când produsul este utilizat în spații publice, zonele tratate trebuie marcate în perioada de tratament și un semn explicativ trebuie să informeze despre riscul de intoxicație primară și secundară cu anticoagulante precum și măsurile de prim ajutor.

Momelile trebuie asigurate pentru a preveni tragerea lor din cutia de momeli.

A nu se lăsa cutiile de momeală la îndemâna copiilor, păsărilor, animalelor de companie, animalelor de fermă și altor animale cărora produsul nu este destinat.

Nu trebuie aplicat în zonele în care alimentele/furajele, băuturile, ustensilele de gătit sau suprafețele de prelucrare a alimentelor pot intra în contact cu produsul sau pot fi contaminate de acesta.

Se vor purta mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice în timpul fazei de manipulare (materialul pentru mănuși trebuie furnizat de deținătorul autorizației în informațiile despre produs).

În timpul utilizării produsului, nu va mănca, bea sau fuma. Se vor spăla mâinile și zonele expuse ale pielii după utilizarea produsului.

Dacă cantitatea de momeală ingerată este mică în raport cu dimensiunea aparentă a infestării, trebuie luate în considerare stații de momeală suplimentare și posibilitatea de a trece la o altă formulare de momeală.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID E

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Daca dupa o perioada de tratament de 35 de zile se observa ca momelile continua sa fie consumate si activitatea rozatoarelor nu scade, trebuie determinata cauza. Atunci când au fost excluse alte elemente, utilizarea unui rodenticid non-anticoagulant sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic poate fi necesară pentru rozătoarele rezistente. Utilizarea capcanelor ar trebui, de asemenea, considerată o măsură alternativă de control.

Se va scoate momeala rămasă și suportul pentru momeală la sfârșitul tratamentului

Instrucțiuni specifice în funcție de tipul de momeală:

- Momeală în saci: A nu se deschide punga care conține momeala

Personal profesionist instruit

Se vor citi și urma informațiile despre produs, precum și orice alte informații care însoțesc produsul sau furnizate la punctul de vânzare înainte de utilizare.

Se va efectua un studiu de pretratare a zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica speciile de rozătoare, zonele lor de activitate și pentru a determina cauza și amploarea infestării.

Se vor îndepărta alimentele disponibile rozătoarelor (de exemplu cereale vrac sau deșeuri alimentare). În afară de aceasta, nu se curăță zona de tratat chiar înainte de tratament, acest lucru nu va face decât să enerveze rozătoarele și va fi mai greu de realizat acceptarea momelii.

Produsul trebuie utilizat ca parte a unui plan cuprinzător de combatere a dăunătorilor, incluzând, dar fără a se limita la, măsuri de igienă și, acolo unde este posibil, metode fizice de control.

Produsul trebuie amplasat în vecinătatea locurilor în care a fost observată activitatea rozătoarelor (zone de plimbare, locuri de cuibărit, hrănituri, găuri, vizuini...).

Ori de câte ori este posibil, cutia de momeală trebuie fixată pe pământ sau pe alte structuri

Cutiile de momeală trebuie să fie etichetate clar, indicând că acestea conțin rodenticide și că nu trebuie mutate sau deschise (vezi secțiunea 5.3. pentru a vedea informațiile care trebuie incluse pe etichetă).

Atunci când produsul este utilizat în spații publice, zonele tratate trebuie marcate în perioada de tratament și un semn explicativ trebuie să informeze despre riscul de intoxicație primară și secundară cu anticoagulante precum și măsurile de prim ajutor.

Momelile trebuie asigurate pentru a preveni tragerea lor din cutia de momeli.

A nu se lăsa stațiile de momeală la îndemâna copiilor, păsărilor, animalelor de companie, animalelor de fermă și altor animale care nu sunt vizate

Nu trebuie aplicat în zonele în care alimentele/furajele, băuturile, ustensilele de gătit sau suprafețele de prelucrare a alimentelor pot intra în contact cu produsul sau pot fi contaminate de acesta.

Se vor purta mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice în timpul fazei de manipulare (materialul pentru mănuși trebuie furnizat de deținătorul autorizației în informațiile despre produs).

În timpul utilizării produsului, nu se va mânca, bea sau fuma. Se vor spăla mâinile și zonele expuse ale pielii după utilizarea produsului.

Frecvența vizitelor în zonele tratate trebuie să fie la latitudinea aplicatorului, în virtutea sondajelor efectuate la începutul tratamentului. Această frecvență trebuie să fie în concordanță cu recomandările furnizate de Manualul de bune practici.

Dacă cantitatea de momeală ingerată este mică în raport cu dimensiunea aparentă a infestării, trebuie luate în considerare stații de momeală suplimentare și posibilitatea de a trece la o altă formulare de momeală.

Daca dupa o perioada de tratament de 35 de zile se observa ca momelile continua sa fie consumate si

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

activitatea rozatoarelor nu scade, trebuie determinata cauza. Atunci când au fost excluse alte elemente, utilizarea unui rodenticid non-anticoagulant sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic poate fi necesară pentru rozătoarele rezistente. Utilizarea capcanelor ar trebui, de asemenea, considerată o măsură alternativă de control.

Instrucțiuni specifice în funcție de tipul de momeală:

- Momeală în saci: Pentru pungii care nu se reîncarcă – A nu se deschide punga care conține momeala

Utilizare # 1 - Șoareci - Publicul larg – Interior

Numărul și frecvența aplicării: Până la 40 g de momeală per punct de momeală. Puncte de alimentare separate de la 2 la 5 m.

Utilizare # 2 - Șobolani - Public larg – Interior

Numărul și frecvența aplicării: Până la 200 g de momeală per punct de momeală. Puncte de alimentare separate de la 5 la 10 m.

Utilizare # 3 - Șobolani - Publicul larg - în jurul clădirilor

Numărul și frecvența aplicării: Până la 200 g de momeală per punct de momeală. Puncte de momeală distanțate între 5 și 10 m

Utilizare # 4 - Șoareci și/sau Șobolani - Personal profesionist - interior

Numărul și frecvența aplicării:

- Șoareci: până la 40 g de momeală per punct de momeală. Puncte de momeală separate la fiecare 2 sau 5 m.
- Șobolani: până la 200 g de momeală per punct de momeală. Puncte de momeală separate la fiecare 5 sau 10 m.

Utilizare # 5 - Șobolani - Personal profesionist - în jurul cladirilor.

Numărul și frecvența aplicării: Șobolani: până la 200 g de momeală per punct de momeală. Puncte de momeală separate la fiecare 5 sau 10 m.

Utilizare # 6 - Șoareci și/sau șobolani - Personal calificat - interior

Numărul și frecvența aplicării:

- Șoareci:
 - Infestare mare: până la 40 g de momeală per punct de momeală. Puncte de amorsare la fiecare 2 m.
 - Infestare redusă: până la 40 g de momeală per punct de momeală. Puncte de momeală separate la fiecare 5 m.
- Sobolani:
 - Infestare mare: până la 200 g de momeală per punct de momeală. Puncte de alimentare la fiecare 5 m.
 - Infestare redusă: până la 200 g de momeală per punct de momeală. Puncte de alimentare la fiecare 10 m.

Utilizare # 7 - Șoareci și/sau Șobolani - Personal calificat - în jurul cladirilor

Numărul și frecvența aplicării:



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

- Șoareci:

- Infestare mare: până la 40 g de momeală per punct de momeală. Puncte de amorsare la fiecare 2 m.
- Infestare redusă: până la 40 g de momeală per punct de momeală. Puncte de momeală separate la fiecare 5 m.

- Sobolani:

- Infestare mare: până la 200 g de momeală per punct de momeală. Puncte de alimentare la fiecare 5 m.
- Infestare redusă: până la 200 g de momeală per punct de momeală. Puncte de alimentare la fiecare 10 m.

Vizuini: 20-200g per vizuina

Utilizare # 8 - Șobolani - Personal calificat - zone deschise și gropi de gunoi

- Numărul și frecvența aplicării:

- Infestare mare: până la 200 g de momeală per punct de momeală. Puncte de alimentare la fiecare 5 m.
- Infestare redusă: până la 200 g de momeală per punct de momeală. Puncte de alimentare la fiecare 10 m.

Vizuini: 20-200g per vizuina

XIII. CONDITIILE DE DEPOZITARE A se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat.

Se va păstra recipientul închis și ferit de lumină.

A nu se lăsa la îndemâna păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă.

Nu trebuie aplicat în zonele în care alimentele/furajele, băuturile, ustensilele de bucătărie sau suprafețele de prelucrare a alimentelor pot intra în contact sau pot fi contaminate cu produs.

DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCID ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE : 24 luni

ALTE INFORMATII:

Datorită modului de acțiune întârziat, rodenticidele anticoagulante pot dura 4-10 zile pentru a deveni eficiente după consumul de momeală.

Rozatoarele sunt transmitoare de boli. Nu se vor atinge rozătoarele moarte cu mâinile goale, se vor folosi mănuși sau ustensile, cum ar fi penseta, pentru eliminare.

Acest produs conține un agent amarant și un colorant.

Prezenta autorizatie este însoțită de următoarele documente :

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fisa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

I. Este obligatorie transmiterea de către detinătorul autorizatiei a fisei cu date de securitate către Institutul National de Sănătate Publică – Biroul RSI și Informare Toxicologică

II. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

PRESEDINTE,

Dr. Chim. Gabriela Cîlînea

