

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: Vertox 25 Whole Wheat Bait (purple)

Τύπος(οι) προϊόντος: PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

Αριθμός άδειας: ΤΠ14-0185

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0025469-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	3
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	3
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	16
5.1. Οδηγίες χρήσης	16
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	18
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	20
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	20
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	20
6. Άλλες πληροφορίες	20

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Vertox S
Ratorex Wheat N
Thunder Purple Wheat
TOM CAT BRODI AB
BRODY 2.5 GRAIN

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	PelGar International Limited
	Διεύθυνση	18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon Γαλλία
Αριθμός άδειας	ΤΠ14-0185	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	GR-0025469-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	01/02/2021	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	01/07/2024	

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	PelGar International Limited
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Ηνωμένο Βασίλειο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Ηνωμένο Βασίλειο
	Promedivet SRL 545500 SOVATA , str. Lunga nr. 46/G jud. Mures, Ρουμανία
	DELTA GAMMA AGRO SA, AGIAS SOFIAS, MILIADITSA AREA 19300 ASPROPYRGOS Ελλάδα
	TAFARM LTD, VIOPA Kerateas, East Section 190 01 Attiki Ελλάδα
	SEFE SA, INDUSTRIAL AREA OF INOFYTA, Place Madaro 32011 INOFYTA Ελλάδα
	Alfa Agricultural Supplies S.A. Potamia Place, 32011 Inofita Viotias Ελλάδα

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας	11 - Brodifacoum (βρωδιφακούμη)
Όνομα του παρασκευαστή	PelGar International Limited
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Ηνωμένο Βασίλειο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Prazska 54 280 02 Kolin Δημοκρατία της Τσεχίας

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum (βρωδιφακούμη)	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Δραστική Ουσία	56073-10-0	259-980-5	0,0025

2.2. Είδος τυποποίησης

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε σπόρους σιτηρών (ΑΒ)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση .

Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολόνη-3(2H).. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις προφύλαξης

Μην αναπνέετε σκόνη.

Συμβουλευθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Ποντικοί - Ευρύ κοινο- Εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Mus musculus
Κοινή ονομασία: Οικιακός ποντικός
στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά ζώα, ενήλικες

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή

Λεπτομερής περιγραφή:

Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς

σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: Υψηλή προσβολή: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό, κάθε 2 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό, κάθε 5μέτρα.
Αραιώση (%):
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:
Υψηλή προσβολή: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό, κάθε 2 μέτρα.
Χαμηλή προσβολή: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό, κάθε 5μέτρα.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 50 γρ.

15, 20, 25, 30, ή 50 γρ. σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE μέσα σε PE/PP συσκευασίες (σκαφάκια, κάδους ή σακούλες).

Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια από χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE

Εξωτερική συσκευασία: PE/PP συσκευασίες (σκαφάκια ή κάδους ή σακούλες) 15γρ., 20γρ., 25γρ., 30γρ., 40γρ., 50γρ.

15, 20, 25, 30, ή 50 γρ. σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE, μέσα σε χάρτινο κουτί.

Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE

Εξωτερική συσκευασία: Χάρτινο κουτί 15γρ., 20γρ., 25γρ., 30γρ., 40γρ., 50γρ.

15, 20, 25, 30, ή 50 γρ.. σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE μέσα σε fibreboard κουτί με χαρτόνι εξωτερικά.

Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE

Εξωτερική συσκευασία: Fibreboard κουτί/χαρτόνι 15γρ., 20γρ., 25γρ., 30γρ., 40γρ., 50γρ..

Χύδην δόλωμα έως 20 γρ., μέσα σε δολωματικούς δίσκους με θερμοκολλημένο κάλυμμα, που συσκευάζονται σε πολλαπλάσια μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά.

Εσωτερική συσκευασία: Δολωματικοί δίσκοι με θερμοκολλημένο κάλυμμα.

Εξωτερική συσκευασία: Χαρτόνι εξωτερικά 10γρ., 15γρ., 20γρ.. (συσκευάζονται σε πολλαπλάσια του 1/2/4)

Χύδην δόλωμα έως 20g, μέσα σε δολωματικούς δίσκους με θερμοκολλημένο κάλυμμα, συσκευασμένοι σε δολωματικό σταθμό ασφαλείας, μίας ή πολλαπλής χρήσης, από HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά.

Εσωτερική συσκευασία: Δολωματικοί δίσκοι με θερμοκολλημένο κάλυμμα.

Εξωτερική συσκευασία: HDPE ή PP δολωματικός σταθμός ασφαλείας μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. 10γρ., 15γρ., 20γρ. (συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4)

Για όλες τις παραπάνω συσκευασίες:

Η μέγιστη συσκευασία δολωμάτων που προορίζονται για αποκλειστική χρήση κατά των ποντικών είναι 50 γρ.

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Μετακινείτε τους δολωματικούς σταθμούς κάθε 2-3 ημέρες, κατά τον έλεγχο της κατάστασης τους. Ο έλεγχος της κατάστασης τους θα πρέπει να λαμβάνει χώρα κατά τις πρώτες 10 -14 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου τυχόν απώλειες δολώματος ή δόλωμα που έχει βραχεί ή μολυνθεί με σκόνη θα πρέπει να αναπληρώνεται. Εάν διαπιστώσετε ότι έχει

φαγωθεί όλο το δόλωμα αυξήστε τον αριθμό των θέσεων δόλωσης, χωρίς να αυξάνετε την ποσότητα δολώματος ανά θέση δόλωσης.
Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τις πρώτες 2 -3 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής και ακολούθως ανά εβδομαδιαία χρονικά διαστήματα προκειμένου να ελεγχθεί η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και η απομάκρυνση των νεκρών τρωκτικών.
Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών αναμένεται να εξαλειφθεί εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν(ετικέτα ή και φυλλάδιο οδηγιών χρήσης) θα πρέπει να αναφέρουν εμφανώς ότι σε περίπτωση ελαττωμένης αποτελεσματικότητας στο τέλος της εφαρμογής (π.χ. παρατηρείται ακόμα δραστηριότητα των τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με αδειοδοτημένο συνεργείο απεντόμωσης μυοκτονίας.
Μην το χρησιμοποιείτε για στρατηγικές μόνιμης ή τακτικής δόλωσης.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Αρουραίοι - Ευρύ κοινο- Εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus
Κοινή ονομασία: Καφέ αρουραίος
στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά ζώα, ενήλικες

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή
Λεπτομερής περιγραφή:
Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: Υψηλή προσβολή: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό κάθε 5 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό κάθε 10 μέτρα.
Αραίωση (%):
Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:
Υψηλή προσβολή: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό κάθε 5 μέτρα.
Χαμηλή προσβολή: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό κάθε 10 μέτρα.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 150 γρ

15, 20, 25, 30, 50 ή 60 γρ. σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE μέσα σε PE/PP συσκευασίες (σκαφάκια, κάδους ή σακούλες).

Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια από χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE

Εξωτερική συσκευασία: PE/PP συσκευασίες (σκαφάκια ή κάδους ή σακούλες) 15γρ., 20γρ., 25γρ., 30γρ., 40γρ., 50γρ., 60γρ., 75γρ., 100γρ., 120γρ., 150γρ.

15, 20, 25, 30, 50 ή 60 γρ. σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE, μέσα σε χάρτινο κουτί.

Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE

Εξωτερική συσκευασία: Χάρτινο κουτί 15γρ., 20γρ., 25γρ., 30γρ., 40γρ., 50γρ., 60γρ., 75γρ., 100γρ., 120γρ., 150γρ.

15, 20, 25, 30, 50 ή 60 γρ. σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE μέσα σε fibreboard κουτί με χαρτόνι εξωτερικά.

Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE

Εξωτερική συσκευασία: Fibreboard κουτί/χαρτόνι 15γρ., 20γρ., 25γρ., 30γρ., 40γρ., 50γρ., 60γρ., 75γρ., 100γρ., 120γρ., 150γρ.

Χύδην δόλωμα έως 60 γρ., μέσα σε δολωματικούς δίσκους με θερμοκολλημένο κάλυμμα, που συσκευάζονται σε πολλαπλάσια μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά.

Εσωτερική συσκευασία: Δολωματικοί δίσκοι με θερμοκολλημένο κάλυμμα.

Εξωτερική συσκευασία: Χαρτόνι εξωτερικά 10γρ., 15γρ., 20γρ., 25γρ., 50γρ., 60γρ. (συσκευάζονται σε πολλαπλάσια του 2/4/8/12/15)

Χύδην δόλωμα έως 60g, μέσα σε δολωματικούς δίσκους με θερμοκολλημένο κάλυμμα, συσκευασμένοι σε δολωματικό σταθμό ασφαλείας, μίας ή πολλαπλής χρήσης, από HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά.

Εσωτερική συσκευασία: Δολωματικοί δίσκοι με θερμοκολλημένο κάλυμμα.

Εξωτερική συσκευασία: HDPE ή PP δολωματικός σταθμός ασφαλείας μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. 10γρ., 15γρ., 20γρ., 25γρ., 50γρ., 60γρ. (συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4)

Για όλες τις παραπάνω συσκευασίες:

Η μέγιστη συσκευασία δολωμάτων που προορίζονται για αποκλειστική χρήση κατά των ποντικών είναι 50 γρ.

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ελέγχετε τους δολωματικούς σταθμούς ανα τακτά χρονικά διαστήματα και αναπληρώστε δόλωμα που έχει καταναλωθεί ή δόλωμα που έχει βραχεί ή μολυνθεί με σκόνη. Μην μετακινείτε τους δολωματικούς σταθμούς για αρκετές ημέρες από την τοποθέτησή τους. Σε περίπτωση που δεν γίνει αντιληπτή δραστηριότητα τρωκτικών εντός 7 έως 10 ημερών από την τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών σε κάποιο σημείο, τοποθετείστε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλο σημείο και αναπληρώστε τυχόν δόλωμα που έχει καταναλωθεί ή έχει υποστεί ζημιά από νερό ή σκόνη. Εάν διαπιστώσετε ότι έχει φαγωθεί όλο το δόλωμα αυξήστε τον αριθμό των θέσεων δόλωσης, χωρίς να αυξάνετε την ποσότητα δολώματος ανά θέση δόλωσης.

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τις πρώτες 5 -7 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής και ακολούθως ανά εβδομαδιαία χρονικά διαστήματα προκειμένου να ελεγχθεί η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και η απομάκρυνση των νεκρών τρωκτικών.

Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών αναμένεται να εξαλειφθεί εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν(ετικέτα ή και φυλλάδιο οδηγιών χρήσης) θα πρέπει να αναφέρουν εμφανώς ότι σε περίπτωση ελαττωμένης αποτελεσματικότητας στο τέλος της εφαρμογής (π.χ. παρατηρείται ακόμα δραστηριότητα των τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με αδειοδοτημένο συνεργείο απεντόμωσης μυοκτονίας.

Μην το χρησιμοποιείτε για στρατηγικές μόνιμης ή τακτικής δόλωσης.

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.3 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 3 - Αρουραίοι - Ευρύ κοινο- Περιμετρικά κτιρίων

Τύπος προϊόντος

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus
Κοινή ονομασία: Καφέ αρουραίος

στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά ζώα, ενήλικες

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή
Λεπτομερής περιγραφή:
Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: Υψηλή προσβολή: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό κάθε 5 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό κάθε 10 μέτρα.

Αραίωση (%):

Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:

Υψηλή προσβολή: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό κάθε 5 μέτρα.

Χαμηλή προσβολή: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό κάθε 10 μέτρα.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 150 γρ

15, 20, 25, 30, 50 ή 60 γρ. σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE μέσα σε PE/PP συσκευασίες (σκαφάκια, κάδους ή σακούλες).

Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια από χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE

Εξωτερική συσκευασία: PE/PP συσκευασίες (σκαφάκια ή κάδους ή σακούλες) 15γρ., 20γρ., 25γρ., 30γρ., 40γρ., 50γρ. 60γρ., 75γρ., 100γρ., 120γρ., 150γρ.

15, 20, 25, 30, 50 ή 60 γρ. σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE, μέσα σε χάρτινο κουτί.

Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE

Εξωτερική συσκευασία: Χάρτινο κουτί 15γρ., 20γρ., 25γρ., 30γρ., 40γρ., 50γρ., 60γρ., 75γρ., 100γρ., 120γρ., 150γρ.

15, 20, 25, 30, 50 ή 60 γρ. σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE μέσα σε fibreboard κουτί με χαρτόνι εξωτερικά.

Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE

Εξωτερική συσκευασία: Fibreboard κουτί/χαρτόνι 15γρ., 20γρ., 25γρ., 30γρ., 40γρ., 50γρ., 60γρ., 75γρ., 100γρ., 120γρ., 150γρ.

Χύδην δόλωμα έως 60 γρ., μέσα σε δολωματικούς δίσκους με θερμοκολλημένο κάλυμμα, που συσκευάζονται σε πολλαπλάσια μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά.

Εσωτερική συσκευασία: Δολωματικοί δίσκοι με θερμοκολλημένο κάλυμμα.

Εξωτερική συσκευασία: Χαρτόνι εξωτερικά 10γρ., 15γρ., 20γρ., 25γρ., 50γρ., 60γρ. (συσκευάζονται σε πολλαπλάσια του 2/4/8/12/15)

Χύδην δόλωμα έως 60g, μέσα σε δολωματικούς δίσκους με θερμοκολλημένο κάλυμμα, συσκευασμένοι σε δολωματικό σταθμό ασφαλείας, μίας ή πολλαπλής χρήσης, από HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά.

Εσωτερική συσκευασία: Δολωματικοί δίσκοι με θερμοκολλημένο κάλυμμα.

Εξωτερική συσκευασία: HDPE ή PP δολωματικός σταθμός ασφαλείας μέσα σε χαρτόνι

εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. 10γρ., 15γρ., 20γρ., 25γρ., 50γρ., 60γρ. (συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4)

4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ελέγχετε τους δολωματικούς σταθμούς ανα τακτά χρονικά διαστήματα και αναπληρώστε δόλωμα που έχει καταναλωθεί ή δόλωμα που έχει βραχεί ή μολυνθεί με σκόνη. Μην μετακινείτε τους δολωματικούς σταθμούς για αρκετές ημέρες από την τοποθέτησή τους. Σε περίπτωση που δεν γίνει αντιληπτή δραστηριότητα τρωκτικών εντός 7 έως 10 ημερών από την τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών σε κάποιο σημείο, τοποθετείστε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλο σημείο και αναπληρώστε τυχόν δόλωμα που έχει καταναλωθεί ή έχει υποστεί ζημιά από νερό ή σκόνη. Εάν διαπιστώσετε ότι έχει φαγωθεί όλο το δόλωμα αυξήστε τον αριθμό των θέσεων δόλωσης, χωρίς να αυξάνετε την ποσότητα δολώματος ανά θέση δόλωσης. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τις πρώτες 5 -7 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής και ακολούθως ανά εβδομαδιαία χρονικά διαστήματα προκειμένου να ελεγχθεί η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και η απομάκρυνση των νεκρών τρωκτικών. Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών αναμένεται να εξαλειφθεί εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν(ετικέτα ή και φυλλάδιο οδηγιών χρήσης) θα πρέπει να αναφέρουν εμφανώς ότι σε περίπτωση ελαττωμένης αποτελεσματικότητας στο τέλος της εφαρμογής (π.χ. παρατηρείται ακόμα δραστηριότητα των τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με αδειοδοτημένο συνεργείο απεντόμωσης μυοκτονίας. Μην το χρησιμοποιείτε για στρατηγικές μόνιμης ή τακτικής δόλωσης. +

4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.4 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 4 - Ποντικοί και/ή αρουραίοι- Επαγγελματίες – εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14 - Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Mus musculus Κοινή ονομασία: Οικιακός ποντικός στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά ζώα, ενήλικες επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: Καφέ αρουραίος στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά ζώα, ενήλικες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καλυμμένα σημεία δόλωσης ή σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Ποντικοί: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Αρουραίοι: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Αραίωση (%): Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Ποντικοί: Υψηλή προσβολή: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης κάθε 2 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης, κάθε 5μέτρα.. Αρουραίοι: Υψηλή προσβολή: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης κάθε 5 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά ανά σημείο δόλωσης κάθε 10 μέτρα.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 κιλά. Έως 25 κιλά σάκος πολλαπλών στρώσεων χαρτιού με επένδυση PE ή με PE εσωτερικά σάκο ή σάκος υφασμένος PP με PE εσωτερικά ή σάκος υφασμένος PP χωρίς επένδυση. Εσωτερική συσκευασία: M/E. Εξωτερική συσκευασία: Χαρτί, PP, PE σάκος, PP σάκος 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 4.5 κιλά, 5 κιλά, 10 κιλά, 20 κιλά. 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 ή 200 γρ. σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE, μέσα σε PE/PP συσκευασίες (σκαφάκια, κάδους ή σακούλες). Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια από χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE. Εξωτερική συσκευασία: PE/PP συσκευασίες (σκαφάκια ή κάδους ή σακούλες) 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 6 κιλά, 7 κιλά, 8 κιλά, 9 κιλά, 10 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά, 13 κιλά, 14 κιλά, 15 κιλά, 16 κιλά, 17 κιλά, 18 κιλά, 19 κιλά, 20 κιλά. 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 ή 200 γρ. σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE, μέσα χάρτινο κουτί. Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE. Εξωτερική συσκευασία: Χάρτινο κουτί 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 6 κιλά, 7 κιλά, 8 κιλά, 9 κιλά, 10 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά, 13 κιλά, 14 κιλά, 15 κιλά, 16 κιλά, 17 κιλά,

18 κιλά, 19 κιλά, 20 κιλά.

15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 ή 200 γρ σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE μέσα σε fibreboard κουτί/χαρτόνι εξωτερικά.

Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE.

Εξωτερική συσκευασία: Fibreboard κουτί/χαρτόνι 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 6 κιλά, 7 κιλά, 8 κιλά, 9 κιλά, 10 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά, 13 κιλά, 14 κιλά, 15 κιλά, 16 κιλά, 17 κιλά, 18 κιλά, 19 κιλά, 20 κιλά.

Χύδην δόλωμα μέσα σε συσκευασίες PE/PP (σκαφάκια, κάδους ή σακούλες).

Εσωτερική συσκευασία: M/E.

Εξωτερική συσκευασία: Συσκευασίες PE/PP (σκαφάκια, κάδους ή σακούλες) 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 6 κιλά, 7 κιλά, 8 κιλά, 9 κιλά, 10 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά, 13 κιλά, 14 κιλά, 15 κιλά, 16 κιλά, 17 κιλά, 18 κιλά, 19 κιλά, 20 κιλά.

Χύδην δόλωμα σε χάρτινο κουτί με PE επένδυση.

Εσωτερική συσκευασία: M/E.

Εξωτερική συσκευασία: Χάρτινο κουτί με PE επένδυση 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 6 κιλά, 7 κιλά, 8 κιλά, 9 κιλά, 10 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά, 13 κιλά, 14 κιλά, 15 κιλά, 16 κιλά, 17 κιλά, 18 κιλά, 19 κιλά, 20 κιλά.

Η συσκευασία περιορίζεται σε χωριστές συσκευασμένες σακούλες που έχουν μέγιστο μέγεθος 10 κιλά.

Χύδην δόλωμα έως 20 γρ. (αρουραίοι και ποντικοί) και έως 60 γρ. (μόνο αρουραίοι) μέσα σε δολωματικούς δίσκους με θερμοκολλημένο κάλυμμα, που συσκευάζονται σε πολλαπλάσια μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά.

Εσωτερική συσκευασία: Δολωματικοί δίσκοι με θερμοκολλημένο κάλυμμα. Εξωτερική συσκευασία: Χαρτόνι εξωτερικά.

Πολλαπλάσια

10γρ. -250
15γρ. - 250
20γρ. - 125, 144
25γρ. - 120, 144
30γρ. - 96, 120, 144
40γρ. - 72, 96, 120, 144
50γρ. - 60, 72, 96, 120, 144
60γρ. - 48, 60, 72, 96, 120

Χύδην δόλωμα έως 20 γρ. (αρουραίοι και ποντικοί) και έως 60 γρ. (μόνο αρουραίοι), μέσα σε δολωματικούς δίσκους με θερμοκολλημένο κάλυμμα, συσκευασμένοι σε δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης, από HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά.

Εσωτερική συσκευασία: Δολωματικοί δίσκοι με θερμοκολλημένο κάλυμμα. Εξωτερική συσκευασία: HDPE ή PP δολωματικός σταθμός μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά.

Πολλαπλάσια

10γρ. -250
15γρ. - 250
20γρ. - 125, 144
25γρ. - 120, 144
30γρ. - 96, 120, 144
40γρ. - 72, 96, 120, 144
50γρ. - 60, 72, 96, 120, 144
60γρ. - 48, 60, 72, 96, 120
80γρ. - 32, 48, 60, 72, 96
90γρ. - 32, 48, 60, 72, 96
100γρ. - 32, 48, 60, 72, 96
120γρ. - 24, 32, 48, 60, 72
200γρ. - 16, 24, 32, 48, 60
240γρ. - 16, 24, 32, 48, 60

4.4.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ποντικοί:

Μετακινείτε τους δολωματικούς σταθμούς κάθε 2-3 ημέρες, κατά τον έλεγχο της κατάστασης τους. Ο έλεγχος της κατάστασης τους θα πρέπει να λαμβάνει χώρα κατά τις πρώτες 10 -14 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου τυχόν απώλειες δολώματος ή δόλωμα που έχει βραχεί ή μολυνθεί με σκόνη θα πρέπει να αναπληρώνεται. Εάν διαπιστώσετε ότι έχει φαγωθεί όλο το δόλωμα αυξήστε τον αριθμό των θέσεων δόλωσης, χωρίς να αυξάνετε την ποσότητα δολώματος ανά θέση δόλωσης.

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τις πρώτες 2 -3 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής και ακολούθως ανά εβδομαδιαία χρονικά διαστήματα προκειμένου να ελεγχθεί η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και η απομάκρυνση των νεκρών τρωκτικών.

Αρουραίοι

Ελέγχετε τους δολωματικούς σταθμούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα και αναπληρώστε δόλωμα που έχει καταναλωθεί ή δόλωμα που έχει βραχεί ή μολυνθεί με σκόνη. Μην μετακινείτε τους δολωματικούς σταθμούς για αρκετές ημέρες από την τοποθέτησή τους. Σε περίπτωση που δεν γίνει αντιληπτή δραστηριότητα τρωκτικών εντός 7 έως 10 ημερών από την τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών σε κάποιο σημείο, τοποθετείστε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλο σημείο και αναπληρώστε τυχόν δόλωμα που έχει καταναλωθεί ή έχει υποστεί ζημιά από νερό ή σκόνη. Εάν διαπιστώσετε ότι έχει φαγωθεί όλο το δόλωμα αυξήστε τον αριθμό των θέσεων δόλωσης, χωρίς να αυξάνετε την ποσότητα δολώματος ανά θέση δόλωσης.

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τις πρώτες 5 -7 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής και ακολούθως ανά εβδομαδιαία χρονικά διαστήματα προκειμένου να ελεγχθεί η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και η απομάκρυνση των νεκρών τρωκτικών.

Πριν την εφαρμογή διεξάγετε μια επιτόπια έρευνα προκειμένου να διαπιστώσετε τα είδη των τρωκτικών, τα σημεία που δραστηριοποιούνται και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και μέγεθος της προσβολής.

Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης του πληθυσμού των τρωκτικών, που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων και άλλα μέτρα όπως μέτρα υγιεινής, και όπου είναι εφικτό φυσικές μεθόδους ελέγχου.

Η κατάσταση ανθεκτικότητας του προς αντιμετώπιση πληθυσμού τρωκτικών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή του κατάλληλου τρωκτικοκτόνου. Σε περιοχές όπου υπάρχει ένδειξη ανάπτυξης ανθεκτικότητας του πληθυσμού των τρωκτικών σε συγκεκριμένη τρωκτικοκτόνο δραστική ουσία, η συγκεκριμένη δραστική ουσία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Προκειμένου, να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, προτείνεται η εναλλαγή δολωμάτων με διαφορετική τρωκτικοκτόνο δραστική ουσία κάθε φορά.

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε κοινόχρηστους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής του θα πρέπει να σημαίνονται καθ' όλη την περίοδο χρήσης (παρουσίας) του στο χώρο με ειδική σήμανση που να εξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και τις α' βοήθειες που πρέπει να λάβουν χώρα σε περίπτωση δηλητηρίασης

Απομακρύνετε το δόλωμα που έχει περισσέψει στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.

Μην το χρησιμοποιείτε για στρατηγικές μόνιμης δόλωσης.

4.4.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Όπου είναι δυνατόν, πριν από την εφαρμογή ενημερώστε τους πιθανούς παρευρισκόμενους για την εφαρμογή καταπολέμησης τρωκτικών.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά σε συχνά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής (π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα).

Μη χρησιμοποιείτε δολώματα που περιέχουν αντιπηκτικές δραστικές ουσίες ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών

Χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας από τα χημικά (EN374) όταν χειρίζεστε το προϊόν.

4.4.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

4.5 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 5 - Ποντικοί και/ή αρουραίοι – Επαγγελματίες – εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων

Τύπος προϊόντος	PT14 - Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Mus musculus Κοινή ονομασία: Οικιακός ποντικός στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά ζώα, ενήλικες επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: Καφέ αρουραίος στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά ζώα, ενήλικες
Πεδίο χρήσης	Εξωτερικοί Χώροι Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καλυμμένα σημεία δόλωσης ή δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση). Η εφαρμογή μπορεί να γίνει και απευθείας στις στοές που δημιουργούν τα τρωκτικά.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Ποντικοί: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Αρουραίοι: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Αραίωση (%): Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Ποντικοί: Υψηλή προσβολή: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης κάθε 2 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης, κάθε 5μέτρα.. Αρουραίοι: Υψηλή προσβολή: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης κάθε 5 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά ανά σημείο δόλωσης κάθε 10 μέτρα.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 κιλά. Έως 25 κιλά σάκος πολλαπλών στρώσεων χαρτιού με επένδυση PE ή με PE εσωτερικά σάκο ή σάκος υφασμένος PP με PE εσωτερικά ή σάκος υφασμένος PP χωρίς επένδυση. Εσωτερική συσκευασία: M/E. Εξωτερική συσκευασία: Χαρτί, PP, PE σάκος, PP σάκος 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 4.5 κιλά, 5 κιλά, 10 κιλά, 20 κιλά.

15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 ή 200 γρ. σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE, μέσα σε PE/PP συσκευασίες (σκαφάκια, κάδους ή σακούλες).

Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια από χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE.

Εξωτερική συσκευασία: PE/PP συσκευασίες (σκαφάκια ή κάδους ή σακούλες) 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 6 κιλά, 7 κιλά, 8 κιλά, 9 κιλά, 10 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά, 13 κιλά, 14 κιλά, 15 κιλά, 16 κιλά, 17 κιλά, 18 κιλά, 19 κιλά, 20 κιλά.

15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 ή 200 γρ. σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE, μέσα χάρτινο κουτί.

Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE.

Εξωτερική συσκευασία: Χάρτινο κουτί 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 6 κιλά, 7 κιλά, 8 κιλά, 9 κιλά, 10 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά, 13 κιλά, 14 κιλά, 15 κιλά, 16 κιλά, 17 κιλά, 18 κιλά, 19 κιλά, 20 κιλά.

15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 ή 200 γρ σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE μέσα σε fibreboard κουτί/χαρτόνι εξωτερικά.

Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE.

Εξωτερική συσκευασία: Fibreboard κουτί/χαρτόνι 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 6 κιλά, 7 κιλά, 8 κιλά, 9 κιλά, 10 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά, 13 κιλά, 14 κιλά, 15 κιλά, 16 κιλά, 17 κιλά, 18 κιλά, 19 κιλά, 20 κιλά.

Χύδην δόλωμα μέσα σε συσκευασίες PE/PP (σκαφάκια, κάδους ή σακούλες).

Εσωτερική συσκευασία: M/E.

Εξωτερική συσκευασία: Συσκευασίες PE/PP (σκαφάκια, κάδους ή σακούλες) 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 6 κιλά, 7 κιλά, 8 κιλά, 9 κιλά, 10 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά, 13 κιλά, 14 κιλά, 15 κιλά, 16 κιλά, 17 κιλά, 18 κιλά, 19 κιλά, 20 κιλά.

Χύδην δόλωμα σε χάρτινο κουτί με PE επένδυση.

Εσωτερική συσκευασία: M/E.

Εξωτερική συσκευασία: Χάρτινο κουτί με PE επένδυση 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 6 κιλά, 7 κιλά, 8 κιλά, 9 κιλά, 10 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά, 13 κιλά, 14 κιλά, 15 κιλά, 16 κιλά, 17 κιλά, 18 κιλά, 19 κιλά, 20 κιλά.

Η συσκευασία περιορίζεται σε χωριστές συσκευασμένες σακούλες που έχουν μέγιστο μέγεθος 10 κιλά.

Χύδην δόλωμα έως 20 γρ. (αρουραίοι και ποντικοί) και έως 60 γρ. (μόνο αρουραίοι) μέσα σε δολωματικούς δίσκους με θερμοκολλημένο κάλυμμα, που συσκευάζονται σε πολλαπλάσια μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά.

Εσωτερική συσκευασία: Δολωματικοί δίσκοι με θερμοκολλημένο κάλυμμα. Εξωτερική συσκευασία: Χαρτόνι εξωτερικά.

Πολλαπλάσια

10γρ. – 250
15γρ. - 250
20γρ. – 125, 144
25γρ. – 120, 144
30γρ. – 96, 120, 144
40γρ. – 72, 96, 120, 144
50γρ. – 60, 72, 96, 120, 144
60γρ. – 48, 60, 72, 96, 120

Χύδην δόλωμα έως 20 γρ. (αρουραίοι και ποντικοί) και έως 60 γρ. (μόνο αρουραίοι), μέσα σε δολωματικούς δίσκους με θερμοκολλημένο κάλυμμα, συσκευασμένοι σε δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης, από HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά.

Εσωτερική συσκευασία: Δολωματικοί δίσκοι με θερμοκολλημένο κάλυμμα. Εξωτερική συσκευασία: HDPE ή PP δολωματικός σταθμός μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά.

Πολλαπλάσια

10γρ. – 250
15γρ. - 250
20γρ. – 125, 144
25γρ. – 120, 144
30γρ. – 96, 120, 144
40γρ. – 72, 96, 120, 144
50γρ. – 60, 72, 96, 120, 144
60γρ. – 48, 60, 72, 96, 120
80γρ. – 32, 48, 60, 72, 96
90γρ. – 32, 48, 60, 72, 96
100γρ. – 32, 48, 60, 72, 96

4.5.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ποντικοί:

Μετακινείτε τους δολωματικούς σταθμούς κάθε 2-3 ημέρες, κατά τον έλεγχο της κατάστασης τους. Ο έλεγχος της κατάστασης τους θα πρέπει να λαμβάνει χώρα κατά τις πρώτες 10 -14 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου τυχόν απώλειες δολώματος ή δόλωμα που έχει βραχεί ή μολυνθεί με σκόνη θα πρέπει να αναπληρώνεται. Εάν διαπιστώσετε ότι έχει φαγωθεί όλο το δόλωμα αυξήστε τον αριθμό των θέσεων δόλωσης, χωρίς να αυξάνετε την ποσότητα δολώματος ανά θέση δόλωσης.

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τις πρώτες 2 -3 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής και ακολούθως ανά εβδομαδιαία χρονικά διαστήματα προκειμένου να ελεγχθεί η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και η απομάκρυνση των νεκρών τρωκτικών.

Αρουραίοι

Ελέγχετε τους δολωματικούς σταθμούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα και αναπληρώστε δόλωμα που έχει καταναλωθεί ή δόλωμα που έχει βραχεί ή μολυνθεί με σκόνη. Μην μετακινείτε τους δολωματικούς σταθμούς για αρκετές ημέρες από την τοποθέτησή τους. Σε περίπτωση που δεν γίνει αντιληπτή δραστηριότητα τρωκτικών εντός 7 έως 10 ημερών από την τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών σε κάποιο σημείο, τοποθετείστε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλο σημείο και αναπληρώστε τυχόν δόλωμα που έχει καταναλωθεί ή έχει υποστεί ζημιά από νερό ή σκόνη. Εάν διαπιστώσετε ότι έχει φαγωθεί όλο το δόλωμα αυξήστε τον αριθμό των θέσεων δόλωσης, χωρίς να αυξάνετε την ποσότητα δολώματος ανά θέση δόλωσης.

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τις πρώτες 5 -7 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής και ακολούθως ανά εβδομαδιαία χρονικά διαστήματα προκειμένου να ελεγχθεί η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και η απομάκρυνση των νεκρών τρωκτικών.

Πριν την εφαρμογή διεξάγετε μια επιτόπια έρευνα προκειμένου να διαπιστώσετε τα είδη των τρωκτικών, τα σημεία που δραστηριοποιούνται και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και μέγεθος της προσβολής.

Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης του πληθυσμού των τρωκτικών, που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων και άλλα μέτρα όπως μέτρα υγιεινής, και όπου είναι εφικτό φυσικές μεθόδους ελέγχου. Η κατάσταση ανθεκτικότητας του προς αντιμετώπιση πληθυσμού τρωκτικών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή του κατάλληλου τρωκτικοκτόνου. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη ανάπτυξης ανθεκτικότητας του πληθυσμού των τρωκτικών σε συγκεκριμένη τρωκτικοκτόνο δραστική ουσία, η συγκεκριμένη δραστική ουσία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Προκειμένου, να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, προτείνεται η εναλλαγή δολωμάτων με διαφορετική τρωκτικοκτόνο δραστική ουσία κάθε φορά.

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε κοινόχρηστους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής του θα πρέπει να σημαίνονται καθ' όλη την περίοδο χρήσης (παρουσίας) του στο χώρο με ειδική σήμανση που να εξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και τις α' βοήθειες που πρέπει να λάβουν χώρα σε περίπτωση δηλητηρίασης Προστατέψτε το δόλωμα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες (χιόνι, βροχή κλπ). Μην τοποθετείτε τα δολώματα σε περιοχές που είναι εύκολο να πλημμυρήσουν.

Απομακρύνετε το δόλωμα που έχει περισσέψει στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.

Όταν χρησιμοποιείται σε στρατηγικές τακτικής δόλωσης, αναπληρώστε το δόλωμα που έχει καταναλωθεί 3 ημέρες από την πρώτη εφαρμογή και ακολούθως ανά εβδομάδα (μέγιστο)

4.5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Όπου είναι δυνατόν, πριν από την εφαρμογή ενημερώστε τους πιθανούς παρευρισκόμενους για την εφαρμογή καταπολέμησης τρωκτικών.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά σε συχνά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής (π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα).

Μη χρησιμοποιείτε δολώματα που περιέχουν αντιπηκτικές δραστικές ουσίες ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

Όταν χρησιμοποιείται απευθείας στις στοές, τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται ώστε να υπάρχει μειωμένη έκθεση ζώων μη στόχων και παιδιών στο δόλωμα. Τα ανοίγματα εισόδου/εξόδου των στοών θα πρέπει να σφραγίζονται ώστε να αποφευχθεί η έξοδος του δολώματος.

Χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας από τα χημικά (EN374) όταν χειρίζεστε το προϊόν.

4.5.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τα σημεία δόλωσης είναι κοντά σε επιφανειακά ύδατα (ποταμοί, λίμνες, συστήματα άρδευσης κλπ) ή σε αποχετεύσεις εξασφαλίστε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό .

4.5.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Επαγγελματική χρήση:

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος πριν από κάθε χρήση.
- Επιθεωρήστε τον χώρο πριν την εφαρμογή των δολωμάτων και πραγματοποιήστε επιτόπια αξιολόγηση προκειμένου να εντοπιστούν τα είδη τρωκτικών, ο τόπος δραστηριότητάς τους με σκοπό να προσδιορισθεί η πιθανή αιτία και η έκταση της προσβολής.
- Καθαρίστε το χώρο από εναλλακτικές εστίες τροφής των τρωκτικών (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίζετε τη μολυσμένη περιοχή ακριβώς πριν από την εφαρμογή των δολωμάτων, καθώς αυτό το μέτρο μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και να δυσχεράνει την αποδοχή των δολωμάτων.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM), συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των μέτρων υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικών μεθόδων ελέγχου.
- Εξετάστε μέτρα προληπτικού ελέγχου (π.χ. βούλωμα τρυπών, απομάκρυνση πιθανών εστιών τροφής και πόσιμου νερού όσο το δυνατόν περισσότερο) για να βελτιώσετε την πρόσληψη του προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας επαναπροσβολής.
- Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γειτνίαση με μέρη όπου έχει παρατηρηθεί προηγουμένως δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. μονοπάτια, φωλιές, τρύπες, λαγούμια, κλπ.).
- Όπου είναι δυνατόν, οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατάλληλες κατασκευές.
- Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να φέρουν σαφή επισήμανση ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνο και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται.
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε κοινόχρηστους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής του θα πρέπει να σημαίνονται καθ' όλη την περίοδο χρήσης (παρουσίας) του στο χώρο με ειδική σήμανση που να εξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και τις α' βοήθειες που πρέπει να λάβουν χώρα σε περίπτωση δηλητηρίασης.
- Το δόλωμα πρέπει να ασφαρίζεται έτσι ώστε να μην μπορεί να απομακρυνθεί από τον δολωματικό σταθμό.
- Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 2 με 3 ημέρες (στην περίπτωση των ποντικών) ή κάθε 5 με 7 ημέρες (στην περίπτωση των αρουραίων) κατά την πρώτη εφαρμογή και ανά εβδομαδιαία διαστήματα στις επόμενες εφαρμογές, ώστε να ελέγχεται η κατανάλωση του δολώματος από τα τρωκτικά, η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επαναδολώνονται εάν κριθεί απαραίτητο
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, ζώα εκτροφής και άλλα ζώα μη στόχους.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Τα δολώματα θα πρέπει να είναι προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι κλπ.). Η τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να γίνεται σε περιοχές που δεν πλημμυρίζουν.
- Εάν η πρόσληψη δολώματος από τα τρωκτικά είναι χαμηλή σε σχέση με το εμφανές μέγεθος της προσβολής, σκεφτείτε την μετεγκατάσταση των σταθμών δόλωσης σε διαφορετικές θέσεις και την πιθανότητα αλλαγής δολώματος.
- Εάν μετά από μια περίοδο θεραπείας 35 ημερών τα δολώματα συνεχίζουν να καταναλώνονται και δεν παρατηρείται μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, πρέπει να καθοριστεί η πιθανή αιτία. Στην περίπτωση όπου έχουν εξαιρεθεί άλλες αιτίες μειωμένης αποτελεσματικότητας, είναι πιθανό να υπάρχουν ανθεκτικά τρωκτικά. Σε αυτήν την περίπτωση συστήνεται η χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου υπάρχει, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, η χρήση παγίδων θα πρέπει να εξεταστεί ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
- Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, τα δολώματα θα πρέπει να αφαιρούνται και οι δολωματικοί σταθμοί να απομακρύνονται.
- Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται στους δολωματικούς σταθμούς με τη χρήση δοσομετρητή.

Χρήση από το ευρύ κοινό:

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος πριν από κάθε χρήση.
- Πριν από κάθε χρήση τρωκτικοκτόνων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μη χημικές μέθοδοι ελέγχου (π.χ. παγίδες).
- Καθαρίστε το χώρο από εναλλακτικές εστίες τροφής των τρωκτικών (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίζετε τη μολυσμένη περιοχή ακριβώς πριν από την εφαρμογή των δολωμάτων, καθώς αυτό το μέτρο μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και να δυσχεράνει την αποδοχή των δολωμάτων.
- Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γειτνίαση με μέρη όπου έχει παρατηρηθεί προηγουμένως δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. μονοπάτια, φωλιές, τρύπες, λαγούμια, κλπ.).

- Όπου είναι δυνατόν, οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατάλληλες κατασκευές.
- Τα δολώματα θα πρέπει να είναι προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι κλπ.). Η τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να γίνεται σε περιοχές που δεν πλημμυρίζουν.
- Μην ανοίγετε τα σακουλάκια που περιέχουν το δόλωμα
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, ζώα εκτροφής και άλλα ζώα μη στόχους.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Μην τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με το νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, τα δολώματα θα πρέπει να αφαιρούνται και οι δολωματικοί σταθμοί να απομακρύνονται.
- Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 2 με 3 ημέρες (στην περίπτωση των ποντικών) ή κάθε 5 με 7 ημέρες (στην περίπτωση των αρουραίων) κατά την πρώτη εφαρμογή και ανά εβδομαδιαία διαστήματα στις επόμενες εφαρμογές, ώστε να ελέγχεται η κατανάλωση του δολώματος από τα τρωκτικά, η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επαναδολώνονται εάν κριθεί απαραίτητο.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Για επαγγελματική χρήση:

- Μη το χρησιμοποιείτε μέχρι να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
- Όπου είναι δυνατόν, πριν από την εφαρμογή ενημερώστε τους πιθανούς παρευρισκόμενους για την εφαρμογή καταπολέμησης τρωκτικών.
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά σε συχνά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής (π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα).
- Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για χρονικό διάστημα που ξεπερνά τις 35 ημέρες χωρίς να προηγηθεί αξιολόγηση της κατάστασης της μόλυνσης και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.
- Μη χρησιμοποιείτε δολώματα που περιέχουν αντιπηκτικές δραστικές ουσίες ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.
- Οι πληροφορίες για το προϊόν (ήτοι η ετικέτα ή / και το φύλλο οδηγιών) θα πρέπει να δείχνουν σαφώς ότι το προϊόν (α) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από το ευρύ κοινό (β) θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε δολωματικούς σταθμούς που είναι ανθεκτικοί στην παραβίαση και (γ) οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επισημαίνονται κατάλληλα ώστε να αναφέρουν τα παρακάτω:
 - Μη μετακινείτε ή ανοίγετε.
 - Περιέχει το τρωκτικοκτόνο "όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης "," δραστική ουσία (-ες) "
 - Σε περίπτωση συμβάντος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων 210 7793777.
 - Επικίνδυνο για την άγρια φύση.
- Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να εξαλειφθεί εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (ήτοι η ετικέτα ή / και το φύλλο οδηγιών) πρέπει να συστήνουν με σαφήνεια ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της θεραπείας (δηλαδή εξακολουθεί να παρατηρείται η δραστηριότητα των τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος.
- Μην πλένετε τους σταθμούς δολωμάτων με νερό μεταξύ των εφαρμογών.
- Απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
- Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό, στην περίπτωση που οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται κοντά σε αποχετευτικά δίκτυα ή κοντά σε επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, ρυάκια, κανάλια, εγκαταστάσεις ποτίσματος κλπ).

Για χρήση από το ευρύ κοινό:

- Μη το χρησιμοποιείτε μέχρι να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Εξετάστε μέτρα προληπτικού ελέγχου (π.χ. βούλωμα τρυπών, απομάκρυνση πιθανών εστιών τροφής και πόσιμου νερού όσο το δυνατόν περισσότερο) για να βελτιώσετε την πρόσληψη του προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας επαναπροσβολής.
- Μη χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για την ανίχνευση της δραστηριότητας των τρωκτικών).
- Οι πληροφορίες για το προϊόν (ήτοι η ετικέτα ή / και το φύλλο οδηγιών) θα πρέπει να δείχνουν σαφώς ότι το προϊόν (α) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από το ευρύ κοινό (β) θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε δολωματικούς σταθμούς που είναι ανθεκτικοί στην παραβίαση και (γ) οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επισημαίνονται κατάλληλα ώστε να αναφέρουν τα παρακάτω:
 - Μη μετακινείτε ή ανοίγετε.
 - Περιέχει το τρωκτικοκτόνο "όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης "," δραστική ουσία (-ες) "
 - Σε περίπτωση συμβάντος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων 210 7793777.
 - Επικίνδυνο για την άγρια φύση.
- Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να εξαλειφθεί εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (ήτοι η ετικέτα ή / και το φύλλο οδηγιών) πρέπει να συστήνουν με σαφήνεια ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της θεραπείας (δηλαδή εξακολουθεί να παρατηρείται η δραστηριότητα των τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώσει τον προμηθευτή του προϊόντος και να αποταθεί σε αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων μυοκτονιών.
- Αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας, τουλάχιστον όσο συχνά ελέγχονται οι σταθμοί δόλωσης.
- Απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
- Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό, στην περίπτωση που οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται κοντά σε αποχετευτικά δίκτυα ή κοντά σε επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, ρυάκια, κανάλια, εγκαταστάσεις ποτίσματος κλπ).

5.3. Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

- Το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία.
- Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα ούλα.
- Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.
- Αντίδοτο: Βιταμίνη K1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.
- Σε περίπτωση:
 - δερματικής έκθεσης, πλύνετε πρώτα το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι.
 - οφθαλμικής έκθεσης, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή σκέτο νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.
 - στοματικής έκθεσης, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό.
- Ποτέ μη χορηγείτε οτιδήποτε δια του στόματος σε ένα αναισθητο άτομο.
- Μην προκαλέσετε εμετό.
- Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευθείτε αμέσως ιατρό και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος [Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777].
- Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο [...].
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: «να μην ανοίγεται και να μην μετακινείται»- «περιέχει τρωκτικοτόνο»· «ονομασία προϊόντος ή αριθμός έγκρισης»· «δραστική(-ές) ουσία(-ες)» και «σε περίπτωση ατυχήματος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων [Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων 210 77 93 777.]».
- Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Κατά το τέλος της περιόδου αντιμετώπισης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Απορρίψτε όλα τα δολώματα μετά την εφαρμογή σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Απορρίψτε τις συσκευασίες σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Τα δολώματα δε θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται. Μη φαγωμένα δολώματα θα πρέπει να απορρίπτονται μέσω καύσης. Τα κενά μέσα συσκευασίας δε θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και θα πρέπει να καταστρέφονται με σχίσμο και να εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Συνιστάται η χρήση γαντιών.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Διάρκεια ζωής προϊόντος: 24 μήνες
- Φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το δοχείο κλειστό και μακριά από το ηλιακό φως.
- Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα.
- Διατηρήστε το μόνο στην αρχική του συσκευασία.

6. Άλλες πληροφορίες

- Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτικοτόνων, απαιτούνται 4 έως 10 ημέρες από την κατανάλωση του δολώματος για να υπάρξει αποτελεσματικότητα. Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς νόσων.
- Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείστε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες, κατά την απόρριψή τους.
- Το παρόν προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική ουσία.

In accordance with Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1381 of 25 July 2017 renewing the approval of brodifacoum as an active substance for use in biocidal products of type 14, the maximum amount of bait (grains, granules, paste) of 150 g per pack is allowed for combined packaging against mice and rats intended for use by the general public.