

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

Denumirea produsului: AGRORAT BRODI-3 PASTA

Tipul (tipurile) de produs (produse): TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

Numărul curent: RO/2020/0273MRS/ES/BB(NA)-2018-14-00561

Numărul curent R4BP 3: RO-0026767-0000

Cuprins

Informații administrative	1
1.1. Denumirea comercială a produsului	1
1.2. Detinatorul autorizației	1
1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide	1
1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active	2
2. Compoziția și formularea produsului	2
2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid	2
2.2. Tipul preparatului	2
3. Fraze de pericol și de precauție	2
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)	3
5. Direcții generale de utilizare	24
5.1. Instrucțiuni de utilizare	24
5.2. Măsuri de reducere a riscurilor	29
5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	29
5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia	30
5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	30
6. Alte informații	31

Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului

AGRORAT BRODI-3 PASTA
TOXIRAT BRODY FORTE 30

1.2. Detinatorul autorizației

Numele și adresa detinatorului autorizației	Numele	Laboratorios Agrochem S.L.
	Adresa	C/Tres Rieres, 10 - Pol. Ind. Sud 08292 Esparreguera Spania
Numărul curent	RO/2020/0273MRS/ES/BB(NA)-2018-14-00561	
Numărul curent R4BP 3	RO-0026767-0000	
Data autorizației	04/12/2018	
Data de expirare a autorizației	01/07/2024	

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Numele producatorului	Laboratorios Agrochem, S.L.
Adresa producătorului	Tres Rieres, 10 (Pol. Ind. Sud) 08292 Esparraguera (Barcelona) Spania
Adresa locurilor de producție	Tres Rieres, 10 08292 Esparraguera (Barcelona) Spania
Numele producatorului	SC AGROSEM ZAHIU ECOFITOPLANT S.R.L.
Adresa producătorului	Sat Pitulicea, Comuna Godeanu Sarat, Pitulicea, nr. 200. 127258 Judet Buzau România
Adresa locurilor de producție	Sat Pitulicea, Comuna Godeanu Sarat, Pitulicea, nr. 200. 127258 Judet Buzau România

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activă	11 - Brodifacum
Numele producătorului	Activa S.r.l
Adresa producătorului	via Feltre, 32 20132 Milano Italia
Adresa locurilor de producție	Tezza S.r.l, via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio (VR) Italia

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Brodifacum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Substanța activă	56073-10-0	259-980-5	0,0025

2.2. Tipul preparatului

Ready-to-use bait: paste

3. Fraze de pericol și de precauție

Fraze de pericol

Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

Fraze de precauție

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.

Purtați îmbrăcăminte de protecție.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ.

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)**4.1 Modul de utilizare****Utilizarea 1 - Utilizați numărul 1 - Ratón- public general-interior****Tipul produsului**

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Nu este relevant pentru rodenticidas

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Mus musculus
denumirea comună: House mouse
etapă de dezvoltare: Adulți

denumirea științifică: Mus musculus
denumirea comună: House mouse
etapă de dezvoltare: Minori

Domeniul de utilizare

de interior

Interior

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: cerere momeală
Descriere detaliată:
Puneți momeala manual într-o stație rezistentă la modificări, etichetată corect în zona infestată.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: 20-40 g de momeală pe portacebo.
Diluare (%): 0
Numărul și calendarul de aplicare:

Dacă este nevoie de mai mult de un portacebo, distanța dintre portacebos trebuie să fie de 5 metri

Categoria (categoriile) de utilizatori

Publicul larg (neprofesionist)

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Pasta de momeli de 10, 15, 20, 25 sau 30 de grame cu următorul ambalaj:

sac:

Material: cutie de carton sau HDPE

Greutate netă: 20, 30, 40 sau 50 g

Saci de hârtie:

Material: pungi de hârtie Kraft, cu acoperire PE sau PP

Greutate netă: 20, 30, 40 sau 50 g

Tăvi din plastic:

Material: HDPE, PE sau PP

Greutate: tăvi de 50g

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Cutiile placebo trebuie vizitate după 2 sau 3 zile de la începerea tratamentului și, ulterior, cel puțin o dată pe săptămână, pentru a verifica acceptarea momecii, ca placebo-urile să fie intacte și să îndepărteze corpurile rozătoarelor. Umpleți momeala atunci când este necesar.

--

4.1.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

A se vedea punctul 5. Instrucțiuni de utilizare.
--

4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

A se vedea punctul 5. Instrucțiuni de utilizare.
--

4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

A se vedea punctul 5. Instrucțiuni de utilizare.
--

4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

A se vedea punctul 5. Instrucțiuni de utilizare.
--

4.2 Modul de utilizare

Utilizarea 2 - Utilizați numărul 2 - Șobolanele publice generale - Clădirile interioare și înconjurătoare

Tipul produsului	TP 14 - Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rozătoare
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: Adulți denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: Minori
Domeniul de utilizare	de interior Other Interior și împrejurimi case și exterioare ale clădirilor de uz privat.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală

Descriere detaliata:
Așezați momeala într-o stație robustă, etichetată corespunzător și în zona infestată.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: 100-200 g de momeală în fiecare cutie de aceeașebo
Diluare (%): 0
Numărul și calendarul de aplicare:

100-200 g de momeală în fiecare cutie holly, în funcție de gradul de infestare. Dacă este nevoie de mai multe cutii, distanța minimă între cutii trebuie să fie de 5-10 metri.

Categoria (categoriile) de utilizatori

Publicul larg (neprofesionist)

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Pasta de momeli de 10, 15, 20, 25 sau 30 de grame cu următorul ambalaj:

sac:

Material: cutie de carton sau HDPE

Greutate netă: 40, 50, 90, 100 și 150 g

Saci de hârtie:

Material: pungi de hârtie Kraft, cu acoperire PE sau PP

Greutate netă: 40, 50, 90, 100 și 150 g

Tăvi din plastic:

Material: HDPE, Pe sau PP

Greutate: tăvi de 80 g (până la 12 unități în interiorul cutiei de carton) și 150 g (până la 6 unități în interiorul cutiei de carton)

4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Cutiile goale trebuie vizitate cel puțin o dată la 5-7 zile de la începerea tratamentului și, ulterior, o dată pe săptămână, pentru a verifica acceptarea momecii și pentru ca portacebosul să fie intact și pentru a îndepărta corpurile rozătoarelor. Umpleți momeala atunci când este necesar.

4.2.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

A se vedea punctul 5. Instrucțiuni de utilizare.

4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

A se vedea punctul 5. Instrucțiuni de utilizare.

4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

A se vedea punctul 5. Instrucțiuni de utilizare.

4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

A se vedea punctul 5. Instrucțiuni de utilizare.

4.3 Modul de utilizare

Utilizarea 3 - Utilizați numărul 3 - Mouse - Profesional - Interior

Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Nu este relevant pentru rozătoare

**Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)**

denumirea științifică: Mus musculus
denumirea comună: House mouse
etapă de dezvoltare: Adulți

denumirea științifică: Mus musculus
denumirea comună: House mouse
etapă de dezvoltare: Minori

Domeniul de utilizare

de interior

interior

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: cerere momeală

Descriere detaliată:

Momeală gata de utilizare, concepută pentru a fi utilizată pe suporturile de cutii rezistente la modificări

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: 20-40 g momeală pe suport

Diluare (%): 0

Numărul și calendarul de aplicare:

20-40 g de momeală pe cutie de placebo în funcție de gradul de infestare. Dacă este nevoie de mai mult de o cutie, distanța minimă între cutii trebuie să fie de 5-10 metri.

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Pasta de momeli de 10, 15, 20, 25, 30, 50 sau 100 de grame cu următorul ambalaj:

sac:

Material: cutie de carton sau HDPE

Greutate netă: de la 3 kg la 10 kg

3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 și 10 kg

Saci de hârtie:

Material: pungi de hârtie Kraft, cu acoperire PE sau PP

Greutate netă: de la 3 kg la 10 kg

3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 și 10 kg

Tăvi din plastic:

Material: HDPE, PE sau PP

Greutate: tăvi de 80g (până la 50 de unități în interiorul cutiei de carton) și 160 g (până la 25 de unități în interiorul cutiei de carton)

Țevi din plastic:

Material: HDPE, PE sau PP

Greutate: de la 3 kg la 10 kg

3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 și 10 kg

4.3.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Cutiile Portacebo trebuie vizitate după 2 sau 3 zile de la începerea tratamentului și apoi cel puțin o dată pe săptămână, pentru a

verifica acceptarea datoriei, ca portacebosul să fie intact și să înlăture corpurile rozătoarelor. Umpleți momeala când este posibil

4.3.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Vezi secțiunea 5. Instrucțiuni de utilizare

4.3.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Când așezați cutii goale în apropierea sistemelor de canalizare, asigurați-vă că împiedicați momeala să intre în contact cu apa.

4.3.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

A se vedea punctul 5. Instrucțiuni de utilizare.

4.3.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

A se vedea punctul 5. Instrucțiuni de utilizare.

4.4 Modul de utilizare

Utilizarea 4 - Utilizați numărul 4 - Șobolani - Profesional - Interior

Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Nu este relevant pentru rodenticide.

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: *Rattus norvegicus*
denumirea comună: Brown rat
etapă de dezvoltare: Adulți

denumirea științifică: *Rattus norvegicus*
denumirea comună: Brown rat
etapă de dezvoltare: Minori

Domeniul de utilizare

	<p>de interior</p> <p>Interior profesional</p>
Metoda (metodele) de aplicare	<p>Metoda: cerere momeală Descriere detaliata: Momeală pentru utilizare concepută pentru a fi utilizată pe suporturile de cutii rezistente la modificări.</p>
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	<p>Frecvența de aplicare: 100-200 g momeală pe suport Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare:</p> <p>100-200 g de momeală pe cutie de aceacebo în funcție de gradul de infestare. Dacă este nevoie de mai mult de o cutie, distanța minimă între cutii trebuie să fie de 5-10 metri.</p>
Categoria (categoriile) de utilizatori	<p>profesional</p>
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	<p>Pasta de momeli de 10, 15, 20, 25, 30, 50 sau 100 de grame cu următorul ambalaj:</p> <p>sac:</p> <p>Material: cutie de carton sau HDPE</p> <p>Greutate netă: de la 3 kg la 10 kg</p> <p>3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 și 10 kg</p> <p>Saci de hârtie:</p>

Material: pungi de hârtie Kraft, cu acoperire PE sau PP

Greutate netă: de la 3 kg la 10 kg

3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 și 10 kg

Tăvi din plastic:

Material: HDPE, PE sau PP

Greutate: tăvi de 80g (până la 50 de unități în interiorul cutiei de carton) și 160 g (până la 25 de unități în interiorul cutiei de carton)

Țevi din plastic:

Material: HDPE, PE sau PP

Greutate: de la 3 kg la 10 kg

3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 și 10 kg

4.4.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Cutiile scobite trebuie vizitate cel puțin o dată la 5-7 zile la începutul tratamentului și, ulterior, cel puțin o dată pe săptămână, pentru a verifica acceptarea momecii și pentru ca portacebosul să fie intact și pentru a îndepărta carcasele de rozătoare . Umpleți momeala atunci când este necesar.

4.4.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

A se vedea punctul 5. Instrucțiuni de utilizare

4.4.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Când așezați cutii goale în apropierea sistemelor de canalizare, asigurați-vă că împiedicați momeala să intre în contact cu apa.

4.4.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

A se vedea punctul 5. Instrucțiuni de utilizare.

4.4.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

A se vedea punctul 5. Instrucțiuni de utilizare

4.5 Modul de utilizare

Utilizarea 5 - Utilizați numărul 5 - Șobolani - Profesioniști - în jurul clădirilor

Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Nu este relevant pentru rozătoare

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Rattus norvegicus
denumirea comună: Brown rat
etapă de dezvoltare: Adulți

denumirea științifică: Rattus norvegicus
denumirea comună: Brown rat
etapă de dezvoltare: Minori

Domeniul de utilizare

Metoda (metodele) de aplicare	<p>Other</p> <p>În jurul clădirilor care utilizează instalații fixe sau mobile strâns legate de opțiunile agricole.</p>
	<p>Metoda: cerere momeală Descriere detaliată:</p> <p>Momeală gata de utilizare, concepută pentru a fi utilizată pe suporturile de cutii rezistente la modificări.</p>
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	<p>Frecvența de aplicare: 100-200 g momeală pe suport Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare:</p> <p>100-200 g de momeală pe cutie de aceacebo în funcție de gradul de infestare. Dacă este nevoie de mai mult de o cutie, distanța minimă între cutii trebuie să fie de 5-10 metri</p>
Categoria (categoriile) de utilizatori	<p>profesional</p>
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	<p>Pasta de momeli de 10, 15, 20, 25, 30, 50 sau 100 de grame cu următorul ambalaj:</p> <p>sac:</p> <p>Material: cutie de carton sau HDPE</p> <p>Greutate netă: de la 3 kg la 10 kg</p> <p>3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 și 10 kg</p>

Saci de hârtie:

Material: pungi de hârtie Kraft, cu acoperire PE sau PP

Greutate netă: de la 3 kg la 10 kg

3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 și 10 kg

Tăvi din plastic:

Material: HDPE, PE sau PP

Greutate: tăvi de 80g (până la 50 de unități în interiorul cutiei de carton) și 160 g (până la 25 de unități în interiorul cutiei de carton)

Țevi din plastic:

Material: HDPE, PE sau PP

Greutate: de la 3 kg la 10 kg

3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 și 10 kg

4.5.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Așezați cutii holly în afara zonelor inundate.

Cutiile portacebo trebuie vizitate după 5 sau 7 zile de la începerea tratamentului și, ulterior, cel puțin o dată pe săptămână, pentru a verifica acceptarea momeții, ca portacebo-urile să fie intacte și să elimine corpurile rozătoarelor. Umpleți momeala atunci când este necesar.

Înlocuiți momeala deteriorată de apă sau contaminată de murdărie.

4.5.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Nu aplicați acest produs direct pe cremele.

4.5.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când așezați cutiile portacebo în apropierea apelor de suprafață (râuri, bălți, canale, diguri sau șanțuri) sau în sistemul de canalizare, asigurați-vă că împiedicați momeala să intre în contact cu apa.

4.5.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

A se vedea punctul 5. Instrucțiuni de utilizare.

4.5.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

A se vedea punctul 5. Instrucțiuni de utilizare.

4.6 Modul de utilizare

Utilizarea 6 - Consultați Utilizarea nr. 6 - Șobolan și șoarece - Profesionalist specializat - Clădiri interioare și din împrejurimi

Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Nu este relevant pentru rodenticias.

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea stiintifica: Rattus norvegicus
denumirea comună: Brown rat
etapă de dezvoltare: Adulți

denumirea stiintifica: Rattus norvegicus
denumirea comună: Brown rat
etapă de dezvoltare: Minori

denumirea stiintifica: Mus musculus
denumirea comună: House mouse
etapă de dezvoltare: Adulți

denumirea stiintifica: Mus musculus
denumirea comună: House mouse
etapă de dezvoltare: Minori

Domeniul de utilizare

de interior

în aer liber

-Interior și în jurul clădirilor

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: cerere momeală
Descriere detaliata:

Momeală gata de utilizare pentru a fi folosită în cutii portacebo rezistente la modificări.

Puncte acoperite și protejate.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: Șobolani: 100-200 g momeală / Șoarece: 20-40 g momeală
Diluare (%): 0
Numărul și calendarul de aplicare:

Șobolani: 100-200 g de momeală pe cutie de aceacebo în funcție de gradul de infestare.

Mouse: 20-40 g de momeală pe cutie de aceacebo în funcție de gradul de infestare.

Categoria (categoriile) de utilizatori

instruiți profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Pasta de momeli de 10, 15, 20, 25, 30, 50 sau 100 de grame cu următorul ambalaj:

sac:

Material: cutie de carton sau HDPE

Greutate netă: de la 3 kg la 10 kg

3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 și 10 kg

Saci de hârtie:

Material: pungi de hârtie Kraft, cu acoperire PE sau PP

Greutate netă: de la 3 kg la 10 kg

3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 și 10 kg

Tăvi din plastic:

Material: HDPE, Pe sau PP

Greutate: tăvi de 80g (până la 50 de unități în interiorul cutiei de carton) și 160 g (până la 25 de unități în interiorul cutiei de carton)

Țevi din plastic:

Material: HDPE, PE sau PP

Greutate: de la 3 kg la 10 kg

3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 și 10 kg

4.6.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Îndepărtați produsul rămas la sfârșitul perioadei de tratament.

4.6.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Pe cât posibil și înainte de începerea tratamentului, informați orice trecător potențial (de exemplu, utilizatorii zonei tratate și împrejurimile sale) despre campania de control a rozătoarelor (în conformitate cu prevederile aplicabile ale codului de bune practici, dacă este cazul)

Luați în considerare adoptarea de măsuri de control preventiv (prinderea găurilor, eliminarea surselor potențiale de alimente și băuturi, pe cât posibil) pentru a îmbunătăți acceptarea produsului și pentru a reduce probabilitatea de noi infestări.

Pentru a reduce riscul de intoxicații secundare, căutați și eliminați rozătoarele moarte în timpul codului corespunzător de tratament de bune practici.

Nu folosiți produsul ca momeală permanentă pentru a preveni infestarea rozătoarelor sau pentru a detecta activitățile rozătoarelor.

Nu folosiți produsul în tratamente cu momeală cu puls.

4.6.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Când așezați cutiile goale lângă canalizare, asigurați-vă că împiedicați momeala să intre în contact cu apa.

4.6.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

A se vedea punctul 5. Instrucțiuni de utilizare.

4.6.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

A se vedea punctul 5. Instrucțiuni de utilizare.

4.7 Modul de utilizare

Utilizarea 7 - Utilizați numărul 7 - Rats-Specialized Professional-Outdoor zone deschise și depozite de deșuri

Tipul produsului	TP 14 - Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rozătoare
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: Adulți denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: Minori
Domeniul de utilizare	în aer liber Other Zonele deschise în aer liber și depozitele de deșuri exterioare.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare pentru a fi folosită în cutii portacebo rezistente la modificări. Puncte acoperite și protejate.
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 100-200 g momeală Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: 100-200 g de momeală pe cutie de aceacebo în funcție de gradul de infestare.

Categoria (categoriile) de utilizatori

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

instruiți profesional

Pasta de momeli de 10, 15, 20, 25, 30, 50 sau 100 de grame cu următorul ambalaj:

sac:

Material: cutie de carton sau HDPE

Greutate netă: de la 3 kg la 10 kg

3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 și 10 kg

Saci de hârtie:

Material: pungi de hârtie Kraft, cu acoperire PE sau PP

Greutate netă: de la 3 kg la 10 kg

3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 și 10 kg

Tăvi din plastic:

Material: HDPE, Pe sau PP

Greutate: tăvi de 80g (până la 50 de unități în interiorul cutiei de carton) și 160 g (până la 25 de unități în interiorul cutiei de carton)

Țevi din plastic:

Material: HDPE, PE sau PP

Greutate: de la 3 kg la 10 kg

3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 și 10 kg

4.7.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Îndepărtați produsul rămas la sfârșitul perioadei de tratament.

4.7.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Pe cât posibil și înainte de începerea tratamentului, informați orice trecător potențial (de exemplu, utilizatorii zonei tratate și împrejurimile sale) despre campania de control a rozătoarelor (în conformitate cu prevederile aplicabile ale codului de bune practici, dacă este cazul)

Luați în considerare adoptarea de măsuri de control preventiv (prinderea găurilor, eliminarea surselor potențiale de alimente și băuturi, pe cât posibil) pentru a îmbunătăți acceptarea produsului și pentru a reduce probabilitatea de noi infestări.

Pentru a reduce riscul de intoxicații secundare, căutați și eliminați rozătoarele moarte în timpul codului corespunzător de tratament de bune practici.

Nu folosiți produsul ca momeală permanentă pentru a preveni infestarea rozătoarelor sau pentru a detecta activitățile rozătoarelor.

Nu folosiți produsul în tratamente cu momeală cu puls.

4.7.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Când așezați cutiile goale lângă canalizare, asigurați-vă că împiedicați momeala să intre în contact cu apa.

4.7.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

A se vedea punctul 5. Instrucțiuni de utilizare.

4.7.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

A se vedea punctul 5. Instrucțiuni de utilizare.

5. Direcții generale de utilizare

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Public general:

- Înainte de utilizarea produselor rodenticide, trebuie luată în considerare opțiunea de a utiliza metode de control non-chimice (de exemplu capcane).

- Eliminați alimentele care pot ajunge cu ușurință la rozătoare (de exemplu, cereale vărsate sau deșeuri alimentare).

De asemenea, nu curățați zona infestată înainte de tratament, deoarece acest lucru va perturba populația de rozătoare și va îngreuna acceptarea momealelor.

- Cutiile Holly trebuie amplasate în apropierea locului în care ați observat activitatea rozătoarelor (pasaje, zone de cuibărire, momeli, găuri, burlă etc ...).

- Pe cât posibil, cutiile goale trebuie fixate pe sol sau alte structuri.

- Așezați cutiile scobite la îndemâna copiilor, păsărilor, animalelor de companie, animalelor și altor animale care nu sunt vizate.

- Așezați cutii placebo departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale, precum și ustensile sau suprafețe care sunt în contact cu acestea.

- Nu așezați cutii goale lângă canalizare unde pot intra în contact cu apa.

- Atunci când utilizați produsul, nu mâncați, nu beți și nu fumați. Nu mâncați, beți sau nu fumați în timpul aplicării produsului.

- Spălați-vă pe mâini și pielea expusă direct după utilizarea produsului.

- Îndepărtați-vă mâinile și pielea expusă direct după utilizarea produsului.

- Îndepărtați urmele de momeală sau cutii de placebo la sfârșitul perioadei de tratament.

- Nu folosiți produsul în zonele în care poate fi suspectată rezistența la substanța activă.

- Tratamentul trebuie alternat cu alte substanțe active pentru a evita rezistența și rezistența încrucișată la rozătoare.

- Rodenticidele anticoagulante autorizate să fie utilizate de utilizatorii publicului larg trebuie utilizate în stațiile de momeală din categoria 1, pentru produsele care sunt autorizate să fie utilizate în clădirile 2 și din împrejurimi, pentru produsele autorizate numai pentru utilizare interior, că stațiile de momeală rămân uscate și intacte.

Utilizatori profesioniști:

Citiți și urmați informațiile despre produs, precum și orice informații care însoțesc produsul sau care sunt furnizate la punctul de vânzare înainte de a-l utiliza.

- Efectuați un sondaj pre-momeală a zonei infestată și o evaluare la fața locului pentru a identifica speciile de rozătoare, locurile lor de activitate și a determina cauza probabilă și întinderea infestării.

- Eliminați alimentele care pot fi obținute cu ușurință pentru rozătoare (de exemplu, cereale vărsate sau deșeuri alimentare). În afară de aceasta, nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece acest lucru deranjează doar populația de rozătoare și face mai dificilă acceptarea momealelor.

- Produsul trebuie utilizat doar ca parte a unui sistem integrat de gestionare a dăunătorilor (IPM), care include, printre alte măsuri de igienă și, dacă este posibil, metode de control fizic.

- Luați în considerare măsurile de control preventiv (de exemplu, înfășurarea găurilor, eliminarea potențialelor alimente și consumul cât mai mult posibil) pentru a îmbunătăți aportul produsului și pentru a reduce probabilitatea de revașare.

- Stațiile de momeală trebuie amplasate în imediata apropiere a locurilor unde a fost observată anterior activitatea rozătoarelor (de exemplu, trasee de călătorie, situri de cuibărire, stilouri pentru îngrășare, găuri, burcuri etc.).

- Ori de câte ori este posibil, stațiile de momeală trebuie fixate la sol sau la alte structuri.

- Stațiile de momeală trebuie să fie etichetate în mod clar pentru a arăta că conțin rozătoare și că nu trebuie mutate sau deschise (vezi secțiunea 5.3 pentru informațiile prezentate pe etichetă).

- Când produsul este utilizat în zonele publice, zonele tratate trebuie marcate în perioada de tratament și un avertisment care explică riscul de intoxicații primare sau secundare de către anticoagulant, precum și primele măsuri care trebuie luate în caz de intoxicație. Fii disponibil alături de momeli.

- Momeala trebuie să fie asigurată astfel încât să nu se poată îndepărta de stația de momeală.

- Așezați produsul la îndemâna copiilor, păsărilor, animalelor de companie și animalelor de la fermă și a altor animale care nu vizează.

- Așezați produsul departe de alimente, băuturi și furaje, precum și ustensile sau suprafețe care au contact cu acestea.

- Atunci când utilizați produsul, nu mâncați, nu beți și nu fumați. Spălați-vă mâinile și pielea direct expusă după utilizarea produsului.

Dacă absorbția momeală este scăzută în raport cu dimensiunea aparentă a infestării, luați în considerare înlocuirea stațiilor de momeală cu alte locații și posibilitatea de a trece la o altă formulare de momeală.

- Dacă după o perioadă de tratament de 35 de zile, momelile sunt încă consumate și nu se observă nicio scădere a activității rozătoarelor, trebuie stabilită cauza probabilă. Atunci când alte elemente au fost excluse, rozătoarele rezistente sunt probabil să existe, deci luați în considerare utilizarea unui agent non-anticoagulant

Rodenticid, atunci când este disponibil, sau un rodenticid anticoagulant mai puternic. De asemenea, luați în considerare utilizarea capcanelor ca o măsură alternativă de control.

- Scoateți momeala rămasă sau stațiile de momeală la sfârșitul perioadei de tratament.

- Nu deschideți pungile care conțin momeală.

- Nu folosiți în zonele în care poate fi suspectată rezistența la substanța activă.

- Tratamentul trebuie alternat cu alte substanțe active pentru a evita rezistența și rezistența încrucișată la rozătoare.

- Rodenticidele anticoagulante autorizate să fie utilizate de utilizatori profesioniști trebuie utilizate în stațiile de momeală din categoria 1 care sunt inviolabile, pentru produsele care sunt autorizate să fie utilizate în clădirile din categoria 2 și din jurul acestora, numai pentru produsele autorizate Pentru uz interior, stațiile de momeală sunt păstrate uscate și intacte.

Utilizare profesională specializată:

Citiți și urmați instrucțiunile produsului și orice informații care însoțesc produsul sau sunt furnizate la punctul de vânzare înainte de utilizare.

Efectuați o examinare și vizitați zona infestată înainte de a fi plasată momeala, pentru a identifica speciile de rozătoare și locurile lor de activitate și pentru a determina cauza cea mai probabilă și întinderea infestării.

Eliminați alimentele care pot ajunge cu ușurință la rozătoare (de exemplu, cereale vărsate sau deșeuri alimentare). De asemenea, nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece acest lucru va perturba populația de rozătoare și va face mai ușor să acceptați momeala.

Produsul trebuie utilizat numai în cadrul unui sistem integrat de combatere a dăunătorilor (PIB), care include, printre altele, măsuri igienice și, dacă este posibil, metode de control fizic.

Produsul trebuie amplasat aproape de locul în care a fost observată anterior activitatea rozătoarelor (căi de acces, zone de cuibărit, zone de pășunat, găuri, burcuri etc.).

Pe cât posibil, cutiile care poartă momeală trebuie fixate pe sol sau alte structuri,

Casetele de momeală trebuie să fie etichetate corespunzător, astfel încât să indice că conțin rodenticide și că nu trebuie mutate sau deschise (vezi secțiunea 5.3. Pentru informații pe etichetă.

Dacă produsul este utilizat în zone publice, zonele tratate trebuie identificate în timpul perioadei de tratament și, împreună cu momelile, trebuie inclusă o notificare care explică riscul de intoxicații primare secundare cauzate de îngheț sau care indică primele măsuri care trebuie luate. În caz de intoxicație.

Momeala trebuie fixată astfel încât să poată fi târâtă în afara stației de momeală.

-Puneți produsul la îndemâna copiilor, păsărilor, animalelor de companie, băuturilor și furajelor pentru animale de fermă și alte animale care nu sunt ținta dvs.

Așezați produsul departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale, precum și ustensile sau suprafețe care sunt în contact cu acestea.

Când este necesar de evaluarea riscului:

Purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice în timpul fazei de manipulare a produsului (materialul din care sunt fabricate mănușile va fi specificat de către titularul autorizației în informațiile despre produs.

Atunci când utilizați produsul nu mâncați, nu beți și nu fumați. Spălați-vă mâinile și pielea expusă direct după utilizarea produsului. Frecvența vizitelor în zona tratată va fi lăsată la latitudinea operatorului, conform rezultatelor studiului efectuat la începutul tratamentului. Frecvența ar trebui să fie în concordanță cu recomandările cuprinse în codul de bune practici.

În cazul în care nivelul de consum de momeală este scăzut în ceea ce privește dimensiunea aparentă a infestării, luați în considerare amplasarea unor cutii cu suport pentru momeală în alte locuri și posibilitatea plasării unui alt tip de momeală.

Dacă, după o perioadă de tratament de 35 de zile, momeala continuă să fie consumată, dar nu există o scădere a activității rozătoare, ar trebui să se determine cauza cea mai probabilă a acestui lucru.

În cazul în care alte elemente au fost aruncate, este probabil să existe rozătoare rezistente, astfel încât este convenabil să se ia în considerare utilizarea rozătoarelor a căror substanță activă nu este anticoagulantă, dacă a avut-o, sau un rodenticid coagulant mai puternic.

Utilizarea capcanelor ar putea fi, de asemenea, considerată ca o măsură de control

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

Public general:

Luați în considerare adoptarea măsurilor de control preventiv (prinderea găurilor, eliminarea cât mai multă a surselor potențiale de alimente și băuturi) pentru a îmbunătăți acceptarea produsului și pentru a reduce probabilitatea de noi infestări.

Nu folosiți rozătoarele anticoagulante ca momeli permanente (de exemplu, pentru a preveni infestarea rozătoarelor sau pentru a detecta activitatea rozătoarelor).

Informațiile despre produs (adică etichetarea și / sau broșura) ar trebui să indice clar că:

- Produsul trebuie utilizat în cutii de suport pentru momeală rezistente la demonstrații (de exemplu, identificate numai în stațiile de momeală rezistente la modificări).

-Utilizatorii trebuie să identifice în mod corespunzător casetele placebo cu informațiile menționate în secțiunea 5.3 din documentul SPC (de exemplu, să identifice casetele placebo conform recomandărilor)

Prin utilizarea acestui produs, eliminarea rozătoarelor trebuie realizată în 35 de zile. Informațiile despre produs (adică etichetarea și / sau broșura) ar trebui să recomande clar faptul că, în cazul în care se suspectează că este ineficient la sfârșitul tratamentului (adică în cazul în care activitatea rozătoare este încă respectată), utilizatorul ar trebui să solicite sfaturi la furnizorul de produse sau apelați un serviciu de combatere a dăunătorilor)

Căutați și îndepărtați rozătoarele moarte în timpul tratamentului, cel puțin cu o frecvență echivalentă cu inspecția cutiilor de suport.

Eliminați rozătoarele moarte în conformitate cu reglementările locale.

Autorizația necesită ca produsul să conțină un colorant, astfel încât să nu fie atractiv pentru animalele sălbatice și în special păsările.

Produsul va conține un agent aversiv sau amar.

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Acest produs conține o substanță anticoagulantă.

Printre simptomele ingestiei sale, a căror apariție ar putea fi amânată, merită menționate hemoragiile și sângerarea gingiilor.

În cazuri severe, poate apărea vânătăi și poate fi detectat sânge în scaun sau urină.

- Antidot: Vitamina K1 administrată de personal medical sau veterinar.

În cazul:

-expunere termică, spălați pielea cu apă și apoi, cu săpun și apă.

-Expunerea la ochi, în joc ochii cu picături de ochi sau apă și mențineți pleoapele deschise timp de 10 minute.

-Expunerea orală, clătiți gura cu grijă cu apă.

Nu da niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

NU induceți vărsături.

Dacă înghițiți, consultați imediat medicul și arătați eticheta sau recipientul produsului.

Consultați un medic veterinar dacă înghițiți de un animal de companie.

Stațiile de momeală trebuie să fie etichetate clar cu următoarele informații: și în cazul unui incident, apelați la un centru toxicologic>

Pericol pentru viața sălbatică.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Public general:

La sfârșitul tratamentului, aruncați momeala nesigură și recipientul acesteia în conformitate cu reglementările locale. Se recomandă utilizarea mănușilor.

Utilizator profesionist:

-La sfârșitul tratamentului, aruncați momeala nesigură și recipientul acesteia în conformitate cu reglementările locale.

Utilizatori specializați profesioniști:

La sfârșitul tratamentului, aruncați momeala nesigură și recipientul acesteia în conformitate cu reglementările locale

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Depozitați într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat.

Păstrați recipientul închis și ferit de lumina directă a soarelui.

Expirare: Produsul biocid este stabil timp de 24 de luni.

6. Alte informații

368/5000

Datorită modului de acțiune întârziat, rodenticidele anticoagulante necesită între 4 și 10 zile pentru a acționa după ingerarea momecii.

Rozătoarele pot transporta boala.

Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâinile, nu folosiți mănuși sau ustensile precum penseta pentru a le îndepărta.

Acest produs conține un agent amar și un colorant.