



TERVISEAMET

Unichem d.o.o.
Sinja Gorica 2
SI 1360 Vrhnika
Slovenia

03.10.2022 nr 10.1-5/22/527-1

Eesti riikliku loa EE-2013-0029 muutmine

Terviseamet muudab (NA-AAT: BC-UW080195-99) vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklile 48 biotsiidi **Ratimor pasta bait** riiklikku luba EE-2013-0029 kooskõlas käesoleva otsuse lisas (lisatud) toodud biotsiidi omaduste kokkuvõttega.

Pikendatakse loa kehtivusaega lõppkuupäevaga 01.07.2024.

Biotsiidi kättesaadavaks tegemisel peab järgima Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklite 69 ja 72 nõudeid ja heakskiidetud biotsiidi omaduste kokkuvõtet.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 52 kohaselt on alates otsusest ajapikendus asjaomase biotsiidi olemasolevate varude turul kättesaadavaks tegemiseks 180 päeva ning nende kasutamiseks täiendavalt 180 päeva.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Enda Veskimäe
osakonnajuhataja
kemikaaliohutuse osakond

Lisa: Loa number EE-2013-0029 biotsiidi omaduste kokkuvõte, 20 lehel

ET

LISA

Biotsiidi omaduste kokkuvõte

Ratimor pasta bait

Tooteliik 14. Rodentitsiidid (kahjuritõrje)

Loa number: EE-2013-0029

R4BP registrinumber: EE-0000203-0000

1. HALDUSTEAVE

1.1. Toote kaubanduslik(ud) nimetus(ed)

Kaubanduslik nimetus	Ratimor Bromadioloon Pasta Bromadioloon Pasta
----------------------	--

1.2. Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimi	Unichem d.o.o.
	Aadress	Sinja Gorica 2, SI 1360 Vrhnika Sloveenia
Loa number	EE-2013-0029	
<i>R4BP registrinumber</i>	EE-0000203-0000	
Loa andmise kuupäev	09/04/2013	
Loa kehtivusaja lõppkuupäev	01/07/2024	

1.3. Toote tootja(d)

Tootja nimi	Unichem d.o.o.
Tootja aadress	Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika Sloveenia
Tootmiskohtade asukoht	Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika Sloveenia

1.4. Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine	Bromadioloon
Tootja nimi	Activa Srl
Tootja aadress	Via Feltre 32, 20132 Milan Itaalia
Tootmiskohtade asukoht	Tezza S.r.l via Tre Ponti 22, 37050 S.Maria di Zevio Itaalia

2. TOOTE KOOSTIS JA OLEK

2.1. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave toote koostise kohta

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
Bromadioloon	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Toimeaine	28772-56-7	249-205-9	0,005

2.2. Oleku kirjeldus

RB - Sööt (kasutusvalmis)

3. OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	Võib kahjustada loodet. Kahjustab elundeid (verd) pikaajalisel või korduval kokkupuutel .
Hoiatuslaused	Enne kasutamist tutvuda erijuhistega. Mitte käidelda enne ohutusnõuetega tutvumist ja nendest arusaamist. Pärast käitlemist pesta hoolega käsi. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Kanda kaitsekindaid. Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral:Pöörduda arsti poole. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. Hoida lukustatult. Sisu kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele.

4. LUBATUD KASUTUSALA(D)

4.1. Kasutusala kirjeldus

Tabel 1. Kasutus # 1 – Koduhiired - kutselised kasutajad - siseruumis

Tooteliik	Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Pole kohane rodentitsiididele
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Mus musculus Tavanimetus: Koduhiir Arengustaadium: Täiskasvanud ja Juveniilid
Kasutuskoh	Sisetingimustes Siseruumis
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Kasutamine söödana Üksikasjalik kirjeldus: Kasutusvalmis mürksööt kasutamiseks muukimiskindlas söödamajas.
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: Hiirte leviku korral kasutada kuni 40 g mürksööta söödamaja kohta. Lahjendus (%): 0 Kasutamise arv ja ajastus: Hiirte leviku korral kasutada kuni 40 g mürksööta söödamaja kohta. Kui on vajalik rohkem kui ühe söödamaja kasutamine, tuleb need paigutada teineteisest vähemalt 5 m kaugusele (kui närilisi on väga palju, siis 2 m kaugusele).
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Minimaalne lubatud müügipakend 3 kg. Maksimaalne välise pakendi suurus on kuni 20 kg. Söödavast paberist teekoti pakendid [10 g, 15 g, 20 g] - pakendatud polüetüleenist (PE) või polüpropüleenist (PP) või paberist/polüetüleenist ümbriskotti, mis on pakendatud papist või puitkiust ümbrispakendisse, 3-20 kg - PE- või PP-pakenditesse, 3-20 kg

	<p>- alumiiniumist või lamineeritud PP-st või PET/PE-st kotikestes, papist ümbrispakendiga või ilma, 3-20 kg</p> <p>- jõupaberist kotti, 3-20 kg</p> <p>- kotike (PE-st või PE/PP-st või PP või paberist/PE-st) on pakendatud jõupaberist kotti, 3-20 kg</p> <p>- kaanega PP- või PE-ämbrisse või kanistrisse või kaanega pange või tuubidesse, 3-20 kg</p> <p>- PE-kotiga või voodriga papist või puitkiust karpidesse, 3-20 kg</p> <p>- papist või puitkiust karpidesse, 3-20 kg</p> <p>- eeltäidetud või taastäidetavasse muukimiskindlasse hiire HDPE-st või PP-st söödamajakesse. Söödamajakesed on pakendatud papist välisesse või plastikust kuumakindlasse konteinerisse või termotihendatud kilesse, 3-20 kg</p> <p>- PE-st või PP-st blisterpakendid. Blisterpakendid on pakendatud papist välisesse või plastikust kuumakindlasse konteinerisse või termotihendatud kilesse, 3-20 kg</p> <p>Muud</p> <p>Söödaalus (20 kuni 40 g) kuumakindla kaanega; pakendatud eeltäidetud või taastäidetavasse muukimiskindlasse hiire HDPE-st või PP-st söödamajakesse. Söödamajakesed on pakendatud papist ümbris- või blisterpakendisse või papist ümbrikusse või kuumakindlasse kotti või kuumakindlasse papist kattega ümbrisse, 3 - 10 kg</p> <p>Muud</p> <p>Kuumakindla kaanega või PE-st või PP-st või alumiiniumist kilekleebisega söödaalus (20 kuni 40 g) ning papist ümbrise, 3-10 kg</p> <p>Muud</p> <p>30 g polüetüleenist kile „vorst“ kollageenist või PE-st ümbrises kasutamiseks hiiresööda karpides; pakendatud puitkiust ümbrisse, 3 - 10 kg</p> <p>Muud</p> <p>0.1, 0.15, 0.2 või 0.3 kg mastikstuubid söödapiistoliga pealekandmiseks. Mastikstuubid on pakendatud papist ümbrispakendisse, 3-20 kg</p> <p>Muud</p> <p>Lahtine pasta PP-st või PE-st pakendites, pealekandmiseks dekoorna või -spaatliga, 3-20 kg</p>
--	--

4.1.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

- Söödamajad tuleb tõrjet alustades üle vaadata vähemalt iga kahe-kolme päeva tagant ning edaspidi vähemalt kord nädalas, et kontrollida, kas mürgsööta on puutunud ja söödamajad on kahjustamata, ning eemaldada näriliste laibad. Vajadusel lisada mürgsööta.
- Järgida asjaomase hea tava kohaseid lisajuhiseid.

4.1.2. Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vaata jaotist 5.2

4.1.3. Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

- Söödamajade asetamisel veeäravoolusüsteemide lähedusse tuleb vältida mürgsööda sattumist vette.

4.1.4. Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vaata jaotist 5.4

4.1.5. Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vaata jaotist 5.5

4.2. Kasutusala kirjeldus

Tabel 2. Kasutus # 2 – Rotid - kutselised kasutajad - siseruumis

Tooteliik	Tooteliik 14 - Rodenttsiidid (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Pole kohane rodenttsiididele
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Rattus norvegicus Tavanimetus: Rändrott Arengustaadium: Täiskasvanud ja Juveniilid
Kasutukoht	Sisetingimustes Siseruumis
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Kasutamine söödana Üksikasjalik kirjeldus: Kasutusvalmis mürksööt kasutamiseks muukimiskindlas söödamajas.
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: Rottide leviku korral kasutada kuni 200 g mürksööta söödamaja kohta. Lahjendus (%): 0 Kasutamise arv ja ajastus: Rottide leviku korral kasutada kuni 200 g mürksööta söödamaja kohta. Kui on vajalik rohkem kui ühe söödamaja kasutamine, tuleb need paigutada teineteisest vähemalt 10 m kaugusele (kui närilisi on väga palju, siis 5 m kaugusele).
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Minimaalne lubatud müügipakend 3 kg. Maksimaalne välise pakendi suurus on kuni 20 kg. Söödavast paberist teekoti pakendid [20 g] - pakendatud polüetüleenist (PE) või polüpropüleenist (PP) või paberist/polüetüleenist ümbriskotti, mis on pakendatud papist või puitkiust ümbrispakendisse, 3-20 kg - PE- või PP-pakenditesse, 3-20 kg - alumiiniumist või lamineeritud PP-st või PET/PE-st kotikestesse, papist ümbrispakendiga või ilma, 3-20 kg - jõupaberist kotti, 3-20 kg - kotike (PE-st või PE/PP-st või paberist/PE-st) on pakendatud jõupaberist kotti, 3-20 kg - kaanega PP- või PE-ämbritesse või kanistrisse või kaanega pange või tuubidesse, 3-20 kg - PE-kotiga või voodriga papist või puitkiust karpidesse, 3-20 kg - papist või puitkiust karpidesse, 3-20 kg - eeltäidetud või taastäidetavasse muukimiskindlasse roti HDPE-st või PP-st söödamajakesse. Söödamajakesed on pakendatud papist välisesse või plastikust kuumakindlasse konteinerisse või termotihendatud kilesse, 3-20 kg - PE-st või PP-st blisterpakendid. Blisterpakendid on pakendatud papist välisesse või plastikust kuumakindlasse konteinerisse või termotihendatud kilesse, 3-20 kg

	<p>Muud Söödaalus (20 kuni 200 g) kuumakindla kaanega; pakendatud eeltäidetud või taastäidetavasse muukimiskindlasse roti HDPE-st või PP-st söödamajakesse. Söödamajakased on pakendatud papist ümbris- või blisterpakendisse või papist ümbrikusse või kuumakindlasse kotti või kuumakindlasse papist kattega ümbrisesse, 3-10 kg</p> <p>Muud Kuumakindla kaanega või PE-st või PP-st või alumiiniumist kilekleebisega söödaalus (20 kuni 200 g) ning papist ümbrise, 3-10 kg</p> <p>Muud 200 g polüetüleenist kile „vorst“ kollageenist või PE-st ümbrises kasutamiseks rotisööda karpides; pakendatud puitkiust ümbrisesse, 3-10 kg</p> <p>Muud 0.1, 0.15, 0.2 või 0.3 kg mastikstuubid söödapüstoliga pealekandmiseks. Mastikstuubid on pakendatud papist ümbrispakendisse, 3-20 kg</p> <p>Muud Lahtine pasta PP-st või PE-st pakendites, pealekandmiseks dekoornoa või -spaatliga, 3-20 kg</p>
--	--

4.2.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

- Söödamajad tuleb tõrjet alustades üle vaadata alles 5-7 päeva möödudes ning edaspidi vähemalt kord nädalas, et kontrollida, kas mürgsööta on puutunud ja söödamajad on kahjustamata, ning eemaldada näriliste laibad. Vajadusel lisada mürgsööta.
- Järgida asjaomase hea tava kohaseid lisajuhiseid.

4.2.2. Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vaata jaotist 5.2

4.2.3. Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

- Söödamajade asetamisel veeäravoolusüsteemide lähedusse tuleb vältida mürgsööda sattumist vette.

4.2.4. Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vaata jaotist 5.4

4.2.5. Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vaata jaotist 5.5

4.3. Kasutusala kirjeldus

Tabel 3. Kasutus # 3 – Koduhiired ja/või rotid - kutselised kasutajad - väliskeskkonnas hoonete ümber

Tooteliik	Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Pole kohane rodentitsiididele
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	<p>Teaduslik nimetus: Mus musculus Tavanimetus: Koduhiir Arengustaadium: Täiskasvanud ja Juveniilid</p> <p>Teaduslik nimetus: Rattus norvegicus Tavanimetus: Rändrott Arengustaadium: Täiskasvanud ja Juveniilid</p>

Kasutuskoh	Välitingimustes Väliskeskkonnas hoonete ümber
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Kasutamine söödana Üksikasjalik kirjeldus: Kasutusvalmis mürksööt kasutamiseks muukimiskindlas söödama
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: Hiirte leviku korral kasutada kuni 40 g mürksööt söödama kohta. Rottide leviku korral kasutada kuni 200 g mürksööt söödama kohta. Lahjendus (%): 0 Kasutamise arv ja ajastus: Hiirte leviku korral kasutada kuni 40 g mürksööt söödama kohta. Kui on vajalik rohkem kui ühe söödama kasutamine, tuleb need paigutada teineteisest vähemalt 5 m kaugusele (kui närilisi on väga palju, siis 2 m kaugusele). Rottide leviku korral kasutada kuni 200 g mürksööt söödama kohta. Kui on vajalik rohkem kui ühe söödama kasutamine, tuleb need paigutada teineteisest vähemalt 10 m kaugusele (kui närilisi on väga palju, siis 5 m kaugusele).
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Minimaalne lubatud müügipakend 3 kg. Maksimaalne välise pakendi suurus on kuni 20 kg. Söödavast paberist teekoti pakendid [hiire: 10 g, 15, 20 g või roti: 20 g] - pakendatud polüetüleenist (PE) või polüpropüleenist (PP) või paberist/polüetüleenist ümbriskotti, mis on pakendatud papist või puitkiust ümbrispakendisse, 3-20 kg - PE- või PP-pakenditesse, 3-20 kg - alumiiniumist või lamineeritud PP-st või PET/PE-st kotikesse, papist ümbrispakendiga või ilma, 3-20 kg - jõupaberist kotti, 3-20 kg - kotike (PE-st või PE/PP-st või paberist/PE-st) on pakendatud jõupaberist kotti, 3-20 kg - kaanega PP- või PE-ämbritesse või kanistrisse või kaanega pange või tuubidesse, 3-20 kg - PE-kotiga või voodriga papist või puitkiust karpidesse, 3-20 kg - papist või puitkiust karpidesse, 3-20 kg - eeltäidetud või taastäidetavasse muukimiskindlasse roti või hiire HDPE-st või PP-st söödama jakesse. Söödamajakesed on pakendatud papist välisesse või plastikust kuumakindlasse konteinerisse või termotihendatud kilesse, 3-20 kg - PE-st või PP-st blisterpakendid. Blisterpakendid on pakendatud papist välisesse või plastikust kuumakindlasse konteinerisse või termotihendatud kilesse, 3-20 kg Muud Söödaalus (20 kuni 200 g) kuumakindla kaanega; pakendatud eeltäidetud või taastäidetavasse muukimiskindlasse roti või hiire HDPE-st või PP-st söödama jakesse. Söödamajakesed on pakendatud papist ümbris- või blisterpakendisse või papist ümbrikusse või kuumakindlasse kotti või kuumakindlasse papist kattega ümbrisesse, 3-10 kg

	<p>Muud Kuumakindla kaanega või PE-st või PP-st või alumiiniumist kilekleebisega söödaalus (20 kuni 200 g) ning papist ümbrisega, 3-10 kg</p> <p>Muud 30 g polüetüleenist kile „vorst“ kollageenist või PE-st ümbrises kasutamiseks hiiresööda karpides; pakendatud puitkiust ümbrisesse, 3-10 kg</p> <p>Muud 200 g polüetüleenist kile „vorst“ kollageenist või PE-st ümbrises kasutamiseks rotisööda karpides; pakendatud puitkiust ümbrisesse, 3-10 kg</p> <p>Muud 0.1, 0.15, 0.2 või 0.3 kg mastikstuubid söödapüstoliga pealekandmiseks. Mastikstuubid on pakendatud papist ümbrispakendisse, 3-20 kg</p> <p>Muud Lahtine pasta PP-st või PE-st pakendites, pealekandmiseks dekoornoa või -spaatliga, 3-20 kg</p>
--	--

4.3.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

- Kaitsta mürgsööta ilmastikuolude (nt vihm, lumi jne) eest. Asetada söödamajad kohtadesse, kus ei teki üleujutust.
- Söödamajad tuleb tõrjet alustades üle vaadata [hiirte puhul – vähemalt iga kahe-kolme päeva tagant] [rottide puhul – alles viie kuni seitsme päeva möödumisel] ning edaspidi vähemalt kord nädalas, et kontrollida, kas mürgsööta on kasutatud ja söödamajad on kahjustamata, ning eemaldada näriliste laibad. Vajadusel lisada mürgsööta.
- Vahetada söödamajas olev mürgsööt välja, kui see on saanud veekahjustusi või saastunud mustuse tõttu.
- Järgida asjaomase hea tava kohaseid lisajuhiseid.

4.3.2. Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

- Mitte asetada toodet otse urgu.

4.3.3. Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

- Söödamajade asetamisel veekogude (nt jõed, tiigid, veekanalid, tammid, niisutuskraavid) või veeäravoolusüsteemide lähedusse tuleb vältida mürgsööda sattumist vette.

4.3.4. Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vaata jaotist 5.4

4.3.5. Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vaata jaotist 5.5

4.4. Kasutusala kirjeldus

Tabel 4. Kasutus # 4 – Koduhiired ja/või rotid - kahjuritõrjujad - siseruumis

Tooteliik	Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Pole kohane rodentitsiididele
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	<p>Teaduslik nimetus: Mus musculus Tavanimetus: Koduhiir Arengustaadium: Täiskasvanud ja Juveniilid</p> <p>Teaduslik nimetus: Rattus norvegicus Tavanimetus: Rändrott</p>

	Arengustaadium: Täiskasvanud ja Juveniilid
Kasutuskoht	Sisetingimustes Siseruumis
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Kasutamine söödana Üksikasjalik kirjeldus: <ul style="list-style-type: none"> • Kasutusvalmis mürksööt kasutamiseks muukimiskindlas söödajas. • Kaetud ja kaitstud söödakohad.
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: Hiirte leviku korral kasutada kuni 40 g mürksööt söödaja kohta. Rottide leviku korral kasutada kuni 200 g mürksööt söödaja kohta. Lahjendus (%): 0 Kasutamise arv ja ajastus: Hiirte leviku korral kasutada kuni 40 g mürksööt söödaja kohta. Kui on vajalik rohkem kui ühe söödaja kasutamine, tuleb need paigutada teineteisest vähemalt 5 m kaugusele (kui närilisi on väga palju, siis 2 m kaugusele). Rottide leviku korral kasutada kuni 200 g mürksööt söödaja kohta. Kui on vajalik rohkem kui ühe söödaja kasutamine, tuleb need paigutada teineteisest vähemalt 10 m kaugusele (kui närilisi on väga palju, siis 5 m kaugusele).
Kasutajarühm(ad)	Väljaõppe saanud kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Minimaalne lubatud müügipakend 3 kg. Maksimaalne välise pakendi suurus on kuni 20 kg. Söödavast paberist teekoti pakendid [hiire: 10 g, 15g, 20 g või roti: 20 g] - pakendatud polüetüleenist (PE) või polüpropüleenist (PP) või paberist/polüetüleenist ümbriskotti, mis on pakendatud papist või puitkiust ümbrispakendisse, 3-20 kg - PE- või PP-pakenditesse, 3-20 kg - alumiiniumist või lamineeritud PP-st või PET/PE-st kotikesesse, papist ümbrispakendiga või ilma, 3-20 kg - jõupaberist kotti, 3-20 kg - kotike (PE-st või PE/PP-st või paberist/PE-st) on pakendatud jõupaberist kotti, 3-20 kg - kaanega PP- või PE-ämbritesse või kanistrisse või kaanega pange või tuubidesse, 3-20 kg - PE-kotiga või voodriga papist või puitkiust karpidesse, 3-20 kg - papist või puitkiust karpidesse, 3-20 kg - eeltäidetud või taastäidetavasse muukimiskindlasse roti või hiire HDPE-st või PP-st söödajakesse. Söödamajakesed on pakendatud papist välisesse või plastikust kuumakindlasse konteinerisse või termotihendatud kilesse, 3-20 kg - PE-st või PP-st blisterpakendid. Blisterpakendid on pakendatud papist välisesse või plastikust kuumakindlasse konteinerisse või termotihendatud kilesse, 3-20 kg Muud Söödaalus (20 kuni 200 g) kuumakindla kaanega; pakendatud eeltäidetud või taastäidetavasse muukimiskindlasse roti või hiire HDPE-st või PP-st söödajakesse. Söödamajakesed on pakendatud papist ümbris- või blisterpakendisse või papist ümbrikusse või kuumakindlasse kotti või

	kuumakindlasse papist kattega ümbrisesse, 3-10 kg
	Muud Kuumakindla kaanega või PE-st või PP-st või alumiiniumist kilekleebisega söödaalus (20 kuni 200 g) ning papist ümbris, 3-10 kg
	Muud 30 g polüetüleenist kile „vorst“ kollageenist või PE-st ümbrises kasutamiseks hiiresööda karpides; pakendatud puitkiust ümbrisesse, 3-10 kg
	Muud 200 g polüetüleenist kile „vorst“ kollageenist või PE-st ümbrises kasutamiseks rotisööda karpides; pakendatud puitkiust ümbrisesse, 3-10 kg
	Muud 0.1, 0.15, 0.2 või 0.3 kg mastikstuubid söödapüstoliga pealekandmiseks. Mastikstuubid on pakendatud papist ümbrispakendisse, 3-20 kg
	Muud Lahtine pasta PP-st või PE-st pakendites, pealekandmiseks dekoornoa või -spaatliga, 3-20 kg

4.4.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

- Eemaldada kasutamata mürksööt tõrje lõpus.
- Järgida asjaomase hea tava kohaseid lisajuhiseid.

4.4.2. Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

- Võimaluse korral teavitada enne tõrje alustamist võimalikke kõrvalisi isikuid (nt tõrjeala ja ümbruse kasutajaid) kahjuritõrjest [kooskõlas kehtiva hea tavaga, kui see on olemas].
- Kasutada ennetavaid tõrjemeetmeid (avade sulgemine, kättesaadava toidu ja joogi eemaldamine võimalikult suures ulatuses), et suurendada toote tarvitamist ja vähendada sissetungi kordumise tõenäosust.
- Teisese mürgistuse ohu vähendamiseks otsida ja eemaldada surnud närilised tõrjel kindla aja tagant kooskõlas asjaomase hea tava kohaste soovitusetega.

• Mitte kasutada toodet pidevalt väljapandava mürksöödana näriliste leviku ennetamiseks või nende elutegevuse jälgimiseks.

• Mitte kasutada toodet perioodiliselt väljapandava mürksöödana.

4.4.3. Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

- Söödamajade asetamisel veeäravoolusüsteemide lähedusse tuleb vältida mürksööda sattumist vette.

4.4.4. Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vaata jaotist 5.4

4.4.5. Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vaata jaotist 5.5

4.5. Kasutusala kirjeldus

Tabel 5. Kasutus # 5 – Hiired ja/või rotid - kahjuritõrjujad - väliskeskkonnas hoonete ümber

Tooteliik	Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Pole kohane rodentitsiididele
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	<p>Teaduslik nimetus: <i>Mus musculus</i> Tavanimetus: Koduhiir Arengustaadium: Täiskasvanud ja Juveniilid</p> <p>Teaduslik nimetus: <i>Rattus norvegicus</i> Tavanimetus: Rändrott Arengustaadium: Täiskasvanud ja Juveniilid</p>
Kasutuskohat	Välitingimustes Väliskeskkonnas hoonete ümber
Kasutusmeetod(id)	<p>Meetod: Kasutamine söödana</p> <p>Üksikasjalik kirjeldus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kasutusvalmis mürksööt kasutamiseks muukimiskindlas söödajas. • Kaetud ja kaitstud söödakohad.
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	<p>Kasutusmäär: Hiirte leviku korral kasutada kuni 40 g mürksööt söödaja kohta. Rottide leviku korral kasutada kuni 200 g mürksööt söödaja kohta.</p> <p>Lahjendus (%): 0</p> <p>Kasutamise arv ja ajastus: Hiirte leviku korral kasutada kuni 40 g mürksööt söödaja kohta. Kui on vajalik rohkem kui ühe söödaja kasutamine, tuleb need paigutada teineteisest vähemalt 5 m kaugusele (kui närilisi on väga palju, siis 2 m kaugusele). Rottide leviku korral kasutada kuni 200 g mürksööt söödaja kohta. Kui on vajalik rohkem kui ühe söödaja kasutamine, tuleb need paigutada teineteisest vähemalt 10 m kaugusele (kui närilisi on väga palju, siis 5 m kaugusele).</p>
Kasutajarühm(ad)	Väljaõppe saanud kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	<p>Minimaalne lubatud müügipakend 3 kg. Maksimaalne välise pakendi suurus on kuni 20 kg.</p> <p>Söödavast paberist teekoti pakendid [hiire: 10 g, 15g, 20 g või roti: 20 g] - pakendatud polüetüleenist (PE) või polüpropüleenist (PP) või paberist/polüetüleenist ümbriskotti, mis on pakendatud papist või puitkiust ümbrispakendisse, 3-20 kg - PE- või PP-pakenditesse, 3-20 kg - alumiiniumist või lamineeritud PP-st või PET/PE-st kotikestesse, papist ümbrispakendiga või ilma, 3-20 kg - jõupaberist kotti, 3-20 kg - kotike (PE-st või PE/PP-st või paberist/PE-st) on pakendatud jõupaberist kotti, 3-20 kg - kaanega PP- või PE-ämbritesse või kanistrisse või kaanega pange või tuubidesse, 3 - 20 kg - PE-kotiga või voodriga papist või puitkiust karpidesse, 3-20 kg - papist või puitkiust karpidesse, 3-20 kg - eeltäidetud või taastäidetavasse muukimiskindlasse roti või hiire HDPE-st</p>

	<p>või PP-st söödamajakesse. Söödamajakesed on pakendatud papist välisesse või plastikust kuumakindlasse konteinerisse või termotihendatud kilesse, 3-20 kg</p> <p>- PE-st või PP-st blisterpakendid. Blisterpakendid on pakendatud papist välisesse või plastikust kuumakindlasse konteinerisse või termotihendatud kilesse, 3-20 kg</p> <p>Muud Söödaalus (20 kuni 200 g) kuumakindla kaanega; pakendatud eeltäidetud või taastäidetavasse muukimiskindlasse roti või hiire HDPE-st või PP-st söödamajakesse. Söödamajakesed on pakendatud papist ümbris- või blisterpakendisse või papist ümbrikusse või kuumakindlasse kotti või kuumakindlasse papist kattega ümbrisesse, 3-10 kg</p> <p>Muud Kuumakindla kaanega või PE-st või PP-st või alumiiniumist kilekleebisega söödaalus (20 kuni 200 g) ning papist ümbris, 3-10 kg</p> <p>Muud 30 g polüetüleenist kile „vorst“ kollageenist või PE-st ümbrises kasutamiseks hiiresööda karpides; pakendatud puitkiust ümbrisesse, 3-10 kg</p> <p>Muud 200 g polüetüleenist kile „vorst“ kollageenist või PE-st ümbrises kasutamiseks rotisööda karpides; pakendatud puitkiust ümbrisesse, 3-10 kg</p> <p>Muud 0.1, 0.15, 0.2 või 0.3 kg mastikstuubid söödapüstoliga pealekandmiseks. Mastikstuubid on pakendatud papist ümbrispakendisse, 3-20 kg</p> <p>Muud Lahtine pasta PP-st või PE-st pakendites, pealekandmiseks dekoornoa või -spaatliga, 3-20 kg</p>
--	--

4.5.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

- Kaitsta mürgsööta ilmastikuolude eest. Asetada söödamajad kohtadesse, kus ei teki üleujutust.
- Vahetada söödamajas olev mürgsööt välja, kui see on saanud veekahjustusi või saastunud mustuse tõttu.
- Eemaldada kasutamata mürgsööt tõrje lõpus.
- Järgida asjaomase hea tava kohaseid lisajuhiseid.
- Väliskeskkonnas kasutamisel katta ja asetada söödakohad strateegilistesse kohtadesse, et vähendada kokkupuudet mitte sihtloomadega.

4.5.2. Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

- Võimaluse korral teavitada enne tõrje alustamist võimalikke kõrvalisi isikuid (nt tõrjeala ja ümbruse kasutajaid) kahjuritõrjest [kooskõlas kehtiva hea tavaga, kui see on olemas].
- Kasutada ennetavaid tõrjemeetmeid (avade sulgemine, kättesaadava toidu ja joogi eemaldamine võimalikult suures ulatuses), et suurendada toote tarvitamist ja vähendada sissetungi kordumise tõenäosust.
- Teise mürgistuse ohu vähendamiseks otsida ja eemaldada surnud närilised tõrjel kindla aja tagant kooskõlas asjaomase hea tava kohaste soovitusetega.
- Mitte kasutada toodet pidevalt väljapandava mürgsöödana näriliste leviku ennetamiseks ja nende elutegevuse jälgimiseks.
- Mitte kasutada toodet perioodiliselt väljapandava mürgsöödana.
- Mitte asetada toodet otse urgu.

4.5.3. Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed

hädaolukorras.

• Söödamajade asetamisel veekogude (nt jõed, tiigid, veekanalid, tammid, niisutuskraavid) või veeärravoolusüsteemide lähedusse tuleb vältida mürgsööda sattumist vette.

4.5.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaata jaotist 5.4

4.5.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vaata jaotist 5.5

4.6. Kasutusala kirjeldus

Tabel 6. Kasutus # 6 – Rotid - kahjuritõrjujad - väliskeskkonnas avatud aladel ja prügilates

Tooteliik	Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Pole kohane rodentitsiididele
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Rattus norvegicus Tavanimetus: Rändrott Arengustaadium: Täiskasvanud ja Juveniilid
Kasutuskohat	Välistingimustes Väliskeskkonnas asuvad avatud alad Väliskeskkonnas asuvad prügilad
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Kasutamine söödana Üksikasjalik kirjeldus: • Kasutusvalmis mürgsööta kasutamiseks muukimiskindlas söödamajas. • Kaetud ja kaitstud söödakohad.
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: Rottide leviku korral kasutada kuni 200 g mürgsööta söödamaja kohta. Lahjendus (%): 0 Kasutamise arv ja ajastus: Rottide leviku korral kasutada kuni 200 g mürgsööta söödamaja kohta. Kui on vajalik rohkem kui ühe söödamaja kasutamine, tuleb need paigutada teineteisest vähemalt 10 m kaugusele (kui närilisi on väga palju, siis 5 m kaugusele).
Kasutajarühm(ad)	Väljaõppe saanud kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Minimaalne lubatud müügipakend 3 kg. Maksimaalne välise pakendi suurus on kuni 20 kg. Söödavast paberist teekoti pakendid [20 g] - pakendatud polüetüleenist (PE) või polüpropüleenist (PP) või paberist/polüetüleenist ümbriskotti, mis on pakendatud papist või puitkiust ümbrispakendisse, 3-20 kg

	<p>- PE- või PP-pakenditesse, 3-20 kg</p> <p>- alumiiniumist või lamineeritud PP-st või PET/PE-st kotikestesse, papist ümbri pakendiga või ilma, 3-20 kg</p> <p>- jõupaberist kotti, 3-20 kg</p> <p>- kotike (PE-st või PE/PP-st või paberist/PE-st) on pakendatud jõupaberist kotti, 3-20 kg</p> <p>- kaanega PP- või PE-ämbritesse või kanistrisse või kaanega pange või tuubidesse, 3-20 kg</p> <p>- PE-kotiga või voodriga papist või puitkiust karpidesse, 3-20 kg</p> <p>- papist või puitkiust karpidesse, 3-20 kg</p> <p>- eeltäidetud või taastäidetavasse muukimiskindlasse roti HDPE-st või PP-st söödamajakesse. Söödamajakesed on pakendatud papist välisesse või plastikust kuumakindlasse konteinerisse või termotihendatud kilesse, 3-20 kg</p> <p>- PE-st või PP-st blisterpakendid. Blisterpakendid on pakendatud papist välisesse või plastikust kuumakindlasse konteinerisse või termotihendatud kilesse, 3-20 kg</p> <p>Muud</p> <p>PP-st, PE-st või PET-ist söödaalus (20 kuni 200 g) kuumakindla kaanega; pakendatud eeltäidetud või taastäidetavasse muukimiskindlasse roti HDPE-st või PP-st söödamajakesse. Söödamajakesed on pakendatud papist ümbri- või blisterpakendisse või papist ümbrikusse või kuumakindlasse kotti või kuumakindlasse papist kattega ümbri- ssesse, 3-10 kg</p> <p>Muud</p> <p>Kuumakindla kaanega või PE-st või PP-st või alumiiniumist kilekleebisega söödaalus (20 kuni 200 g) ning papist ümbri- ssesse, 3-10 kg</p> <p>Muud</p> <p>200 g polüetüleenist kile „vorst“ kollageenist või PE-st ümbri- ssesse kasutamiseks rotisööda karpides; pakendatud puitkiust ümbri- ssesse, 3-10 kg</p> <p>Muud</p> <p>0.1, 0.15, 0.2 või 0.3 kg mastikstuubid söödapiistoliga pealekandmiseks. Mastikstuubid on pakendatud papist ümbri- ssesse, 3-20 kg</p> <p>Muud</p> <p>Lahtine pasta PP-st või PE-st pakendites, pealekandmiseks dekoorna või -spaatliga, 3-20 kg</p>
--	---

4.6.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

- Kaitsta mürksööta ilmastikuolude eest. Asetada söödamajad kohtadesse, kus ei teki üleujutust.
- Vahetada söödamajas olev mürksööt välja, kui see on saanud veekahjustusi või saastunud mustuse tõttu.
- Eemaldada kasutamata mürksööt tõrje lõpus.
- Järgida asjaomase hea tava kohaseid lisajuhiseid.
- Väliskeskkonnas kasutamisel katta ja asetada söödakohad strateegilistesse kohtadesse, et vähendada kokkupuudet mitte sihtloomadega.

4.6.2. Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

- Võimaluse korral teavitada enne tõrje alustamist võimalikke kõrvalisi isikuid (nt tõrjeala ja ümbri- ssesse kasutajaid) kahjuritõrjest [kooskõlas kehtiva hea tavaga, kui see on olemas].
- Teisese mürgistuse ohu vähendamiseks otsida ja eemaldada surnud närilised tõrjel kindla aja tagant kooskõlas asjaomase hea tava kohaste soovitusetega.
- Mitte kasutada toodet pidevalt väljapandava mürksöödana näriliste leviku ennetamiseks ja nende elutegevuse jälgimiseks.
- Mitte kasutada toodet perioodiliselt väljapandava mürksöödana.

- Mitte asetada toodet otse urgu.

4.6.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

- Söödamajade asetamisel veekogude (nt jõed, tiigid, veekanalid, tammid, niisutuskraavid) või veeäravoolusüsteemide lähedusse tuleb vältida mürgsööda sattumist vette.

4.6.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaata jaotist 5.4

4.6.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vaata jaotist 5.5

4.7. Kasutusala kirjeldus

Tabel 7. Kasutus # 7 – Rotid - kahjuritõrjujad - kanalisatsioon

Tooteliik	Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Pole kohane rodentitsiididele
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Rattus norvegicus Tavanimetus: Rändrott Arengustaadium: Täiskasvanud ja Juveniilid
Kasutuskohat	Kanalisatsioon
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Kasutamine söödana Üksikasjalik kirjeldus: • Kasutusvalmis mürgsööt kinnitada või asetada söödamajadesse nii, et see ei puutuks reoveega kokku. • Kaetud ja kaitstud söödakohad.
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: Rottide leviku korral kanalisatsioonis kasutada kuni 200 g mürgsööta kanalisatsioonikaevu kohta. Lahjendus (%): 0

	<p>Kasutamise arv ja ajastus: Rottide leviku korral kanalisatsioonis kasutada kuni 200 g mürksööta kanalisatsioonikaevu kohta. Rohke arvukuste korral kasutage 200 g mürksööta kanalisatsioonikaevu kohta.</p>
Kasutajarühm(ad)	Väljaõppe saanud kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	<p>Minimaalne lubatud müügipakend 3 kg. Maksimaalne välise pakendi suurus on kuni 20 kg.</p> <p>Söödavast paberist teekoti pakendid [20 g] - pakendatud polüetüleenist (PE) või polüpropüleenist (PP) või paberist/polüetüleenist ümbriskotti, mis on pakendatud papist või puitkiust ümbrispakendisse, 3-20 kg - PE- või PP-pakenditesse, 3-20 kg - alumiiniumist või lamineeritud PP-st või PET/PE-st kotikestesse, papist ümbrispakendiga või ilma, 3-20 kg - jõupaberist kotti, 3-20 kg - kotike (PE-st või PE/PP-st või paberist/PE-st) on pakendatud jõupaberist kotti, 3-20 kg - kaanega PP- või PE-ämbritesse või kanistrisse või kaanega pange või tuubidesse, 3-20 kg - PE-kotiga või voodriga papist või puitkiust karpidesse, 3-20 kg - papist või puitkiust karpidesse, 3-20 kg - eeltäidetud või taastäidetavasse muukimiskindlasse roti HDPE-st või PP-st söödamajakesse. Söödamajakesed on pakendatud papist välisesse või plastikust kuumakindlasse konteinerisse või termotihendatud kilesse, 3-20 kg - PE-st või PP-st blisterpakendid. Blisterpakendid on pakendatud papist välisesse või plastikust kuumakindlasse konteinerisse või termotihendatud kilesse, 3-20 kg</p> <p>Muud Söödaalus (20 kuni 200 g) kuumakindla kaanega; pakendatud eeltäidetud või taastäidetavasse muukimiskindlasse roti HDPE-st või PP-st söödamajakesse. Söödamajakesed on pakendatud papist ümbris- või blisterpakendisse või papist ümbrikusse või kuumakindlasse kotti või kuumakindlasse papist katttega ümbrisesse, 3-10 kg</p> <p>Muud Kuumakindla kaanega või PE-st või PP-st või alumiiniumist kilekleebisega söödaalus (20 kuni 200 g) ning papist ümbrisega, 3-10 kg</p> <p>Muud 200 g polüetüleenist kile „vorst“ kollageenist või PE-st ümbrises kasutamiseks rotisööda karpides; pakendatud puitkiust ümbrisesse, 3-10 kg</p> <p>Muud 0.1, 0.15, 0.2 või 0.3 kg mastikstuubid söödapüstoligaga pealekandmiseks. Mastikstuubid on pakendatud papist ümbrispakendisse, 3-20 kg</p> <p>Muud Lahtine pasta PP-st või PE-st pakendites, pealekandmiseks dekoornoa või -spaatliga, 3-20 kg</p>

4.7.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

- Mürksööt paigutada nii, et see ei puutuks kokku veega ega sedauhutaks minema.
- Järgida asjaomase hea tava kohaseid lisajuhiseid.

4.7.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

- Asetada mürksööt ainult sellistesse kanalisatsioonisüsteemidesse, mis on ühendatud reoveepuhastiga.
- Mitte kasutada toodet perioodiliselt väljapandava mürksöödana.

4.7.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vaata jaotist 5.3

4.7.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaata jaotist 5.4

4.7.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vaata jaotist 5.5

5. ÜLDISED KASUTAMISJUHISED¹

5.1. Kasutusjuhendid

Kutselised kasutajad:

- Enne kasutamist lugeda tooteinfot ja muud tootele lisatud või müügikohas antud teavet ning järgida seda.
- Enne kahjuritõrje alustamist uurida levikuala ja läbi viia kontroll, et määrata kindlaks näriliste liigid, nende elutegevuse kohad ning leviku tõenäoline põhjus ja ulatus.
- Eemaldada närilistele kättesaadav toit (nt mahapudenenu vilid või toidujäätmed). Kui eelnev väljaarvata, mitte puhastada levikuala vahetult enne tõrje tegemist, sest see häirib näriliste populatsiooni ja vähendab mürksööda atraktiivsust.
- Toodet tuleb kasutada ainult osana integreeritud kahjuritõrje programmist (IPM), kuhu kuuluvad muu hulgas hügieenimeetmed ja võimaluse korral füüsilised ohjemeetmed.
- Võtta kasutusele ennetavad tõrjemeetmed (sulgeda avad, eemaldada kättesaadav toit ja jook võimalikult suures ulatuses), et suurendada toote tarvitamist ja vähendada sissetungi kordumise tõenäosust.
- Söödamajad tuleb paigutada nende kohtade vahetuslähedusse, kus on märgatud näriliste elutegevust (nt liikumisteed, pesitsuskohad, söödaplatsid, augud, urud jne).
- Võimaluse korral tuleb söödamajad kinnitada maapinnale või konstruktsioonide külge.
- Söödamajad tuleb selgelt märgistada, et oleks selge, et need sisaldavad näriliste tõrjevahendit ning neid ei tohi liigutada ega avada (vt jaotis 5.3 etiketile märgitava teabe kohta).
- Kui toodet kasutatakse avalikes kohtades, tuleb tõrjealad tõrjeks märgistada ning mürksöötade juurde tuleb paigaldada teave antikoagulandist tingitud esmase või teise mürgistuse ohu kohta ja kirjeldada mürgistuse korral võetavaid esmaabimeetmeid.
- Mürksööt tuleb kinnitada nii, et seda ei saaks söödamajast eemaldada.
- Asetada toode lastele, lindudele, lemmikloomadele, kodu- ja muudele mitte sihtloomadele kättesaamatusse kohta.
- Asetada toode eemale toidust, joogist ja loomasöödast, samuti nendega kokkupuutuvatest nõudest või pindadest.
- Kanda toote käitlemisel kemikaalikindlaid kaitsekindaid (EN 374).
- Toodet käitlemisel mitte süüa, juua ega suitsetada. Peale toote käitlemist pesta käed ja otseselt kokku puutunud nahapind.
- Kui mürksööta tarvitatakse vähe võrreldes näriliste arvukusega, kaaluda söödamajade ümberpaigutamist ja võimalust vahetada mürksööt teise koostisega mürksööda vastu.
- Kui pärast 35 päevase tõrje möödumist jätkub mürksööda kasutamine ning näriliste tegevuse vähenemist ei ole märgata, tuleb kindlaks teha selle tõenäoline põhjus. Kui muud põhjused on välistatud, on tõenäoline, et närilised on resistentsed, mistõttu tuleb kaaluda mitte-antikoagulantse rodentitsiidi või mõne teise antikoagulantse toimega rodentitsiidi kasutamist. Samuti kaaluda alternatiivse ohjemeetmena lõksude kasutamist.
- Eemaldada tõrje lõppemisel kasutamata mürksööt või söödamajad.
- Kasutusjuhised vastavalt mürksööda vormile:
 - Mittetühjendatavate kotikeste korral: Mitte avada mürksööta sisaldavaid kotikesi.
 - Pasta: Asetada mürksöödapasta oma kohale piisavalt pika aplikaatori (spaatli) abil, et vähendada kätega kokkupuudet - vältida käe kokkupuudet ämbriga. Puhastada vahendeid (nt spaatlit) paberrätikuga või niiske lapiga. Kasutada spaatlit mürksöödast puhastamiseks / mürksöödast kõrvaldamiseks.

¹ Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutamisharjumused kehtivad iga lubatud kasutuse puhul.

Kahjuritõrjujad:

- Enne kasutamist lugeda tooteinfot ja muud tootele lisatud või müügikohas antud teavet ning järgida seda.
- Enne kahjuritõrje alustamist uurida levikuala ja läbi viia kontroll, et määrata kindlaks näriliste liigid, nende elutegevuse kohad ning leviku tõenäoline põhjus ja ulatus.
- Eemaldada närilistele kättesaadav toit (nt mahapudenenu vilid või toidujäätmed). Kui eelnev väljaarvata, mitte puhastada levikuala vahetult enne tõrje tegemist, sest see häirib näriliste populatsiooni ja vähendab mürksööda atraktiivsust.
- Toodet tuleb kasutada ainult osana integreeritud kahjuritõrje programmist (IPM), kuhu kuuluvad muu hulgas hügieenimeetmed ja võimaluse korral füüsilised ohjemeetmed.
- Toode tuleb paigutada nende kohtade vahetuslähedusse, kus on märgatud näriliste elutegevust (nt liikumisteed, pesitsuskohad, söödaplatsid, augud, urud jne).
- Võimaluse korral tuleb söödamajad kinnitada maapinnale või konstruktsioonide külge.
- Söödamajad tuleb selgelt märgistada, et oleks selge, et need sisaldavad näriliste tõrjevahendit ning neid ei tohi liigutada ega avada (vt jaotis 5.3 etiketile märgitava teabe kohta).
- Kui toodet kasutatakse avalikes kohtades, tuleb tõrjealad tõrjeks märgistada ning mürksöötade juurde tuleb paigaldada teave antikoagulantist tingitud esmase või teise mürgistuse ohu kohta ja kirjeldada mürgistuse korral võetavaid esmaabimeetmeid.
- Mürksööt tuleb kinnitada nii, et seda ei saaks söödamajast eemaldada.
- Asetada toode lastele, lindudele, lemmikloomadele, kodu- ja muudele mitte sihtloomadele kättesaamatusse kohta.
- Asetada toode eemale toidust, joogist ja loomasöödast, samuti nendega kokkupuutuvatest nõudest või pindadest.
- Kanda toote käitlemisel kemikaalikindlaid kaitsekindaid (EN 374).
- Toote käitlemisel mitte süüa, juua ega suitsetada. Peale toote käitlemist pesta käed ja otseselt kokku puutunud nahapind.
- Tõrjealale mineku sageduse otsustab töötleja vastavalt tõrje alguses tehtud uurimisele. See sagedus peab vastama asjaomase hea tava kohastele soovitudele.
- Kui mürksööta tarvitatakse vähe võrreldes arvukusega, kaaluda söödamajade ümberpaigutamist ja võimalust vahetada mürksööt teise koostisega mürksööda vastu.
- Kui pärast 35 päevase tõrje möödumist jätkub mürksööda tarvitamine ning näriliste tegevuse vähenemist ei ole märgata, tuleb kindlaks teha selle tõenäoline põhjus. Kui muud põhjused on välistatud, on tõenäoline, et närilised on resistentsed, mistõttu tuleb kaaluda mitte-antikoagulantse rodentitsiidi või mõne teise antikoagulantse toimega rodentitsiidi kasutamist. Samuti kaaluda alternatiivse ohjemeetmena lõksude kasutamist.
- Kasutusjuhised vastavalt mürksööda vormile:
 - Mittetühjendatavate kotikeste korral - Mitte avada mürksööta sisaldavaid kotikesi.
 - Pasta: Asetada mürksöödapasta oma kohale piisavalt pika aplikaatori (spaatli) abil, et vähendada kätega kokkupuudet
 - vältida käe kokkupuudet ämbriga. Puhastada vahendeid (nt spaatlit) paberrätikuga või niiske lapiga. Kasutada spaatlit mürksöödast puhastamiseks / mürksööda kõrvalamiseks.

5.2. Riskivähendamismeetmed

Kutselised kasutajad:

- Võimaluse korral teavitada enne tõrje alustamist võimalikke kõrvalisi isikuid (nt tõrjeala ja ümbruse kasutajaid) kahjuritõrjest [kooskõlas kehtiva hea tavaga, kui see on olemas].
- Teise mürgistuse ohu vähendamiseks otsida ja eemaldada surnud närilised tõrjel kindla aja tagant (nt vähemalt kaks korda nädalas).
- Mitte kasutada tooteid üle 35 päeva ilma leviku olukorda ja tõrje tõhusust hindamata.
- Mitte kasutada antikoagulantset toimeainet sisaldavat mürksööta pidevalt väljapandava mürksöödana näriliste leviku ennetamiseks või nende elutegevuse jälgimiseks.
- Tooteinfos (st etiketil ja/või pakendi infolehel) peab olema selgelt kirjas, et:
 - toodet ei tarnita tavatarbijale (nt „ainult kutselistele kasutajatele“).
 - toodet tuleb kasutada selleks ettenähtud muukimiskindlates söödamajades (nt „kasutada ainult muukimiskindlas söödamajas“).
 - kasutajad peavad söödamaja märgistama nõuetekohaselt toote omaduste kokkuvõtte jaotises 5.3 toodud teabega (nt „märgistada söödamajad vastavalt tootel olevatele soovitudele“).
- Selle toote kasutamine peaks närilised kõrvaldama 35 päeva jooksul.
- Tooteinfo (st etikett ja/või pakendi infoleht) peab andma selge soovitus, et kui tõrje lõppedes on kahtlus tõhususe suhtes (st näriliste elutegevust on veel märgata), peab kasutaja pöörduma nõu saamiseks toote tarnija või kahjuritõrjuja poole.
- Mitte pesta söödamajasid veega enne uuesti mürksööda lisamist.
- Kõrvaldada surnud närilised vastavalt kohalikele eeskirjadele. Mürgitatud närilised tuleb hävitada vastavate lubadega jäätmepeletusjaamas, prügimäel või matmiskohas, seda peab tegema jäätmete tekitaja või registreeritud jäätmevedaja.

Kahjuritõrjujad:

- Võimaluse korral teavitada enne tõrje alustamist võimalikke kõrvalisi isikuid (nt tõrjeala ja ümbruse kasutajaid) kahjuritõrjest [kooskõlas kehtiva hea tavaga, kui see on olemas].
- Tooteinfos (st etiketil ja/või pakendi infolehel) peab olema selgelt kirjas, et toodet tohib tarnida ainult kahjuritõrjujatele, kellel on nõuetekohane kutsetunnistus (nt „ainult kahjuritõrjujatele.“)
- Mitte kasutada kohtades, kus võib kahtlustada resistentsust toimeaine suhtes.
- Mitte kasutada tooteid üle 35 päeva ilma leviku olukorda ja tõrje tõhusust hindamata [välja arvatud juhul, kui pidevalt väljapandav mürgsõot on lubatud].
- Mitte kasutada vaheldumisi samase või nõrgema toimega erinevaid antikoagulante, et vältida resistentsuse teket. Vajaduse korral kasutada mitte-antikoagulantset rodentitsiidi või võimalusel tõhusama toimega antikoagulantset rodentitsiidi.
- Mitte pesta söödamajasid või kaetud ja kaitstud söödakohtades kasutatud nõusid veega enne uuesti mürgsööda lisamist.
- Kõrvaldada surnud närilised vastavalt kohalikele eeskirjadele. Mürgitatud närilised tuleb hävitada vastavate lubadega jäätmepeletusjaamas, prügimäel või matmiskohas, seda peab tegema jäätmete tekitaja või registreeritud jäätmevedaja.

5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

- See toode sisaldab antikoagulanti. Allaneelamisel võivad sümptomid avalduda hiljem, milleks on ninaverejooks ja igemete veritsus. Raskematel juhtudel võivad tekkida verevalumid ja roojas või uriinis võib esineda verd.
- Vastumürk: K1-vitamiin, mida tohib manustada ainult arst/veterinaararst.
- Toote:
 - nahale sattumisel, pesta nahka veega ning seejärel vee ja seebiga.
 - silma sattumisel, hoida silmalauge avatuna ja loputada silmi füsioloogilise lahuse või veega vähemalt 10 minutit.
 - allaneelamisel, loputada suud hoolikalt veega. Mitte manustada teadvuseta inimesele midagi suukaudselt. Mitte esile kutsuda oksendamist.
- Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti (pidada nõu <http://www.16662.ee/>).
- Kui lemmikloom on toodet alla neelanud, pöörduda veterinaararsti poole.
- Söödamajad tuleb märgistada järgneva infoga: „mitte liigutada ega avada“; „sisaldab näriliste tõrjevahendit“; „tootenimi või loa number“; „toimeaine(d)“ ja „õnnetusjuhtumi korral helistada mürgistusteabekeskusesse 16662“.
- Ohtlik metsloomadele.

5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

- Kõrvaldada tõrje lõppemisel kasutamata mürgsõot ja pakend ning viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.
- Soovitav on kasutada kindaid.

5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

- Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida mahuti suletuna ja kaitstuna otsese päikesevalguse eest.
- Hoida lastele, lindudele, lemmikloomadele ja koduloomadele kättesaamatus kohas.
- Säilivusaeg: 2 aastat.

6. MUU TEAVE

- Antikoagulantsete näriliste tõrjevahendid mõjuvad viibega saavutades tõhususe 4–10 päeva jooksul pärast mürgsööda tarvitamist.
- Närilised võivad olla haigus kandjad. Mitte puutuda surnud närilisi paljaste kätega, vaid kasutada nende kõrvaldamiseks kindaid või abivahendeid nagu tangid.
- Toode sisaldab mõruainet ja värvainet.

Õiged ohu- ja hoiatuslaused vastavalt EÜ määrusele nr 1272/2008 (CLP):

P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele.

Ohupiktogramm ja tunnussõna vastavalt EÜ määrusele nr 1272/2008 (CLP):

Piktogramm: GHS08

Tunnussõna: Ettevaatust