

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

Ime prvič avtoriziranega proizvoda: Kenolox 10

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 04 - Za območja s hrano in krmo (razkužila)

Vrsta proizvodov 04 - Za območja s hrano in krmo (razkužila)

Vrsta proizvodov 04 - Za območja s hrano in krmo (razkužila)

Vrsta proizvodov 04 - Za območja s hrano in krmo (razkužila)

Vrsta proizvodov 02 - Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)

Vrsta proizvodov 02 - Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)

Vrsta proizvodov 02 - Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)

Vrsta proizvodov 02 - Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)

Vrsta proizvodov 02 - Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)

Vrsta proizvodov 02 - Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)

Vrsta proizvodov 02 - Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)

Številka dovoljenja: SI-0030359-0000

Referenčna številka vnosa v R4BP 3: SI-0030359-0000

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	2
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	3
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	3
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	26
5.1. Navodila za uporabo	26
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	27
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	27
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	28
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	28
6. Druge informacije	28

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

Kenolox 10
Kenoxylac
Kenoxilac
AIR DES 100

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	CID LINES NV
	Naslov	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgija
Številka dovoljenja	SI-0030359-0000	
Referenčna številka vnosa v R4BP 3	SI-0030359-0000	
Datum dovoljenja	23/01/2023	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	31/05/2032	

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	CID LINES NV
Naslov proizvajalca	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgija
Lokacije proizvodnje	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgija

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	1322 - L-(+)-mlečna kislina
Ime proizvajalca	Purac Biochem bv
Naslov proizvajalca	Arkselsedijk 46 4206 Gorinchem Nizozemska
Lokacije proizvodnje	Arkselsedijk 46 4206 Gorinchem Nizozemska
Aktivna snov	1315 - Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Evonik Degussa Antwerpen NV
Naslov proizvajalca	Tijsmanstunnel Wes 2040 Antwerpen Belgija
Lokacije proizvodnje	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgija
Aktivna snov	1322 - L-(+)-mlečna kislina
Ime proizvajalca	Jungbunzlauer S.A.
Naslov proizvajalca	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Francija
Lokacije proizvodnje	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Francija

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
L-(+)-mlečna kislina		Aktivna snov	79-33-4	201-196-2	1
Vodikov peroksid		Aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	1

2.2. Vrsta formulacije

AL- druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti

Povzroča draženje kože.
Povzroča hudo draženje oči.

Previdnostni stavki

Po uporabi roke temeljito umiti.
Nositi zaščitne rokavice.
Nositi zaščito za oči/obraz.
PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
PRI STIKU S KOŽO:Umiti z veliko mila in vode.
Če nastopi draženje kože:Poiščite zdravniško pomoč.
Če draženje oči ne preneha:Poiščite zdravniško pomoč.
Sleči kontaminirana oblačila.In jih oprati pred ponovno uporabo.
Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
Hraniti zunaj dosega otrok.
Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.

4. Dovoljena(e) uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Uporaba 1: Razkuževanje trdih površin s pršenjem za poklicno uporabo (Vrsta proizvodov 04)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 04 - Za območja s hrano in krmo (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

-

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: drugo: bakterije
Splošno ime: Bacteria
Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: drugo: kvasovke
Splošno ime: Yeasts
Razvojni stadij: Ni podatkov

	Znanstveno ime: drugo: virusi Splošno ime: Viruses Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Živilska in krmna industrija Razkuževanje trdih/neporoznih površin s predhodnim čiščenjem
Način(-i) uporabe	Metoda: S pršenjem (po izteku časa stika po možnosti obrišite z brisačo) ali samodejnim pršenjem v zaprtem sistemu (za nože). Podroben opis: -s pršenjem z (nizkotlačno) nahrbtno razpršilko in puščanjem površine/predmeta na zraku ali brisanjem površine/predmeta z brisačo po izteku časa stika. -Napršiti s sprožilnim razpršilnikom in pustiti, da se površina/predmet posuši na zraku, ali obrisati površino/predmet z brisačo po izteku časa stika. -samodejno pršenje nožev v zaprtih sistemih.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 40 ml/m ² za razprševanje (20 sprožilnih razpršil/m ²) Redčenje (%): - Število in časovni raspored uporabe: Z nerazredčenim izdelkom pri sobni temperaturi <u>S pršenjem:</u> Za delovanje na bakterije in kvasovke: čas stika 2 min Za učinek na bakterije, kvasovke in viruse: čas stika 5 min Frekvenca: enkrat na dan
Skupina(-e) uporabnikov	Strokovnjak z licenco
Velikosti in material embalaže	500 ml, 750 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1000 l, 1100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (polietilen visoke gostote)

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Glej splošna navodila za uporabo.

Uporabnika je treba usposobiti za pravilno uporabo predpisane opreme za zaščito dihal

S pršenjem z (nizkotlačno) nahrbtno razpršilko in sušenjem površine/predmeta na zraku ali brisanjem površine/predmeta z brisačo po izteku časa stika:

Kenolox 10 se uporablja za razkuževanje s pršenjem površin in materialov v kuhinjah, menzah in živilski ali krmni industriji, kjer se pripravlja hrana, npr. tal, sten, kuhinjskih delovnih površin, strojev za predelavo hrane, rezalnih desk in površin, ki so v stiku z rokami (npr. zasloni na dotik, ročajji, stikala).

Pred uporabo izdelka je treba površine in materiale, ki jih je treba razkužiti, temeljito očistiti in sprati s čisto vodo. Odvečno vodo je treba odstraniti.

Nerazredčen proizvod z (nizkotlačno) nahrbtno razpršilko nanesite na površino ali predmet, ki ga je treba razkužiti. Za ustrezen čas stika glejte poglavje o številu in času uporabe. Obdelane površine morajo v času stika ostati mokre. Izpiranje na koncu ni potrebno. Obdelane površine/material pustite, da se posušijo na zraku, ali pa jih obrišite z brisačo po izteku časa stika. Med sušenjem površin se mimoidoči/splošna javnost ne sme približati površinam. Če to ni mogoče, površine po izteku časa stika osušite z brisačo.

Od uporabnika se pričakuje, da bo pripravil točno določeno količino, potrebno za razkuževanje. Odstranjevanje preostale raztopine: če je na voljo, se zlije v odtok. Po nanosu očistite uporabljeno opremo.

Z razprševanjem s sprožilnim razpršilnikom in sušenjem površin na zraku ali brisanjem z brisačo po izteku časa stika:

Kenolox 10 se uporablja s sprožilnim razprševanjem za razkuževanje majhnih površin in materiala v kuhinjah, menzah in živilski ali krmni industriji, kjer se pripravlja hrana, npr. kuhinjske delovne plošče, stroji za predelavo hrane, deske za rezanje in površine v stiku

z rokami (npr. zasloni na dotik, ročaji, stikala).

Pred uporabo izdelka je treba površine in materiale, ki jih je treba razkužiti, temeljito očistiti in sprati s čisto vodo. Odvečno vodo je treba odstraniti.

Nerazredčen proizvod s sprožilnim razpršilnikom nanesite na površino ali predmet, ki ga je treba razkužiti. Za ustrezen čas stika glejte poglavje o številu in času uporabe. Obdelane površine morajo v času stika ostati mokre. Izpiranje na koncu ni potrebno. Obdelane površine/material pustite, da se posušijo na zraku, ali pa jih obrišite z brisačo po izteku časa stika. Med sušenjem površin se mimoidoči/splošna javnost ne sme približati površinam. Če to ni mogoče, površine po izteku časa stika osušite z brisačo.

S samodejnim pršenjem nožev v zaprtih sistemih:

Pred uporabo izdelka je treba nože temeljito očistiti in sprati s čisto vodo. Nerazredčen proizvod nanesite s samodejnim razprševanjem v zaprtih sistemih. Za ustrezen čas stika glejte poglavje o številu in času uporabe. Obdelane površine morajo v času stika ostati mokre. Izpiranje na koncu ni potrebno.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Za mešanje in polnjenje, nizkotlačno pršenje, ročno pršenje s sprožilcem, suho brisanje po razkuževanju, čiščenje opreme, vzdrževanje in popravila:

Med ravnanjem s proizvodom je obvezna uporaba opreme za zaščito oči. Med ravnanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic mora navesti imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu). Nositi je treba zaščitni kombinezon (vsaj tipa 6, EN 13034, 13962, 14605 ali 943).

Blago, ki se uporablja za suho brisanje razkuženih površin, je treba hraniti v zaprti posodi.

Zaščita dihal:

Za nanašanje z nizkotlačnim, grobim pršenjem po velikih površinah v živilski in krmni industriji:

- V čistih prostorih:

- je obvezna uporaba opreme za zaščito dihal (RPE), ki zagotavlja zaščitni faktor 40. Potreben je vsaj motoriziran dihalni aparat s čiščenjem zraka s čelado/kapo/masko (TH3/TM3) ali polna obrazna maska s plinskim filtrom (vrsto filtra (kodna črka, barva) določi imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).

- Priporoča se uporaba profesionalne zaščite za obraz.

- V institucionalnih kuhinjah in menzah, industrijskih kuhinjah, industrijskih proizvodnih prostorih in čistih prostorih s povečanim prezračevanjem (20/h ali več):

- Je obvezna uporaba opreme za zaščito dihal (RPE), ki zagotavlja zaščitni faktor 20. Potreben je vsaj motoriziran dihalni aparat s čiščenjem zraka s čelado/kapo/masko (TH2/TM2) ali polna obrazna maska s plinskim filtrom (vrsto filtra (kodna črka, barva) določi imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).

- Priporoča se uporaba profesionalne zaščite za obraz.

Za nanašanje z nizkotlačnim, grobim pršenjem po majhnih površinah v živilski in krmni industriji (npr. velikost površine 1 m² ali stroj za predelavo hrane): zaščita dihal ni potrebna. Priporoča se uporaba profesionalne zaščite za obraz.

Za nanašanje z ročnim sprožilnim pršenjem na velike površine (velikost površine 10 m²) v živilski in krmni industriji:

- V institucionalnih kuhinjah in menzah:

- Je obvezna uporaba opreme za zaščito dihal (RPE), ki zagotavlja zaščitni faktor 20. Potreben je vsaj motoriziran dihalni aparat s čiščenjem zraka s čelado/kapo/masko (TH2/TM2) ali polna obrazna maska s plinskim filtrom (vrsto filtra (kodna črka, barva) določi imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).

- Priporoča se uporaba profesionalne zaščite za obraz.

Za nanašanje z ročnim sprožilnim razpršilom na majhne površine v živilski in krmni industriji (npr. površina velikosti 1 m² ali stroj za predelavo hrane): Priporoča se uporaba profesionalne zaščite za obraz.

Za nanašanje med razkuževanjem nožev z avtomatskim razprševanjem v živilski in krmni industriji (uporabnik ne pride v stik z biocidnim pripravkom): zaščita dihal ni potrebna.

Za suho brisanje razkuženih površin v živilski in krmni industriji: je potrebna enaka oprema za zaščito dihal kot v fazi nanašanja.

Za čiščenje opreme, vzdrževanje in popravila: zaščita dihal ni potrebna.

RMM za mimoidoče in strokovnjake brez zaščitne opreme:

Obdelava majhnih površin: Širša javnost se ne sme dotikati ali uporabljati predmetov, ki so bili razkuženi, dokler se ne posušijo. Obdelava velikih površin: med obdelavo in dokler se površine ne posušijo in dokler se obdelano območje dovolj ne prezračí, širši javnosti ni dovoljen dostop.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Uporaba 2: Razkuževanje trdih površin s potopitvijo za poklicno uporabo (Vrsta proizvodov 04)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 04 - Za območja s hrano in krmo (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: drugo: kvasovke Splošno ime: Yeasts Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: drugo: virusi Splošno ime: Viruses Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Živilska in krmna industrija Razkuževanje trdih/neporoznih površin s predhodnim čiščenjem
Način(-i) uporabe	Metoda: S potopitvijo Podroben opis: Potopiti in pustiti, da se površina/predmet posuši na zraku, ali obrisati površino/predmet z brisačo po izteku časa stika.
Odmarki in pogostost uporabe	Odmerek: potopitev v kopel Redčenje (%): - Število in časovni raspored uporabe: Z nerazredčenim izdelkom pri sobni temperaturi S potopitvijo: <ul style="list-style-type: none">• Za delovanje na bakterije in kvasovke: čas stika 2 min• Za učinek na bakterije, kvasovke in viruse: čas stika 5 min Stopnja nanosa za potopitev: potopitev v kopel

	Frekvenca: Enkrat na dan
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	500 ml, 750 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1000 l, 1100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (polietilen visoke gostote)

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Glej splošna navodila za uporabo.

Potopiti in pustiti predmete na zraku ali obrisati z brisačo po izteku časa stika:

Kenolox 10 s potopitvijo se uporablja za razkuževanje materiala v kuhinjah ter živilski in krmni industriji, npr. nožev.

Pred uporabo izdelka je treba površine in materiale, ki jih je treba razkužiti, temeljito očistiti in sprati s čisto vodo. Odvečno vodo je treba odstraniti.

Predmete potopite v kopal Kenolox 10 (+20 °C). Obdelani predmeti morajo ostati mokri toliko časa, kolikor traja čas stika (glejte poglavje o stopnji in pogostosti nanosa). Izpiranje na koncu ni potrebno. Obdelane predmete pustite, da se posušijo na zraku, ali pa jih obrišite z brisačo po izteku časa stika. Med sušenjem površin se mimoidoči/splošna javnost ne sme približati površinam. Če to ni mogoče, površine po izteku časa stika osušite z brisačo.

Odstranjevanje uporabljene raztopine: zlit v odtok.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Za mešanje in polnjenje, potopitev/namakanje, suho brisanje po razkuževanju, čiščenje opreme, vzdrževanje in popravila:

Med ravnanjem s proizvodom je obvezna uporaba opreme za zaščito oči.

Med ravnanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic mora navesti imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).

Nositi je treba zaščitni kombinezon (vsaj tipa 6, EN 13034, 13962, 14605 ali 943).

Blago, ki se uporablja za suho brisanje razkuženih površin, je treba hraniti v zaprti posodi.

Zaščita dihal:

Za nanašanje s potapljanjem/namakanjem v živilski in krmni industriji: zaščita dihal ni potrebna.

Za suho brisanje razkuženih površin v živilski in krmni industriji: je potrebna enaka oprema za zaščito dihal kot v fazi nanašanja.

Začiščenje opreme, vzdrževanje in popravila: zaščita dihal ni potrebna.

RMM za mimoidoče in strokovnjake brez zaščitne opreme: ni potrebno

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - Uporaba 3: Razkuževanje trdih površin z zamegljevanjem, za poklicno uporabo (Vrsta proizvodov 04)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 04 - Za območja s hrano in krmo (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

-

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: drugo: bakterije
Splošno ime: Bacteria
Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: drugo: kvasovke
Splošno ime: Yeasts
Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: drugo: virusi
Splošno ime: Viruses
Razvojni stadij: Ni podatkov

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Živilska in krmna industrija Razkuževanje trdih/neporoznih površin s predhodnim čiščenjem.

Način(-i) uporabe

Metoda: Z zamegljevanjem
Podroben opis:

zamegljevanje

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: 30 ml/m³

Redčenje (%): -

Število in časovni raspored uporabe:

Z nerazredčenim izdelkom pri sobni temperaturi

Z zamegljevanjem:

1) V prostorih s prostornino od 30 do 150 m³

Bakterije, kvasovke in virusi: 30 ml/m³, s časom stika 3 ure (po difuziji proizvoda)

2) V prostorih s prostornino od 30 do 2000 m³

Bakterije in kvasovke: 30 ml/m³, s časom stika 3 ure (po difuziji proizvoda)

Frekvenca: Enkrat na dan

Skupina(-e) uporabnikov

Poklicni

Velikosti in material embalaže

500 ml, 750 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1000 l, 1100 l
1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg
HDPE (polietilen visoke gostote)

4.3.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Glej splošna navodila za uporabo.

Z zamegljevanjem

Kenolox 10 se uporablja za razkuževanje kuhinj in prostorov v celotni živilski in krmni industriji z zamegljevanjem.

Kenolox 10 je namenjen za hladno zamegljevanje. Površine, opremo in material v prostoru, ki ga je treba razkužiti, je treba najprej temeljito očistiti in sprati s čisto vodo.

Pred razkuževanjem je treba opraviti naslednje postopke:

- Odstraniti odvečno vodo
- Odstraniti ali zaščititi občutljivo elektronsko opremo in druge predmete, ki so občutljivi na vlago
- Odpreti predele in vrata omar
- Izklopiti prezračevanje ter zaprite okna in prezračevalne odprtine
- Zapreti straniščne školjke (samo za nanos vrste proizvodov 02)

Izpiranje ni potrebno.

Za podrobna navodila o postopkih zamegljevanja glejte splošna navodila za uporabo.

Mikrobiološka potrditev: glej splošna navodila za uporabo

Od uporabnika se pričakuje, da bo pripravil točno določeno količino, potrebno za razkuževanje. Odstranjevanje preostale raztopine: če je na voljo, se zlije v odtok. Po nanosu očistite uporabljeno opremo.

Ponovni vstop v prostor:

Prostor se lahko sprosti za uporabo le, če je izmerjena koncentracija vodikovega peroksida 1.25 mg/m^3 (0.86 ppm).

4.3.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Za mešanje in polnjenje, čiščenje opreme, vzdrževanje in popravila:

Med ravnanjem s proizvodom je obvezna uporaba opreme za zaščito oči.

Med ravnanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic mora navesti imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).

Nositi je treba zaščitni kombinezon (vsaj tipa 6, EN 13034, 13962, 14605 ali 943).

Zaščita dihal:

Med izvajanjem zamegljevanja v živilski in krmni industriji (uporabnik ne pride v stik z biocidnim pripravkom): zaščita dihal ni potrebna.

Med razkuževanjem v prostoru ne smejo biti prisotni ljudje, živali, rastline, zdravila ali živila. Obdelava velikih površin: med obdelavo in dokler se površine ne posušijo in dokler se obdelano območje dovolj ne prezračí, širši javnosti ni dovoljen dostop.

Po zamegljevanju in času stika je treba prostor prezračiti, po možnosti z mehanskim prezračevanjem. Trajanje prezračevanja je treba določiti z merjenjem z ustrezno merilno opremo. Ponovni vstop je dovoljen šele, ko koncentracija H_2O_2 v zraku pade pod 0.9 ppm (1.25 mg/m^3).

Poklicni uporabnik lahko vstopi v prostor le v nujnih primerih ali za ponovno aktiviranje prezračevanja, ko se koncentracija vodikovega peroksida zniža pod 36 ppm (50 mg/m^3), pri čemer je treba uporabiti opremo za zaščito dihal z zaščitnim faktorjem APF 40 proti hlapom (vrsto opreme za zaščito dihal določi imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku).

Pred ponovnim vstopom uporabite umerjen senzor, da potrdite, da je koncentracija H_2O_2 v zraku $\leq 0.9 \text{ ppm}$ (1.25 mg/m^3).

4.3.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.3.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo.

4.3.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.4 Opis uporabe

Uporaba 4 - Uporaba 4: Razkuževanje trdih površin RTU za nepoklicno uporabo (Vrsta proizvodov 04)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 04 - Za območja s hrano in krmo (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

-

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: drugo: bakterije
Splošno ime: Bacteria
Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: drugo: kvasovke
Splošno ime: Yeasts
Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: drugo: virusi
Splošno ime: Viruses
Razvojni stadij: Ni podatkov

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

V zasebnih hišah/kuhinjah: Razkuževanje trdih/neporoznih površin s predhodnim čiščenjem

Način(-i) uporabe

Metoda: Z razprševanjem (po izteku časa stika po možnosti obrišite z brisačo do suhega)

Podroben opis:

Napršiti s sprožilnim razpršilnikom in pustiti, da se površina/predmet posuši na zraku, ali obrisati površino/predmet z brisačo po izteku časa stika.

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: 40 ml/m² (20 sprožilnih razpršil/m²)

Redčenje (%): -

Število in časovni razpored uporabe:

Frekvenca: Enkrat na dan

Z nerazredčenim izdelkom pri sobni temperaturi

Za delovanje na bakterije in kvasovke: čas stika 2 min

Za učinek na bakterije, kvasovke in viruse: čas stika 5 min

Skupina(-e) uporabnikov

Splošna javnost (nepoklicna)

Velikosti in material embalaže

500 ml, 750 ml in 1l

Razpršilo s sprožilcem

HDPE (polietilen visoke gostote)

4.4.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Glej splošna navodila za uporabo.
Upoštevati navodila za uporabo.
Z razprševanjem s sprožilnim razpršilnikom in pustiti, da se posuši na zraku, ali obrisati z brisačo po izteku časa stika:
Kenolox 10 se uporablja za razkuževanje s pršenjem majhnih površin v kuhinjah v gospodinjstvih, npr. kuhinjskih delovnih površin, rezalnih desk in nožev.
Pred uporabo izdelka je treba površine in materiale, ki jih je treba razkužiti, temeljito očistiti in sprati s čisto vodo. Odvečno vodo je treba odstraniti.
Nerazredčen proizvod nanesite s sprožilnim razpršilnikom na površino ali predmet, ki ga je treba razkužiti. Za ustrezen čas stika glejte poglavje o številu in času uporabe. Obdelane površine morajo v času stika ostati mokre. Izpiranje na koncu ni potrebno. Po preteku časa stika pustite, da se obdelane površine/material posušijo na zraku, ali pa jih obrišite z brisačo. Med sušenjem površin se mimoidoči/splošna javnost ne sme približati površinam. Če to ni mogoče, površine po izteku časa stika osušite z brisačo.

4.4.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Po uporabi si temeljito umijteroke.
Izdelek je treba razpršiti navzdol.
Po razkuževanju zagotovite ustrezno prezračevanje (odprite okna in vrata). Obdelane površine morajo biti nedostopne dojenčkom, otrokom, spremljevalnim živalim in ne ciljnim živalim, dokler se te površine ne posušijo.

4.4.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

4.4.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo.

4.4.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo. Hraniti izven dosega otrok in ne ciljnih živali/hišnih ljubljencev.

4.5 Opis uporabe

Uporaba 5 - Uporaba 5: Razkuževanje trdih površin v zdravstvenih ustanovah s sprožilnim razpršilom (za poklicno uporabo) (Vrsta proizvodov 02)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 02 - Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	<p>Znanstveno ime: drugo: bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojni stadij: Ni podatkov</p> <p>Znanstveno ime: drugo: kvasovke Splošno ime: Yeasts Razvojni stadij: Ni podatkov</p> <p>Znanstveno ime: drugo: virusi Splošno ime: Viruses Razvojni stadij: Ni podatkov</p>
Področje uporabe	<p>Notranjost, znotraj</p> <p>V ZDRAVSTVU (medicinski in nemedicinski prostori, kot so čisti prostori, laboratoriji in biotehnoški, farmacevtski in kozmetični proizvodni obrati). Razkuževanje trdih/neporoznih površin s predhodnim čiščenjem.</p>
Način(-i) uporabe	<p>Metoda: Z razprševanjem (po izteku časa stika po možnosti obrišite z brisačo do suhega)</p> <p>Podroben opis: Napršiti s sprožilnim razpršilnikom in pustiti, da se površina/predmet posuši na zraku, ali obrisati površino/predmet z brisačo po izteku časa stika.</p>
Odmerki in pogostost uporabe	<p>Odmerek: 40 ml/m² za razprševanje (ali 20 sprožilnih razpršil/m²) Redčenje (%): - Število in časovni raspored uporabe:</p> <p>Z nerazredčenim izdelkom pri sobni temperaturi</p> <p><u>S pršenjem:</u></p> <p>Za delovanje na bakterije in kvasovke: čas stika 2 min Za učinek na bakterije, kvasovke in viruse: čas stika 5 min</p>
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	500 ml, 750 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1000 l, 1100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (polietilen visoke gostote)

4.5.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Glej splošna navodila za uporabo.

Z razprševanjem s sprožilnim razpršilnikom in sušenjem površin na zraku ali brisanjem z brisačo po izteku časa stika:

Kenolox 10 s sprožilnim razpršilnikom se uporablja za razkuževanje majhnih površin in materialov v zdravstvu/bolnišnicah, npr. pohištva, kopalnic, straniščne školjke in kotlička, površin v stiku z rokami (npr. zaslone na dotik, ročaji, stikala, vozički, bolniške postelje, daljinski upravljalniki).

Pred uporabo izdelka je treba površine in materiale, ki jih je treba razkužiti, temeljito očistiti in sprati s čisto vodo. Odvečno vodo je treba odstraniti.

Nerazredčen proizvod s sprožilnim razpršilnikom nanesite na površino ali predmet, ki ga je treba razkužiti. Za ustrezen čas stika

glejte razdelek o stopnji in pogostosti nanosa. Obdelane površine morajo v času stika ostati mokre. Izpiranje na koncu ni potrebno. Obdelane površine/material pustite, da se posušijo na zraku, ali pa jih obrišite z brisačo po izteku časa stika. Med sušenjem površin se mimoidoči/splošna javnost ne sme približati površinam. Če to ni mogoče, površine po izteku časa stika osušite z brisačo.

4.5.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Za mešanje in polnjenje, ročno pršenje s sprožilcem, suho brisanje po razkuževanju, čiščenje opreme, vzdrževanje in popravila: Med ravnanjem s proizvodom je obvezna uporaba opreme za zaščito oči. Med ravnanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic mora navesti imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu). Nositi je treba zaščitni kombinezon (vsaj tipa 6, EN 13034, 13962, 14605 ali 943).

Blago, ki se uporablja za suho brisanje razkuženih površin, je treba hraniti v zaprti posodi.

Zaščita dihal:

Za nanašanje z ročnim sprožilnim razpršilom na majhnih površinah v zdravstvu (npr. površina velikosti 0,5–2 m²): Priporoča se uporaba profesionalne zaščite za obraz.

Za suho brisanje razkuženih površin v zdravstvu: je potrebna enaka oprema za zaščito dihal kot v fazi nanašanja.

Za čiščenje opreme, vzdrževanje in popravila: zaščita dihal ni potrebna.

RMM za mimoidoče in strokovnjake brez zaščitne opreme: zaščita dihal ni potrebna.

Obdelava majhnih površin: Širša javnost se ne sme dotikati ali uporabljati predmetov, ki so bili razkuženi, dokler se ne posušijo.

4.5.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.5.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo.

4.5.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.6 Opis uporabe

Uporaba 6 - Uporaba 6: Razkuževanje trdih površin v zdravstvu z zamegljevanjem (za poklicno uporabo) (Vrsta proizvodov 02)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 02 - Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

-

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: drugo: bakterije
Splošno ime: Bacteria
Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: drugo: kvasovke
Splošno ime: Yeasts
Razvojni stadij: Ni podatkov

	Znanstveno ime: drugo: virusi Splošno ime: Viruses Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj V ZDRAVSTVU (medicinski in nemedicinski prostori, kot so čisti prostori, laboratoriji in biotehnoški, farmacevtski in kozmetični proizvodni obrati). Razkuževanje trdih/neporoznih površin s predhodnim čiščenjem.
Način(-i) uporabe	Metoda: Z zamegljevanjem Podroben opis: zamegljevanje
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 30 ml/m ³ Redčenje (%): - Število in časovni raspored uporabe: Z nerazredčenim izdelkom pri sobni temperaturi <u>Z zamegljevanjem:</u> 1) V prostorih s prostornino od 30 do 150 m ³ Bakterije, kvasovke in virusi: 30 ml/m ³ , s časom stika 3 ure (po difuziji proizvoda) 2) V prostorih s prostornino od 30 do 2000 m ³ Bakterije in kvasovke: 30 ml/m ³ , s časom stika 3 ure (po difuziji proizvoda)
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	500 ml, 750 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1000 l, 1100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (polietilen visoke gostote)

4.6.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Glej splošna navodila za uporabo.

Z zamegljevanjem

Kenolox 10 se uporablja za razkuževanje prostorov v zdravstvu z zamegljevanjem.

Kenolox 10 je namenjen za hladno zamegljevanje. Površine, opremo in material v prostoru, ki ga je treba razkužiti, je treba najprej temeljito očistiti in sprati s čisto vodo.

Pred razkuževanjem je treba opraviti naslednje postopke:

- Odstraniti odvečno vodo
- Odstraniti ali zaščititi občutljivo elektronsko opremo in druge predmete, ki so občutljivi na vlago
- Odpreti predale in vrata omar
- Izklopiti prezračevanje ter zaprite okna in prezračevalne odprtine
- Zapreti straniščne školjke (samo za nanos vrste proizvodov 02)

Izpiranje ni potrebno.

Za podrobna navodila o postopkih zamegljevanja glejte splošna navodila za uporabo.

Mikrobiološka potrditev:glej splošna navodila za uporabo

Od uporabnika se pričakuje, da bo pripravil točno določeno količino, potrebno za razkuževanje. Odstranjevanje preostale raztopine: če je na voljo, se zlije v odtok. Po nanosu očistite uporabljeno opremo.

Ponovni vstop v prostor: Prostor se lahko sprost za uporabo le, če je izmerjena koncentracija vodikovega peroksida 1.25 mg/m³ (0.86 ppm).

4.6.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Za mešanje in polnjenje, čiščenje opreme, vzdrževanje in popravila: Med ravnanjem s proizvodom je obvezna uporaba opreme za zaščito oči.

Med ravnanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic mora navesti imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).

Nositi je treba zaščitni kombinezon (vsaj tipa 6, EN 13034, 13962, 14605 ali 943).

Zaščita dihal:

Med razkuževanjem v prostoru ne smejo biti prisotni ljudje, živali, rastline, zdravila ali živila. Obdelava velikih površin: med obdelavo in dokler se površine ne posušijo in dokler se obdelano območje dovolj ne prezračí, širši javnosti ni dovoljen dostop.

Po zamegljevanju in času stika je treba prostor prezračiti, po možnosti z mehanskim prezračevanjem. Trajanje prezračevanja je treba določiti z merjenjem z ustrezno merilno opremo. Ponovni vstop je dovoljen šele, ko koncentracija H₂O₂ v zraku pade pod 0.9 ppm (1.25 mg/m³).

Poklicni uporabnik lahko vstopi v prostor le v nujnih primerih ali za ponovno aktiviranje prezračevanja, ko se koncentracija vodikovega peroksida zniža pod 36 ppm (50 mg/m³), pri čemer je treba uporabiti opremo za zaščito dihal z zaščitnim faktorjem APF 40 proti hlapom (vrsto opreme za zaščito dihal določi imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku).

Pred ponovnim vstopom uporabite umerjen senzor, da potrdite, da je koncentracija H₂O₂ v zraku ≤ 0.9 ppm (1.25 mg/m³).

4.6.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.6.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo.

4.6.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.7 Opis uporabe

Uporaba 7 - Uporaba 7: Razkuževanje velikih površin v zdravstvenih prostorih s pršenjem (za poklicno uporabo) (Vrsta proizvodov 02)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 02 - Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

-

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojni stopnjo)

Znanstveno ime: drugo: bakterije
Splošno ime: Bacteria
Razvojni stadij: Ni podatkov

	<p>Znanstveno ime: drugo: kvasovke Splošno ime: Yeasts Razvojni stadij: Ni podatkov</p> <p>Znanstveno ime: drugo: virusi Splošno ime: Viruses Razvojni stadij: Ni podatkov</p>
Področje uporabe	<p>Notranjost, znotraj</p> <p>V ZDRAVSTVU (medicinski in nemedicinski prostori, kot so čisti prostori, laboratoriji in biotehnoški, farmacevtski in kozmetični proizvodni obrati). Razkuževanje trdih/neporoznih površin s predhodnim čiščenjem.</p>
Način(-i) uporabe	<p>Metoda: Z razprševanjem (po izteku časa stika po možnosti obrišite z brisačo do suhega) Podroben opis: s pršenjem z (nizkotlačno) nahrbtno razpršilko in puščanjem površine/predmeta na zraku ali brisanjem površine/predmeta z brisačo po izteku časa stika.</p> <p>Napršiti s sprožilnim razpršilnikom in pustiti, da se površina/predmet posuši na zraku, ali obrisati površino/predmet z brisačo po izteku časa stika (velikost površine 8–10 m²)</p>
Odmerki in pogostost uporabe	<p>Odmerek: 40 ml/m² za razprševanje (20 sprožilnih razpršil/m²) Redčenje (%): - Število in časovni raspored uporabe:</p> <p>Z nerazredčenim izdelkom pri sobni temperaturi</p> <p><u>S pršenjem:</u></p> <p>Za delovanje na bakterije in kvasovke: čas stika 2 min Za učinek na bakterije, kvasovke in viruse: čas stika 5 min</p>
Skupina(-e) uporabnikov	<p>Strokovnjak z licenco</p>
Velikosti in material embalaže	<p>500 ml, 750 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1000 l, 1100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (polietilen visoke gostote)</p>

4.7.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Glej splošna navodila za uporabo.

Uporabnika je treba usposobiti za pravilno uporabo predpisane opreme za zaščito dihal

Napršiti z (nizkotlačno) nahrbtno razpršilko ali napršiti s sprožilnim razpršilnikom in pustiti, da se površine posušijo na zraku, ali obrisati z brisačo po izteku časa stika:

Kenolox 10 se uporablja za razkuževanje s pršenjem površin v zdravstvu/bolnišnicah, npr. sten, tal, kopalnic, straniščnih školjk, straniščnih kotličkov in površin v stiku z rokami (npr. zasloni na dotik, ročaj, stikala, vozički, bolniške postelje, daljinski upravljalniki). Pred uporabo izdelka je treba površine in materiale, ki jih je treba razkužiti, temeljito očistiti in sprati s čisto vodo. Odvečno vodo je treba odstraniti.

Nerazredčen proizvod nanesite z (nizkotlačno) nahrbtno razpršilko ali sprožilnim razpršilnikom na površino ali predmet, ki ga je treba razkužiti. Za ustrezen čas stika glejte razdelek o stopnji in pogostosti nanosa. Obdelane površine morajo v času stika ostati mokre.

Izpiranje na koncu ni potrebno. Obdelane površine/material pustite, da se posušijo na zraku, ali pa jih obrišite z brisačo po izteku časa stika. Med sušenjem površin se mimoidoči/splošna javnost ne sme približati površinam. Če to ni mogoče, površine po izteku

časa stika osušite z brisačo.

Od uporabnika se pričakuje, da bo pripravil točno določeno količino, potrebno za razkuževanje. Odstranjevanje preostale raztopine: če je na voljo, se zlije v odtok. Po nanosu očistite uporabljeno opremo.

4.7.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Za mešanje in polnjenje, nizekotalčno pršenje, suho brisanje po razkuževanju, čiščenje opreme, vzdrževanje in popravila:

Med ravnanjem s proizvodom je obvezna uporaba opreme za zaščito oči.

Med ravnanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic mora navesti imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).

Nositi je treba zaščitni kombinezon (vsaj tipa 6, EN 13034, 13962, 14605 ali 943).

Blago, ki se uporablja za suho brisanje razkuženih površin, je treba hraniti v zaprti posodi.

Zaščita dihal:

Za nanašanje z nizekotalčnim, grobim pršenjem na velike površine na področjih, ki so namenjena zdravstveni oskrbi:

- v laboratorijih, operacijskih dvoranah, zdravniških ordinacijah, v enotah intenzivne nege:

- je obvezna uporaba opreme za zaščito dihal (RPE), ki zagotavlja zaščitni faktor 40. Potreben je vsaj motoriziran dihalni aparat s čiščenjem zraka s čelado/kapo/masko (TH3/TM3) ali polna obrazna maska s plinskim filtrom (vrsto filtra (kodna črka, barva) določi imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).

- - Priporoča se uporaba profesionalne zaščite za obraz.

- v sanitarnih prostorih, bolnišničnih sobah:

- je obvezna uporaba opreme za zaščito dihal (RPE), ki zagotavlja zaščitni faktor 40. Potreben je vsaj motoriziran dihalni aparat s čiščenjem zraka s čelado/kapo/masko (TH3/TM3) ali polna obrazna maska s plinskim filtrom (vrsto filtra (kodna črka, barva) določi imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu). Zagotovite, da je stopnja prezračevanja med razkuževanjem in po njem najmanj 3ACH.

- Priporoča se uporaba profesionalne zaščite za obraz.

- V čistih prostorih s povečanim prezračevanjem (20/h ali več):

- Je obvezna uporaba opreme za zaščito dihal (RPE), ki zagotavlja zaščitni faktor 20. Potreben je vsaj motoriziran dihalni aparat s čiščenjem zraka s čelado/kapo/masko (TH2/TM2) ali polna obrazna maska s plinskim filtrom (vrsto filtra (kodna črka, barva) določi imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).

- Priporoča se uporaba profesionalne zaščite za obraz.

- V večjih javnih prostorih:

- Je obvezna uporaba opreme za zaščito dihal (RPE), ki zagotavlja zaščitni faktor 10. Potreben je vsaj motoriziran dihalni aparat s čiščenjem zraka s čelado/kapo/masko (TH1/TM1) ali polovična/polna maska s plinskim filtrom (vrsto filtra (kodna črka, barva) določi imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).

- Priporoča se uporaba profesionalne zaščite za obraz.

Za nanašanje z ročnim sprožilnim razpršilnikom na velike površine (velikost površine 8–10 m²) v zdravstvu:

- V čistih prostorih, sanitarnih prostorih:

- Je obvezna uporaba opreme za zaščito dihal (RPE), ki zagotavlja zaščitni faktor 20. Potreben je vsaj motoriziran dihalni aparat s čiščenjem zraka s čelado/kapo (TH2/TM2) ali polna obrazna maska s plinskim filtrom (tip filtra (črkovna oznaka, barva) navede imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).

- Priporoča se uporaba profesionalne zaščite za obraz.

- V čistih prostorih s povečanim prezračevanjem (20/h ali več), laboratorijih in medicinskih ordinacijah:

- Je obvezna uporaba opreme za zaščito dihal (RPE), ki zagotavlja zaščitni faktor 10. Potreben je vsaj motoriziran dihalni aparat s čiščenjem zraka s čelado/kapo (TH2/TM2) ali polna obrazna maska s plinskim filtrom (tip filtra (črkovna oznaka, barva) navede imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).

- Priporoča se uporaba profesionalne zaščite za obraz.

4.7.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.7.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo.

4.7.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.8 Opis uporabe

Uporaba 8 - Uporaba 8: Razkuževanje trdih površin na območjih, ki niso namenjena zdravstveni oskrbi, s sprožilnim razpršilnikom, za poklicno uporabo (Vrsta proizvodov 02)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 02 - Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: drugo: kvasovke Splošno ime: Yeasts Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: drugo: virusi Splošno ime: Viruses Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Na drugih območjih, ki niso v zdravstvu (laboratoriji in biotehnologija, čisti prostori, farmacevtski in kozmetični proizvodni obrati). Razkuževanje trdih/neporoznih površin s predhodnim čiščenjem.
Način(-i) uporabe	Metoda: Z razprševanjem (po izteku časa stika po možnosti obrišite z brisačo do suhega) Podroben opis: -Napršiti s sprožilnim razpršilnikom in pustiti, da se površina/predmet posuši na zraku, ali obrisati površino/predmet z brisačo po izteku časa stika.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 40 ml/m ² za razprševanje (ali 20 sprožilnih razpršil/m ²) Redčenje (%): - Število in časovni raspored uporabe: Z nerazredčenim izdelkom pri sobni temperaturi <u>S pršenjem:</u> Za delovanje na bakterije in kvasovke: čas stika 2 min Za učinek na bakterije, kvasovke in viruse: čas stika 5 min
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni

Velikosti in material embalaže

500 ml, 750 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1000 l, 1100 l
1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg
HDPE (polietilen visoke gostote)

4.8.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Glej splošna navodila za uporabo.

Z razprševanjem s sprožilnim razpršilnikom in sušenjem površin na zraku ali brisanjem z brisačo po izteku časa stika:

Kenolox 10 se uporablja za razkuževanje s pršenjem majhnih površin v gospodinjstvih in javnih prostorih, npr. kopalnice, straniščne deske, straniščni kotlički in površine v stiku z rokami (npr. zasloni na dotik, ročajji, stikala, daljinski upravljalniki).

Pred uporabo izdelka je treba površine in materiale, ki jih je treba razkužiti, temeljito očistiti in sprati s čisto vodo. Odvečno vodo je treba odstraniti.

Nerazredčen proizvod nanesite s sprožilnim razpršilnikom na površino ali predmet, ki ga je treba razkužiti. Za ustrezen čas stika glejte razdelek o stopnji in pogostosti nanosa. Obdelane površine morajo v času stika ostati mokre. Izpiranje na koncu ni potrebno. Obdelane površine/material pustite, da se posušijo na zraku, ali pa jih obrišite z brisačo po izteku časa stika. Med sušenjem površin se mimoidoči/splošna javnost ne sme približati površinam. Če to ni mogoče, površine po izteku časa stika osušite z brisačo.

4.8.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Za mešanje in polnjenje, ročno pršenje s sprožilcem, suho brisanje po razkuževanju, čiščenje opreme, vzdrževanje in popravila:

Med ravnanjem s proizvodom je obvezna uporaba opreme za zaščito oči.

Med ravnanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic mora navesti imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).

Nositi je treba zaščitni kombinezon (vsaj tipa 6, EN 13034, 13962, 14605 ali 943).

Blago, ki se uporablja za suho brisanje razkuženih površin, je treba hraniti v zaprti posodi.

Zaščita dihal:

Za nanašanje z ročnim sprožilnim razpršilnikom za pršenje majhnih površin v nezdravstvu (npr. velikost površine 0,5–2 m²):

Priporočena se uporaba profesionalne zaščite za obraz.

Začiščenje opreme, vzdrževanje in popravila: zaščita dihal ni potrebna.

RMM za mimoidoče in strokovnjake brez zaščitne opreme: zaščita dihal ni potrebna.

Obdelava majhnih površin: Širša javnost se ne sme dotikati ali uporabljati predmetov, ki so bili razkuženi, dokler se ne posušijo.

4.8.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.8.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo.

4.8.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.9 Opis uporabe

Uporaba 9 - Uporaba 9: Razkuževanje trdih površin na območjih, ki niso namenjena zdravstveni oskrbi, z zamegljevanjem, za poklicno uporabo (Vrsta proizvodov 02)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 02 - Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: drugo: kvasovke Splošno ime: Yeasts Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: drugo: virusi Splošno ime: Viruses Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Na drugih območjih, ki niso v zdravstvu (laboratoriji in biotehnologija, čisti prostori, farmacevtski in kozmetični proizvodni obrati). Razkuževanje trdih/neporoznih površin s predhodnim čiščenjem.
Način(-i) uporabe	Metoda: Z zamegljevanjem Podroben opis: zamegljevanje
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 30 ml/m ³ Redčenje (%): - Število in časovni raspored uporabe: Z nerazredčenim izdelkom pri sobni temperaturi 1) V prostorih s prostornino od 30 do 150 m ³ Bakterije, kvasovke in virusi: 30 ml/m ³ , s časom stika 3 ure (po difuziji proizvoda) 2) V prostorih s prostornino od 30 do 2000 m ³ Bakterije in kvasovke: 30 ml/m ³ , s časom stika 3 ure (po difuziji proizvoda)
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	500 ml, 750 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1000 l, 1100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (polietilen visoke gostote)

4.9.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Glej splošna navodila za uporabo.
Kenolox 10 je namenjen za hladno zamegljevanje. Površine, opremo in material v prostoru, ki ga je treba razkužiti, je treba najprej temeljito očistiti in sprati s čisto vodo.

Pred razkuževanjem je treba opraviti naslednje postopke:

- Odstraniti odvečno vodo
- Odstraniti ali zaščititi občutljivo elektronsko opremo in druge predmete, ki so občutljivi na vlago
- Odpreti predale in vrata omar
- Izklopiti prezračevanje ter zaprite okna in prezračevalne odprtine
- Zapreti straniščne školjke (samo za nanos vrste proizvodov 02)

Izpiranje ni potrebno.

Za podrobna navodila o postopkih zamegljevanja glejte splošna navodila za uporabo.

Mikrobiološka potrditev:glej splošna navodila za uporabo

Od uporabnika se pričakuje, da bo pripravil točno določeno količino, potrebno za razkuževanje. Odstranjevanje preostale raztopine: če je na voljo, se zlije v odtok. Po nanosu očistite uporabljeno opremo.

Ponovni vstop v prostor: Prostor se lahko sprosti za uporabo le, če je izmerjena koncentracija vodikovega peroksida 1.25 mg/m³ (0.86 ppm).

4.9.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Za mešanje in polnjenje, čiščenje opreme, vzdrževanje in popravila: Med ravnanjem s proizvodom je obvezna uporaba opreme za zaščito oči. Med ravnanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic mora navesti imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).

Nositi je treba zaščitni kombinezon (vsaj tipa 6, EN 13034, 13962, 14605 ali 943).

Za uporabo med izvajanjem zamegljevanja v nezdravstvu (uporabnik ne pride v stik z biocidnim proizvodom): zaščita dihal ni potrebna.

Zamegljevanje:

Med razkuževanjem v prostoru ne smejo biti prisotni ljudje, živali, rastline, zdravila ali živila. Obdelava velikih površin: med obdelavo in dokler se površine ne posušijo in dokler se obdelano območje dovolj ne prezrači, širši javnosti ni dovoljen dostop.

Po zamegljevanju in času stika je treba prostor prezračiti, po možnosti z mehanskim prezračevanjem. Trajanje prezračevanja je treba določiti z merjenjem z ustrezno merilno opremo. Ponovni vstop je dovoljen šele, ko koncentracija H₂O₂ v zraku pade pod 0.9 ppm (1.25 mg/m³).

Poklicni uporabnik lahko vstopi v prostor le v nujnih primerih ali za ponovno aktiviranje prezračevanja, ko se koncentracija vodikovega peroksida zniža pod 36 ppm (50 mg/m³), pri čemer je treba uporabiti opremo za zaščito dihal z zaščitnim faktorjem APF 40 proti hlapom (vrsto opreme za zaščito dihal določi imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku).

Pred ponovnim vstopom uporabite umerjen senzor, da potrdite, da je koncentracija H₂O₂ v zraku ≤ 0.9 ppm (1.25 mg/m³).

4.9.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.9.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo.

4.9.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.10 Opis uporabe

Uporaba 10 - Uporaba 10: Razkuževanje velikih površin na območjih, ki niso namenjena zdravstveni oskrbi, z razprševanjem, za poklicno uporabo (Vrsta proizvodov 02)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 02 - Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: drugo: kvasovke Splošno ime: Yeasts Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: drugo: virusi Splošno ime: Viruses Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Na drugih območjih, ki niso v zdravstvu (laboratoriji in biotehnologija, čisti prostori, farmacevtski in kozmetični proizvodni obrati). Razkuževanje trdih/neporoznih površin s predhodnim čiščenjem.
Način(-i) uporabe	Metoda: Z razprševanjem (po izteku časa stika po možnosti obrišite z brisačo do suhega) Podroben opis: s pršenjem z (nizkotlačno) nahrbtno razpršilko in puščanjem površine/predmeta na zraku ali brisanjem površine/predmeta z brisačo po izteku časa stika. Napršiti s sprožilnim razpršilnikom in pustiti, da se površina/predmet posuši na zraku, ali obrisati površino/predmet z brisačo po izteku časa stika (velikost površine 8–10 m ²)
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 40 ml/m ² za razprševanje (20 sprožilnih razpršil/m ²) Redčenje (%): - Število in časovni razpored uporabe: Z nerazredčenim izdelkom pri sobni temperaturi <u>S pršenjem:</u> Za delovanje na bakterije in kvasovke: čas stika 2 min Za učinek na bakterije, kvasovke in viruse: čas stika 5 min
Skupina(-e) uporabnikov	Strokovnjak z licenco
Velikosti in material embalaže	500 ml, 750 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1000 l, 1100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (polietilen visoke gostote)

4.10.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Glej splošna navodila za uporabo.

Uporabnika je treba usposobiti za pravilno uporabo predpisane opreme za zaščito dihal.

Napršiti (z nizkotlačno) nahrbtno razpršilko ali napršiti s sprožilnim razpršilnikom in pustiti, da se površina posuši na zraku, ali jo po izteku časa stika obrisati z brisačo:

Kenolox 10 se uporablja za razkuževanje s pršenjem površin v gospodinjstvih in javnih prostorih, npr. sten, tal, kopalnic, straniščnih školjk, straniščnih kotličkov, garderobnih omaric, garderob in površin v stiku z rokami (npr. zasloni na dotik, ročaji, stikala, daljinski upravljalniki).

Pred uporabo izdelka je treba površine in materiale, ki jih je treba razkužiti, temeljito očistiti in sprati s čisto vodo. Odvečno vodo je treba odstraniti.

Nerazredčen proizvod nanesite z (nizkotlačno) nahrbtno razpršilko ali sprožilnim razpršilnikom na površino ali predmet, ki ga je treba razkužiti. Za ustrezen čas stika glejte razdelek o stopnji in pogostosti nanosa. Obdelane površine morajo v času stika ostati mokre.

Izpiranje na koncu ni potrebno. Obdelane površine/material pustite, da se posušijo na zraku, ali pa jih obrišite z brisačo po izteku časa stika. Med sušenjem površin se mimoidoči/splošna javnost ne sme približati površinam. Če to ni mogoče, površine po izteku časa stika osušite z brisačo.

Od uporabnika se pričakuje, da bo pripravil točno določeno količino, potrebno za razkuževanje. Odstranjevanje preostale raztopine: če je na voljo, se zlije v odtok. Po nanosu očistite uporabljeno opremo.

4.10.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Uporabnika je treba usposobiti za pravilno uporabo predpisane opreme za zaščito dihal.

Za mešanje in polnjenje, nizkotlačno pršenje, suho brisanje po razkuževanju, čiščenje opreme, vzdrževanje in popravila:

Med ravnanjem s proizvodom je obvezna uporaba opreme za zaščito oči.

Med ravnanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic mora navesti imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).

Nositi je treba zaščitni kombinezon (vsaj tipa 6, EN 13034, 13962, 14605 ali 943).

Blago, ki se uporablja za suho brisanje razkuženih površin, je treba hraniti v zaprti posodi.

Zaščita dihal:

Za nanašanje z nizkotlačnim, grobim pršenjem na velike površine na področjih, ki niso namenjena zdravstveni oskrbi:

- v laboratorijih:

- je obvezna uporaba opreme za zaščito dihal (RPE), ki zagotavlja zaščitni faktor 40. Potreben je vsaj motoriziran dihalni aparat s čiščenjem zraka s čelado/kapo/masko (TH3/TM3) ali polna obrazna maska s plinskim filtrom (vrsto filtra (kodna črka, barva) določi imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).

- - Priporoča se uporaba profesionalne zaščite za obraz.

- v sanitarnih prostorih:

- je obvezna uporaba opreme za zaščito dihal (RPE), ki zagotavlja zaščitni faktor 40. Potreben je vsaj motoriziran dihalni aparat s čiščenjem zraka s čelado/kapo/masko (TH3/TM3) ali polna obrazna maska s plinskim filtrom (vrsto filtra (kodna črka, barva) določi imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu). Zagotovite, da je stopnja prezračevanja med razkuževanjem in po njem najmanj 3ACH.

- Priporoča se uporaba profesionalne zaščite za obraz.

- V čistih prostorih s povečanim prezračevanjem (20/h ali več):

- Je obvezna uporaba opreme za zaščito dihal (RPE), ki zagotavlja zaščitni faktor 20. Potreben je vsaj motoriziran dihalni aparat s čiščenjem zraka s čelado/kapo/masko (TH2/TM2) ali polna obrazna maska s plinskim filtrom (vrsto filtra (kodna črka, barva) določi imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).

- Priporoča se uporaba profesionalne zaščite za obraz.

- V večjih javnih prostorih:

- Je obvezna uporaba opreme za zaščito dihal (RPE), ki zagotavlja zaščitni faktor 10. Potreben je vsaj motoriziran dihalni aparat s čiščenjem zraka s čelado/kapo/masko (TH1/TM1) ali polovična/polna maska s plinskim filtrom (vrsto filtra (kodna črka, barva) določi imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).

- Priporoča se uporaba profesionalne zaščite za obraz.

Za nanašanje z ročnim sprožilnim razpršilom na velike površine (velikost površine 8–10 m²) na področjih, ki niso namenjena zdravstveni oskrbi:

- V čistih prostorih, sanitarnih prostorih:

- Je obvezna uporaba opreme za zaščito dihal (RPE), ki zagotavlja zaščitni faktor 20. Potreben je vsaj motoriziran dihalni aparat s čiščenjem zraka s čelado/kapo (TH2/TM2) ali polna obrazna maska s plinskim filtrom (tip filtra (črkovna oznaka, barva) navede imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).

- Priporoča se uporaba profesionalne zaščite za obraz.

- V čistih prostorih s povečanim prezračevanjem (20/h ali več) in laboratorijih:

- Je obvezna uporaba opreme za zaščito dihal (RPE), ki zagotavlja zaščitni faktor 10. Potreben je vsaj motoriziran dihalni aparat s čiščenjem zraka s čelado/kapo (TH2/TM2) ali polna obrazna maska s plinskim filtrom (tip filtra (črkovna oznaka, barva) navede imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).

- Priporoča se uporaba profesionalne zaščite za obraz.

4.10.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.10.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo.

4.10.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.11 Opis uporabe

Uporaba 11 - Uporaba 11: za razkuževanje trdih površin v prostorih, ki niso namenjeni zdravstveni oskrbi, za nepoklicno uporabo Vrsta proizvodov 02

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 02 - Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: drugo: kvasovke Splošno ime: Yeasts Razvojni stadij: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: virusi Splošno ime: Viruses Razvojni stadij: ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj V drugih prostorih, ki niso namenjeni zdravstveni oskrbi. Razkuževanje trdih/neporoznih površin s predhodnim čiščenjem
Način(-i) uporabe	Metoda: Z razprševanjem (po izteku časa stika po možnosti obrišite z brisačo do suhega) Podroben opis: -Napršiti s sprožilnim razpršilnikom in pustiti, da se površina/predmet posuši na zraku, ali obrisati površino/predmet z brisačo po izteku časa stika.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 40 ml/m ² (ali 20 sprožilnih razpršil/m ²) Redčenje (%): - Število in časovni raspored uporabe: enkrat na dan Z nerazredčenim izdelkom pri sobni temperaturi

	<p>Za delovanje na bakterije in kvasovke: čas stika 2 min</p> <p>Za učinek na bakterije, kvasovke in viruse: čas stika 5 min</p>
Skupina(-e) uporabnikov	Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	500 ml, 750 ml in 1l Razpršilo s sprožilcem HDPE (polietilen visoke gostote)

4.11.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Glej splošna navodila za uporabo.

Upoštevati navodila za uporabo.

Z razprševanjem s sprožilnim razpršilnikom in sušenjem površin na zraku ali brisanjem z brisačo po izteku časa stika: Kenolox 10 se uporablja za razkuževanje s pršenjem manjših površin v hišah ali javnih prostorih, kot so manjše površine v kopalnicah (npr. pipe, umivalniki), straniščna školjka, straniščni kotliček in površine, ki so v stiku z rokami (npr. zaslone na dotik, ročaj, stikala, daljinski upravljalniki). Pred uporabo izdelka je treba površine in materiale, ki jih je treba razkužiti, temeljito očistiti in sprati s čisto vodo. Odvečno vodo je treba odstraniti. Nerazredčen proizvod nanesite s sprožilnim razpršilnikom na površino ali predmet, ki ga je treba razkužiti. Za ustrezen čas stika glejte razdelek o stopnji in pogostosti nanosa. Obdelane površine morajo v času stika ostati mokre. Izpiranje na koncu ni potrebno. Obdelane površine/material pustite, da se posušijo na zraku, ali pa jih obrišite z brisačo po izteku časa stika. Med sušenjem površin se mimoidoči/splošna javnost ne sme približati površinam. Če to ni mogoče, površine po izteku časa stika osušite z brisačo.

4.11.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Po uporabi si temeljito umijteroke.

Izdelek je treba razpršiti navzdol.

Po razkuževanju zagotovite ustrezno prezračevanje (odprite okna in vrata). Obdelane površine morajo biti nedostopne dojenčkom, otrokom, spremljevalnim živalim in ne ciljnim živalim, dokler se te površine ne posušijo.

4.11.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

4.11.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo.

4.11.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo. Hraniti izven dosega otrok in neciljnih živali/hišnih ljubljencev.

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

Za uporabo glejte navodila za uporabo.

· Vse površine, namenjene razkuževanju, je treba očistiti pred postopkom razkuževanja. Na etiketo proizvoda bo dodan naslednji opozorilni stavek: "Temeljito očistite, sperite in odcedite čistilne tekočine s površin, ki jih je treba razkužiti".

· **Cikel razkuževanja :**

- Izdelek je namenjen uporabi v nerazredčeni obliki
- Čas stika je odvisen od zelene uporabe. Glejte opis metode nanosa za vsako posamezno uporabo.
- Končno izpiranje (s pitno vodo): ni potrebno.

Postopki razkuževanja s pršenjem : površine, namenjene razkuževanju, morajo biti dovolj mokre, da ostanejo mokre ves zahtevani čas stika za optimalno razkužitev. Potem mora uporabnik paziti, da površine popolnoma namoči z raztopino razkužila. Po izteku ustreznega časa stika je treba površino/predmet do suhega obrisati z brisačo.

Postopki razkuževanja s potopitvijo : Kad ni mišljena za ponovno uporabo. Kopel uporabite samo enkrat, izpraznite jo takoj po uporabi in jo tik pred vsako uporabo zamenjajte s svežo raztopino.

Postopki razkuževanja z zameglevanjem :

Med razkuževanjem v prostoru ne smejo biti prisotni ljudje, živali ali hrana.

Proizvod **KENOLOX 10** je tekoče razkužilo, pripravljeno za uporabo, ki se uporablja za razkuževanje površin iz zraka z zameglevanjem (v prostorih s prostornino med 30 in 150 m³ za delovanje proti virusom in v prostorih s prostornino med 30 in 2000 m³ za delovanje proti bakterijam in kvasovkam) in ga lahko uporabljajo samo poklicni uporabniki.

Vedno preverite združljivost z materiali, ki jih želite razkužiti.

Razkuževanje je treba izvajati v zaprtih prostorih.

Razkuževanje iz zraka se lahko izvaja le po čiščenju in izpiranju. Površine, namenjene razkuževanju, je treba posušiti pred postopkom razkuževanja.

Ne pozabite odpreti predalov omar.

Preverite temperaturo in relativno vlago (ki naj bi znašala med 51 in 87.3 %) v prostoru za zagotovitev optimalne stopnje za učinkovitost proizvoda.

Prostor, kjer poteka zameglevanje, je med zameglevanjem tesno zaprt, noben uporabnik ni prisoten:

Pred pričetkom cikla razkuževanja z zameglevanjem se obdelovani prostor zapečati. Za vse varnostne naloge za izvedbo dekontaminacije je zadolžen uporabnik, ki je opravil osnovno usposabljanje. Med njimi je prvi korak zaprtje enot za delo z zrakom in zaprtje vstopa in izstopa zraka, da se proizvod ne širi v druge prostore. Vsa vrata, ki vodijo ven z območja se nato zaklenejo in, če sklopi niso dovolj tesni, se jih zalepi s trakom. Priporoča se uporaba oranžnega ali svetlega traku, ki pritegne pozornost, in napisa »Dostop prepovedan, poteka razkuževanje prostora«. Za uporabo samo na območjih, ki niso dostopna splošni javnosti in spremljevalnim živalim.

Proizvod **KENOLOX 10** je bil zasnovan za uporabo na primer z atomizatorji NEBULO-NEBUROTOR. Število naprav (ali šob) je treba prilagoditi prostornini, ki jo je treba obdelati.

Penečega se proizvoda: med mešanjem in polnjenjem ne mešajte, da se izognete penjenju.

Vendar je mogoča uporaba drugih atomizatorjev. Ti morajo biti zasnovani tako, da zagotavljajo ustvarjanje megle, ki lahko ostane suspendirana v zraku, in pod pogojem, da te naprave izpolnjujejo naslednje značilnosti:

- Velikost delcev: 10 µm
- Pretok: 0.3 – 15 l/h
- Stopnja nanosa: 30 ml/m³
- prostornina prostora od 30 do 150 m³ (za delovanje proti virusom) in od 30 do 2000 m³ (za delovanje proti bakterijam in kvasovkam)

Uporabnik mora vedno opraviti mikrobiološko potrditev razkuževanja v prostorih, ki so predmet razkuževanja (ali ustreznem »standardnem prostoru«, če je primerno) z napravami, ki bodo uporabljene, nakar je mogoče pripraviti protokol za razkuževanje teh prostorov in ga uporabljati v prihodnje. Vsaka naprava ali specifična inštalacija se sistematično preveri, ko se jo postavi.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte ukrepe za zmanjšanje tveganja, specifične za posamezno uporabo.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

PRI VDIHAVANJU: Če se pojavijo simptomi, se obrnite na CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU S KOŽO: Slecite vsa kontaminirana oblačila in jih operite pred ponovno uporabo. Kožo sprati z vodo. Če nastopi draženje kože: Poiskati zdravniško pomoč.

PRI STIKU Z OČMI: Sprati z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte s spiranjem 5 minut. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ponuditi pijačo, če prizadeta oseba lahko požira. NE izzvati bruhanja. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Embalažo in vsebino je treba zavreči kot nevaren odpadni proizvod, za kar je v celoti odgovoren imetnik tega odpadka. Odpadkov ne mečite v kanalizacijo in vodotoke. Odstranite na varen način skladno z lokalnimi/nacionalnimi predpisi.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti samo v izvorni posodi na hladnem in dobro prezračenem mestu. Ko ni v uporabi, naj bo posoda zaprta. Ne shranjevati pri temperaturah, višjih od 40 °C.

Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
Rok uporabe izdelkov je 2 leti.

6. Druge informacije

Samo za profesionalno uporabo: P280 - Nositi zaščitne rokavice, zaščito za oči/obraz.

Samo za nepoklicno uporabo:

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok

P103 Pred uporabo preberite etiketo