

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

RATIGEN WAX BLOCK

Τύπος(οι) προϊόντος

PT14: Τρωκτικοκτόνα

Αριθμός άδειας: KY-0055

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: CY-0013797-0000

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	RATIGEN WAX BLOCK
-------------------	-------------------

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Όνομασία	IMPEX EUROPA, S.L.
	Διεύθυνση	Avda. de Pontevedra, nº 39 36600 Vilagarcía de Arousa Ισπανία
Αριθμός άδειας		KY-0055
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		CY-0013797-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		05/02/2014
Ημερομηνία λήξης της άδειας		31/12/2026

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	IMPEX EUROPA, S.L.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Avda. de Pontevedra Nº 39 36600 Villagarcia de Arosa-Pontevedra Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Pol. Ind. de Trabanca Badiña, parcelas 22-24 36600 Villagarcia de Arosa - Pontevedra Ισπανία

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	Brodifacoum (βρωδιφακούμη)
Επωνυμία παρασκευαστή	Activa s.r.l.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Feltre, 32 20132 Milano Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio (VR) Ιταλία

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum (βρωδιφακούμη)	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	δραστική ουσία	56073-10-0	259-980-5	0,005 % (β/β)

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

XX Άλλο: έτοιμο για χρήση μπλοκ

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H360D: Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.</p> <p>H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα {0:ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά:} ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση {1:αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης:}.</p>
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.</p> <p>P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης.</p> <p>P280: Να φοράτε προστατευτικά ενδύματα.</p> <p>P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΣΕΩΝ.</p> <p>P314: Συμβουλευθείτε Συμβουλευθείτε εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.</p> <p>P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.</p> <p>P501: Διάθεση του περιεχομένου σε κατάλληλα σημεία συλλογής.</p> <p>P501: Διάθεση του περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής.</p>

Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

**Πίνακας 1. Χρήση 1 -Ποντίκιακαινουφίτσες-Εξειδικευμένο Προσωπικό–
Εσωτερικά και Εξωτερικά Κτιρίων**

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: άλλο: ΚαφέΑρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ενήλικα Επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: άλλο: ΚαφέΑρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά Επιστημονική ονομασία: Mus musculus Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακόποντίκι Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ενήλικα Επιστημονική ονομασία: Mus musculus Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακόποντίκι Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο χρήση σε εξωτερικό χώρο άλλο: Other Εσωτερικούς χώρους. Εξωτερικούς χώρους. Μέσα και γύρω από τα κτήρια. Άλλο.
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Δολωματική εφαρμογή - Λεπτομερής περιγραφή: Δολωματική εφαρμογή - • Δόλωμα έτοιμο προς χρήση για χρήση σε ανθεκτικούςδολωματικούςσταθμούς ασφαλείας. • Καλυμμένα και προστατευμένα δολωματικά σημεία. Δολωματική εφαρμογή -Απευθείας εφαρμογή έτοιμου προς χρήση δολώματος στο σημείο προσβολής. Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Δολωματική εφαρμογή - Απευθείας εφαρμογή έτοιμου προς χρήση δολώματος στο σημείο προσβολής
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Αρουραίοι: κιβώτια δολωμάτων με έως 100 ή 200 g προϊόντος για κάθε 5-10m / Ποντίκια: κιβώτια δολωμάτων με έως και 50 g προϊόντος για κάθε 5-10m Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Αρουραίοι: δολωματικοί σταθμοί με 100 έως 200 g προϊόντος για κάθε 5-10m. Κύβος των 5,10, 15, 20, 25, 30, 50 και 100 g για δολωματικούς σταθμούς 100 g και κύβοι 5,10,15, 20, 25, 30, 50 και 100 g για δολωματικούς σταθμούς 200 g.

	<p>Ποντίκια: δολωματικοί σταθμοί με έως και 50 g προϊόντος για κάθε 5-10 μέτρα</p> <p>Αρουραίοι: 100 - 200 g προϊόντος ανά σημείο δόλωσης. / Ποντικοί: 50 g προϊόντος ανά σημείο δόλωσης.- 0 - Αρουραίοι: 100 - 200 g προϊόντος ανά σημείο δόλωσης. Ποντίκια: 50 g προϊόντος ανά σημείο δόλωσης.</p> <p>Δόση εφαρμογής: Αρουραίοι: 100 - 200 g προϊόντος ανά σημείο δόλωσης. / Ποντικοί: 50 g προϊόντος ανά σημείο δόλωσης.</p> <p>Αραίωση (%): 0</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Αρουραίοι: 100 - 200 g προϊόντος ανά σημείο δόλωσης. Ποντίκια: 50 g προϊόντος ανά σημείο δόλωσης</p>
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Το προϊόν μπορεί να τοποθετηθεί στην αγορά σε κέρινους κύβους 5,10, 15, 20, 25, 30, 50, 90 και 100g, στις ακόλουθες συσκευασίες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PE ή PP φάκελο/σακούλα ή χάρτινη Kraft σακούλα με εσωτερική στρώση PE ή PP των 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250,260, 300, 360,400, 500,540, 600 και 800g 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 και 25kg. • Χάρτινο κιβώτιο με εσωτερική στρώση PE ή PP των 100, 150, 200, 250,260, 300, 360, 400, 500, 540, 600, και 800g και 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 και 25kg. • Κουβάδες HDPE των 100, 150, 200, 250, 260, 300, 360, 400, 500g 540,,600, 800G και 1, 2, 3, 4,5, 10, 15, 20, 20,7 και 25kg.

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Αφαιρέστε το εναπομένον προϊόν στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.

- Η ακόλουθη πρόταση πρέπει να περιλαμβάνεται στην ετικέτα: "Αποκλειστική χρήση για εκπαιδευμένους επαγγελματίες χρήστες".

- Σε περίπτωση μόνιμων σημείων δολώσεως: όπου είναι δυνατόν, συνιστάται η επανεξέταση της περιοχής εφαρμογής κάθε 4 εβδομάδες το αργότερο, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

- Για εξωτερική χρήση, τα δολωματικά σημεία πρέπει να καλύπτονται και να τοποθετούνται σε στρατηγικά σημεία για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε είδη που δεν αποτελούν στόχο.

- Τα δολώματα πρέπει να τοποθετούνται με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε είδη μη-στόχους και παιδιά.

- Καλύψτε ή αποκλείστε τις εισόδους των σημείων δολώσεως για να μειώσετε τους κινδύνους απόρριψης και έκχυσης των δολωμάτων.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Όπου είναι δυνατόν, πριν από την εφαρμογή ενημερώστε τους πιθανούς παρευρισκομένους (π.χ. χρήστες της περιοχής εφαρμογής και αυτούς που τους περιβάλλουν) σχετικά με την εκστρατεία ελέγχου τρωκτικών.

- Εξετάστε μέτρα προληπτικού ελέγχου (π.χ. σκάψιμο τρυπών, απομακρύνετε πιθανά τρόφιμα και πτότα όσο πιο ακριβώς γίνεται) για να βελτιώσετε την πρόσληψη του προϊόντος και να μειώσετε την πιθανότητα επανάληψης της προσβολής.

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής σε συχνές χρονικές περιόδους, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με εφαρμογές τύπου «pulsed».

- Σε περίπτωση μόνιμου σημείου δολώσεως: Το μόνιμο σημείο δολώσεως περιορίζεται αυστηρά σε τοποθεσίες με υψηλή πιθανότητα επανεμφάνισης της προσβολής, όταν άλλες μέθοδοι ελέγχου αποδεικνύονται ανεπαρκείς. Η στρατηγική μόνιμων σημείων δολώσεως πρέπει να επανεξετάζεται περιοδικά στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM) και της εκτίμησης του κινδύνου επανεμφάνισης της προσβολής.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε δολωματικά σημεία κοντά στα επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, λίμνες, κανάλια νερού, αναχώματα, κανάλια άρδευσης) ή συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Η επικέτα του προϊόντος πρέπει να περιέχει η ακόλουθη πρόταση: " οι άδειες συσκευασίες, τα νεκρά τρωκτικά, τα δολώματα και οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, μέσω των διαχειριστών απορριμμάτων."

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε αυτό το σημείο στην ενότητα 5, οδηγίες χρήσης.

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2. Χρήση #2 – Αρουραίοι και ποντικοί – Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες – Υπαίθριες περιοχές και χωματερές Use #2 - Rats and Mice - Trained Professional - Open areas and waste dumps

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	<p>Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: ΚαφέΑρουραίος- Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ενήλικα</p> <p>Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: ΚαφέΑρουραίος- Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά</p> <p>Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακόποντίκι Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ενήλικα</p> <p>Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακόποντίκι Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά</p>
Πεδίο(α) χρήσης	<p>χρήση σε εξωτερικό χώρο άλλο: Other</p> <p>Εξωτερικούς χώρους Άλλους Υπαίθριες περιοχές και χωματερές.</p>
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	<p>Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή</p> <p>Λεπτομερής περιγραφή: Δολωματική εφαρμογή - • Δόλωμα έτοιμο προς χρήση για χρήση σε ανθεκτικούς δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας. • Καλυμμένα και προστατευμένα δολωματικά σημεία. Δολωματική εφαρμογή -Απευθείας εφαρμογή έτοιμου προς χρήση δολώματος στο σημείο δολώσεως. Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή</p> <p>Λεπτομερής περιγραφή: Δολωματική εφαρμογή - Απευθείας εφαρμογή έτοιμου προς χρήση δολώματος στο σημείο δολώσεως.</p>
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: Αρουραίοι: κιβώτια δολωμάτων με έως 100 ή 200 g προϊόντος για κάθε 5-10m / Ποντίκια: κιβώτια δολωμάτων με έως και 50 g προϊόντος για κάθε 5-10m</p> <p>Αραίωση (%): 0</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Αρουραίοι: δολωματικοί σταθμοί με 100 έως 200 g προϊόντος για κάθε 5-10 m . Κύβοι των 5,10, 15, 20, 25, 30, 50 και 100 g για κουτιά δολωμάτων 100 g και κύβοι 5,10,15, 20, 25, 30, 50 και 100 g για δολωματικούς σταθμούς 200 g . Ποντίκια: δολωματικοί σταθμοί με έως και 50 g προϊόντος για κάθε 5-10 μέτρα</p>

	<p>Αρουραίοι: 100 - 200 g προϊόντος ανά σημείο δολώσεως. / Ποντικοί: 50 g προϊόντος ανά σημείο δολώσεως.- 0 - Αρουραίοι: 100 - 200 g προϊόντος ανά σημείο δολώσεως. Ποντίκια: 50 g προϊόντος ανά σημείο δολώσεως.</p> <p>Δόση εφαρμογής: Αρουραίοι: κιβώτια δολωμάτων με έως 100 ή 200 g προϊόντος για κάθε 5-10m / Ποντίκια: κιβώτια δολωμάτων με έως και 50 g προϊόντος για κάθε 5-10m</p> <p>Αραίωση (%): 0</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:</p> <p>Αρουραίοι: δολωματικοί σταθμοί με 100 έως 200 g προϊόντος για κάθε 5-10m. Κύβοι των 5,10, 15, 20, 25, 30, 50 και 100 g για κουτιά δολωμάτων 100 g και κύβοι 5,10,15, 20, 25, 30, 50 και 100 g για δολωματικούς σταθμούς 200 g. Ποντίκια: δολωματικοί σταθμοί με έως και 50 g προϊόντος για κάθε 5-10 μέτρα</p> <p>Αρουραίοι: 100 - 200 g προϊόντος ανά σημείο δολώσεως. / Ποντικοί: 50 g προϊόντος ανά σημείο δολώσεως.- 0 - Αρουραίοι: 100 - 200 g προϊόντος ανά σημείο δολώσεως. Ποντίκια: 50 g προϊόντος ανά σημείο δολώσεως.</p>
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Το προϊόν μπορεί να τοποθετηθεί στην αγορά σε κέρινους κύβους των 5,10, 15, 20, 25, 30, 50, 90 και 100g, στις ακόλουθες συσκευασίες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PE ή PP σακούλα/φάκελο ή χάρτινη Kraft σακούλα με εσωτερική στρώση PE ή PP των 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250,260, 300, 360,400, 500,540, 600 και 800g 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 και 25kg.

• Χάρτινο κιβώτιο με εσωτερική στρώση PE ή PP των 100, 150, 200, 250, 260, 300, 360, 400, 500, 540, 600, και 800g και 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 και 25kg.

• Κουβάδες HDPE των 100, 150, 200, 250, 260, 300, 360, 400, 500, 540, 600, 800G και 1, 2, 3, 4,5, 10, 15, 20, 20,7 και 25kg.

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Προστατέψτε τα δολώματα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Τοποθετήστε τα δολωματικά σημεία σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε πλημμύρες.
- Αντικαταστήστε το δόλωμα από δολωματικά σημεία στα οποία το δόλωμα έχει παραποιηθεί από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες.

- Αφαιρέστε το εναπομένον προϊόν στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.
- Η ακόλουθη πρόταση πρέπει να περιλαμβάνεται στην ετικέτα: " Αποκλειστική χρήση για εκπαιδευμένους επαγγελματίες χρήστες "
- Σε περίπτωση μόνιμων σημείων δολώσεως: όπου είναι δυνατόν, συνιστάται η επανεξέταση της περιοχής εφαρμογής κάθε 4 εβδομάδες το αργότερο, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
- Για εξωτερική χρήση, τα δολωματικά σημεία πρέπει να καλύπτονται και να τοποθετούνται σε στρατηγικά σημεία για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε είδη που δεν αποτελούν στόχο.
- Τα δολώματα πρέπει να τοποθετούνται ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε μη στοχευόμενα είδη και σε παιδιά.
- Καλύψτε ή αποκλείστε τις εισόδους των σημείων δολώσεως για να μειώσετε τους κινδύνους απόρριψης και έκχυσης των δολωμάτων.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Όπου είναι δυνατόν, πριν από την εφαρμογή ενημερώστε τους πιθανούς παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της περιοχής εφαρμογής και αυτούς που τους περιβάλλουν) σχετικά με την εκστρατεία ελέγχου τρωκτικών.
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής σε συχνές χρονικές περιόδους, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με εφαρμογές τύπου «pulsed».
- Σε περίπτωση μόνιμου σημείου δολώσεως: Το μόνιμο σημείο δολώσεως περιορίζεται αυστηρά σε τοποθεσίες με υψηλή πιθανότητα επανεμφάνισης της προσβολής, όταν άλλες μέθοδοι ελέγχου αποδεικνύονται ανεπαρκείς. Η στρατηγική μόνιμων σημείων δολώσεως πρέπει να επανεξετάζεται περιοδικά στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM) και της εκτίμησης του κινδύνου επανεμφάνισης της προσβολής.

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε δολωματικά σημεία κοντά στα επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, λίμνες, κανάλια νερού, αναχώματα, κανάλια άρδευσης) ή συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό.

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Η ετικέτα του προϊόντος πρέπει να περιέχει την ακόλουθη πρόταση: " οι άδειες συσκευασίες, τα νεκρά τρωκτικά, τα δολώματα και οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, μέσω των διαχειριστών απορριμμάτων."

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε αυτό το σημείο στην ενότητα 5, οδηγίες χρήσης.

4.3. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 3. Χρήση #3 - Αρουραίοι – Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες - Υπόνομοι Use #3 - Rats - Trained Professional - Sewers Use #3 - Rats - Trained Professional - Sewers

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετική για τρωκτικοκτόνα . Υπόνομοι
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος- Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ενήλικα Επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά Επιστημονική ονομασία: Mus musculus Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακό ποντίκι- Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ενήλικα Επιστημονική ονομασία: Mus musculus Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακό ποντίκι- Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο Εξωτερικούς χώρους Υπόνομοι

Μέθοδος(οι) εφαρμογής	<p>Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή</p> <p>Λεπτομερής περιγραφή: Δολωματική εφαρμογή - • Δόλωμα έτοιμο προς χρήση για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας. • Καλυμμένα και προστατευμένα δολωματικά σημεία. Δολωματική εφαρμογή -Απευθείας εφαρμογή έτοιμου προς χρήση δολώματος στο σημείο εφαρμογής.</p> <p>Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή</p> <p>Λεπτομερής περιγραφή: Δολωματική εφαρμογή - • Δόλωμα έτοιμο προς χρήση για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας. • Καλυμμένα και προστατευμένα δολωματικά σημεία. Δολωματική εφαρμογή -Απευθείας εφαρμογή έτοιμου προς χρήση δολώματος στο σημείο εφαρμογής.</p>
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: Αρουραίοι: Δολωματικοί σταθμοίμέχρι 200 gπροϊόντος για κάθε 5-10 m</p> <p>Αραίωση (%): 0</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Δολωματικοί σταθμοίμέχρι 200 g κύβωντων 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 150 και 200 g .</p> <p>Αρουραίοι: 100 - 200 g προϊόντος για κάθε σημείο εφαρμογής / Ποντίκια: 50 g προϊόντος για κάθε σημείο εφαρμογής - Αρουραίοι: 100 - 200 g προϊόντος για κάθε σημείο εφαρμογής</p> <p>Ποντίκια: 50 g προϊόντος για κάθε τρύπα-φωλιά.</p> <p>Δόση εφαρμογής: Αρουραίοι: Δολωματικοί σταθμοίμέχρι 200 gπροϊόντος για κάθε 5-10 m</p> <p>Αραίωση (%): 0</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:</p> <p>Δολωματικοί σταθμοίμέχρι 200 g κύβωντων 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 150 και 200 g .</p>

	<p>Αρουραίοι: 100 - 200 g προϊόντος για κάθε σημείο εφαρμογής / Ποντίκια: 50 g προϊόντος για κάθε σημείο εφαρμογής - Αρουραίοι: 100 - 200 g προϊόντος για κάθε σημείο εφαρμογής</p> <p>Ποντίκια: 50 g προϊόντος για κάθε τρύπα-φωλιά.</p>
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Το προϊόν μπορεί να τοποθετηθεί στην αγορά σε κέρινους κύβους των 5,10, 15, 20, 25, 30, 50, 90 και 100g, στις ακόλουθες συσκευασίες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PE ή PP σακούλα/φάκελο ή χάρτινη Kraft σακούλα με εσωτερική στρώση PE ή PP των 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250,260, 300, 360,400, 500,540, 600 και 800g 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 και 25kg. • Χάρτινο κιβώτιο με εσωτερική στρώση PE ή PP των 100, 150, 200, 250,260, 300, 360, 400, 500, 540, 600, και 800g και 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 και 25kg. • Κουβάδες HDPE των 100, 150, 200, 250, 260, 300, 360, 400, 500g 540, 600, 800G και 1, 2, 3, 4,5, 10, 15, 20, 20,7 και 25kg.

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Τα δολώματα πρέπει να εφαρμόζονται κατά τρόπο ώστε να μην έρχονται σε επαφή με το νερό και να μην ξεπλένονται.

- Η ακόλουθη πρόταση πρέπει να περιλαμβάνεται στην ετικέτα: "Αποκλειστική χρήση για εκπαιδευμένους επαγγελματίες χρήστες".

- Σε περίπτωση μόνιμων σημείων δολώσεως: όπου είναι δυνατόν, συνιστάται η επανεξέταση της περιοχής εφαρμογής κάθε 4 εβδομάδες το αργότερο, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

- Για εξωτερική χρήση, τα δολωματικά σημεία πρέπει να καλύπτονται και να τοποθετούνται σε στρατηγικά σημεία για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε είδη που δεν αποτελούν στόχο.

- Τα δολώματα πρέπει να τοποθετούνται ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε μη στοχευόμενα είδη και σε παιδιά.

- Καλύψτε ή αποκλείστε τις εισόδους των σημείων εφαρμογής για να μειώσετε τους κινδύνους απόρριψης και έκχυσης των δολωμάτων.

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Τοποθετείται δολώματα μόνο σε συστήματα αποχετεύσεων που ενώνονται με μονάδα επεξεργασίας.
- Μην χρησιμοποιείται το προϊόν σε εφαρμογές τύπου «pulsed».
- Σε περίπτωση μόνιμου σημείου δολώσεως: Το μόνιμο σημείο δολώσεως περιορίζεται αυστηρά σε τοποθεσίες με υψηλή πιθανότητα επανεμφάνισης της προσβολής, όταν άλλες μέθοδοι ελέγχου αποδεικνύονται ανεπαρκείς. Η στρατηγική μόνιμων σημείων δολώσεως πρέπει να επανεξετάζεται περιοδικά στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM) και της εκτίμησης του κινδύνου επανεμφάνισης της προσβολής.

4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε αυτό το σημείο στην ενότητα 5, οδηγίες χρήσης.

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Η ετικέτα του προϊόντος πρέπει να περιέχει την ακόλουθη πρόταση: " οι άδειες συσκευασίες, τα νεκρά τρωκτικά, τα δολώματα και οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, μέσω των διαχειριστών απορριμμάτων."

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε αυτό το σημείο στην ενότητα 5, οδηγίες χρήσης.

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες χρήστες

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Διεξάγετε προκαταρκτική έρευνα σχετικά με τη προσβεβλημένη περιοχή και επιτόπια αξιολόγηση προκειμένου να προσδιορίσετε τα είδη τρωκτικών, τους τόπους δραστηριότητάς τους και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και την έκταση της προσβολής.
- Αφαιρέστε τα τρόφιμα τα οποία είναι εύκολα προσβάσιμα για τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Εκτός από αυτό, μην καθαρίσετε την προσβεβλημένη περιοχή παρά μόνο πριν τη εφαρμογή, καθώς αυτό διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσχεραίνει την αποδοχή των δολωμάτων.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των παρασίτων (IPM), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικές μεθόδους ελέγχου.
- Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται σε άμεση γειτνίαση με τα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί προηγουμένως η δραστηριότητα των τρωκτικών (π.χ. διάδρομοι, φωλιές, τροφές, τρύπες, αυλάκια κλπ.).
- Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλα σημεία.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να είναι σαφώς επισημασμένοι ώστε να δείχνουν ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται (βλ. παράγραφο 5.3 για τις πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα).
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να επισημαίνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής και θα πρέπει να αναγράφεται μια ειδοποίηση που να εξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και τα πρώτα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης πρέπει να διατίθενται παράλληλα με τα δολώματα.
- Το δόλωμα πρέπει να ασφαρίζεται έτσι ώστε να μην μπορεί να απομακρυνθεί από τον δολωματικό σταθμό.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια ζώα και ζώα εκτροφής και άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έχουν επαφή με αυτά.
- Σε περίπτωση που απαιτείται από την εκτίμηση κινδύνου: Να φοράτε ανθεκτικά προστατευτικά χημικά πλαστικά γάντια κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Η συχνότητα των επισκέψεων στην περιοχή εφαρμογής πρέπει να βρίσκεται στη κρίση του επαγγελματία χρήστη, και εξαρτάται από τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη κατά την έναρξη της εφαρμογής. Η συχνότητα αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.
- Εάν η πρόσληψη δολώματος είναι χαμηλή σε σχέση με το διαφαινόμενο μέγεθος της προσβολής, σκεφτείτε την αντικατάσταση των δολωματικών σημείων σε άλλες θέσεις και τη πιθανότητα αλλαγής σε άλλη σύνθεση δολώματος.
- Εάν μετά από μια περίοδο εφαρμογής 35 ημερών τα δολώματα συνεχίζουν να καταναλώνονται και δεν παρατηρείται μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, πρέπει να καθοριστεί η πιθανή αιτία. Όταν έχουν αποκλεισθεί άλλα στοιχεία, είναι πιθανό να υπάρχουν ανθεκτικά τρωκτικά, οπότε εξετάστε τη χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου υπάρχει δυνατότητα, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, θεωρήστε τη χρήση παγίδων ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
- Μην χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα ύπαρξης ανθεκτικοτήτων στη δραστική ουσία.

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

-
- Η εφαρμογή πρέπει να εναλλάσσεται με άλλα είδη δραστικών ουσιών, προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση ανθεκτικότητας και διασταυρούμενων ανεκτικότητων σε τρωκτικοκτόνα.
 - Σε περίπτωση μόνιμου σημείου δολώσεως: όπου είναι δυνατόν, συνιστάται η επανεξέταση της περιοχής εφαρμογής κάθε 4 εβδομάδες το αργότερο, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
 - Για εξωτερική χρήση, τα δολωματικά σημεία πρέπει να καλύπτονται και να τοποθετούνται σε στρατηγικές τοποθεσίες για να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση σε είδη που δεν αποτελούν στόχο.
 - Τα δολώματα πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε είδη που δεν αποτελούν στόχο και σε παιδιά.
 - Καλύψτε ή αποκλείστε τις εισόδους των σημείων εφαρμογής για να μειώσετε τους κινδύνους απόρριψης και έκχυσης των δολωμάτων.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες χρήστες

- Όπου είναι δυνατόν, πριν από την εφαρμογή ενημερώστε τους πιθανούς παρευρισκόμενους σχετικά με την εκστρατεία ελέγχου τρωκτικών.
- Οι πληροφορίες για το προϊόν (δηλ. η ετικέτα ή / και το φυλλάδιο) πρέπει να δίνουν σαφείς οδηγίες ότι το προϊόν πρέπει να παρέχεται μόνο σε εκπαιδευμένους επαγγελματίες χρήστες που διαθέτουν πιστοποίηση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις κατάρτισης.
- Μην χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία για ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία.
- Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πέρα των 35 ημερών χωρίς αξιολόγηση του επιπέδου προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής ή των μόνιμων εφαρμογών με δόλωμα υπό ορισμένες συνθήκες.
- Σε περίπτωση μόνιμου σημείου δολώσεως: Το μόνιμο σημείο δολώσεως περιορίζεται αυστηρά σε τοποθεσίες με υψηλή πιθανότητα επανάληψης της προσβολής, όταν άλλες μέθοδοι ελέγχου αποδείχθηκαν ανεπαρκείς.
- Η μόνιμη στρατηγική καταπολέμησης πρέπει να αναθεωρείται περιοδικά μέσα στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (IPM) και να επανεξετάζεται συνεχώς ο κίνδυνος για νέα προσβολή.
- Για σκοπούς διαχείρισης της ανθεκτικότητας, να μην γίνεται η εναλλαγή των αντιπηκτικών σκευασμάτων με αντίστοιχη ή ασθενέστερη δραστικότητα. Για εναλλασσόμενη χρήση εξετάστε την πιθανότητα, εάν υπάρχει, ενός μη-αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, ή ενός πιο ισχυρού αντιπηκτικού σκευάσματος.
- Μην πλένετε τους δολωματικούς σταθμούς ή οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιήθηκε σαν δολωματικός σταθμός με νερό μεταξύ εφαρμογών.
- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
- Η άδεια απαιτεί το προϊόν να βαφεί με χρώμα ώστε να μην είναι ελκυστικό για την άγρια πανίδα και ιδιαίτερα για τα πουλιά.
- Το προϊόν πρέπει να περιέχει αποτρεπτικό και πικραντικό παράγοντα.

Ισπανικά μέτρα μετριασμού των κινδύνων:

Το προϊόν πρέπει να περιέχει βαφή και πικραντικό παράγοντα. Προκειμένου να αποφευχθεί η ανθεκτικότητα και η πρωτογενής δηλητηρίαση για ζώα που δεν αποτελούν στόχο, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για έλεγχο τρωκτικών. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, τουλάχιστον όσο συχνά ελέγχονται και / ή αναπληρώνονται τα δολώματα.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

- Αυτό το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγίες και αιμορραγία ούλων. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα.

- **Αντίδοτο: Η βιταμίνη K1 χορηγείται μόνο από ιατρικό / κτηνιατρικό προσωπικό.**

- Σε περίπτωση:

- Επαφής με το δέρμα, πλύνετε το δέρμα με νερό και στη συνέχεια με νερό και σαπούνι.
- Επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια με κατάλληλο υγρό ή νερό, κρατήστε τα μάτια ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.
- Έκθεσης από το στόμα, ξεπλύνετε προσεκτικά το στόμα με νερό. Ποτέ μην δίνετε τίποτα από το στόμα στο άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο.

ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ Ή ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

- Κλινικά συμπτώματα: Αιμορραγία, που προέρχεται από την επίδραση της αντιπροθρομβίνης - παρατεταμένος χρόνος προθρομβίνης - που μπορεί να είναι εμφανής σε ελάχιστη 24 - μέγιστη περίοδο 72 ωρών (Ένας κανονικός χρόνος προθρομβίνης

όταν ο ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο, δεν αποκλείει τη διάγνωση).

- Για να αναφέρετε συμβάντα ανθρώπινης δηλητηρίασης, καλέστε το αρμόδιο τηλεφωνικό κέντρο δηλητηριάσεων. Περιλάβετε πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό έγκρισης προϊόντος, την εμπορική ονομασία του προϊόντος και τη δραστική ουσία. Αν είναι δυνατόν, να παρέχεται αντίγραφο της ετικέτας ή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις: "μη μετακινείτε ή ανοίγετε", "περιέχει τρωκτικοκτόνο", "όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης". "δραστική ουσία (-ες)" και "σε περίπτωση συμβάντος, καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων (1401).

- Επικίνδυνο για την άγρια ζωή.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Εκπαιδευμένοι Επαγγελματίες Χρήστες

- Στο τέλος της εφαρμογής, απορρίψτε το αφάγωτο δόλωμα και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Αποθηκεύστε σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε τον περιέκτη κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

-
- Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν επιτρέπεται η πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων ζώων και ζώων εκτροφής
 - Διάρκεια ζωής: Το βιοκτόνο είναι σταθερό για 24 μήνες

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Λόγω του τρόπου δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα χρειάζονται από 4 έως 10 ημέρες για να είναι αποτελεσματικά μετά την κατανάλωση του δολώματος.

- Τα τρωκτικά μπορούν να είναι φορείς ασθένειας. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή χρησιμοποιείτε εργαλεία όπως λαβίδες όταν τα απορρίπτετε.
- Αυτό το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα και χρωστική ουσία.