

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

Ime prvič avtoriziranega proizvoda: FREE LAND 10EC

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja: SI-0030265-0000

Referenčna številka vnosa v R4BP 3: SI-0030265-0000

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	2
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	2
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	20
5.1. Navodila za uporabo	20
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	20
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	20
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	20
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	20
6. Druge informacije	21

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

Free Land 10EC

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	Activa s.r.l.
	Naslov	via Feltre, 32 20132 Milano Italija
Številka dovoljenja	SI-0030265-0000	
Referenčna številka vnosa v R4BP 3	SI-0030265-0000	
Datum dovoljenja	16/02/2023	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	16/02/2033	

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	Activa S.r.l.
Naslov proizvajalca	Via Feltre 32 20132 Milano Italija
Lokacije proizvodnje	(1) c/o ALTHALLER ITALIA s.r.l. Strada Com.le per Campagna, 5 20078 San Colombano al Lambro (MI) Italija
	(2) c/o FERBI SRL Contrada Ripoli 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Italija
	(3) c/o DIACHEM SpA Via Mozzanica, 9/11 24043 Caravaggio (BG) Italija

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	1283 - (RS)- α -ciano-3-fenoksibenzil-(1RS)- cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (cipermetrin)
Ime proizvajalca	Limaru NV (acting for Tagros Chemicals India Ltd)
Naslov proizvajalca	Paalsesteenweg 170 Bus 7 B-3583 Beringen Belgija
Lokacije proizvodnje	Tagros Chemicals India Private Ltd, Plant: A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam, Cuddalore 607 005 Tamil Nadu Indija

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
(RS)- α -ciano-3-fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (cipermetrin)		Aktivna snov	52315-07-8	257-842-9	10,53
DPM – methoxymethyl-ethoxy propanol	2-methoxymethyl-ethoxy propanol	Neaktivna snov	34590-94-8	252-104-2	54,47

2.2. Vrsta formulacije

EC - koncentrat za emulzijo

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti	Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Lahko škoduje organom živčni system pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti ..
Previdnostni stavki	Preprečiti sproščanje v okolje. Prestreči razlito tekočino. Odstraniti posodo nacionalne ureditve.

Odstraniti vsebino nacionalne ureditve.

Ne vdihavati prahu.

Ne vdihavati dima.

Ne vdihavati plina.

Ne vdihavati meglice.

Ne vdihavati hlapov.

Ne vdihavati razpršila.

Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč.

Ob slabem počutju poiščite zdravniško oskrbo.

4. Dovoljena(e) uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Točkovni nanos proti plazečim žuželkam v zaprtih prostorih -Profesionalni uporabnik

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Točkovni nanos
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	<p>Znanstveno ime: Blattella germanica Splošno ime: Nemški ščurek Razvojni stadij: Odrasli osebki</p> <p>Znanstveno ime: Blatta orientalis Splošno ime: Orientalski ščurki Razvojni stadij: Odrasli osebki</p> <p>Znanstveno ime: Lasius niger Splošno ime: Vrtna mravlja Razvojni stadij: Odrasli osebki</p>
Področje uporabe	Notranjost, znotraj
Način(-i) uporabe	<p>Metoda: Točkovni nanos s škropljenjem Podroben opis: Za obdelavo poroznih površin, uporabiti 10 g koncentriran izdelkom in razredčimo v 1 L vode (1%); temeljito premešajte in nanesite z ustreznim razpršilcem s količino 50 mL raztopina na 1 m²</p> <p>Za obdelavo neporozne površine, uporabiti 5 g koncentriran izdelkom in razredčimo v 1 L vode (0.5%); temeljito premešajte in nanesite z ustreznim razpršilcem s količino 40 mL raztopina na 1 m².</p>

	Preostala količina: 4 tedni
Odmerki in pogostost uporabe	<p>Odmerek: Poroznih površin: odmerek glede na zdravilno učinkovino je 52.7 mg t.g.a.i./m2. Neporozne površine: odmerek glede na zdravilno učinkovino je 21 mg t.g.a.i./m2.</p> <p>Redčenje (%):</p> <p>Število in časovni raspored uporabe:</p> <p>Zdravljenje se lahko izvaja do 2-krat na leto.</p>
Skupina(-e) uporabnikov	<p>Strokovnjak z licenco</p> <p>Poklicni</p>
Velikosti in material embalaže	<p>HDPE steklenica z merilnim pokrovčkom: 100, 250, 500, 1000, 2000 ml.</p> <p>HDPE steklenica z merilno komoro (steklenica z dvojnimi vratom): 500, 1000 ml.</p> <p>HDPE Kanister : 5, 10, 20 L.</p>

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Izdelkom je treba uporabljati na omejenih območjih na površinah, ki se ne redno čistijo, na primer zadaj ali pod hladilnik, pod kuhinjskih korit, pod pečico ali grelnik vode, kjer se žuželke ponavadi skrivajo.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ne uporabljajte na območjih, ki so dovzetna za rutina mokrega čiščenja.

Izogibajte se stiku z obdelanimi površinami.

V fazi ravnanja z izdelkom nosite zaščitne kemijsko odporne rokavice (material rokavic določi imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku).

Nositi je treba zaščitni kombinezon (vsaj tip X, EN XXXXX).

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Točkovni nanos proti plazečim žuželkam v zaprtih prostorih -Splošna javnost

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Točkovni nanos
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Blattella germanica</i> Splošno ime: Nemški ščurek Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: <i>Blatta orientalis</i> Splošno ime: Orientalski ščurki Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: <i>Lasius niger</i> Splošno ime: Vrtna mravlja Razvojni stadij: Odrasli osebki
Področje uporabe	Notranjost, znotraj
Način(-i) uporabe	Metoda: Točkovni nanos s škropljenjem Podroben opis: Pri poroznih površnin (npr. beton, opeka, lesena plastika, itd.) (52.7 mg t.g.a.i./m ²) • Steklenica z merilnim okencem: odmerite 1 mL izdelka in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m ² • Pakiranje za enkratno uporabo 1 mL: odprite tesnilo in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m ² • Sistem je pripravljen za redčenje: Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m ² • Kartušni sistem: Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m ² Pri non poroznih površnin (npr. plastika, kovina, keramika, itd.) (21 mg t.g.a.i./ m ²): • Steklenica z merilnim okencem: odmerite 0.5 mL izdelka in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 32 pršenj na m ² .

	<ul style="list-style-type: none"> • Pakiranje za enkratno uporabo 1 mL: odprite tesnilo in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 16 pršenj na m². • Sistem je pripravljen za redčenje: Dobro pretresite in opraviti 16 pršenj na m². • Kartušni sistem: Dobro pretresite in opraviti 16 pršenj na m². <p>Preostala količina: 4 tedni:</p>
Odmerki in pogostost uporabe	<p>Odmerek: Pri poroznih površin 52.7 mg t.g.a.i./m². Pri non poroznih površin 21 mg t.g.a.i./ m². Redčenje (%): Število in časovni raspored uporabe: Zdravljenje se lahko izvaja do 2-krat na leto.</p>
Skupina(-e) uporabnikov	<p>Splošna javnost (nepoklicna)</p>
Velikosti in material embalaže	<p>Steklenica z merilnim okencem (20 mL)</p> <p>Pakiranje za enkratno uporabo: 1 mL</p> <p>Sistem je pripravljen za redčenje: 5 mL</p> <p>Kartušni sistem: 5 mL</p>

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Izdelkom je treba uporabljati na omejenih območjih na površinah, ki se ne redno čistijo, na primer zadaj ali pod hladilnik, pod kuhinjskih korit, pod pečico ali grelnik vode, kjer se žuželke ponavadi skrivajo.

Pri sistem je pripravljen za redčenje, odstranite ovratnik, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljen z ustreznim sprožilcem.

Pri kartušni sistem, v steklenico dodajte 500 ml vode iz pipe, namestite kartušo v vrat steklenice, namestite sprožilec, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljen z ustreznim sprožilcem.

Pri steklenica z merilnim okencem in pakiranje za enkratno uporabo, uporabo se opravi s sprožilni razpršilec z odmerkom 1,25 ml/razpršilo. Ustrezna količina izdelka se doda potrebna količina vode in premeša

Za neprofesionalni uporabnik se predlaga vključitev naslednje omejitve: "Ubijanje ščurkov je predviden 4 ure po izpostavljenosti insektom na obdelane površine".

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ne uporabljajte na območjih, ki so dovzetna za rutina mokrega čiščenja.

Izogibajte se stiku z obdelanimi površinami

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - Točkovni notranji v razpoke in špranje proti plazečim žuželkam -Profesionalni uporabnik

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Uporaba v razpoke in špranje

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Blattella germanica
Splošno ime: Nemški ščurček
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: Blatta orientalis
Splošno ime: Orientalški ščurki
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: Lasius niger
Splošno ime: Vrtna mravlja
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Področje uporabe	Notranjost, znotraj
Način(-i) uporabe	<p>Metoda: Obdelava razpoke in špranje s škropljenjem Podroben opis: Pri poroznih površin (npr. beton, opeka, lesena plastika, itd.) (52.7 mg t.g.a.i./m²): uporabiti 10 g koncentriran izdelkom in razredčimo v 1 L vode (1%); temeljito premešajte in nanesite z ustreznim razpršilcem s količino 50 mL raztopina na 1 m².</p> <p>Pri neporozne površine (npr. plastika, kovina, keramika, itd.) (21 mg t.g.a.i./ m²): uporabiti 5 g koncentriran izdelkom in razredčimo v 1 L vode (0.5%); temeljito premešajte in nanesite z ustreznim razpršilcem s količino 40 mL raztopina na 1 m².</p> <p>Preostala količina: 4 tedni</p>
Odmerki in pogostost uporabe	<p>Odmerek: Pri poroznih površin 52.7 mg t.g.a.i./m². Pri neporozne površine 21 mg t.g.a.i./ m². Redčenje (%): Število in časovni razpored uporabe: Zdravljenje se lahko izvaja do 2-krat na leto.</p>
Skupina(-e) uporabnikov	<p>Strokovnjak z licenco</p> <p>Poklicni</p>
Velikosti in material embalaže	<p>HDPE steklenica z merilnim pokrovčkom: 100, 250, 500, 1000, 2000 mL.</p> <p>HDPE steklenica z merilno komoro (steklenica z dvojnimi vratom): 500, 1000 mL.</p> <p>HDPE Kanister : 5, 10, 20 L.</p>

4.3.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Nanesite na površine, razpoke in špranje, kot so: keramične ploščice, marmor, granit in druge površine v trd kamen, kovine (jeklo, železo itd.), plastika, steklo (npr. okenska stekla), pobarvane vezane plošče. Izdelkom nanesite neposredno v razpoke in špranje z razdalje 40 cm.

Izdelkom je treba uporabljati na omejenih območjih na površinah, ki se ne redno čistijo, na primer zadaj ali pod hladilnik, pod

kuhinjskih korit, pod pečico ali grelnik vode, v vseh razpoke in špranje, ki so lahko zatočišče za ščurke in mravelj.

4.3.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ne uporabljajte na območjih, ki so dovzetna za rutina mokrega čiščenja.

Izogibajte se stiku z obdelanimi površinami.

V fazi ravnanja z izdelkom nosite zaščitne kemijsko odporne rokavice (material rokavic določi imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku).

Nositi je treba zaščitni kombinezon (vsaj tip X, EN XXXXX).

4.3.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

4.3.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

4.3.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

4.4 Opis uporabe

Uporaba 4 - Točkovni notranji v razpoke in špranje proti plazečim žuželkam -Splošna javnost

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Obdelava razpoke in špranje s škropljenjem

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: *Blattella germanica*
Splošno ime: Nemški ščurek
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: *Blatta orientalis*
Splošno ime: Orientalski ščurki
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: *Lasius niger*
Splošno ime: Vrtna mravlja
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Način(-i) uporabe

Metoda: Obdelava razpoke in špranje s škropljenjem

Podroben opis:

Pri poroznih površnin (npr. beton, opeka, lesena plastika, itd.) (52.7 mg t.g.a.i./m²)

- Steklenica z merilnim okencem: odmerite 1 mL izdelka in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m²

- Pakiranje za enkratno uporabo 1 mL: odprite tesnilo in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m²

- Sistem je pripravljen za redčenje: Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m²

- Kartušni sistem: Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m²

Pri non poroznih površnin (npr. plastika, kovina, keramika, itd.) (21 mg t.g.a.i./ m²):

- Steklenica z merilnim okencem: odmerite 0.5 mL izdelka in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 32 pršenj na m².

- Pakiranje za enkratno uporabo 1 mL: odprite tesnilo in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 16 pršenj na m².

- Sistem je pripravljen za redčenje: Dobro pretresite in opraviti 16 pršenj na m².

- Kartušni sistem: Dobro pretresite in opraviti 16 pršenj na m².

Preostala količina: 4 tedni

Odmerki in pogostost uporabeOdmerek: Pri poroznih površnin 52.7 mg t.g.a.i./m². Pri non poroznih površnin 21 mg t.g.a.i./m².

Redčenje (%):

Število in časovni raspored uporabe:

Zdravljenje se lahko izvaja do 2-krat na leto.

Skupina(-e) uporabnikov

Splošna javnost (nepoklicna)

Velikosti in material embalaže

Steklenica z merilnim okencem (20 mL)

Pakiranje za enkratno uporabo: 1 mL

Sistem je pripravljen za redčenje: 5 mL

Kartušni sistem: 5 mL

4.4.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Nanesite v domačih prostorih, razpoke in špranje, kot so: keramične ploščice, marmor, granit in druge površine v trd kamen, kovine (jeklo, železo itd.), plastika, steklo (npr. okenska stekla), pobarvane vezane plošče. Izdelkom nanesite neposredno v razpoke in špranje z razdalje 40 cm.

Izdelkom je treba uporabljati na omejenih območjih na površinah, ki se ne redno čistijo, na primer zadaj ali pod hladilnik, pod kuhinjskih korit, pod pečico ali grelnik vode, v vseh razpoke in špranje, ki so lahko zatočišče za ščurke in mravelj.

Za neprofesionalni uporabnik se predlaga vključitev naslednje omejitve: "Ubijanje ščurkov je predviden 4 ure po izpostavljenosti insektom na obdelane površine".

Pri sistem je pripravljen za redčenje, odstranite ovratnik, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljen z ustreznim sprožilcem.

Pri kartušni sistem, v steklenico dodajte 500 ml vode iz pipe, namestite kartušo v vrat steklenice, namestite sprožilec, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljen z ustreznim sprožilcem

Pri steklenica z merilnim okencem in pakiranje za enkratno uporabo, uporabo se opravi s sprožilni razpršilec z odmerkom 1,25 ml/razpršilo. Ustrezna količina izdelka se doda potrebna količina vode in premeša

4.4.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ne uporabljajte na območjih, ki so dovzetna za rutina mokrega čiščenja. Izogibajte se stiku z obdelanimi površinami.

4.4.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

4.4.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

4.4.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

4.5 Opis uporabe

Uporaba 5 - Površinske ostanki obdelave okoli stavbe proti tigrasti komar -Profesionalni uporabnik

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Izdelkom se uporablja na prostem okoli stavb na podeželju za zatiranje tigrastih komarjev.

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Aedes albopictus
Splošno ime: tigrasti komar
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Področje uporabe

Zunanost, zunaj
Na prostem na podeželju

Način(-i) uporabe

Metoda: Razprševanje, površinske obdelave
Podroben opis:
Za tretiranje okoli stavbe do višine približno 50 cm do vključno 150 cm, skupina za zdravljenje visok približno en meter.

uporabiti 2 g koncentriran izdelkom in razredčimo v 1 L vode (0.2%); temeljito premešajte in nanesite z ustreznim razpršilcem s količino 50 mL raztopina na 1 m².

Preostalo delovanje proizvoda traja 3 dni.

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek glede na zdravilno učinkovino je 10.5 mg t.g.a.i. /m2. Redčenje (%): Število in časovni raspored uporabe: Zdravljenje se lahko izvaja do 2-krat na leto.
Skupina(-e) uporabnikov	Strokovnjak z licenco Poklicni
Velikosti in material embalaže	HDPE steklenica z merilnim pokrovčkom: 100, 250, 500, 1000, 2000 mL. HDPE steklenica z merilno komoro (steklenica z dvojnimi vratom): 500, 1000 mL. HDPE Kanister: 5, 10, 20 L.

4.5.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Izdelkom razredčite z vodo do 0,2 % w/v, temeljito premešajte in s pomočjo razpršilca v nahrbtniku ali naprave ustrezne nanesite 50 mL insekticid raztopina na m².

Izdelkom je treba enakomerno nanesti na izbrani površini z razdalje 50 cm. Izdelkom deluje proti tigrastih komarjev s stikom in hlapi.

4.5.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Izdelkom ne uporabljajte na območjih, ki so priključene na kanalizacijo, drenažna voda, jaški ali blizu njih

Ne uporabljajte v deževnem ali vetrovnem vremenu. Preprečiti izpostavljenost neciljnih organizmov (npr. razmislite o uporabi čez noč, ko opraševalci, vključno s čebelami, niso aktivni, ne tretirajte rastlin v obdobju cvetenja).

V fazi ravnanja z izdelkom nosite zaščitne kemijsko odporne rokavice (material rokavic določi imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku).

Nositi je treba zaščitni kombinezon (vsaj tip X, EN XXXXX).

4.5.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

4.5.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

4.5.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

4.6 Opis uporabe

Uporaba 6 - Površinske ostanki obdelave okoli stavbe proti tigrasti komar -Splošna javnost

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Izdelkom se uporablja na prostem okoli stavb na podeželju za zatiranje komarji.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Aedes albopictus Splošno ime: tigrasti komar Razvojni stadij: Odrasli osebki
Področje uporabe	Zunanost, zunaj Na prostem na podeželju.
Način(-i) uporabe	Metoda: Razprševanje, površinske obdelave Podroben opis: Za tretiranje okoli stavbe do višine približno 50 cm do vključno 150 cm, skupina za zdravljenje visok približno en meter. <ul style="list-style-type: none">• Steklenica z merilnim okencem: odmerite 2 mL izdelka in prelijte s 1 L vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m2• Pakiranje za enkratno uporabo 2 mL: odprite tesnilo in prelijte s 1 L vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m2• Sistem je pripravljen za redčenje: Dobro pretresite in opraviti 8 pršenj na m2• Kartušni sistem: Dobro pretresite in opraviti 8 pršenj na m2 Preostalo delovanje proizvoda traja 3 dni.

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek glede na zdravilno učinkovino je 10.5 mg t.g.a.i./m ² Redčenje (%): Število in časovni raspored uporabe: Zdravljenje se lahko izvaja do 2-krat na leto.
Skupina(-e) uporabnikov	Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	Steklenica z merilnim okencem: 20 mL Pakiranje za enkratno uporabo: 2 mL Sistem je pripravljen za redčenje: 5 mL Kartušni sistem: 5 mL

4.6.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

<p>Izdelkom je treba enakomerno nanesti na izbrani površini z razdalje 50 cm. Izdelkom deluje proti tigrastih komarjev s stikom in hlapi.</p> <p>Pri sistem je pripravljen za redčenje, odstranite ovrtnik, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljen z ustreznim sprožilcem.</p> <p>Pri kartušni sistem, v steklenico dodajte 500 ml vode iz pipe, namestite kartušo v vrat steklenice, namestite sprožilec, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljen z ustreznim sprožilcem.</p> <p>Pri steklenica z merilnim okencem in pakiranje za enkratno uporabo, uporabo se opravi s sprožilni razpršilec z odmerkom 1,25 ml/razpršilo. Ustrezna količina izdelka se doda potrebna količina vode in premeša</p>

4.6.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

<p>Izdelkom ne uporabljajte na območjih, ki so priključene na kanalizacijo, drenažna voda, jaški ali blizu njih.</p> <p>Ne uporabljajte v deževnem ali vetrovnem vremenu. Preprečiti izpostavljenost neciljnih organizmov (npr. razmislite o uporabi čez noč, ko oprashaalci, vključno s čebelami, niso aktivni, ne tretirajte rastlin v obdobju cvetenja).</p>

4.6.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

4.6.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

4.6.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

4.7 Opis uporabe

Uporaba 7 - Izkoreninjenje mravljišča -Profesionalni uporabnik

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Izdelkom se uporablja na prostem s škropljenjem za izkoreninjenje mravljišča.

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Lasius niger
Splošno ime: Vrtna mravlja
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Področje uporabe

Zunanost, zunaj

Način(-i) uporabe

Metoda: Uporabiti okoli gnezdo in na vhodu v gnezdo s škropljenjem. Z enim samim nanosom za uničenje gnezdo
Podroben opis:
Koncentriran izdelkom je treba razredčiti z vodo do 0.5% w/v pred uporabo.

Količina v insekticid raztopina (razredčene), ki jo je treba nanesti na vsako gnezdo je 25 g/gnezdo.

Odmerki in pogostost uporabe	<p>Odmerek: Odmerek glede na zdravilno učinkovino je 13.2 mg t.g.a.i./ gnezdo</p> <p>Redčenje (%):</p> <p>Število in časovni raspored uporabe:</p> <p>Brez omejitev.</p>
Skupina(-e) uporabnikov	<p>Strokovnjak z licenco</p> <p>Poklicni</p>
Velikosti in material embalaže	<p>HDPE steklenica z merilnim pokrovčkom: 100, 250, 500, 1000, 2000 mL.</p> <p>HDPE steklenica z merilno komoro (steklenica z dvojnimi vratom): 500, 1000 mL.</p> <p>HDPE Kanister: 5, 10, 20 L.</p>

4.7.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Izdelkom razredčite z vodo v priporočeni količini, temeljito premešajte in nanašajte s posebnim nebulatorjem za razpršitev raztopina. Izdelkom je treba uporabiti s količino 25 mL insekticid raztopina na gnezdo, nanešen okoli gnezdo in na vhodu v gnezdo at the entrance of the nest. Za optimalno učinkovitost tretiranja ne uporabljajte v primeru vetra ali dežja.

4.7.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Obdelava enega samega gnezdo za nanosom.

V fazi ravnanja z izdelkom nosite zaščitne kemijsko odporne rokavice (material rokavic določi imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku).

Nositi je treba zaščitni kombinezon (vsaj tip X, EN XXXXX).

4.7.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

4.7.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

4.7.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

4.8 Opis uporabe

Uporaba 8 - Izkoreninjenje mravljišča -Splošna javnost

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Izdelkom se uporablja na prostem s škropljenjem za izkoreninjenje mravljišča.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Lasius niger Splošno ime: Vrtna mravlja Razvojni stadij: Odrasli osebki
Področje uporabe	Zunanost, zunaj
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporabiti okrog gnezdo in na vhodu v gnezdo, s škropljenjem. Z enim samim nanosom za uničenje gnezdo. Podroben opis: <ul style="list-style-type: none">• Pakiranje za enkratno uporabo 1 mL: odprite tesnilo in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 10 pršenj na gnezdo• Sistem je pripravljen za redčenje: Dobro pretresite in opraviti 10 pršenj na gnezdo• Kartušni sistem: Dobro pretresite in opraviti 10 pršenj na gnezdo.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek glede na zdravilno učinkovino je 13.2 mg t.g.a.i./ gnezdo Redčenje (%): Število in časovni raspored uporabe: Brez omejitev.
Skupina(-e) uporabnikov	Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	Pakiranje za enkratno uporabo: 1 mL Sistem je pripravljen za redčenje: 5 mL

Kartušni sistem: 5 mL

4.8.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Pri sistem je pripravljen za redčenje, odstranite ovrtnik, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljen z ustreznim sprožilcem.

Pri kartušni sistem, v steklenico dodajte 500 ml vode iz pipe, namestite kartušo v vrat steklenice, namestite sprožilec, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljen z ustreznim sprožilcem.

Pri pakiranje za enkratno uporabo, uporabo se opravi s sprožilni razpršilec z odmerkom 1,25 ml/razpršilo. Ustrezna količina izdelka se doda potrebna količina vode in premeša

Izdelkom je treba uporabiti v priporočeni količini, okoli gnezdo in na vhodu v gnezdo. Za optimalno učinkovitost tretiranja ne uporabljajte v primeru vetra ali dežja.

4.8.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Obdelava enega samega gnezdo za nanosom.

4.8.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

4.8.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

4.8.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa priložena navodila.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Izdelkom je treba uporabljati tako, da otroci, rejne živali in hišnih ljubljencev, zlasti mačke, ne pridejo v stik z izdelkom. Mačke držite stran od obdelane površine. Zaradi posebne občutljivosti do piretroidi, izdelkom lahko povzroči pri mačkah hude neželene reakcije.

Pred uporabo odstranite ali pokrijte terarije, akvarije in živalske kletke. Med pršenjem izklopite zračni filter v akvariju. Hranite zunaj dosega otrok in hišnih ljubljencev. Nezainteresirane osebe, otrok in hišnih ljubljencev držite stran od obdelane površine/območja, dokler se površine ne posušijo. Ne pršite na ljudi ali hišnih ljubljencev.

Za uporabo v zaprtih prostorih za zatiranje tigrasti komar:

- N-122 Pokrijte vse površine in prostore, ki bodo verjetno prišli v stik z živili, krmo in pitno vodo.
 - N-127 Ne nanašajte neposredno na živila, krmo ali pijačo ter ga ne uporabljajte na površinah ali orodjih, ki bi lahko prišla v stik z živili, krmo, pijačo in živino/hišnih ljubljencev.
 - N-132 Ne nanašajte neposredno na površine ali prostore, na katerem je shranjeni, pripravljeno ali zaužito hrano ali krmo.
 - N-301 Ne shranjujte v bližini hrane, pijače in živalske krme.
- Glej zgoraj podrobno opisane ukrepe za zmanjševanje tveganja.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Piretroidi in piretrini lahko povzročijo parestezijo (pekoč občutek in zbadanje kože brez draženja). Če simptomi ne izginejo, poiščite zdravniško pomoč

- PRI VDIHAVANJU: Če se pojavijo simptomi, takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

- PRI ZAUŽITJU: Če se pojavijo simptomi, takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

- PRI STIKU S KOŽO: Če se pojavijo simptomi, takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

- PRI STIKU Z OČMI: Če se pojavijo simptomi, sperite z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

- Ne izpuščajte izdelkom ali prazne posode v okolje.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi predpisi o ravnanju z odpadki.

Ne izprazniti v kanalizacijo. Ne uporabljajte prazne embalaže.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hranite zunaj dosega otrok. Shranjujte ločeno od hrane, pijače ali živilo.

Shelf-life: 2 years, in original container at room temperatures. Izogibajte se ekstremne temperature in izpostavljenosti neposredni sončni. Zaščititi pred zmrzaljo.

6. Druge informacije

Vsebuje cypermethrin; lahko povzročijo parestezijo.