



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel.:(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID
NR. RO/2019/0114/MRA / IT/2014/00179/AUT

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRĂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data 17.10.2019, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. TIPUL AUTORIZATIEI

reînnoirea autorizației naționale eliberată în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012

- Nr. Autorizației naționale care a fost reînnoită : **IT/2014/00179/AUT** cu autorizația națională nr. **IT/2014/00179/AUT**

II. Data emiterii autorizației : 19.11.2019

III. Data expirării autorizației : 31.12.2022

IV.

DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: KL-RAT® ERD MOMEALA
RODENTICIDA SUB FORMA DE PASTA

V.

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI din România: BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL
CENTRE LTD

ADRESA: Szállás u. H-6.1107, Budapesta, Ungaria

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc: BÁBOLNA
BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD

ADRESA : Szállás u. H-6.1107, Budapesta, Ungaria

NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID : BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL
CENTRE LTD

ADRESA : Szállás u. H-6.1107, Budapesta, Ungaria

ADRESA LOCULUI DE PRODUCȚIE : Szállás u. H-6.1107, Budapesta, Ungaria

NUMELE FABRICANTULUI fiecărei SUBSTANȚE ACTIVE : Activa S.r.l.

ADRESA : Via Feltre, 32, 20132, Milano, Italia

ADRESA UNITĂȚILOR DE FABRICARE : Tezza S.r.l., via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio, Italia

VI.

TIPUL DE PRODUS: TP14 (Rodenticide)

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40,21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

VII.

CATEGORIILE DE UTILIZATORI: profesioniști și profesioniști instruiți.

VIII.

TIPUL PREPARATULUI : momeală rodenticidă sub formă de pastă gata de utilizare**IX COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ**1) **Substanța activă**a) *substanțe chimice*

Denumire comuna	Brodifacum
Denumirea IUPAC	[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin
Numar CAS	56073-10-0
Numar CE	259-980-5
Continut de substanță activă	0,005%

b) *microorganisme-nu exista*2) **Substanța nonactivă**-nespecificat**X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI**A. **Produs biocid cu substanțe active - substanțe chimice**

Pictograme, simboluri și indicarea pericolului	GHS08 Pericol
Fraze de risc H	H360D – Poate dauna fătului. H373 – Poate provoca leziuni ale organelor (sange) în caz de expunere prelungită sau repetată.
Fraze de prudență P	P102- A nu se lasa la indemana copiilor P202 – A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. P264 – Spălați-vă mainile bine după utilizare. P270 – A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P280 – Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. P308 + P313 – ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul. P405 – A se depozita sub cheie. P501 – Aruncați conținutul/recipientul la un centru autorizat pentru colectarea deșeurilor.
Mențiuni: se vor preciza substanțele care prezintă pericolozitate, dar care nu conduc la clasificarea produsului	

B. **Produs biocid cu substanțe active** *microorganisme-nu exista***XI. AMBALAREA**Pentru uz profesional: Unitate de produs de 20 gr /momeala.
Marime ambalaj minim 1,5 kg maxim 25 kg.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

În cazul în care pachetul aplicabil este restricționat la saci ambalate separat, cu o dimensiune maximă sac de 10 kg.

- Flacon etichetat sau printat de la 1,5 kg la 5 kg.
- Pungi/saci etichetati sau printati de la 1,5 kg la 25 kg.
- Pungi/saci etichetati sau printati - cu căptușeală din material plastic interioară de la 1,5 kg - până la 10 kg - dimensiune maximă căptușeală interioară 10 kg.
- Galeata plastic de la 1,5 kg la 25 kg.
- Galeata plastic de la 1,5 kg la 10 kg cu captuseala in interior de plastic de maxim 10 kg.
- Plic de carton cu captuseala interioara de plastic de la 1,5 kg pana la 10 kg.
- Cutie de carton etichetat sau printat cu căptușeala interioara din material plastic de la 1,5 kg pana la 10 kg .

Materialul de ambalare: plastic compozit, carton

Tip de ambalaj: flacon, punga/sac, galeata plastic, saci de carton.

Personalul profesional instruit: Unitate de produs de 20 gr /momeala.

Marime ambalaj minim 1,5 kg maxim 25 kg.

În cazul în care pachetul aplicabil este restricționat la saci ambalate separat, cu o dimensiune maximă sac de 10 kg.

- Flacon etichetat sau printat de la 1,5 kg la 5 kg.
- Pungi/saci etichetati sau printati de la 1,5 kg la 25 kg.
- Pungi/saci etichetati sau printati - cu căptușeală din material plastic interioară de la 1,5 kg - până la 10 kg - dimensiune maximă căptușeală interioară 10 kg.
- Galeata plastic de la 1,5 kg la 25 kg.
- Galeata plastic de la 1,5 kg la 10 kg cu captuseala in interior de plastic de maxim 10 kg.
- Plic de carton cu captuseala interioara de plastic de la 1,5 kg pana la 10 kg.
- Cutie de carton etichetat sau printat cu captuseala interioara din material plastic de la 1,5 kg pana la 10 kg.

Materialul de ambalare: plastic compozit, carton

Tip de ambalaj: flacon, punga/sac, galeata plastic, saci de carton.

XII.

INSTRUCIUNILE SI DOZELE DE APLICARE si dupa caz :

Poate fi utilizat in interior si exterior in jurul cladirilor.

Instructii de utilizare:

Preparatul se va folosi în locuri, unde se observă apariția șobolanilor și a șoarecilor. Se va estima gradul de răspândire a rozătoarelor pe baza urmelor sau a daunelor vizibile, urmând ca combaterea să fie efectuată pe baza acestei estimări. Înainte de amplasarea preparatului se va lua în considerare dacă daunele provocate de rozătoare se pot elimina și fără aplicarea unui rodenticid. Se va utiliza rodenticid numai în cazuri justificate!

Înainte de amplasarea preparatului se va verifica zona ce urmează a fi tratată și se vor lua măsurile necesare în vederea creșterii eficienței și prevenirii reinfectării. Se vor elimina gropile, găurile și - pe cât posibil - se va îndepărta orice surse de hrană (de exemplu deșeuri alimentare, cereale vărsate) și lichid accesibile rozătoarelor.

Modul de amplasare depinde în primul rând de condițiile locale. Scopul primar este împiedecarea accesului la pesticid a persoanelor neautorizate și a animalelor care nu sunt organisme țintă.

Pasta rodenticidă se poate amplasa în zonele frecventate de către rozătoare, în rutele de migrație ale acestora, respectiv în împrejurimea presupuselor locuri de ascunziș ale acestora în primul rând în casetele pentru amplasarea momelii, protejate împotriva deschiderii sau în locuri de alimentare acoperite și protejate, în cazul în care acestea asigură același nivel de protecție pentru animalele care nu sunt organisme țintă și pentru om, ca și stațiile de momeală protejate împotriva deschiderii.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIIDE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Doză de aplicare la combaterea sobolanilor:

în cazul unor daune minore: 100 grame pastă la fiecare 10 metri (10 buc pungi),

în cazul unor daune majore: 100 grame pastă la fiecare 5 metri (5 buc pungi). ... /10 buc. pungi

Doză de aplicare la combaterea soarecilor:

în cazul unor daune minore: 40 grame pastă la fiecare 10 metri (4 buc pungi),

în cazul unor daune majore: 40 grame pastă la fiecare 5 metri (4 buc pungi).

Frecvența verificării locurilor de amplasare a rodenticidului se determină în funcție de rezultatele inspecției locale înainte de începerea tratamentului.

În cursul verificărilor se va completa momeala consumată. Se va schimba momeala, dacă aceasta este stricată sau mucegăită. Dacă momeala amplasată se consumă continuu, se vor amplasa mai multe locuri de alimentare, dar nu se va crește cantitatea momelii amplasate într-un anumit loc de alimentare. Dacă momelile rămân intacte, dar rozătoarele persistă, rodenticidul se va amplasa într-un loc diferit.

Cantitatea maximă care se poate amplasa într-o casetă de alimentare este doza maximă de aplicare. Aveți grijă de fixarea stabilă a casetelor de alimentare. Protejați caseta de contactul direct cu apa, ploaia și efectele nocive ale condițiilor meteorologice.

Datorită efectului retardat al principiului activ cu efect anticoagulant, rozătoarele încep să cadă la 3-5 după amplasarea momelii. Lăsați momeala expusă doar până când prezența rozătoarelor justifică acest fapt. Nu expuneți nejustificat momeala în mod permanent. Locurile de alimentare se vor elimina după tratament. Rodenticidul rămas și accesoriile rodenticide se vor colecta. Pesticidul eventual împrăștiat se va colecta. Se recomandă ca aplicarea momelii să se facă simultan cu introducerea unui sistem integrat de combatere a dăunătorilor (IPM/IPC). În cazul în care după o perioadă de tratament de 35 zile momeala se consumă în continuare și activitatea rozătoarelor nu scade, trebuie determinate cauzele cele mai plauzibile și se vor lua măsurile necesare.

Termen de valabilitate și mod de păstrare: Se poate utiliza timp de 2 ani de la data fabricației, păstrat în ambalaj original, nedeschis, în loc ferit de lumină, uscat, răcoros, bine aerisit.

Utilizări:

Soareci de casă – specialiști – la interior

de interior - La interior - industrial profesional *Mus musculus* House mouse minori și adulți

Aplicare momeală: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării.

40 g de momeală per capcană. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri. (10, 20 grame momeală (pastă) în pungă din hârtie de filtru, în ambalaj de 1.5kg -25 kg)

Capcanele se inspectează cel puțin o dată la 2-3 zile la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.

Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant.

- Dacă amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

Sobolani – specialiști – la interior

La interior, profesional - *Rattus norvegicus* /Brown rat minori și adulți *Rattus rattus* /Roof rat minori și adulți. Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării. 60-

100g de momeală per capcană. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri. (10, 20 grame momeală (pastă) în pungă din hârtie de filtru, în ambalaj de 1.5 kg -25 kg). Capcanele se inspectează doar după 5-7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leontë, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Realimentați cu momeala atunci când este necesar. Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant. - Dacă amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

Șoareci de casă și șobolani – specialiști – la exterior, în jurul clădirilor

în aer liber - La exterior, în jurul clădirilor – profesional - șobolani cenușii *Rattus norvegicus* Brown rat minori și adulți șoareci de casă *Mus musculus* House mouse minori și adulți șobolan negru *Rattus rattus* Roof rat minori și adulți. Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării.

Șoareci de casă: 40 g de momeală per capcană. șobolani: 60-100 g momeală per capcană of bait per bait point. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri. (10, 20 grame momeală (pastă) în pungă din hârtie de filtru, în ambalaj de 1.5kg - 25 kg).

Protejați momeala de intemperii (de exemplu, ploaie, zăpadă etc.). Amplasați capcanele în zone fără risc de inundare. Capcanele se inspectează [în cazul șoarecilor – cel puțin o dată la 2-3 zile la] [în cazul șobolanilor – numai după 5-7 zile de la] începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar. Înlocuiți momelile deteriorate de apă sau contaminate cu pământ din interiorul capcanelor. - [Dacă sunt disponibile] Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant.

- Pentru a reduce riscul de intoxicație secundară, căutați și îndepărtați frecvent rozătoarele moarte pe durata tratamentului. Acest produs ar trebui să elimine rozătoarele într-o perioadă de 35 de zile. Informațiile despre produs (eticheta și/ sau prospectul) trebuie să recomande în mod clar utilizatorului să contacteze furnizorul produsului sau un serviciu de deratizare în cazul în care există suspiciuni de ineficiență a produsului la sfârșitul perioadei de tratament (se observă în continuare prezența rozătoarelor).

- Nu introduceți produsul direct în vizuini. - Atunci când amplasați capcanele în apropierea apelor de suprafață (de exemplu, râuri, iazuri, canale navigabile, diguri, canale de irigații) sau a sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

Șoareci de casă și șobolani - experți - la interior

La interior - instruiți profesional- șobolani cenușii *Rattus norvegicus* Brown rat minori și adulți șoareci de casă *Mus musculus* House mouse minori și adulți șobolan negru *Rattus rattus* Roof rat minori și adulți

Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării sau autorizate pentru utilizare în punctele acoperite și protejate de amplasare a momelilor în măsura în care ele realizează același nivel de protecție a speciilor nevizate și a oamenilor ca și capcanele cu momeală care nu pot fi anihilate.

Șoareci de casă: 40 g de momeală per capcană. șobolani: Infestare majoră: 100 g, Infestare redusă: 60 g de momeală per capcană. (10, 20 grame momeală (pastă) în pungă din hârtie de filtru.)

Îndepărtați resturile de produs la sfârșitul perioadei de tratament.

Analizați posibilitatea de a lua măsuri de combatere preventive (astupați găurile, îndepărtați cât mai mult posibil eventualele surse de hrană și băutură) pentru a crește șansa de consum al produsului și pentru a reduce riscul de reinvadare.

- Pentru a reduce riscul de intoxicație secundară, căutați și îndepărtați frecvent rozătoarele moarte pe durata tratamentului, conform recomandărilor conținute în codul de bune practici relevant. - Nu utilizați produsul pentru tratamente cu aplicare intermitentă a momelii. - Nu utilizați produsul ca momeală permanentă pentru a preveni infestarea cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor. - Dacă amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

că momeala nu intră în contact cu apa.
Șoareci și șobolani - experți - la exterior și în jurul clădirilor
în aer liber - La exterior, în jurul clădirilor, instruiți profesional șobolani cenușii *Rattus norvegicus* Brown rat minori și adulți șoareci de casă *Mus musculus* House mouse minori și adulți *Rattus rattus* Roof rat minori și adulți.
Metoda de aplicare: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării sau autorizate pentru utilizare în punctele acoperite și protejate de amplasare a momelilor în măsura în care ele realizează același nivel de protecție a speciilor nevizate și a oamenilor ca și capcanele cu momeală care nu pot fi anihilate.
Șoareci de casă: 40 g de momeală per capcană. Șobolani: Infestare majoră: 100 g, Infestare redusă: 60 g de momeală per capcană of bait per bait point. (10, 20 grame momeală (pastă) în pungă din hârtie de filtru.)

Îndepărtați resturile de produs la sfârșitul perioadei de tratament.

Dacă este posibil, înainte de tratament, informați persoanele care s-ar putea afla în preajma capcanelor (de exemplu, utilizatorii zonei tratate și ai împrejurimilor acesteia) în legătură cu campania de combatere a rozătoarelor [conform codului de bune practici aplicabil, dacă este cazul].

Analizați posibilitatea de a lua măsuri de combatere preventive (astupați găurile, îndepărtați cât mai mult

posibil eventualele surse de hrană și băutură) pentru a crește șansa de consum al produsului și pentru a reduce riscul de reinvadare.

- Pentru a reduce riscul de intoxicare secundară, căutați și îndepărtați frecvent rozătoarele moarte pe durata tratamentului, conform recomandărilor conținute în codul de bune practici relevant.

- Nu utilizați produsul pentru tratamente cu aplicare intermitentă a momelii.

- Nu utilizați produsul ca momeală permanentă pentru a preveni infestarea cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor. Atunci când amplasați capcanele în apropierea apelor de suprafață (de exemplu, râuri, iazuri, canale navigabile, diguri, canale de irigații) sau a sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

specialiști sau experți:

"Înainte de utilizare, citiți și respectați informațiile despre produs și toate informațiile care îl însoțesc sau care sunt comunicate în momentul vânzării.

- Studiați și evaluați în prealabil zona infestată, pentru a identifica speciile de rozătoare și locurile de activitate ale acestora și pentru a determina cauzele posibile și amploarea infestării.

Îndepărtați hrana la care rozătoarele pot ajunge ușor (de exemplu, boabe de cereale vărsate sau resturi de mâncare). Pe lângă aceasta, nu curățați zona infestată imediat înainte de tratament, deoarece astfel veți deranja populația de rozătoare și veți îngreuna acceptarea momelii.

Produsul trebuie să fie utilizat numai în cadrul unui sistem de combatere integrată a dăunătorilor, care include, printre altele, măsuri de asigurare a igienei și, atunci când este posibil, metode fizice de combatere.

Produsul trebuie să fie amplasat în imediata apropiere a locurilor în care s-a observat prezența rozătoarelor (de exemplu, ea de acces, locuri de cuibărit, jgheaburi de hrănire a animalelor, găuri, vizuini etc.).

- Dacă este posibil, capcanele trebuie să fie fixate pe sol sau de alte structuri.

- Capcanele trebuie să fie etichetate cu avertismente clare privind conținutul de rodenticide și interzicerea mutării sau a deschiderii acestora (a se vedea punctul 5.3 privind informațiile care se înscriu pe etichetă).

[...] Atunci când produsul este utilizat în zone publice, zonele tratate trebuie să fie marcate pe toată durata tratamentului, iar în apropierea momelii trebuie să se amplaseze avertismente privind riscul de intoxicare primară sau secundară cu anticoagulant, precum și măsurile de prim-ajutor care se iau în caz de intoxicare.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

- COPIE**
- Momeala trebuie să fie fixată pentru a nu putea fi îndepărtată de capcană.
 - Amplasați produsul în locuri inaccesibile pentru copii, păsări, animale de companie, animale de fermă și alte animale nevizate.
 - Amplasați produsul la distanță de alimente, băuturi și hrană pentru animale, precum și de ustensilele sau suprafețele aflate în contact cu acestea.
- [Atunci când este cazul, conform evaluării riscurilor:
Manipulați produsul numai cu mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice (materialul mănușilor este specificat de titularul autorizației în informațiile privind produsul).
Dacă este relevant, specificați orice alt EIP (de exemplu, ochelari de protecție sau mască) obligatoriu la manipularea produsului.]
- Nu consumați alimente sau băuturi și nu fumați în timpul utilizării produsului. După utilizarea produsului, spălați-vă mâinile și pielea direct expusă.
- Frecvența vizitelor în zona tratată rămâne la discreția operatorului, în funcție de rezultatele studiului efectuat la începutul perioadei de tratament.
- Această frecvență trebuie să fie conformă cu recomandările cuprinse în codul de bune practici relevant.
- Dacă asimilarea momeii este redusă comparativ cu dimensiunea aparentă a infestării, luați în considerare mutarea capcanelor în alte locuri și o eventuală schimbare a formulei momeii.
- Dacă momeala continuă să fie consumată după o perioadă de tratament de 35 de zile și nu se observă o diminuare a activității rozătoarelor, trebuie să se determine cauza probabilă a acestei situații.
- Dacă s-au exclus alte cauze, este posibil ca rozătoarele să aibă un grad înalt de rezistență, astfel încât poate fi necesară utilizarea unui rodenticid fără efect coagulant, dacă este disponibil, sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic. Luați în considerare și utilizarea de curse, ca măsură de combatere alternativă.
- Instructions for use that are "bait-specific":- Bait in filter paper sachets: "Do not open the sachets containing the bait.
- specialiști sau experți:
- "Dacă este posibil, înainte de tratament, informați persoanele care s-ar putea afla în preajma capcanelor în legătură cu campania de combatere a rozătoarelor [conform codului de bune practici aplicabil, dacă este cazul]". - Informațiile despre produs (eticheta și/sau prospectul) trebuie să specifice în mod clar că produsul se furnizează exclusiv utilizatorilor experți, posesori ai unor certificări care să ateste îndeplinirea cerințelor de formare aplicabile (de exemplu, „numai pentru experți”).
- A nu se utiliza în zone în care poate fi suspectată o rezistență la substanța activă.
- Produsele nu se utilizează pe o durată mai mare de 35 de zile fără o evaluare a stării de infestare și a eficacității tratamentului [...]. Nu utilizați prin rotație anticoagulanți diferiți, cu potență comparabilă sau mai mică, în scopul gestionării rezistenței. Pentru utilizarea prin rotație, analizați posibilitatea folosirii unui rodenticid fără efect coagulant, dacă este disponibil, sau a unui anticoagulant cu potență mai mare.
- Între aplicări, nu spălați cu apă capcanele sau ustensilele folosite în capcane acoperite și protejate.
- Eliminați rozătoarele moarte în conformitate cu cerințele locale [...]."

XIII. CONDITIILE DE DEPOZITARE : Depozitarea recipientului într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat, închis și departe de lumina directă a soarelui.

Accesul copiilor, păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă sa fie interzisă.

DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCIDE ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE
: 2 ani de la data fabricației.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

ALTE INFORMATII: Din cauza modului lent de actiune, rodenticidele anticoagulante isi produc efectul dupa 4-10 zile de la consumul momelii. Nu atingeti rozatoarele moarte cu mainile neprotejate, utilizati manusi sau instrumente (clasti) atunci cand le indepartati. Acest produs contine un aditiv amar si un colorant. Avand in vedere efectele adverse potentiale pentru sanatatea umana, se recomanda citirea cu maxima atentie a instructiunilor de pe eticheta si respectarea lor .

Restrictii pentru utilizarea produsului biocid: Se va evita prin orice mijloace patrunderea in sistemul de canalizare si in ape de suprafata. Atunci cand se plaseaza punctele de momeala in apropierea apelor de suprafata (rauri, iazuri, canale de apa, diguri, santuri de irigare) sau sisteme de scurgere a apei , se va evita contactul momelii cu apa.

Prezenta autorizatie este însoțită de următoarele documente :

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fisa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către deținătorul autorizatiei a fisei cu date de securitate către Institutul National de Sănătate Publică – Biroul RSI si Informare Toxicologică
- II. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

Acest certificat reprezinta reinnoirea certificatului pentru autorizarea produsului biocid Nr. RO/2014/0114/MRA/ IT/2014/00179/AUT

COPIE

PREȘEDINTE,
Dr. Chim. Gabriela Cilinca

COPIE