

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Produkto pavadinimas: Dip es silver

Produkto tipas (-ai): PT 03 - Veterinarinė higiena

PT 03 - Veterinarinė higiena

PT 03 - Veterinarinė higiena

PT 03 - Veterinarinė higiena

PT 03 - Veterinarinė higiena

Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0018724-0000

**R4BP 3 sprendimo nuorodos
numeris:** EU-0018724-0005

Turinys

| | |
|--|----|
| Administracinė informacija | 1 |
| 1.1. Produkto prekiniai pavadinimai | 1 |
| 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas | 1 |
| 1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai) | 1 |
| 1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai) | 1 |
| 2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas | 3 |
| 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį | 3 |
| 2.2. Formuliacijos tipas | 3 |
| 3. Pavojingumo ir atsargumo frazės | 3 |
| 4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai) | 3 |
| 5. Bendrieji naudojimo nurodymai | 12 |
| 5.1. Naudojimo instrukcijos | 12 |
| 5.2. Rizikos valdymo priemonės | 12 |
| 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką | 13 |
| 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos | 15 |
| 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis | 15 |
| 6. Kita informacija | 15 |

Administracinė informacija

1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

| |
|---------------|
| Dip es silver |
|---------------|

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

| | | |
|--|---------------------|--|
| Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas | Pavadinimas | CVAS Development GmbH |
| | Adresas | Dr. Albert Reimann Str. 16 a 68526 Ladenburg Vokietija |
| Autorizacijos liudijimo numeris | EU-0018724-0000 1-4 | |

| | |
|--|-----------------|
| R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris | EU-0018724-0005 |
| Autorizacijos liudijimo data | 18/12/2018 |
| Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data | 30/11/2028 |

1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

| | |
|------------------------------|--|
| Gamintojo pavadinimas | Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG |
| Gamintojo adresas | Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubeuern Vokietija |
| Gamybos vieta | Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubeuern Vokietija |

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

| | |
|------------------------------|--|
| Veiklioji medžiaga | 1319 - Jodas |
| Gamintojo pavadinimas | Cosayach Nitratos S.A. |
| Gamintojo adresas | Amunategui 178 not applicable Santiago Čilė |
| Gamybos vieta | S.C.M. Cosayach Cala Cala not applicable Pozo Almonte Čilė |

| | |
|------------------------------|---|
| Veiklioji medžiaga | 1319 - Jodas |
| Gamintojo pavadinimas | ACF Minera S.A. |
| Gamintojo adresas | San Martin No 499 not applicable Iquique Čilė |
| Gamybos vieta | Lagunas mine not applicable Pozo Almonte Čilė |

| | |
|------------------------------|--|
| Veiklioji medžiaga | 1319 - Jodas |
| Gamintojo pavadinimas | SQM S.A. |
| Gamintojo adresas | Los Militares 4290, Piso 4 not applicable Las Condes Čilė |
| Gamybos vieta | Nueva Victoria plant not applicable Pedro de Valdivia plant Čilė |

| | |
|------------------------------|---|
| Veiklioji medžiaga | 1319 - Jodas |
| Gamintojo pavadinimas | Nihon Tennen Gas Co., Ltd / Kanto Natural Gas Development Co., Ltd |
| Gamintojo adresas | 661 Mobara 297-8550 Mobara City, Chiba Japonija |
| Gamybos vieta | 2508 Minami-Hinata 299-4205 Shirako-Machi, Chosei-Gun, Chiba Japonija |

| | |
|------------------------------|--|
| Veiklioji medžiaga | 1319 - Jodas |
| Gamintojo pavadinimas | Norkem Limited (manufacturer of PVP-iodine) |
| Gamintojo adresas | Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Jungtinė Karalystė |
| Gamybos vieta | Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Jungtinė Karalystė |

2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

| Bendrasis pavadinimas | IUPAC pavadinimas | Funkcinė paskirtis | CAS numeris | EB numeris | Kiekis (proc.) |
|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|------------|----------------|
| Jodas | | Veiklioji medžiaga | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,3 |
| Acto rūgštis | Acto rūgštis | | 64-19-7 | 200-580-7 | 0 |

2.2. Formuliacijos tipas

AL - Bet koks kitas skystis

3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pavojingumo frazės

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

turinį išpilti (išmesti) į pagal vietinius/regioninius/nacionalinius/tarptautinius reikalavimus..

talpyklą išpilti (išmesti) į pagal vietinius/regioninius/nacionalinius/tarptautinius reikalavimus..

4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Naudojimo Nr.4.1 – melžiamų gyvūnų spenių dezinfekcija rankiniu būdu merkiant po melžimo.

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Neaktualu

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos
Vystymo stadija: Vegetatyvinės ląstelės

Mokslinis pavadinimas: Mielės
Bendrinis pavadinimas: Mielės
Vystymo stadija: Vegetatyvinės ląstelės

Naudojimo sritis

vidaus

Melžiamų gyvūnų (melžiamų karvių) spenių dezinfekcija po melžimo.

Naudojimo metodas (-ai)

Rankiniu būdu, naudojant mirkymo indą. -

Žr. naudojimo instrukcijas

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Karvės: 5 ml vienam kartui - 0% -

Naudoti po melžimo, 2–3 kartus per dieną (po kiekvieno melžimo).

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Didelio tankio polietileno (HDPE) talpyklės po 5-60 kg, 60-200 kg ir 600-1000 kg.

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekantą, prieš naudojant, reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

Rekomenduojama naudoti dozatorių, pilant paruoštą naudoti dezinfekantą į talpą. Pripildyti talpą dezinfekantu, skiriant 5 ml dezinfekanto vienai karvei, ir ant viršaus užsukti mirkymo indą. Vengti perteklinio skysčio nutekėjimo.

Prieš melžimą kruopščiai nušluostyti spenius vienkartinė popierine servetėle arba šluoste. Po melžimo suspausti talpą ir pakišti po kiekvienu speniu mirkymo indą iš apačios. Įsitikinti, kad į dezinfekantą įmerkta apie 3 cm spenio.

Suspaudus talpą, pakartotinai pripildyti mirkymo indą šviežiu dezinfekantu. Jeigu reikia pakartotinai pripildyti talpą šviežiu dezinfekantu.

Dezinfekantą ant spenių palikti iki kito melžimo. Užtikrinti, kad gyvūnai stovėtų bent 5 minutes po dezinfekcijos.

Po dezinfekcijos ištuštinti, išvalyti talpą ir mirkymo indą, ir išskalauti vandeniu.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei būtina dezinfekcija prieš ir po melžimo, dezinfekcija prieš melžimą turi būti atlikta su produktu be jodo.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Naudojimo Nr.4.2 – melžiamų gyvūnų spenių dezinfekcija po melžimo naudojant rankinį purkštuvą.

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Neaktualu

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrasis pavadinimas: Bakterijos
Vystymo stadija: Vegetatyvinės ląstelės

Mokslinis pavadinimas: Mielės
Bendrasis pavadinimas: Mielės
Vystymo stadija: Vegetatyvinės ląstelės

| | |
|--|--|
| Naudojimo sritis | <p>vidaus</p> <p>Melžiamų gyvūnų (melžiamų karvių) spenių dezinfekcija po melžimo.</p> |
| Naudojimo metodas (-ai) | <p>Rankiniu būdu, naudojant rankinį purkštuvą. -</p> <p>Žr. naudojimo instrukcijas</p> |
| Naudojimo norma (-os) ir dažnis | <p>Karvės: 5 ml vienam kartui - 0% -</p> <p>Naudoti po melžimo, 2–3 kartus per dieną (po kiekvieno melžimo).</p> |
| Vartotojų kategorija (-os) | <p>Profesionalas</p> |
| Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga | <p>Didelio tankio polietileno (HDPE) talpyklės po 5-60 kg, 60-200 kg ir 600-1000 kg.</p> |

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekantą, prieš naudojant, reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje. Rekomenduojama naudoti dozatorių, pilant produktą į talpą. Pripildyti talpą paruoštu naudoti dezinfekantu, skiriant 5 ml dezinfekanto vienai karvei, ir ant jo viršaus užsukti purkštuvą. Vengti perteklinio skysčio nutekėjimo. Prieš melžimą kruopščiai nušluostyti spenius vienkartinėmis popierinėmis servetėlėmis arba šluoste. Po melžimo, rankiniu purkštuvu purkšti dezinfekantą. Dezinfekantas aplink spenio kanalą turi padengti apie 3 cm plotą. Jeigu reikia, pripildyti talpą šviežiu dezinfekantu. Dezinfekantą ant spenių palikti iki kito melžimo. Užtikrinti, kad gyvūnai stovėtų bent 5 minutes po dezinfekcijos. Po dezinfekcijos, talpą ir purkštuvą ištuštinti, išvalyti ir išskalauti vandeniu.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Dezinfekuojant rankiniu purkštuvu spenius po melžimo, mūvėti, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą nurodo autorizuotojas produkto informacijoje). Saugotis purškiamo produkto dalelių ore.

Jei būtina dezinfekcija prieš ir po melžimo, dezinfekcija prieš melžimą turi būti atlikta su produktu, kurio sudėtyje nėra jodo.

| |
|--|
| |
|--|

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

| |
|--|
| Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas. |
|--|

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

| |
|--|
| Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas. |
|--|

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

| |
|--|
| Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas. |
|--|

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Naudojimo Nr.4.3 – melžiamų gyvūnų spenių dezinfekcija rankiniu būdu, po melžimo, naudojant elektroninį purkštuvą.

| | |
|---|--|
| Produkto tipas | PT 03 - Veterinarinė higiena |
| Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas | Neaktualu |
| Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas) | Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: Vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: Vegetatyvinės ląstelės |
| Naudojimo sritis | vidaus Melžiamų gyvūnų (melžiamų karvių) spenių dezinfekcija po melžimo. |
| Naudojimo metodas (-ai) | Rankiniu būdu, naudojant elektroninį purkštuvą. - Žr. naudojimo instrukcijas |

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Karvės: 5 ml vienam kartui - 0% -
Naudoti po melžimo, 2–3 kartus per dieną (po kiekvieno melžimo).

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Didelio tankio polietileno (HDPE) talpyklės po 5-60 kg, 60-200 kg ir 600-1000 kg.

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekantą, prieš naudojant, reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.
Atidaryti talpą, į kurią įpilta paruošto naudoti dezinfekanto ir įstatyti elektroninio purkštuvu žarną. Vienam gyvūnui skiriama apie 5 ml dezinfekanto. Vengti perteklinio skysčio nubėgimo.
Prieš melžimą, kruopščiai nuvalyti spenius vienkartinė popierine servetėle arba šluoste.
Po melžimo, elektroniniu purkštuvu purkšti dezinfekantą. Dezinfekantas aplink spenio kanalą turi padengti apie 3 cm plotą.
Esant reikalui, tuščią talpą pakeisti pilna RTU talpa.
Dezinfekantą ant spenių palikti iki kito melžimo. Užtikrinti, kad gyvūnai stovėtų bent 5 minutes po dezinfekcijos.
Po dezinfekavimo, purkštuvu žarną įstatyti į kibirą su vandeniu ir praskalauti purkštuvą purškiant vandenį.

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Dezinfekuojant elektroniniu purkštuvu spenius po melžimo, mūvėti, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą nurodo autorizuotojas produkto informacijoje). Saugotis purškiamo produkto dalelių ore.
Jei būtina dezinfekcija prieš ir po melžimo, dezinfekcija prieš melžimą turi būti atlikta su produktu, kurio sudėtyje nėra jodo.

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4 Naudokite aprašymą

Naudojimas 4 - Naudojimo Nr.4.4 - melžiamų gyvūnų spenių dezinfekcija automatizuotu būdu merkiant, po melžimo

| | |
|---|--|
| Produkto tipas | PT 03 - Veterinarinė higiena |
| Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas | Neaktualu |
| Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas) | Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: Vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: Vegetatyvinės ląstelės |
| Naudojimo sritis | vidaus Melžiamų gyvūnų (melžiamų karvių) spenių dezinfekcija po melžimo. |
| Naudojimo metodas (-ai) | Automatizuotas spenių merkimas. - Žr. naudojimo instrukcijas |
| Naudojimo norma (-os) ir dažnis | Karvės: 5 ml vienam kartui - 0% - Naudoti po melžimo, 2–3 kartus per dieną (po kiekvieno melžimo). |
| Vartotojų kategorija (-os) | Profesionalas |
| Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga | Didelio tankio polietileno (HDPE) talpyklės po 5-60 kg, 60-200 kg ir 600-1000 kg. |

4.4.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekantą, prieš naudojant, reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.
Atidaryti talpą, kurioje yra paruoštas naudoti dezinfekantas, ir į ją įstatyti automatizuotos spenių merkimo sistemos žarną. Vengti perteklinio skysčio nubėgimo.
Po melžimo vakuumas išjungiamas ir išvirkščinama spenių dezinfekantio į kolektorių. Automatizuotai klosterio šalinimo (AKŠ) sistemai patraukus mirkymo indą, speniai lieka padengti 5 ml dezinfekanto. Pašalinus AKŠ, visos automatinės spenių įmerkimo sistemos linijos gerai išplaunamos vandeniu ir prapučiamos suspausto oro srove.
Paskutiniu valymo etapu, po kiekvieno bandos melžimo, linijos yra dezinfekuojamos (pvz., priemone, kurios sudėtyje yra chloro) ir dar kartą prapučiamos suspausto oro srove.
Dezinfekantą ant spenių palikti iki kito melžimo. Užtikrinti, kad gyvūnai stovėtų bent 5 minutes po dezinfekcijos.
Po tokios procedūros, melžimo sistema yra parengta kitam melžimui.
Visas procesas yra automatizuotas.

4.4.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei būtina dezinfekcija prieš ir po melžimo, dezinfekcija prieš melžimą turi būti atlikta su produktu be jodo.

4.4.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5 Naudokite aprašymą

Naudojimas 5 - Naudojimo Nr.4.5 – melžiamų gyvūnų spenių dezinfekcija automatizuotu būdu, naudojant robotą.

| | |
|---|--|
| Produkto tipas | PT 03 - Veterinarinė higiena |
| Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas | Neaktualu |
| Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas) | Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: Vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: Vegetatyvinės ląstelės |
| Naudojimo sritis | vidaus Melžiamų gyvulių (melžiamų karvių) spenių dezinfekcija, naudotina pamelžus |
| Naudojimo metodas (-ai) | Automatizuotas purškimas, naudojant robotą. - Žr. naudojimo instrukcijas |
| Naudojimo norma (-os) ir dažnis | Karvės: 5 ml vienam kartui - 0% - Naudoti po melžimo, 2–3 kartus per dieną (po kiekvieno melžimo). |
| Vartotojų kategorija (-os) | Profesionalas |
| Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga | Didelio tankio polietileno (HDPE) talpyklės po 5-60 kg, 60-200 kg ir 600-1000 kg. |

4.5.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekantą, prieš naudojant, reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.
Atidaryti talpą, kurioje yra paruošto naudoti dezinfekanto, ir į ją įstatyti automatizuoto roboto melžimo įrenginio žarną. Vengti perteklinio skysčio nubėgimo .
Robotas, automatizuotu būdu, šepetėliais nuvalo spenius.
Robotui baigus melžimo procedūrą, dezinfekantas iš klasterio automatiškai purškiamas ant spenių.
Dezinfekantą ant spenių palikti iki kito melžimo. Užtikrinti, kad gyvūnai stovėtų bent 5 minutes po dezinfekcijos.
Purkštuvus plaunamas automatizuotai.

4.5.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei būtina dezinfekcija prieš ir po melžimo, dezinfekcija prieš melžimą turi būti atlikta su produktu, kurio sudėtyje nėra jodo.

4.5.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

5. Bendrieji naudojimo nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. naudojimo instrukcijas

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Žr. rizikos mažinimo priemonės.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Paminėta MSDS

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpus: įleiskite gryno oro; atsiradus negalavimų, kreipkitės į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsdami nuplaukite vandeniu ir muilu ir gerai nuplaukite.

Patekus į akis: skalaukite akis tekančiu vandeniu (bent 15 minučių).

Nurijus: skalaukite burną ir gerkite daug vandens. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Jei reikia gydytojo pagalbos, turėkite po ranka dezinfekavimo priemonės indą arba etiketę.

Stabilumas ir reaktyvumas

Reaktyvumas: nėra žinomų reakcijų.

Cheminis stabilumas: priemonė yra chemiškai stabili esant normalioms aplinkos sąlygoms (aplinkos temperatūrai).

Pavojingų reakcijų tikimybė: naudojant priemonę, kaip nurodyta, nereikia bijoti jokių pavojingų reakcijų.

Vengtinios aplinkos sąlygos: nenustatyta.

Nesuderinamos medžiagos: nenustatyta.

Pavojingos irimo medžiagos: nežinoma apie pavojingas irimo medžiagas.

Avarijų likvidavimo priemonės

Atsargumo priemonės, asmens apsaugos priemonės ir skubiosios pagalbos procedūros:

Dėvėkite asmens apsaugos priemones.

Užtikrinkite pakankamą vėdinimą.

Saugokite nuo ugnies šaltinių; draudžiama rūkyti.

Aplinkos apsaugos priemonės: neleiskite patekti į drenažo sistemą, į paviršinius ir gruntinius vandenis.

Izoliavimo ir valymo priemonės ir medžiagos: sugerkite naudodami skysčius išančias medžiagas (smėlį, diatomitą, rūgščių rišiklius, universaliuosius rišiklius, pjuvenas). Surinktas medžiagas būtina šalinti laikantis galiojančių taisyklių.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Paminėta MSDS

Atliekų tvarkymo metodai: pavojingos atliekos (AVV). Draudžiama šalinti kartu su buitinėmis atliekomis, kad dezinfekavimo priemonės nepatektų į nuotekų sistemą. Būtina šalinti specialiu būdu, laikantis vietinių ir nacionalinių taisyklių.

Panaudoję priemonę, šalinkite nepanaudotus likučius ir pakuotę pagal vietines ir nacionalines taisykles. Panaudotą dezinfekavimo priemonę galima nuleisti į komunalinę kanalizaciją arba išmesti mėšlo laikymo vietoje, atsižvelgiant į vietinių taisyklių reikalavimus. vengti patekimų į individualias nuotekų valymo sistemas.

Rekomenduojama valymo priemonė: vanduo; jei reikia, ploviklis.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Galiojimo laikas: 18 mėnesių.

Dezinfekavimo priemonės būtina saugoti nuo šalčio, aukštesnės nei 30 °C temperatūros ir nuo tiesioginių saulės spindulių.

6. Kita informacija

Neaktualu