

PT

ANEXO

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO BIOCIDA (SPC BP)

SERPA RAT BLOCK BRODIFACOUM

Tipo(s) de produto

PT14: Rodenticidas

Número de autorização: PT/DGS mrs-43/2021

Número da decisão de autorização R4BP: PT-0026766-0000

Capítulo 1. INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. Nome(s) comercial(ais) do produto

Nome(s) comercial(ais) do produto	SERPA-RAT BLOCK BRODIFACOUM
-----------------------------------	-----------------------------

1.2. Titular da autorização

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	MYLVA S.A.
	Endereço	Via Augusta, 48 08006 Barcelona Espanha
Número de autorização	PT/DGS mrs-43/2021	
<i>Número da decisão de autorização R4BP</i>	PT-0026766-0000	
Data da autorização	05/02/2014	
Data de caducidade da autorização	31/12/2026	

1.3. Fabricante(s) do produto

Nome do fabricante	I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.a.
Endereço do fabricante	Nona Strada, 57 – 35129 – Padova Italia 35129 Padova Itália
Localização das instalações de fabrico	- - - Itália

1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

Substância ativa	Brodifacume
Nome do fabricante	Activa s.r.l./Dr. Tezza s.r.l.
Endereço do fabricante	Via Feltre, 32 - 20132 Milano - Italia 20132 Milano Itália
Localização das instalações de fabrico	Dr Tezza s.r.l - Via Tre Ponti 22, 37050 S. Maria di Zevio (VR) - Italia 37050 S. Maria di Zevio (VR) Itália

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO E FORMULAÇÃO DO PRODUTO

2.1. Informação qualitativa e quantitativa sobre a composição do produto

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Brodifacume	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	substância ativa	56073-10-0	259-980-5	0,005 % (m/m)

2.2. Tipo(s) de formulação

RB isco (pronto a usar)

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA

Advertências de perigo	
Recomendações de prudência	P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P280: Usar luvas de proteção.

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S)

4.1. Descrição de utilizações

Tabela 1. Profissional

Tipo de produto	PT14: Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	O produto é um rodenticida anticoagulante/antagonista de vitamina K isco pronto al usar en blocos
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: Rattus norvegicus Nome comum: brown rat Estadio de desenvolvimento: adultos Nome científico: Rattus norvegicus Nome comum: brown rat Estadio de desenvolvimento: jovens Nome científico: Rattus rattus Nome comum: house rat Estadio de desenvolvimento: adultos Nome científico: Rattus rattus Nome comum: house rat Estadio de desenvolvimento: jovens Nome científico: Mus musculus Nome comum: house mouse Estadio de desenvolvimento: adultos Nome científico: Mus musculus Nome comum: house mouse Estadio de desenvolvimento: jovens
Campo(s) de utilização	utilização em interiores utilização no exterior Interior exterior
Método(s) de aplicação	Método: Em estações de isco Descrição detalhada: Coloque blocos em isco devidamente rotulados
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Ratos: Estaçoes de iscos 40g /100m2. - Ratazanas: Estaçoes de iscos 100g/100m2 Diluição (%): 0 Número e calendário da aplicação: Ratos: Estaçoes de iscos 40g /100m2.- Ratazanas: Estaçoes de iscos 100g/100m2
Categoria(s) de utilizadores	industrial ; profissional com formação ; profissional
Capacidade e material da embalagem	

	<p>Blocos 10, 15, 20, 25, 30, 50 y 100g en:</p> <ul style="list-style-type: none">- Os sacos de plástico de polietileno (PE) ou polipropileno (PP) e sacos de papel kraft com a camada interna de polietileno (PE) ou polipropileno (PP) de 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400 y 500g y de 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25Kg.- Caixas de cartão com uma camada interna de polietileno (PE) ou polipropileno (PP) de 100, 150, 200, 250, 300, 500g. y de 1Kg.- baldes de plástico polietileno de alta densidade (HDPE) 100, 150, 200, 250, 300, 400 y 500g. y de 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 y 25 Kg.
--	--

4.1.1. Instruções específicas de utilização

Ver modo de utilização

4.1.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Ver modo de utilização

4.1.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver modo de utilização

4.1.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver modo de utilização

4.1.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver modo de utilização

Capítulo 5. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A UTILIZAÇÃO¹

5.1. Instruções de utilização

Você deve evitar o uso em áreas onde há evidência de resistência à substância activa. A fim de evitar o desenvolvimento de resistência, devem garantir a susceptibilidade dos roedores à brodifacum antes de iniciar o tratamento. Após a campanha de controle, você deve verificar se os objectivos foram alcançados.

Antes de usar o produto leia atentamente o rótulo e siga as propostas instruções específicas.

A isca carregado deve ser colocado de forma segura e localizado em crianças inacessíveis, animais de estimação e outros animais que são as áreas não-alvo. Eles devem ser colocados em locais onde evitar ser arrastado.

Não aplicar em áreas onde alimentos / alimentação, utensílios de cozinha ou superfícies de processamento de alimentos podem entrar em contacto com o produto ou ser contaminadas por ele.

Aplicar medidas de higiene: Não comer, beber ou fumar durante a aplicação do produto. Lave as mãos e pele exposta após a aplicação do produto.

O tratamento deve ser alternado com iscas anticoagulantes que contenham substâncias activas diferentes, para evitar a resistência e o possível surgimento de roenticidas de resistência cruzada.

Não iscas com água limpa entre dois aplicativos.

Não jogue o produto no chão em um curso de água, na pia ou ralo.

Remover roedores mortos durante as operações de controle para minimizar o risco de envenenamento de crianças, animais e outros animais que não se destine ao consumo.

Remover roedores mortos em conformidade com os regulamentos locais.

Retirar e remover todas as iscas e isca de acordo com a legislação vigente.

5.2. Medidas de redução do risco

A isca deve ser devidamente rotulados mostrando claramente que contêm um produto raticida.

A autorização exige que o produto tenha um corante que faz com que a isca atraente para a vida selvagem, especialmente aves.

O produto contém um agente amargo.

Para minimizar os problemas de resistência e o risco de envenenamento primário o produto não deve ser utilizado como isco permanente para evitar a ocorrência de roedores.

Para minimizar o risco de envenenamento secundário, eles devem procurar e remover os roedores mortos em intervalos frequentes durante o tratamento, pelo menos com a mesma frequência que são verificados e peças sobressalentes iscas.

5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

¹As instruções de utilização, as medidas de redução do risco e outras instruções de utilização ao abrigo da presente secção são válidas para todas as utilizações autorizadas.

- medidas básicas de desempenho:

- Retirar a pessoa contaminada e remover a área a roupa contaminada.
- Contacto com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos. Lembre-se de remover as lentes de contato.
- Em contato com a pele, lave com água e sabão sem esfregar.
- Em caso de ingestão, NÃO provocar o vômito a não ser dito para fazê-lo através de controle de veneno ou profissional de saúde.
- Manter o paciente em repouso e manter a temperatura do corpo.
- Verifique a respiração. Se necessário, a respiração artificial.
- Se a pessoa estiver inconsciente, coloque na parte inferior do que o resto do corpo e os joelhos dobrados.
- Se for necessário mover a vítima para um hospital, e sempre que possível, tomar a embalagem ou o rótulo.

NÃO DEIXE A PESSOA INTOXICADA SOZINHA EM QUALQUER MOMENTO.

- pode causar envenenamento:

- Diátese hemorrágica, derivado do efeito antiprothrombin tempo -tempo de protrombina- que podem tornar-se evidente em um mínimo de 24 horas e até 72 horas (a rendimento normal do tempo de protrombina, não exclui o diagnóstico).

- aconselhamento terapêutico para médicos e profissionais de saúde:

- Em casos de ingestão, administrar uma dose de carvão activado (25 g), se menos do que duas horas após a ingestão atrás.
- Antídoto: vitamina K1 (fitomenadiona).
- Verifique o tempo de protrombina ou INR.
- O tratamento sintomático.

5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

Os recipientes vazios, roedores mortos, iscas de resíduos e isca devem ser geridos de acordo com as normas vigentes através recicladores locais.

5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

O produto é estável durante dois anos.

Conservar na embalagem original, fechado, num local seco, fresco e bem ventilado.

Manter afastado da luz solar e outras fontes de calor.

Manter longe do alcance de crianças e animais de estimação.

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES