

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: PROBLOC 25

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA:UP/I-543-04/18-12/52

**Referentni broj odluke u registru
biocidnih proizvoda (R4BP 3):** HR-0020051-0000

Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	1
2. Sastav i formulacija proizvoda	2
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Oznake opasnosti i obavijesti	2
4. Odobrena uporaba	2
5. Opće upute za uporabu	19
5.1. Upute za uporabu	19
5.2. Mjere za smanjenje rizika	20
5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	21
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	22
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja	22
6. Ostale informacije	22

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

PROBLOC 25 BRODILON DIF HOME BLOK

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	ARMOSA TECH SA
	Adresa	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgija
Broj odobrenja	KLASA:UP/I-543-04/18-12/52	
Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)	HR-0020051-0000	
Datum odobrenja	19/06/2013	
Datum isteka odobrenja	01/07/2024	

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača	ARMOSA SA
Adresa proizvođača	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgija
Lokacija proizvodnih pogona	Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Belgija

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	26 - Difenakum
Naziv proizvođača	PELGAR
Adresa proizvođača	Unit 13, Newmann Lane Industrial Estate Alton GU34 2 QR Alton Hants Ujedinjeno Kraljevstvo
Lokacija proizvodnih pogona	Prazska 54 280 02 Kolin Češka

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Difenakum	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin	Aktivna tvar	56073-07-5	259-978-4	0,0025

2.2. Vrsta formulacije

RB - mamac (pripremljen za uporabu)

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja	Može uzrokovati oštećenje organa (krv) tijekom produžene ili ponavljane izloženosti (oralno).
Oznake obavijesti	U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti pomoć liječnika. Odložiti spremnik u/na skladu s nacionalnim propisima.

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - kućni miševi – profesionalni korisnici – u zatvorenom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije mjerodavno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: kućni miševi Stadij razvoja: Odrasli i mladi
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu koji se koristi u zaštitnim kutijama za mamce koje su otporne na manipulaciju/premještanje.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: - 30 g mamca po kutiji s mamcem. Ako je potrebno više kutija s mamcem, najmanja udaljenost među kutijama treba biti 2 metra. Razrjeđivanje (%): Broj i vremenski raspored primjene: -
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Najmanja veličina pakiranja: 5 kg. Mamac u pojedinačnim PE/PP vrećicama: 30 g ili bez vrećica (nezamotan) Materijal za ambalažu: Kutija (karton) 5-25 kg mamca u vrećicama; Kanta (PE/PP) 5-25 kg mamca u vrećicama; Papirnata vreća s unutarnjom oblogom od PE 5-25 kg mamca bez vrećica; Predhodno napunjena zaštitna kutija za mamce (PP, PS, PVC)-mamci u vrećicama Veličina pakiranja: 5-25 kg

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Zaštitne kutije s mamcem treba provjeriti barem svaka 2 do 3 dana u početku tretmana, kasnije barem jednom tjedno, a prema potrebi se nadopunjavaju. Provjerava se je li mamac konzumiran te jesu li zaštitne kutije s mamcem neoštećene ili odvučene od strane glodavaca, a uginuli glodavci se moraju ukloniti.
[Ako je moguće] Slijedite dodatne upute navedene u mjerodavnom kodeksu najbolje prakse.

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidi 5.2.

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ako su zaštitne kutije s mamcima u blizini odvodnih sustava, mora se spriječiti bilo kakav kontakt s vodom.

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4.

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - štakori – profesionalni korisnici– u zatvorenom

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Nije mjerodavno za rodenticide

**Ciljni organizam(mi)
(uključujući razvojnu fazu)**

Znanstveno ime: Rattus norvegicus
Uobičajeno ime: smeđi štakor
Stadij razvoja: Odrasli i mladi

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

Načini primjene

Metoda: primjena mamaca
Detaljan opis:

Mamac spreman za uporabu koji se koristi u zaštitnim kutijama za mamce koje su

	otporne na manipulaciju/premještanje.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: - 100 g mamca po kutiji s mamcem. Ako je potrebno više kutija s mamcem, najmanja udaljenost među kutijama treba biti 5 metara. Razrjeđivanje (%): Broj i vremenski raspored primjene: -
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Najmanja veličina pakiranja: 5 kg. Mamac u pojedinačnim PE/PP vrećicama: 30 g ili bez vrećica (nezamotan) Materijal za ambalažu: Kutija (karton) 5-25 kg mamca u vrećicama; Kanta (PE/PP) 5-25 kg mamca u vrećicama; Papirnata vreća s unutarnjom oblogom od PE 5-25 kg mamca bez vrećica; Predhodno napunjena zaštitna kutija za mamce (PP, PS, PVC)-mamci u vrećicama Veličina pakiranja: 5-25 kg

4.2.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Zaštitne kutije s mamcem treba provjeriti barem svakih 5 do 7 dana u početku tretmana, kasnije barem jednom tjedno, a prema potrebi se nadopunjavaju. Provjerava se je li mamac konzumiran te jesu li zaštitne kutije s mamcem neoštećene ili odvučene od strane glodavaca, a uginuli glodavci se moraju ukloniti.
[Ako je moguće] Slijedite dodatne upute navedene u mjerodavnom kodeksu najbolje prakse.

4.2.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidi 5.2.

4.2.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ako su zaštitne kutije s mamcima u blizini odvodnih sustava, mora se spriječiti bilo kakav kontakt s vodom.

4.2.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4.

4.2.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - kućni miševi i/ili štakori –profesionalni korisnici – na otvorenom, oko zgrada

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije mjerodavno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: Odrasli i mladi Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: kućni miševi Stadij razvoja: Odrasli i mladi
Područje primjene	na otvorenom na otvorenom, oko zgrada
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu koji se koristi u kutijama s mamcem koje su otporne na manipulaciju/premještanje.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: -štakor: 100 g mamca po kutiji s mamcem. Ako je potrebno više kutija s mamcem, najmanja udaljenost među kutijama treba biti 5 metara. - miš: 30 g mamca po kutiji s mamcem. Ako je potrebno više kutija s mamcem, najmanja udaljenost među kutijama treba biti 2 metra. Razrjeđivanje (%): Broj i vremenski raspored primjene: -

Kategorije korisnika

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Najmanja veličina pakiranja: 5 kg.
Mamac u pojedinačnim PE/PP vrećicama: 30 g, 100 g ili bez vrećica (nezamotan) Materijal za ambalažu: Kutija (karton) 5-25 kg mameca u vrećicama; Kanta (PE/PP) 5-25 kg mameca u vrećicama; Papirnata vreća s unutarnjom oblogom od PE 5-25 kg mameca bez vrećica; Predhodno napunjena zaštitna kutija za mamce (PP, PS, PVC)-mamci u vrećicama Veličina pakiranja: 5-25 kg

4.3.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Zaštitiite mamac od atmosferskih uvjeta (na primjer kiše, snijega itd.). Zaštitne kutije s mamcem postavite na područja koja nisu izložena poplavama.
Zaštitne kutije s mamcem treba provjeriti [za miševe – barem svaka 2 do 3 dana] [za štakore – samo 5 do 7 dana] u početku tretmana, kasnije barem jednom tjedno, a prema potrebi se nadopunjavaju.
Provjerava se je li mamac konzumiran te jesu li zaštitne kutije s mamcem neoštećene ili odvučene od strane glodavaca, a uginuli glodavci se moraju ukloniti. Ukoliko je vodom ili prljavštinom došlo do oštećenja mameca ili zaštitne kutije za mamce, oni se moraju zamijeniti.
[Ako je moguće] Slijedite dodatne upute navedene u mjerodavnom kodeksu najbolje prakse.

4.3.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Ovaj proizvod se ne smije stavljati direktno u rupe u kojima se nalaze životinje.

4.3.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Kada zaštitne kutije s mamcem postavljate u blizinu površinskih voda (na primjer rijeka, jezera, odvodnih kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava za odvod vode, izbjegavajte kontakt vode i mameca.

4.3.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4.

4.3.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5.

4.4 Opis uporabe

Uporaba 4 - kućni miš i/ili štakor - osposobljeni profesionalni korisnici - u zatvorenom

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Nije mjerodavno za rodenticide

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: *Rattus norvegicus*
Uobičajeno ime: smeđi štakor
Stadij razvoja: Odrasli i mladi

Znanstveno ime: *Mus musculus*
Uobičajeno ime: kućni miševi
Stadij razvoja: Odrasli i mladi

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

Načini primjene

Metoda: primjena mamaca
Detaljan opis:
Mamac spreman za uporabu koji se koristi u zaštitnim kutijama za mamce koje su otporne na manipulaciju/premještanje ili na zaštićenim i natkrivenim mjestima postavljanja mamca.

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: - štakor: 100 g mamca po mjestu postavljanja mamca. - miš: 30 g mamca po mjestu postavljanja mamca
Razrjeđivanje (%):
Broj i vremenski raspored primjene:
-

Kategorije korisnika

osposobljeni profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Najmanja veličina pakiranja: 5 kg.
Mamac u pojedinačnim PE/PP vrećicama: 30 g, 100 g ili bez vrećica (nezamotan)
Materijal za ambalažu: Kutija (karton) 5-25 kg mamca u vrećicama; Kanta (PE/PP) 5-25 kg mamca u vrećicama; Papirnata vreća s unutarnjom oblogom od PE 5-25 kg mamca bez vrećica; Predhodno napunjena zaštitna kutija za mamce (PP, PS, PVC)-mamci u

vrećicama
Veličina pakiranja: 5-25 kg

4.4.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Uklonite preostali proizvod na kraju postupka deratizacije.
[Ako je moguće] Slijedite dodatne upute navedene u mjerodavnom kodeksu najbolje prakse.

4.4.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Ako je to moguće, prije tretiranja obavijestite sve ostale korisnike prostora o mjerama suzbijanja koje će provesti [u skladu s primjenjivim kodeksom dobre prakse, ako postoje]". U obzir uzmite preventivne kontrolne mjere (zatvaranje rupa, uklanjanje ostataka hrane i pića) kako bi se potaknuo unos biocidnog proizvoda kao izvora hrane i spriječila nova infestacija. Da biste smanjili rizik sekundarnog otrovanja, što češće potražite i uklonite uginule glodavce tijekom postupka deratizacije u skladu s preporukama navedenim u mjerodavnom kodeksu dobre prakse.
Ne koristite proizvode kao trajne mamce za suzbijanje infestacije glodavcima ili praćenja njihove aktivnosti. Ne koristite proizvod samo povremeno (u pulsnom tretmanu).

4.4.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ako su mjesta postavljanja mamca u blizini odvodnih sustava, mora se spriječiti bilo kakav kontakt s vodom.

4.4.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4.

4.4.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vid 5.5.

4.5 Opis uporabe

Uporaba 5 - miševi i/ili štakori – osposobljeni profesionalni korisnici – na otvorenom oko zgrada

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije mjerodavno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: Odrasli i mladi Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: kućni miševi Stadij razvoja: Odrasli i mladi
Područje primjene	na otvorenom na otvorenom, oko zgrada
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu koji se koristi u zaštitnim kutijama za mamce koje su otporne na manipulaciju/premještanje ili na zaštićenim i natkrivenim mjestima postavljanja mamca.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: - štakor: 100 g mamca po mjestu postavljanja mamca. - miš: 30 g mamca po mjestu postavljanja mamca. Razrjeđivanje (%): Broj i vremenski raspored primjene: -
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Najmanja veličina pakiranja: 5 kg. Mamac u pojedinačnim PE/PP vrećicama: 30 g, 100 g ili bez vrećica (nezamotan) Materijal za ambalažu: Kutija (karton) 5-25 kg mamca u vrećicama; Kanta (PE/PP) 5-25 kg mamca u vrećicama; Papirnata vreća s unutarnjom oblogom od PE 5-25 kg mamca bez vrećica; Predhodno napunjena zaštitna kutija za mamce (PP, PS, PVC)-mamci u vrećicama Veličina pakiranja: 5-25 kg

4.5.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Zaštitite mamac od atmosferskih uvjeta (na primjer kiše, snijega itd.). Zaštitne kutije s mamcem postavite na područja koja nisu izložena poplavama.
Ukoliko je vodom ili prljavštinom došlo do oštećenja mamca ili zaštitne kutije za mamce, oni se moraju zamijeniti.
Uklonite preostali proizvod na kraju postupka deratizacije.[Ako je moguće] Slijedite dodatne upute navedene u mjerodavnom kodeksu najbolje prakse.

Za uporabu na otvorenom, mjesta postavljanja mamaca moraju biti zaštićena i natkrivena s minimalnom mogućnošću izloženosti neciljanih vrsta

4.5.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Ako je to moguće, prije tretiranja obavijestite sve ostale korisnike prostora o mjerama suzbijanja koje će provesti [u skladu s primjenjivim kodeksom dobre prakse, ako postoje]". U obzir uzmite preventivne kontrolne mjere (zatvaranje rupa, uklanjanje ostataka hrane i pića) kako bi se potaknuo unos biocidnog proizvoda kao izvora hrane i spriječila nova infestacija. Da biste smanjili rizik sekundarnog otrovanja, što češće potražite i uklonite uginule glodavce tijekom postupka deratizacije u skladu s preporukama navedenim u mjerodavnom kodeksu dobre prakse. Ne koristite proizvode kao trajne mamce za suzbijanje infestacije glodavcima ili praćenja njihove aktivnosti. Ne koristite proizvod samo povremeno (u pulsnom tretmanu).

Ovaj proizvod se ne smije stavljati direktno u rupe u kojima se nalaze životinje.

4.5.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Kada zaštitne kutije s mamcem postavljate u blizinu površinskih voda (na primjer rijeka, jezera, odvodnih kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava za odvod vode, izbjegavajte kontakt vode i mamca.

4.5.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4.

4.5.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5.

4.6 Opis uporabe

Uporaba 6 - štakori – osposobljeni profesionalni korisnici – vanjska otvorena područja i odlagališta otpada

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije mjerodavno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: Odrasli i mladi
Područje primjene	na otvorenom Other Vanjska otvorena područja Vanjska odlagališta otpada
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu koji se koristi u zaštitnim kutijama za mamce koje su otporne na manipulaciju/premještanje ili na zaštićenim i natkrivenim mjestima postavljanja mamca.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: - štakor: 100 g mamca po mjestu postavljanja mamca. Razrjeđivanje (%): Broj i vremenski raspored primjene: -
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Najmanja veličina pakiranja: 5 kg. Mamac u pojedinačnim PE/PP vrećicama: 100 g ili bez vrećica (nezamotan) Materijal za ambalažu: Kutija (karton) 5-25 kg mamca u vrećicama; Kanta (PE/PP) 5-25 kg mamca u vrećicama; Papirnata vreća s unutarnjom oblogom od PE 5-25 kg mamca bez vrećica; Predhodno napunjena zaštitna kutija za mamce (PP, PS, PVC)-mamci u vrećicama Veličina pakiranja: 5-25 kg

4.6.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Zaštite mamac od atmosferskih uvjeta (na primjer kiše, snijega itd.). Zaštitne kutije s mamcem postavite na područja koja nisu izložena poplavama.
Ukoliko je vodom ili prljavštinom došlo do oštećenja mamca ili zaštitne kutije za mamce, oni se moraju zamijeniti.
Uklonite preostali proizvod na kraju postupka deratizacije. [Ako je moguće] Slijedite dodatne upute navedene u mjerodavnom kodeksu najbolje prakse.
Za uporabu na otvorenom, mjesta postavljanja mamaca moraju biti zaštićena i natkrivena s minimalnom mogućnošću izloženosti neciljanih vrsta



4.6.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Ako je to moguće, prije tretiranja obavijestite sve ostale korisnike prostora o mjerama suzbijanja koje će provesti [u skladu s primjenjivim kodeksom dobre prakse, ako postoje]". U obzir uzmite preventivne kontrolne mjere (zatvaranje rupa, uklanjanje ostataka hrane i pića) kako bi se potaknuo unos biocidnog proizvoda kao izvora hrane i spriječila nova infestacija. Da biste smanjili rizik sekundarnog otrovanja, što češće potražite i uklonite uginule glodavce tijekom postupka deratizacije u skladu s preporukama navedenim u mjerodavnom kodeksu dobre prakse. Ne koristite proizvode kao trajne mamce za suzbijanje infestacije glodavcima ili praćenja njihove aktivnosti. Ne koristite proizvod samo povremeno (u pulsnom tretmanu).

Ovaj proizvod se ne smije stavljati direktno u rupe u kojima se nalaze životinje.

4.6.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Kada zaštitne kutije s mamcem postavljate u blizinu površinskih voda (na primjer rijeka, jezera, odvodnih kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava za odvod vode, izbjegavajte kontakt vode i mamca.

4.6.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4.

4.6.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5.

4.7 Opis uporabe

Uporaba 7 - kućni miševi – opća javnost – u zatvorenom

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije mjerodavno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: kućni miševi Stadij razvoja: Odrasli i mladi
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu koji se koristi u zaštitnim kutijama za mamce koje su otporne na manipulaciju/premještanje.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: - 30 g mamca po kutiji s mamcem. Ako je potrebno više kutija s mamcem, najmanja udaljenost među kutijama treba biti 2 metra. Razrjeđivanje (%): Broj i vremenski raspored primjene: -
Kategorije korisnika	široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Najveće pakiranje: 300 g. Mamac u pojedinačnim PE/PP vrećicama: 30 g ili bez vrećica (nezamotan) Materijal za ambalažu: Kutija (karton) do 300 g mamca u vrećicama; Kanta (PE/PP) do 300 g mamca u vrećicama; Predhodno napunjena zaštitna kutija za mamce (PP, PS, PVC)-mamci u vrećicama

4.7.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Zaštitne kutije s mamcem treba provjeriti barem svaka 2 do 3 dana u početku tretmana, kasnije barem jednom tjedno, a prema potrebi se nadopunjavaju. Provjerava se je li mamac konzumiran te jesu li zaštitne kutije s mamcem neoštećene ili odvučene od strane glodavaca, a uginuli glodavci se moraju ukloniti.

--

4.7.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidi 5.2.

4.7.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidi 5.3.

4.7.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4.

4.7.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5.

4.8 Opis uporabe

Uporaba 8 - štakori – opća javnost – u zatvorenom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije mjerodavno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: Odrasli i mladi
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu koji se koristi u zaštitnim kutijama za mamce koje su otporne na manipulaciju/premještanje.

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: 100 g mamca po kutiji s mamcem. Ako je potrebno više kutija s mamcem, najmanja udaljenost među kutijama treba biti 5 metara.
Razrjeđivanje (%):
Broj i vremenski raspored primjene:

-

Kategorije korisnika

Široka javnost (amaterska uporaba)

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Najveće pakiranje: 300 g.
Mamac u pojedinačnim PE/PP vrećicama: 100 g ili bez vrećica (nezamotan)
Materijal za ambalažu: Kutija (karton) do 300 g mamca u vrećicama; Kanta (PE/PP) do 300 g mamca u vrećicama; Predhodno napunjena zaštitna kutija za mamce (PP, PS, PVC)-mamci u vrećicama

4.8.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Zaštitne kutije s mamcem treba provjeriti barem svakih 5 do 7 dana u početku tretmana, kasnije barem jednom tjedno, a prema potrebi se nadopunjavaju. Provjerava se je li mamac konzumiran te jesu li zaštitne kutije s mamcem neoštećene ili odvučene od strane glodavaca, a uginuli glodavci se moraju ukloniti.

4.8.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidi 5.2.

4.8.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidi 5.3.

4.8.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4.

4.8.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

4.9 Opis uporabe

Uporaba 9 - štakori – opća javnost – na otvorenom, oko zgrada

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije mjerodavno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: Odrasli i mladi
Područje primjene	na otvorenom na otvorenom, oko zgrada
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu koji se koristi u kutijama s mamcem koje su otporne na manipulaciju/premještanje.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: 100 g mamca po kutiji s mamcem. Ako je potrebno više kutija s mamcem, najmanja udaljenost među kutijama treba biti 5 metara. Razrjeđivanje (%): Broj i vremenski raspored primjene: -

Kategorije korisnika

široka javnost (amaterska uporaba)

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Najveće pakiranje: 300 g.
Mamac u pojedinačnim PE/PP vrećicama: 100 g ili bez vrećica (nezamotan)
Materijal za ambalažu: Kutija (karton) do 300 g mame u vrećicama; Kanta (PE/PP) do 300 g mame u vrećicama; Predhodno napunjena zaštitna kutija za mamce (PP, PS, PVC)-mamci u vrećicama

4.9.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Zaštitne kutije s mamcem postavite na područja koja nisu izložena poplavama.

Ukoliko je vodom ili prljavštinom došlo do oštećenja mame u vrećicama ili zaštitne kutije za mamce, oni se moraju zamijeniti.

Zaštitne kutije s mamcem treba provjeriti barem svakih 5 do 7 dana u početku tretmana, kasnije barem jednom tjedno, a prema potrebi se nadopunjavaju.

Provjerava se je li mamac konzumiran te jesu li zaštitne kutije s mamcem neoštećene ili odvučene od strane glodavaca, a uginuli glodavci se moraju ukloniti

4.9.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Ovaj proizvod se ne smije stavljati direktno u rupe u kojima se nalaze životinje.

4.9.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidi 5.3.

4.9.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4.

4.9.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5.

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

OSPOSOBLJENI PROFESIONALNI KORISNICI, PROFESIONALNI KORISNICI

Prije uporabe pročitajte i slijedite upute o proizvodu, kao i sve informacije koje su isporučene uz proizvod ili na mjestu prodaje.

- pregledati infestirano područje prije postavljanja mamaca i napraviti procjenu lokacije radi određivanja vrste glodavaca, njihovih mjesta aktivnosti i saznati vjerojatan uzrok i brojnost populacije. Uklonite hranu kojoj glodavci mogu lako pristupiti (na primjer ostatci hrane ili prosuti zrnati proizvodi).

Nemojte čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda jer to ometa glodavce i smanjuje mogućnost konzumiranja mamca.

- Proizvod se treba koristiti kao dio integriranog deratizacijskog postupka uključujući npr. higijenske mjere i fizičke metode suzbijanja glodavaca (ako je moguće).

Proizvod treba staviti u neposrednu blizinu mjesta na kojima je primijećena aktivnost glodavaca (na putanjama kretanja, rupama, mjestima postavljanja gnijezda itd.).

- Ako je moguće, zaštitne kutije s mamcem treba pričvrstiti na tlo ili na neki drugi način. Potrebno je osigurati da životinja ne odvuče mamac iz zaštitne kutije za mamce.
- Kutije s mamcem trebaju biti jasno označene kako bi bilo vidljivo da sadrže rodenticide i da se ne smiju premješati ili otvarati (informacije koje se trebaju navesti na deklaraciji potražite u odjeljku 5.3).

[Ako to zahtijeva nacionalni propis ili praksa] Ako se proizvod koristi na javnim površinama, tretirana područja trebaju se označiti tijekom razdoblja tretiranja te je pored mamaca potrebno postaviti obavijest o rizicima primarnog i sekundarnog trovanja antiokoagulansom, kao i mjerama koje je potrebno poduzeti u slučaju otrovanja.

- Proizvod postavite izvan dosega djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih neciljanih životinja.
- Proizvod stavite dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta i površina koje su u kontaktu s navedenim.

[U slučajevima u kojima procjena rizika to zahtijeva:

Tijekom rukovanja proizvodom nosite zaštitne rukavice otporne na kemijske proizvode (materijal rukavica navest će nositelj odobrenja u informacijama o proizvodu)

Pri uporabi proizvoda nemojte jesti, piti ni pušiti. Nakon uporabe proizvoda oprati ruke i izravno izloženu kožu.

O učestalosti provjera tretiranog područja odlučuje izvođač na temelju provedene PROCJENE POČETKOM PRIMJENE.

Ta bi učestalost trebala biti usklađena s preporukama iz mjerodavnog kodeksa dobre prakse.

OSPOSOBLJENI PROFESIONALNI KORISNICI - Ukoliko se primjeti da je konzumacija mamca relativno mala u odnosu na infestirano područje potrebno je razmotriti premještanje kutija s mamcem na druga mjesta ili promijeniti formulaciju mamca. Ako je nakon završetka deratizacijskog postupka (najviše 35 dana) i dalje primijećena aktivnost glodavaca, potrebno je odrediti mogući razlog.

Ako su drugi uzroci isključeni, treba razmotriti upotrebu djelotvornijeg rodenticida na bazi antiokoagulansa ili primijeniti rodenticid koji ne sadrži antiokoagulans te koristiti alternativne mjere suzbijanja (npr. klopke).

Upute za uporabu koje se „odnose na mamce”

PROFESIONALNI KORISNICI U obzir uzmite preventivne kontrolne mjere (zatvorite rupe, uklonite ostatke hrane koji su dostupni glodavcima kako bi im mamac predstavljao jedini izvor hrane da biste poboljšali konzumaciju proizvoda i smanjili vjerojatnost ponovne pojave glodavaca.

PROFESIONALNI KORISNICI Uklonite preostali mamac nakon provedenog postupka deratizacije.

Vrećice s mamcima nije dozvoljeno otvarati, a spremnici s mamcima ne smiju se oštetiti.

Pričvrstite zaštitne kutije s mamcima na tlo kako ih glodavci ne bi odvukli.

OPCA JAVNOST

Prije uporabe pročitajte i slijedite upute o proizvodu, kao i sve informacije koje su isporučene uz proizvod ili na mjestu prodaje.

- Prije uporabe rodenticida potrebno je uzeti u obzir nekemijske metode suzbijanja (na primjer klopke).

Uklonite hranu kojoj glodavci mogu lako pristupiti (na primjer ostatci hrane ili prosuti zrnati proizvodi).

Nije potrebno čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda, jer to ometa glodavce i smanjuje mogućnost konzumiranja mamca..

- Kutije s mamcem treba staviti blizu primijećene aktivnosti glodavaca (na primjer: na putanjama kretanja, rupama, mjestima postavljanja gnijezda itd.).- Ako je moguće, zaštitne kutije s mamcem treba pričvrstiti na tlo ili na neki drugi način.
- [Ne otvarati vrećice koje sadrže mamce – ako je mjerodavno za formulaciju mamca u proizvodu].
- Kutije s mamcem staviti izvan dosega djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih neciljanih životinja.
- Kutije s mamcem stavite dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta te površina koje su u dodiru s navedenim.
- Kutije s mamcem ne smiju se stavljati blizu odvodnih sustava kako bi se spriječio bilo kakav kontakt s vodom.

Pri uporabi proizvoda ne smije se jesti, piti ni pušiti.

Nakon uporabe proizvoda operite ruke i izravno izloženu kožu.

- Nakon završene primjene proizvoda uklonite preostale mamce ili kutije s mamcem.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

OSPOSOBLJENI PROFESIONALNI KORISNICI, PROFESIONALNI KORISNICI

- Ako je to moguće, prije tretiranja obavijestite sve ostale korisnike prostora o mjerama suzbijanja koje će provesti [u skladu s primjenjivim kodeksom dobre prakse, ako postoje]"
 - U informacijama o proizvodu (tj. deklaracija i/ili letak) jasno treba biti naznačeno da će se proizvod isporučivati samo osposobljenim profesionalnim korisnicima koji posjeduju certifikate kojima se dokazuje usklađenost s primjenjivim zahtjevima obuke (npr. „samo za osposobljene profesionalne korisnike“).
 - OSPOSOBLJENI PROFESIONALNI KORISNICI - Ne upotrebljavajte proizvod na područjima gdje se može očekivati pojava rezistencije na aktivnu tvar.
 - Proizvod se ne smiju upotrebljavati više od 35 dana bez procjene brojnosti populacije i učinkovitosti primjene
 - OSPOSOBLJENI PROFESIONALNI KORISNICI Tijekom deratizacijskog postupka nemojte mijenjati različite vrste rodenticida na bazi antikoagulansa iste ili slabije djelotvornosti zbog mogućnosti rezistencije.
 - U tom slučaju treba razmotriti uporabu ne-antikoagulantnih rodenticida, ako je dostupno, ili djelotvornijeg antikoagulanta.
 - Između primjena ne perite vodom deratizacijske kutije ili pribor koji se upotrebljavao u zaštićenim i natkrivenim mjestima postavljanja mamca.
 - Uginule glodavce odložiti u skladu s lokalnim propisima, tj. predati ih pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za sakupljanje takve vrste otpada. [Način odlaganja mora biti jasno naveden u nacionalnom SPC i na deklaraciji proizvoda].
 - PROFESIONALNI KORISNICI Da biste smanjili rizik sekundarnog otrovanja, u što češćim vremenskim razdobljima potražite i uklonite uginule glodavce tijekom tretmana u skladu s preporukama navedenim u mjerodavnom kodeksu dobre prakse.
 - PROFESIONALNI KORISNICI Ne koristite proizvode kao trajne mamce za sprječavanje pojave glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca.
 - PROFESIONALNI KORISNICI. U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji/ili uputi treba biti jasno navedeno sljedeće:
 - proizvod se koristi u odgovarajućim zaštitnim kutijama s mamcem koje su otporne na rukovanje/premještanje (npr. „koristiti samo u kutijama s mamcem koje su otporne rukovanje/premještanje“),
 - korisnici moraju ispravno označiti zaštitne kutije s mamcem i navesti informacije iz odjeljka 5.3 u sažetku svojstava biocidnog proizvoda (npr. „kutije s mamcem označiti u skladu s preporukama za proizvod“).
 - PROFESIONALNI KORISNICI Uporaba ovog proizvoda trebala bi dovesti do uklanjanja glodavaca u roku od 35 dana.
- Ako proizvod do kraja tretmana ne pokaže učinkovitost, informacije o proizvodu (tj. deklaracija i/ili upute) jasno preporučuju korisniku da potraži savjet od dobavljača proizvoda ili nazove službu za suzbijanje glodavaca (DDD).

OPCA JAVNOST

- Potrebno je provoditi preventivne mjere suzbijanja (zatvoriti rupe, ukloniti ostatke hrane i pića) da biste poboljšali konzimaciju proizvoda i smanjili vjerojatnost ponovne pojave glodavaca.
- Nemojte koristiti antikoagulantne rodenticide kao trajne mamce (npr. za sprječavanje pojave glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca).
- U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji/ili uputi treba biti jasno navedeno sljedeće:
 - proizvod se koristi u odgovarajućim zaštitnim kutijama s mamcem koje su otporne na rukovanje/premještanje (npr. „koristiti samo u kutijama s mamcem koje su otporne rukovanje/premještanje“),
 - korisnici moraju ispravno označiti kutije s mamcem i navesti informacije iz odjeljka 5.3 u sažetku svojstava biocidnog proizvoda (npr. „kutije s mamcem označiti u skladu s preporukama za proizvod“).
- Uporaba ovog proizvoda trebala bi dovesti do uklanjanja glodavaca u roku od 35 dana.
- Ako proizvod do kraja tretmana ne pokaže učinkovitost, informacije o proizvodu (tj. deklaracija i/ili upute) jasno preporučuju korisniku da potraži savjet od dobavljača proizvoda ili nazove službu za suzbijanje glodavaca (DDD).
- Potražite i uklonite uginule glodavce, pri čemu učestalost pregleda ne smije biti manja od one za pregledavanje kutija s mamcem.
- Uginule glodavce odložite u skladu s lokalnim propisima, predajom pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za sakupljanje takve vrste otpada.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ovaj proizvod sadržava antikoagulantnu tvar.

U slučaju gutanja simptomi mogu uključivati krvarenje iz nosa i desni. U ozbiljnim slučajevima može doći do modrica i krvi u stolici ili urinu.

- Protuotrov: Vitamin K1 daje samo medicinsko/veterinarsko osoblje. - U slučaju:

- izloženosti kože, operite kožu vodom, a zatim vodom i sapunom, - izloženosti očiju, isperite oči odgovarajućom tekućinom ili vodom, kapke držite otvorenima barem 10 minuta. U slučaju izloženosti usne šupljine, pažljivo isperite usta vodom. Unesrećenoj osobi nikada nemojte ništa davati na usta..

Ne izazivati povraćanje.

U slučaju gutanja, odmah potražite savjet liječnika i pokažite spremnik ili oznaku proizvoda.

Ako kućni ljubimac proguta proizvod obratite se veterinaru.

Kutije s mamcem potrebno je označiti sljedećim informacijama: „nemojte pomicati ni otvarati“; „sadrži rodenticid“; „naziv proizvoda ili broj autorizacije“; „aktivne tvari“ i „u slučaju nesreće nazovite centar za kontrolu otrovanja“.

- Opasno za divlje životinje.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Na kraju tretmana, neiskorištene mamce i ambalažu odložite u skladu s lokalnim propisima (Zakon o održivom gospodarenju otpadom)

Preporučeno je korištenje zaštitnih rukavica.

Nakon uporabe preostale mamce i ambalažu ne bacati u okoliš nego predati na zbrinjavanje tvrtci ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Čuvati na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Proizvod skladištite u originalnom spremniku s etiketom, zaštićen od izravnog sunčevog zračenja i dalje od grijaćih uređaja.

- Čuvajte na mjestima kojima djeca, ptice, kućni ljubimci i domaće životinje nemaju pristup.

- Rok trajanja: 2 godine

6. Ostale informacije

Zbog odgođenog djelovanja antikoagulantnih rodenticida, nakon njihova uzimanja, potrebno je od 4 do 10 dana da počnu djelovati.

Glodavci mogu biti prijenosnici bolesti.

Uginule glodavce ne dirajte golim rukama, prilikom njihova odlaganja koristite rukavice ili alate kao što su stezaljke.

- Ovaj proizvod sadrži gorku tvar i boju.