

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: CYPАЗ DUST

Τύπος(οι) προϊόντος: ΡΤ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

ΡΤ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

ΡΤ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

ΡΤ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

ΡΤ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

ΡΤ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: ΤΠ18-0568

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0030335-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	1
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	2
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	13
5.1. Οδηγίες χρήσης	13
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	14
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	14
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	14
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	14
6. Άλλες πληροφορίες	15

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

FREE EL SUPER CYPAZ DUST

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	AGROZA AGROTECHNICAL LTD
	Διεύθυνση	AITOLIAS 2 EL. BENIZELOU 158 16341 ATHENS Ελλάδα
Αριθμός άδειας	ΤΠ18-0568	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	GR-0030335-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	07/03/2023	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	18/01/2033	

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	ACTIVA srl
Διεύθυνση του παρασκευαστή	via Feltre 32 20132 Milano Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	c/o SINAPAK Viale Dell' Industria E Artigianato 7 27049 Stradella (PV) Ιταλία
	c/o FERBI S.r.l Contrada Ripoli 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Ιταλία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας

1283 - cis,trans-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (RS)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο (Cypermethrin)

Όνομα του παρασκευαστή

Tagros Chemicals India Ltd.

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building, IV Floor, 72, Marshalls Road 600 008 Egmore, Chennai Ινδία

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam, Cuddalore 607 005 Tamil Nadu Ινδία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
cis,trans-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (RS)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο (Cypermethrin)		Δραστική Ουσία	52315-07-8	257-842-9	0,263
DPM – methoxymethyl-ethoxy propanol	2-methoxymethyl-ethoxy propanol	Μη δραστική ουσία	34590-94-8	252-104-2	0,75

2.2. Είδος τυποποίησης

DP - Σκόνη επίτασης

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Εφαρμογή σε ρωγμές και σχισμές, σε κενά και κοιλότητες - Επαγγελματίες χρήστες - Βαδιστικά έντομα

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο σε σκόνη για χρήση κατά των βαδιστικών εντόμων. Για εφαρμογή σε ρωγμές και σχισμές, κενά και κοιλότητες.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	<p>επιστημονική ονομασία: <i>Blattella germanica</i> Κοινή ονομασία: Γερμανική κατσαρίδα στάδιο ανάπτυξης: Ακμιαία</p> <p>επιστημονική ονομασία: <i>Blatta orientalis</i> Κοινή ονομασία: Ανατολίτικη κατσαρίδα στάδιο ανάπτυξης: Ακμιαία</p> <p>επιστημονική ονομασία: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: Μαύρο μυρμήγκι στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικες</p> <p>επιστημονική ονομασία: crawling insects Κοινή ονομασία: Βαδιστικά έντομα στάδιο ανάπτυξης: Ακμιαία</p>
Πεδίο χρήσης	<p>Εσωτερικοί Χώροι</p> <p>Εσωτερικοί χώροι (οικιακοί χώροι και μεγάλα κτίρια) - σε χώρους όπου τα έντομα συνηθίζουν να κρύβονται.</p>
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	<p>Μέθοδος: Εφαρμογή με το χέρι Λεπτομερής περιγραφή:</p> <p>Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές, σε επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από το νεροχύτη της κουζίνας, κάτω από το φούρνο ή το θερμοσίφωνα, σε όλες τις ρωγμές και τις σχισμές που μπορεί να είναι ένα καταφύγιο έκτακτης ανάγκης για κατσαρίδες και μυρμήγκια.</p> <p>Η εφαρμογή (επίταση) πρέπει να γίνεται με τη χρήση του ειδικού δοχείου που είναι εφοδιασμένο με τον κατάλληλο διασκορπιστή (όπου υπάρχει) ή με επαγγελματικό εξοπλισμό για την εφαρμογή με επίταση.</p>
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: Η δόση εφαρμογής είναι 8 g/m². Αραιώση (%): Έτοιμο προς χρήση Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Η εφαρμογή μπορεί να εκτελεστεί έως 2 φορές το χρόνο.</p>

Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	φιάλη HDPE 1kg, κάδος HDPE 5 kg

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται στη συνιστώμενη δόση.
Τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τον καθαρισμό των χώρων εφαρμογής πρέπει να ενημερώνονται από τον επαγγελματία χρήστη σχετικά με τα μέτρα περιορισμού του κινδύνου για να διασφαλιστεί ότι το προϊόν δεν μπαίνει στο αποχετευτικό σύστημα.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Ο χώρος όπου πραγματοποιείται η εφαρμογή πρέπει να καλύπτεται με πλαστικό φύλλο/μεμβράνη μίας χρήσης, ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση των παρακείμενων επιφανειών και του πατώματος.
Μετά την εφαρμογή, απορρίψτε το πλαστικό φύλλο/μεμβράνη και τα συλλεγμένα υπολείμματα ως επικίνδυνα απόβλητα.
Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές σε επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από το νεροχύτη της κουζίνας, κάτω από το φούρνο ή το θερμοσίφωνα, σε όλες τις ρωγμές και τις σχισμές που μπορεί να είναι ένα καταφύγιο έκτακτης ανάγκης για κατσαρίδες και μυρμήγκια.
Μην το εφαρμόζετε σε περιοχές που συνηθίζεται να γίνεται υγρό καθαρισμό.
Μη χρησιμοποιείτε διαδικασίες υγρού καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε μόνο διαδικασίες στεγνού καθαρισμού (κενό ή σκούπα) ή χρησιμοποιήστε υγρό χαρτί. Μετά τον καθαρισμό, πετάξτε το συλλεχθέν υλικό στους περιέκτες ξηρού υλικού ή τα υγρά χαρτιά που χρησιμοποιήθηκαν ως στερεά απόβλητα.
Βλέπε επίσης Γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Σφηκοφωλιές - Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Άμεση εφαρμογή στη φωλιά της σφήκας.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: <i>Vespa germanica</i> Κοινή ονομασία: σφήκα η γερμανική στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία επιστημονική ονομασία: wasps Κοινή ονομασία: Σφηκοφωλιές στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εφαρμογή στη φωλιά
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή με το χέρι Λεπτομερής περιγραφή: Χειροκίνητη εφαρμογή Η εφαρμογή (επίταση) πρέπει να γίνεται με τη χρήση του ειδικού δοχείου που είναι εφοδιασμένο με τον κατάλληλο διασκορπιστή.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Η δόση εφαρμογής είναι 10 g/φωλιά. Μία μόνο φωλιά ανά εφαρμογή. Αραίωση (%): Έτοιμο προς χρήση Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Η θεραπεία σε εσωτερικούς χώρους μπορεί να πραγματοποιηθεί έως 2 φορές τον χρόνο.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	φιάλη HDPE 1kg, κάδος HDPE 5 kg.

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται στη συνιστώμενη δόση στην είσοδο της φωλιάς. Μία και μόνο εφαρμογή μπορεί να εξαλείψει εντελώς την αποικία. Απλώστε απαλά τη σκόνη επίτασης για να κατευθύνετε την πλήρη ποσότητα στην είσοδο της φωλιάς. Εφαρμόστε κατά προτίμηση το σούρουπο και την αυγή.
Βλέπε επίσης Γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Ο χώρος όπου πραγματοποιείται η εφαρμογή πρέπει να καλύπτεται με πλαστικό φύλλο/μεμβράνη μίας χρήσης, ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση των παρακείμενων επιφανειών και πάτωμα.
Μετά την επεξεργασία, απορρίψτε το πλαστικό φύλλο/μεμβράνη και τα συλλεχθέντα υπολείμματα ως επικίνδυνα απόβλητα.
Η φωλιά θα αφαιρεθεί και θα απορριφθεί (εάν είναι εφικτό) κατά προτίμηση από τον επαγγελματία χρήστη ως μέρος της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Μετά τον έλεγχο των σφηκοφωλιών συλλέξτε τη φωλιά μέσα/πάνω σε κάλυμμα/σακούλα μίας χρήσης και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα του προϊόντος με ηλεκτρική σκούπα.
Μια φωλιά ανά εφαρμογή.

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.3 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 3 - Εφαρμογή σε ρωγμές και σχισμές σε κενά και κοιλότητες - Ευρύ κοινό - Βαδιστικά έντομα

Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Εντομοκτόνο σε σκόνη για χρήση κατά των βαδιστικών εντόμων. Για εφαρμογή σε ρωγμές και σχισμές, κενά και κοιλότητες.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Blattella germanica*
Κοινή ονομασία: Γερμανική κατσαρίδα
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

επιστημονική ονομασία: *Blatta orientalis*
Κοινή ονομασία: Ανατολίτικη κατσαρίδα

	<p>στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία</p> <p>επιστημονική ονομασία: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: Μαύρο μυρμήγκι στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία</p> <p>επιστημονική ονομασία: crawling insects Κοινή ονομασία: Έρποντα έντομα στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία</p>
Πεδίο χρήσης	<p>Εσωτερικοί Χώροι</p> <p>Εσωτερικοί χώροι (οικιακοί χώροι) - σε χώρους όπου τα έντομα συνηθίζουν να κρύβονται.</p>
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	<p>Μέθοδος: Εφαρμογή με το χέρι Λεπτομερής περιγραφή: Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές, σε επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από το νεροχύτη της κουζίνας, κάτω από το φούρνο ή το θερμοσίφωνα, σε όλες τις ρωγμές και τις σχισμές που μπορεί να είναι ένα καταφύγιο έκτακτης ανάγκης για κατσαρίδες και μυρμήγκια. Η εφαρμογή (επίταση) πρέπει να γίνεται με τη χρήση του ειδικού δοχείου που είναι εφοδιασμένο με τον κατάλληλο διασκορπιστή.</p>
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: Η δόση εφαρμογής είναι 8 g/m². Αραιώση (%): Έτοιμο προς χρήση Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Η εφαρμογή μπορεί να εκτελεστεί έως 2 φορές το χρόνο.</p>
Κατηγορία/-ες χρηστών	<p>Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)</p>
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>100g, 250g, 500g HDPE σωλήνας διασκορπισμού σκόνης. 100g, 250g, 500g HDPE σωλήνας διασκορπισμού σκόνης με σταθερό καπάκι.</p>

4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται στη συνιστώμενη δόση.
Για συσκευασία φιάλης με καπάκι διασκορπισμού: Ανακινήστε απαλά τη συσκευασία, αφαιρέστε το καπάκι και γυρίστε τη φιάλη ανάποδα. Για την επεξεργασία μιας επιφάνειας ενός τετραγωνικού μέτρου, γυρίστε τη φιάλη ανάποδα 5 φορές, κινούμενοι από την προς επεξεργασία περιοχή, απελευθερώνοντας μια συνολική δόση των 8 g ανά τετραγωνικό μέτρο.
Για τη συσκευασία φιαλών με σταθερό καπάκι: Ανακινήστε απαλά τη συσκευασία, περιστρέψτε το κύπελλο και γυρίστε τη φιάλη ανάποδα. Για την επεξεργασία μιας επιφάνειας ενός τετραγωνικού μέτρου, πιέστε ελαφρά τη φιάλη για 3 δευτερόλεπτα, κινούμενοι από την προς επεξεργασία περιοχή, απελευθερώνοντας μια συνολική δόση των 8 g ανά τετραγωνικό μέτρο.
Η εξόντωση της ανατολίτικης κατσαρίδας αναμένεται 4 ώρες μετά την έκθεση στις επεξεργασμένες επιφάνειες.
Βλέπε επίσης Γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές, σε επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από το νεροχύτη της κουζίνας, κάτω από το φούρνο ή το θερμοσίφωνα, σε όλες τις ρωγμές και τις σχισμές που μπορεί να είναι ένα καταφύγιο έκτακτης ανάγκης για κατσαρίδες και μυρμήγκια.
Μην το εφαρμόζετε σε περιοχές που συνηθίζεται να γίνεται υγρό καθάρισμα.
Μη χρησιμοποιείτε διαδικασίες υγρού καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε μόνο διαδικασίες στεγνού καθαρισμού (κενό ή σκούπα) ή χρησιμοποιήστε υγρό χαρτί. Μετά τον καθαρισμό, πετάξτε το συλλεχθέν υλικό στους περιέκτες ξηρού υλικού ή τα υγρά χαρτιά που χρησιμοποιήθηκαν ως στερεά απόβλητα.

4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 4 - Σφηκοφωλιές - Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Άμεση εφαρμογή στη φωλιά της σφήκας.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Vespula germanica*
Κοινή ονομασία: σφήκα η γερμανική
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

επιστημονική ονομασία: wasps
Κοινή ονομασία: φωλιά σφήκας
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εφαρμογή στη φωλιά.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή με το χέρι Λεπτομερής περιγραφή: Χειροκίνητη εφαρμογή στη φωλιά. Η εφαρμογή (επίπαση) πρέπει να γίνεται με τη χρήση του ειδικού δοχείου που είναι εφοδιασμένο με τον κατάλληλο διασκορπιστή.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Η δόση εφαρμογής είναι 10 g/φωλιά. Εφαρμόστε στη φωλιά. Μία μόνο φωλιά ανά εφαρμογή. Αραίωση (%): Έτοιμο προς χρήση. Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Η θεραπεία σε εσωτερικούς χώρους μπορεί να πραγματοποιηθεί έως 2 φορές το χρόνο.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	100g, 250g, 500g HDPE σωλήνας διασκορπισμού σκόνη. 100g, 250g, 500g HDPE σωλήνας διασκορπισμού κόνεως με σταθερό καπάκι.

4.4.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται στη συνιστώμενη δόση στην είσοδο της φωλιάς.
Για συσκευασία φιάλης με καπάκι διασκορπισμού: Ανακινήστε απαλά τη συσκευασία, αφαιρέστε το καπάκι και γυρίστε τη φιάλη ανάποδα. Για την επεξεργασία μιας επιφάνειας ενός τετραγωνικού μέτρου, γυρίστε τη φιάλη ανάποδα 6 φορές, κινούμενοι από την προς επεξεργασία περιοχή, απελευθερώνοντας μια συνολική δόση των 10 g ανά φωλιά.
Για τη συσκευασία φιάλης με σταθερό καπάκι: Ανακινήστε απαλά τη συσκευασία, περιστρέψτε το κύπελλο και γυρίστε τη φιάλη ανάποδα. Για την επεξεργασία μιας επιφάνειας ενός τετραγωνικού μέτρου, πιέστε ελαφρά τη φιάλη για 4 δευτερόλεπτα, κινούμενοι από την προς επεξεργασία περιοχή, απελευθερώνοντας μια συνολική δόση των 10 g ανά φωλιά.
Μία και μόνο εφαρμογή μπορεί να εξαλείψει εντελώς την αποικία. Απλώστε απαλά τη σκόνη επίπασης για να κατευθύνετε την πλήρη ποσότητα στην είσοδο της φωλιάς. Εφαρμόστε κατά προτίμηση το σούρουπο και την αυγή. Απομακρύνετε την φωλιά που έχει υποστεί εφαρμογή (εάν είναι εφικτό) αφού εξετάσετε τη φωλιά και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σφήκες γύρω της. Μετά τον έλεγχο των σφηκοφωλιών, συλλέξτε τη φωλιά μέσα/πάνω σε κάλυμμα/σακούλα μιας χρήσης και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα προϊόντων με ηλεκτρική σκούπα.
Βλέπε επίσης Γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Θεραπεία μιας φωλιάς ανά εφαρμογή.

4.4.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.5 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 5 - Εφαρμογή σε φωλιές μυρμηγκιών - Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Άμεση εφαρμογή στη μυρμηγκοφωλιά για εξάλειψη.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Lasius niger*
Κοινή ονομασία: Μαύρο μυρμηγκί
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

Πεδίο χρήσης

Εξωτερικοί Χώροι

Εξωτερικοί χώροι, στις φωλιές.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Εφαρμογή με το χέρι
Λεπτομερής περιγραφή:
Χειροκίνητη εφαρμογή γύρω και στην είσοδο της
Η εφαρμογή (επίταση) πρέπει να γίνεται με τη χρήση του ειδικού δοχείου που είναι εφοδιασμένο με τον κατάλληλο διασκορπιστή.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: Η δόση εφαρμογής είναι 5 g/φωλιά.
Αραιώση (%): Έτοιμο προς χρήση.
Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:
Μία εφαρμογή ανά φωλιά ανά σπίτι.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

100g, 250g, 500g HDPE σωλήνας διασκορπισμού σκόνης.
100g, 250g, 500g HDPE σωλήνας διασκορπισμού σκόνης με σταθερό καπάκι.

4.5.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται στη συνιστώμενη δόση.

Για συσκευασία φιάλης με καπάκι διασκορπισμού: Ανακινήστε απαλά τη συσκευασία, αφαιρέστε το καπάκι και γυρίστε τη φιάλη ανάποδα. Για την επεξεργασία μιας επιφάνειας ενός τετραγωνικού μέτρου, γυρίστε τη φιάλη ανάποδα 3 φορές, κινούμενοι από την προς επεξεργασία περιοχή, απελευθερώνοντας μια συνολική δόση των 5 g ανά φωλιά.

Για τη συσκευασία φιάλης με στιβαρό κύπελλο: Ανακινήστε απαλά τη συσκευασία, περιστρέψτε το κύπελλο και γυρίστε τη φιάλη ανάποδα άνω κάτω. Για την επεξεργασία μιας επιφάνειας ενός τετραγωνικού μέτρου, πιέστε ελαφρά τη φιάλη για 2 δευτερόλεπτα, κινούμενοι από την προς επεξεργασία περιοχή, απελευθερώνοντας μια συνολική δόση των 5 g ανά φωλιά.

Θα πρέπει να γίνεται μία μόνο εφαρμογή ανά φωλιά. Μία και μόνο εφαρμογή μπορεί να εξαλείψει εντελώς την αποικία.

Εάν τα μυρμήγκια εμφανίζονται από πολλαπλές σπές εισόδου, η συνολική ποσότητα σκόνης (5 g) πρέπει να διαιρεθεί με τον αριθμό των εισόδων (για παράδειγμα, εάν υπάρχουν 5 εισοδοί στη φωλιά, εφαρμόστε 1 g του προϊόντος/είσοδος).

Η εφαρμογή μπορεί να γίνει σε πλακόστρωτες και μη επιφάνειες.

Για να βελτιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, μην εφαρμόζετε σε περίπτωση βροχής ή ανέμου.

Βλέπε επίσης Γενικές οδηγίες χρήσης.

4.5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Μα φωλιά ανά εφαρμογή.

4.5.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.5.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.6 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 6 - Τοπική εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους περιμετρικά κτιρίων εναντίον της *Blatta orientalis* - Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Τοπική εφαρμογή περιμετρικά του κτιρίου κοντά στα παράθυρα και τα κατώφλια.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: <i>Blatta orientalis</i> Κοινή ονομασία: Ανατολίτικη κατσαρίδα στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
Πεδίο χρήσης	Εξωτερικοί Χώροι Εξωτερικοί χώροι - περιμετρικά του κτιρίου κοντά στα παράθυρα και τα κατώφλια.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή με το χέρι Λεπτομερής περιγραφή: Χειροκίνητη εφαρμογή σκονίζοντας απευθείας από τη συσκευασία. Η εφαρμογή (επίπασση) πρέπει να γίνεται με τη χρήση του ειδικού δοχείου που είναι εφοδιασμένο με τον κατάλληλο διασκορπιστή.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Η δόση εφαρμογής είναι 8 g/m ² . Αραίωση (%): Έτοιμο προς χρήση. Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Η εφαρμογή μπορεί να εκτελεστεί έως 2 φορές το χρόνο.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	100g, 250g, 500g HDPE σωλήνας διασκορπισμού σκόνης. 100g, 250g, 500g HDPE σωλήνας διασκορπισμού σκόνης με σταθερό καπάκι.

4.6.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται στη συνιστώμενη δόση κοντά στα παράθυρα και τα κατώφλια.
Για συσκευασία φιάλης με καπάκι διασκορπισμού: Ανακινήστε απαλά τη συσκευασία, αφαιρέστε το καπάκι και γυρίστε τη φιάλη ανάποδα. Για την επεξεργασία μιας επιφάνειας ενός τετραγωνικού μέτρου, γυρίστε τη φιάλη ανάποδα 5 φορές, κινούμενοι από την προς επεξεργασία περιοχή, απελευθερώνοντας μια συνολική δόση των 8 g ανά τετραγωνικό μέτρο.

Για τη συσκευασία φιάλης με σταθερό καπάκι: Ανακινήστε απαλά τη συσκευασία, περιστρέψτε το κύπελλο και γυρίστε τη φιάλη ανάποδα. Για την επεξεργασία μιας επιφάνειας ενός τετραγωνικού μέτρου, πιέστε ελαφρά τη φιάλη για 3 δευτερόλεπτα, κινούμενοι από την προς επεξεργασία περιοχή, απελευθερώνοντας μια συνολική δόση των 8 g ανά τετραγωνικό μέτρο. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται μόνο σε χώρους που προστατεύονται από την βροχή (π.χ. καλύπτονται από στέγες). Η θανάτωση της ανατολίτικης κατσαρίδας αναμένεται 4 ώρες μετά την έκθεση στις επεξεργασμένες επιφάνειες. Βλέπε επίσης Γενικές οδηγίες χρήσης.

4.6.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Εφαρμόστε μόνο κοντά στα παράθυρα και τα κατώφλια.
Μην το εφαρμόζετε σε περίπτωση βροχής και σε θυελλώδεις ημέρες.

4.6.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.6.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.6.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Βλέπε συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης.

Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση και να ακολουθείτε τις οδηγίες που δίνονται. Για χρήση μόνο σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, κατοικίδια ζώα (ιδίως γάτες) και ζώα μη στόχους.

Στρατηγικές διαχείρισης ανθεκτικότητας

Για επαγγελματίες:

- Λάβετε υπόψη τον κύκλο ζωής και τα χαρακτηριστικά των εντόμων-στόχων για να προσαρμόσετε τις θεραπείες. Ειδικότερα, στοχεύστε στο πιο ευαίσθητο στάδιο του εχθρού, στο χρόνο εφαρμογής και στις περιοχές που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
- Όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να συστήνεται ο συνδυασμός των επεξεργασιών εφαρμογής με μη χημικά μέτρα.
- Όταν απαιτείται παρατεταμένη περίοδος ελέγχου, οι θεραπείες πρέπει να εναλλάσσονται με προϊόντα που έχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικούς τρόπους δράσης.
- Καθιερώστε ένα βασικό επίπεδο και παρακολουθήστε τα επίπεδα αποτελεσματικότητας σε πληθυσμούς σε περιοχές-κλειδιά, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν σημαντικές αλλαγές στην ευαισθησία στη δραστική ουσία. Οι πληροφορίες από τα προγράμματα παρακολούθησης της ανθεκτικότητας επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων και παρέχουν πληροφορίες για τη σωστή λήψη αποφάσεων.
- Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνουν εάν η θεραπεία είναι αναποτελεσματική και να αναφέρουν άμεσα στον κάτοχο της έγκρισης ή στον διανομέα.
- Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να αναφέρει τυχόν παρατηρούμενα περιστατικά ανθεκτικότητας στις Αρμόδιες Αρχές (ΑΑ) ή σε άλλους εντεταλμένους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση της ανθεκτικότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε/εφαρμόζετε το προϊόν σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ή έχει διαπιστωθεί ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία που περιέχεται σε αυτό το προϊόν.
- Μην [χρησιμοποιείτε/εφαρμόζετε] το προϊόν σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ή έχει διαπιστωθεί ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία (-ες) που περιέχεται (-ονται) σε αυτό το προϊόν.

Για το ευρύ κοινό:

- Εάν η προσβολή επιμένει επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία χρήστη.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Περιέχει κυπερμεθρίνη, μπορεί να είναι επικίνδυνα/τοξικό για τα κατοικίδια ζώα (π.χ. γάτες, μέλισσες, ψάρια και άλλους υδρόβιους οργανισμούς).

Αυτό το βιοκτόνο προϊόν περιέχει κυπερμεθρίνη η οποία είναι επικίνδυνη για μέλισσες.

Κρατήστε τις γάτες μακριά από τις επεξεργασμένες επιφάνειες. Λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας τους στην κυπερμεθρίνη, το προϊόν μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες σε γάτες.

Μην το εφαρμόζετε σε χώρους όπου υπάρχουν ενυδρεία και/ή τερράριο.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και μη στοχευόμενα ζώα/κατοικίδια ζώα.

Κρατήστε τα μη εμπλεκόμενα άτομα, τα παιδιά και τα κατοικίδια μακριά από επεξεργασμένες επιφάνειες/περιοχές.

Μην εφαρμόζετε σε ανθρώπους και κατοικίδια ζώα.

Καλύψτε όλες τις επιφάνειες και τις εγκαταστάσεις που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφών και πόσιμο νερό.

Να μην εφαρμόζεται απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκευή που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και κτηνοτροφικά ζώα/κατοικίδια ζώα.

Βλέπε χρήση συγκεκριμένων μέτρων μετριασμού κινδύνου, όπως περιγράφεται στις παραπάνω ενότητες.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Εάν απαιτείται ιατρική συμβουλή, να έχετε πρόχειρο τον περιέκτη ή ετικέτα.

Τα πυρεθροειδή μπορεί να προκαλέσουν παραισθησία (κάψιμο και τσίμπημα του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εάν τα συμπτώματα επιμένουν: Λάβετε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης: Ζητήστε ιατρική συμβουλή άμεσα ή καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Ζητήστε ιατρική συμβουλή άμεσα ή καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ζητήστε ιατρική συμβουλή άμεσα ή καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή άμεσα ή καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, ξεπλύνετε με νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και εύκολο να γίνει. Ζητήστε ιατρική συμβουλή άμεσα ή καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

Μην απελευθερώνετε το προϊόν ή τις κενές συσκευασίες του στο περιβάλλον.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Απορρίψτε το περιεχόμενο/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Μην αδειάζετε σε αποχετεύσεις. Μην μολύνετε επιφανειακά ύδατα/λίμνες, σωλήνες νερού ή τάφρους με το προϊόν ή με το άδειο δοχείο.

Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευασία.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και μη στοχευόμενα ζώα/κατοικίδια ζώα.
Χρόνος ζωής: 2 χρόνια, στον αρχικό περιέκτη σε θερμοκρασίες δωματίου. Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες και την έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως.
Αποθηκεύστε σε ξηρό μέρος, προστατέψτε από την υγρασία.
Μην αποθηκεύετε κοντά σε τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

6. Άλλες πληροφορίες

Το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα.

Εργοστάσια Συσκευασίας: Κ. ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, Θέση Γκιάνεζα, 32200, Άρμα, Θήβα

ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε., Ο.Τ. 53Β, Γ Ζώνη, Σίνδος, ΒΙ. ΠΕ. Θεσσαλονίκης