



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-543-04/22-12/19
URBROJ: 534-03-3-2/3-22-3
Zagreb, 11. studenoga 2022.

Ministar zdravstva Republike Hrvatske na temelju članka 8. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13, 47/14, 115/18), povodom zahtjeva trgovačkog društva **LODI S.A.S., Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390 Grand Fougeray, Francuska**, u predmetu međusobnog priznavanja procjene rizika i odobrenja za biocidni proizvod, donosi

R J E Š E N J E

I. Trgovačkom društvu **LODI S.A.S., Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390 Grand Fougeray, Francuska** (u daljnjem tekstu: nositelj odobrenja) odobrava se stavljanje na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske i korištenje biocidnog proizvoda **ADDICT GEL ANTS**.

II. Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava skupine biocidnih proizvoda iz priloga ovoga rješenja koji je sastavni dio ovoga rješenja.

III. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja.

IV. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda.

V. Ovo rješenje važi do **31.1.2027.**

O b r a z l o ž e n j e

Trgovačko društvo **LODI S.A.S., Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390 Grand Fougeray, Francuska**, podnijelo je zahtjev Ministarstvu zdravstva za međusobnim priznavanjem procjene rizika i odobrenja izdanog od strane referentne države Francuske za biocidni proizvod **ADDICT GEL ANTS** radi stavljanja na raspolaganje na tržište Republike Hrvatske i uporabe predmetnog biocidnog proizvoda.

Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava skupine biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja, koji je sastavni dio ovoga rješenja. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja i sukladno članku 69. Uredbe (EU) br. 528/2012. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda sukladno članku 47. Uredbe (EU) br. 528/2012. Ovo rješenje važi do 31.1.2027. sukladno datumu važenja odobrenja referentne države. Na temelju naprijed navedenoga u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda, riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom, u roku od 30 dana od dana primitka ovoga rješenja. Tužba se predaje mjesno nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

MINISTAR

izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med.



Dostaviti:

1. LODI S.A.S., Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390 Grand Fougeray, Francuska
2. Arhiva



Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

ADDICT GEL ANTS

Vrsta proizvoda 18 – Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA: UP/I-543-04/22-12/19

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0029949-0000

1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv	ADDICT GEL MRAVI DIGRAIN GEL MRAVI PHOBI GEL MRAVI DN GEL MRAVI GEL MRAVI 200 GEL MRAVI DINOTEFURAN
-----------------	--

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	LODI S.A.S.
	Adresa	Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390 Grand Fougeray, Francuska
Broj odobrenja	KLASA: UP/I-543-04/22-12/19	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	HR-0029949-0000	
Datum odobrenja	11.11.2022.	
Datum isteka odobrenja	31.1.2027.	

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	LODI S.A.S
Adresa proizvođača	Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390 Grand Fougeray Francuska
Lokacija proizvodnih pogona	LODI S.A.S, 35390 Grand Fougeray Francuska

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	Dinotefuran
Naziv proizvođača	Mitsui Chemicals Agro, Inc.
Adresa proizvođača	Nihonbashi Dia Building, 1-19-1, Nihonbashi, Chuo-ku, 103-0027 Tokyo Japan
Lokacija proizvodnih pogona	Mitsui Chemicals Inc./Omuta Works, 30 Asamuta-Machi, Ohmuta Shi, 836-8610 Fukuoka Japan

2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Dinotefuran		Aktivna tvar	165252-70-0		0,0202
Izopenil acetat		Neaktivna tvar	123-92-2	204-662-3	0,005
Cikloheksan		Neaktivna tvar	110-82-7	203-806-2	0,01

2.2. Vrsta formulacije

Mamac u gelu (spreman za uporabu)

3. OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI

Oznaka upozorenja	EUH208 Sadrži 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.
Oznake obavijesti	P501 Odložiti spremnik u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.

4. ODOBRENA UPORABA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1. Uporaba br. 1 – Primjena mamca - U zatvorenim prostorijama

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Lasius niger</i> Uobičajeno ime: Crni vrtni mrav Stadij razvoja: Sve razvojne faze Znanstveno ime: <i>Monomorium pharaonis</i> Uobičajeno ime: Faraonski mrav Stadij razvoja: Sve razvojne faze Znanstveno ime: <i>Linepithema humile</i> Uobičajeno ime: Argentinski mrav Stadij razvoja: Sve razvojne faze
Područje primjene	u zatvorenom prostoru Zatvoreni prostor industrijski, komercijalni ili javni prostor i privatni prostor.
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Primjena stanice za mamce ili kapljice gela
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 0.2 g/m ² Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Obrada štrcaljkom ili bočicom: Nanesite gel kapi kao točkicu ili izravno u pukotine i napukline, u kojima se kriju kukci, na mravlje staze ili u blizinu gnijezda. Nanesite 2 kapi od 0,1 g (0,5 cm promjera) na kvadratni metar.

	<p>Primjena s prethodno pripremljenom jedinicom s mamcem:</p> <p>Primijeniti prethodno pripremljenu stanicu prilagođenu području obrade uz pridržavanje doze od 0,2 g/m². Na primjer, jedna prethodno pripremljena stanica s mamcem od 2 g za primjenu na 10 m² ili jedna prethodno pripremljena stanica s mamcem od 5 g za primjenu na 25 m².</p> <p>Postavite mamac uzduž mravljje staze ili blizu gnijezda, ako je to moguće.</p>
ategorije korisnika	<p>osposobljeni profesionalac</p> <p>profesionalac</p> <p>široka javnost (amaterska uporaba)</p>
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Štrcaljka u LDPE ili PP visoke gustoće : 1g do 50 g</p> <p>HDPE bočica: 1g do 500 g</p> <p>PP ili PS stanica s mamcem : 1g do 5 g</p>

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

-

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

-

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

-

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

-

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

-

4.2. **Opis uporabe**

Tablica 2. Uporaba br. 2 – Primjena mamca – Vanjski prostor oko kuća, zgrada i na terasama

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<p>Znanstveno ime: <i>Lasius niger</i> Uobičajeno ime: Crni vrtni mrav Stadij razvoja: Sve razvojne faze</p> <p>Znanstveno ime: <i>Linepithema humile</i> Uobičajeno ime: Argentinski mrav Stadij razvoja: Sve razvojne faze</p>
Područje primjene	<p>na otvorenom</p> <p>Na otvorenom oko kuća i zgrada</p> <p>Na otvorenom na terasama</p>

Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Primjena stanice za mamce ili kapljice gela
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 0.2 g/m ² Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Obrada štrcaljkom ili bočicom: Nanesite gel kapi kao točkicu ili izravno u pukotine i napukline, u kojima se kriju kukci, na mravlje staze ili u blizinu gnijezda. Nanesite 2 kapi od 0,1 g (0,5 cm promjera) po kvadratnom metru ili linearnom metru. Primjena s prethodno pripremljenom jedinicom s mamcem: Primijeniti prethodno pripremljenu stanicu prilagođenu području obrade uz pridržavanje doze od 0,2 g/m ² . Na primjer, jedna prethodno pripremljena stanica s mamcem od 2 g za primjenu na 10 m ² ili jedna prethodno pripremljena stanica s mamcem od 5 g za primjenu na 25 m ² .
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac profesionalac široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Štrcaljka u LDPE ili PP visoke gustoće : 1g do 50 g HDPE bočica: 1g do 500 g PP ili PS stanica s mamcem : 1g do 5 g

4.2.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

-

4.2.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Ne primjenjivati na povrtnjak.

4.2.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

-

4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

-

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

-

5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

- Prije uporabe uvijek pročitajte naljepnicu ili letak s uputom i pridržavajte se svih navedenih uputa
- Izbjegavajte kontinuiranu uporabu proizvoda.
- Nanesite proizvod precizno na mravlju stazu ili u blizinu gnijezda.
- Poštujte doze proizvoda za primjenu.
- Smanjenje populacije može se primijetiti 7 dana nakon primjene, ali potpuno iskorjenjivanje može potrajati i do mjesec dana.
- Kapi gela i/ili stanice s mamcem treba provjeriti 7 dana nakon prve primjene, a zatim jednom tjedno.
- Obnovite konzumirani ili onečišćen mamac u gelu do potpunog iskorjenjivanja kolonije ili mjesec dana nakon primjene, ako invazija potraje.
- Ne miješajte s drugim proizvodom i ne nanosite na površine koje su već obrađene drugim biocidnim proizvodom.
- Proizvod uvijek zaštitite od oborina, poplava i vode za pranje.
- Ako infestacija potraje, obratite se stručnjaku.
- Obavijestite nositelja registracije, ukoliko je obrada neučinkovita.
- Ne nanosite proizvod na površine koje upijaju.
- Nemojte izlagati kapi mamca sunčevoj svjetlosti ili toplini (tj. radijatoru).
- U slučaju ponovne infestacije ponovite primjenu.
- Uklonite mamac na kraju perioda tretiranja za nadolazeće zbrinjavanje.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

- Opasno za pčele
- Za vanjsku uporabu ovaj biocidni proizvod nanesite u kutije za mamce ili samo u pukotine i napukline ili izravno na mravlja gnijezda. Zaštitite od pčela tako da na primjer prekrijete lončanicom za cvijeće ili pločicom (osiguravajući da mravi i dalje imaju pristup mamcu).
- Ne nanosite izravno na ili u blizini hrane, hrane za životinje ili pića, niti na površine ili pribor, koji bi mogao biti u izravnom doticaju s hranom, hranom za životinje, pićem i stokom.
- Djeci i životinjama onemogućiti pristup mamcu.
- Pridržavajte se strogih individualnih higijenskih uvjeta: nemojte jesti, piti ili pušiti tijekom rukovanja proizvodom i operite ruke nakon uporabe.
- Nikada ne nanosite gel mamac za preventivno liječenje, koristite ga samo u slučaju dokazane infestacije.

5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Dodir s kožom: Isperite kontaminiranu kožu sapunom i vodom. Ako se pojave simptomi, obratite se liječniku specijalistu za otrovanja.
- Dodir s očima: Odmah isperite s puno vode, povremeno podignite gornje i donje kapke. Provjerite, ima li i uklonite kontaktne leće, ako je to jednostavno. nastavite ispirati najmanje 10 minuta. Potražite liječničku pomoć, ukoliko dođe do iritacije ili oštećenja vida.
- Dodir s ustima: Gutanje: isperite usta vodom. Obratite se liječniku specijalistu za otrovanja.

¹ Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

- Pakiranje ili naljepnicu držite dostupnom.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

- Neiskorišteni proizvod nemojte ispuštati u tlo, u vodovodni sustav, cijevi (sudoper, WC...) niti u kanalizaciju
- Odložite neiskorišten proizvod, njegovu ambalažu i ostali otpad u skladu s lokalnim propisima

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

- Čuvati na sigurnom mjestu izvan dohvata djece i životinja.
- Rok trajanja: 2 godine.
- Proizvod čuvajte na temperaturi iznad 0°C.

- Proizvod čuvajte podalje od svjetlosti.

6. OSTALE INFORMACIJE

- Na naljepnici mora biti navedena prisutnost 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona, senzibilizatora kože, koji može izazvati alergijsku reakciju (EUH208).