

**IT**

***ALLEGATO***

**RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO BIOCIDA**

**SERPA-RAT BLOCK BRODIFACOUM**

**Tipo/i di prodotto**

Tipo di prodotto 14: Rodenticidi

**Numero di autorizzazione:** IT/2023/00867/BBS

**Numero dell'approvazione del R4BP:** IT-0031021-0000

---

## Capitolo 1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

### 1.1. Denominazione/i commerciale/i del prodotto

Denominazione/i commerciale/i	SERPA-RAT BLOCK BRODIFACOUM
-------------------------------	-----------------------------

### 1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	MYLVA S.A.
	Indirizzo	Via Augusta, 48 08006 Barcelona Spagna
Numero di autorizzazione	IT/2023/00867/BBS	
<i>Numero dell'approvazione del R4BP</i>	IT-0031021-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	05/02/2014	
Data di scadenza dell'autorizzazione	31/12/2026	

### 1.3. Fabbricante/i del prodotto

Nome del fabbricante	I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.A.
Indirizzo del fabbricante	Nona Strada, 57 35129 Padova Italia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Nona Strada, 57 35129 Padova Italia

### 1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo	Brodifacoum
Nome del fabbricante	Dr. Tezza s.r.l.
Indirizzo del fabbricante	Via Tre Ponti 22 37050 S.Maria di Zevio Italia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Via Tre Ponti 22 37050 S.Maria di Zevio Italia

---

## Capitolo 2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE

### 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Brodifacoum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro -1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	principio attivo	56073-10-0	259-980-5	0,005

### 2.2. Tipo/i di formulazione

RB Esca (pronta per l'uso)

---

### Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Indicazioni di pericolo	
Consigli di prudenza	<p>P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.</p> <p>P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.</p> <p>P262: Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.</p> <p>P301+P310: IN CASO DI INGESTIONE: Contattare immediatamente un un medico.</p> <p>P273: Non disperdere nell'ambiente.</p> <p>P220: Tenere lontano da indumenti e altri materiali combustibili.</p>

## Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I

### 4.1. Descrizione degli usi

**Tabella 1. Uso professionale**

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 14: Rodenticidi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	<p>SERPA RAT PASTA BRODIFACOUM é un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come Brodifacoum, efficace contro Topoalino domestico (<i>Mus musculus</i>), Ratto grigio (<i>Rattus norvegicus</i>), Ratto nero (<i>Rattus rattus</i>) anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in una "pasta fresca" attrattiva per le specie di roditori sopra indicate. Il prodotto non allerta + non crea sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori.</p> <p>SERPA RAT PASTA BRODIFACOUM contiene una sostanza amaricante volta a prevenire accidentale da parte dei bambini.</p>
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	<p>Denominazione scientifica: <i>Rattus norvegicus</i> Denominazione comune: brown rat Fase di sviluppo: adulti</p> <p>Denominazione scientifica: <i>Rattus rattus</i> Denominazione comune: roof rat Fase di sviluppo: adulti</p> <p>Denominazione scientifica: <i>Mus musculus</i> Denominazione comune: house mouse Fase di sviluppo: adulti</p> <p>Denominazione scientifica: <i>Rattus norvegicus</i> Denominazione comune: brown rat Fase di sviluppo: esemplari giovani</p> <p>Denominazione scientifica: <i>Rattus rattus</i> Denominazione comune: roof rat Fase di sviluppo: esemplari giovani</p> <p>Denominazione scientifica: <i>Mus musculus</i> Denominazione comune: house mouse Fase di sviluppo: esemplari giovani</p>
Campo/i di applicazione	<p>uso al chiuso uso all'aperto</p> <p>SERPA RAT PASTA BRODIFACOUM può essere usato all'interno ed intorno edifici industriali (anche depositi merci e stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà.</p>
Metodo/i di applicazione	<p>Metodo: applicazione esca</p> <p>Descrizione dettagliata: Il prodotto è pronto all'uso e deve essere impiegato conformemente ai dosaggi sotto riportati. Le confezioni interne predosate devono essere manipolate con le dovute precauzioni e inserite in un contenitore appropriato, protetta</p>

	dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Osservare l'area di infestazione e porre i contenitori che includono l'esca presso le tane, lungo i loro percorsi e nei posti di maggior presenza. Evitare di toccare il prodotto a mani nude ed utilizzare guanti appropriati. Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Topolino domestico: 2 esche (40 g) x 100 mq Ratto grigio: 3-5 esche (60-100 g) x 100 mq Ratto nero; 3-5 esche (60-100 g) x 100 mq  Diluizione (%): 0  Numero e tempi di applicazione:  Controllare settimanalmente le esche nei contenitori e sostituire quelle consumate. Effettuare operazioni di controllo ad intervalli frequenti per rimuovere i roditori morti ed eliminarli secondo le norme previste. Il prodotto non é destinato ad un uso permanente, organizzare trattamenti che durino al massimo 6 settimane.
Categoria/e di utilizzatori	professionista qualificato ; professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Pacchetti, - , 1-3-5-10-20-25 kg (contenente esche rodenticide in blocchi di paraffina da 20 g ciascuno)  1-3-5-10-20-25 kg (contenente esche rodenticide in blocchi di paraffina da 20 g ciascuno)

#### **4.1.1. Istruzioni specifiche per l'uso**

Vedere la sezione 5, Istruzioni per l'uso

#### **4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso**

#### **4.1.3. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso**

Vedere la sezione 5, Istruzioni per l'uso

#### **4.1.4. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Vedere la sezione 5, Istruzioni per l'uso

#### **4.1.5. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio**

Vedere la sezione 5, Istruzioni per l'uso

#### 4.1.6. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5, Istruzioni per l'uso

#### 4.2. Descrizione degli usi

**Tabella 2. Uso non professionale**

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 14: Rodenticidi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	<p>SERPA RAT PASTA BRODIFACOUM é un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come Brodifacoum, efficace contro Topoalino domestico (<i>Mus musculus</i>), Ratto grigio (<i>Rattus norvegicus</i>), Ratto nero (<i>Rattus rattus</i>) anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in una "pasta fresca" attrattiva per le specie di roditori sopra indicate. Il prodotto non allerta + non crea sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori.</p> <p>SERPA RAT PASTA BRODIFACOUM contiene una sostanza amaricante volta a prevenire accidentale da parte dei bambini.</p>
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	<p>Denominazione scientifica: <i>Rattus norvegicus</i> Denominazione comune: brown rat Fase di sviluppo: adulti</p> <p>Denominazione scientifica: <i>Mus musculus</i> Denominazione comune: house mouse Fase di sviluppo: adulti</p> <p>Denominazione scientifica: <i>Rattus rattus</i> Denominazione comune: roof rat Fase di sviluppo: adulti</p> <p>Denominazione scientifica: <i>Rattus norvegicus</i> Denominazione comune: brown rat Fase di sviluppo: esemplari giovani</p> <p>Denominazione scientifica: <i>Mus musculus</i> Denominazione comune: house mouse Fase di sviluppo: esemplari giovani</p> <p>Denominazione scientifica: <i>Rattus rattus</i> Denominazione comune: roof rat Fase di sviluppo: esemplari giovani</p>
Campo/i di applicazione	<p>uso al chiuso uso all'aperto</p> <p>SERPA RAT PASTA BRODIFACOUM può essere usato all'interno ed intorno ad abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà.</p>
Metodo/i di applicazione	Metodo: applicazione esca

	<p>Descrizione dettagliata: Il prodotto è pronto all'uso e deve essere impiegato conformemente ai dosaggi sotto riportati. Le confezioni interne predosate devono essere manipolate con le dovute precauzioni e inserite in un contenitore appropriato, protetta dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Osservare l'area di infestazione e porre i contenitori che includono l'esca presso le tane, lungo i loro percorsi e nei posti di maggior presenza. Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento.</p>
Tasso/i e frequenza di applicazione	<p>Tasso di domanda: Topolino domestico: 2 esche (40 g) x 100 mq Ratto grigio: 3-5 esche (60-100 g) x 100 mq Ratto nero; 3-5 esche (60-100 g) x 100 mq</p> <p>Diluizione (%): 0</p> <p>Numero e tempi di applicazione:</p> <p>Controllare settimanalmente le esche nei contenitori e sostituire quelle consumate. Effettuare operazioni di controllo ad intervalli frequenti per rimuovere i roditori morti ed eliminarli secondo le norme previste. Il prodotto non è destinato ad un uso permanente, organizzare trattamenti che durino al massimo 6 settimane.</p>
Categoria/e di utilizzatori	<p>pubblico (non professionale)</p>
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Pachetti, -, 40-60-100-160-200-260-500 g (contenente esche rodenticide in blocchi di paraffina da 20 g ciascuno)</p> <p>40-60-100-160-200-260-500 g (contenente esche rodenticide in blocchi di paraffina da 20 g ciascuno)</p>

#### **4.2.1. Istruzioni specifiche per l'uso**

Vedere la sezione 5, Istruzioni per l'uso

#### **4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso**

#### **4.2.3. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso**

Vedere la sezione 5, Istruzioni per l'uso

#### **4.2.4. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Vedere la sezione 5, Istruzioni per l'uso

#### **4.2.5. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio**

Vedere la sezione 5, Istruzioni per l'uso



---

**4.2.6. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.**

Vedere la sezione 5, Istruzioni per l'uso

---

## Capitolo 5. INDICAZIONI GENERALI PER L'USO<sup>1</sup>

### 5.1. Istruzioni d'uso

SERPA RAT PASTA BRODIFACOUM é un'esca rodenticida pronta all'uso . Le confezioni interne predose devono essere manipolate con le dovute precauzioni e inserite in un apposito contenitore, agenti protettivi da agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente  
Osservare l'area di infestazione e porre i contenitori che includes no l'esca presso le tane, long and parrot percorsi and nei posti of maggior presenza.

### 5.2. Misure di mitigazione del rischio

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

### 5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

#### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

MECCANISMO D'AZIONE; la sostanza attiva contenuta nel prodotto è un competitore antagonista della Vitamina K e riduce la sintesi epatica dei fattori K-dipendenti.

SINTOMI: avvelenamento grave a seguito di ingestione di quantità rilevanti di prodotto é in grado di provocare inibizione della vitamina K, causando emorragie cutanee e delle mucose e a livello di organi e parenchimi. La sintomatologia a carico di altri sistemi ed apparati é prevalentemente emorragica.

TERAPIA: in caso di ingestione di grandi quantità di prodotto, provocare il vomito, effettuare lavanda gastrica, L'attività protrombinica va monitorata subito dopo l'ingestione e nei giorni successivi. Se risultasse ridotta somministrare vitamina K. Concordare il protocollo terapeutico con un centro antiveleni.

CONTROINDICAZIONI: anticoagulanti.

### 5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

I contenitori devono essere posizionati in modo sicuro, al fine di minimizzare il rischio di manomissione e di ingestione accidentale dell'esca da parte di bambini o di animali non bersaglio. Accertarsi sempre che i contenitori siano fissati in maniera adeguata e che le esche non possano essere trascinate via dai roditori. Evitare i trattamenti in presenza di alimenti o mangimi non piolotti. Non utilizzare in agricoltura. In caso di contaminazione lavare accuratamente le mani con sapone e acqua abbondante. Non riutilizzare la confezione vuota e non disperderla nell'ambiente ma eliminarla in conformità alle norme vigenti. In caso di sospetta ingestione consultare un Centro Antiveleni, il prodotto può essere pericoloso se ingerito da animali domestici o altri animali non bersaglio. In caso di ingestione accertata occorre indurre il vomito. Rivolgersi immediatamente ad un veterinario mostrandogli il contenitore o l'etichetta.

### 5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

I pacchi devono essere chiusi a chiave e tenuti fuori dalla portata dei bambini.

---

<sup>1</sup>Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.

---

Il prodotto è stabile 24 mesi.

---

## **Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI**