

EN

ANNEX

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS FOR A BIOCIDAL PRODUCT

COLBROM PASTA

Product type(s)

PT14: Rodenticides

Authorisation number: 1567-1, 1567-4

R4BP asset number: BG-0009720-0000

1. ADMINISTRATIVE INFORMATION

1.1. Trade name(s) of the product

Trade name(s)	COLBROM PASTA
---------------	---------------

1.2. Authorisation holder

Name and address of the authorisation holder	Name	COLKIM S.R.L.
	Address	Via Piemonte, 50 40064 Ozzano dell'Emilia Italy
Authorisation number	1567-1, 1567-4	
<i>R4BP asset number</i>	BG-0009720-0000	
Date of the authorisation	14/12/2012	
Expiry date of the authorisation	31/12/2026	

1.3. Manufacturer(s) of the product

Name of manufacturer	Colkim S.r.l.
Address of manufacturer	Via Piemonte 50 40064 Ozzano Emilia (BO) Italy
Location of manufacturing sites	Via Piemonte 50 40064 Ozzano Emilia (BO) Italy

1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)

Active substance	Bromadiolone
Name of manufacturer	Dr Tezza S.r.l.
Address of manufacturer	Via del Lavoro 326 37050 ANGIARI Italy
Location of manufacturing sites	Via del Lavoro 326 37050 ANGIARI Italy

2. PRODUCT COMPOSITION AND FORMULATION

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the product

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Bromadiolone	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	active substance	28772-56-7	249-205-9	98 % (w/w)

2.2. Type(s) of formulation

RB Bait (ready for use)

3. HAZARD AND PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazard statements	
Precautionary statements	P102: Keep out of reach of children.

4. AUTHORISED USE(S)

4.1. Use description

Table 1. rodenticides

Product type	PT14: Rodenticides
Where relevant, an exact description of the authorised use	Готов за употреба родентицид под формата на паста за контрол на числеността на <i>Rattus norvegicus</i> (сив плъх), <i>Rattus Rattus</i> (черен плъх) и <i>Mus musculus</i> (домашна мишка). Да се прилага на закрито и открито (само около сгради).
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: <i>Mus musculus</i> Common name: house rat Development stage: adults
Field(s) of use	indoor use outdoor use Готов за употреба родентицид под формата на паста за контрол на числеността на <i>Rattus norvegicus</i> (сив плъх), <i>Rattus Rattus</i> (черен плъх) и <i>Mus musculus</i> (домашна мишка). Да се прилага на закрито и открито (само около сгради).
Application method(s)	Method: bait application Detailed description: Примамката в пликчетата с тегло 15, 17 или 20 g се поставя в дератизационни кутии, устойчиви и обезопасени против отваряне, защитени от непрофесионална манипулация и маркирани за съответната употреба. Примамките в дератизационните кутии да са обезопасени и закрепени, за да се изключи разпиляването им от гризачи. Дератизационните кутии с примамки, в количество съобразно теглото на единичните опаковки-пликчета и посочените по-долу дози се поставят в засегнатите зони, там където има активност на гризачи, по пътищата на движение или на местата, най-често посещавани от тях за хранене.
Application rate(s) and frequency	Application rate: 45 - 100 g Dilution (%): 98 Number and timing of application: Норми на приложение – за професионални и непрофесионални потребители: Плъхове – 3-5 пликчета по 15 g или 45-75 g; 3-5 пликчета по 17 g или 51-85 g на дератизационна кутия; 3-5 пликчета по 20 g или 60-100 g на дератизационна кутия. Домашна мишка – 2 пликчета по 15 g или 30 g; 2 пликчета по 17 g или 34 g на дератизационна кутия; 2 пликчета по 20 g или 40 g на дератизационна кутия. Необходимият брой дератизационни кутии със съответните количества примамка се поставят на разстояние от 5-10 метра една от друга, в зависимост от нивото на заселеност

	и площта на засегнатия участък. Да се контролира редовно консумирането на примамката и подменя изразходваната или унищожена примамка до спиране на приема и липса на активност на гризачи.Биоцидът не е предназначен за постоянно ползване и е необходимо да се контролира и управлява процеса на приложение, така че да продължи до 6 седмици.
Category(ies) of users	professional ; general public (non-professional)
Pack sizes and packaging material	Bag /Sack, Paper, cardboard , 15 g - 25 kg За масова употреба: Единични примамки от 15, 17 и 20 g в ядлива хартия, поставени в опаковки (блистери, кутии, кофи, дератизационни кутии) от 15, 17, 20, 30, 34, 40, 80, 100, 120, 150, 160, 200, 250, 260, 300, 350, 400, 450 и 500 g.За професионална употреба: Единични примамки от 15, 17 и 20 g, в ядлива хартия, поставени в опаковки (кутии, кофи, корита, чанти, бидони, дератизационни кутии) от 750 g и 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 и 25 kg.

4.1.1. Use-specific instructions

Примамката в пликчета с тегло 15, 17 или 20 g се поставя в дератизационни кутии, устойчиви и обезопасени против отваряне, защитени от непрофесионална манипулация и маркирани за съответната употреба.Примамките в дератизационните кутии да са обезопасени и закрепени, за да се изключи разпиляването им от гризачи.Дератизационните кутии с примамки, в количество съобразно теглото на единичните опаковки-пликчета и посочените по-долу дози се поставят в засегнатите зони, там където има активност на гризачи, по пътищата на движение или на местата, най-често посещавани от тях за хранене.Норми на приложение – за професионални и непрофесионални потребители:Плъхове – 3-5 пликчета по 15 g или 45-75 g; 3-5 пликчета по 17 g или 51-85 g на дератизационна кутия; 3-5 пликчета по 20 g или 60-100 g на дератизационна кутия.Домашна мишка – 2 пликчета по 15 g или 30 g; 2 пликчета по 17 g или 34 g на дератизационна кутия; 2 пликчета по 20 g или 40 g на дератизационна кутия.Необходимият брой дератизационни кутии със съответните количества примамка се поставят на разстояние от 5-10 метра една от друга, в зависимост от нивото на заселеност и площта на засегнатия участък. Да се контролира редовно консумирането на примамката и подменя изразходваната или унищожена примамка до спиране на приема и липса на активност на гризачи.Биоцидът не е предназначен за постоянно ползване и е необходимо да се контролира и управлява процеса на приложение, така че да продължи до 6 седмици.Инструкции за безопасна употребаВинаги да се чете етикета преди употреба и да се следват указанията в посочените инструкции. Да се избягва ненужното излагане, особено да се избягва поглъщането. Примамките трябва да са разположени по сигурен начин в дератизационни кутии или други покрития, за да се намали риска от консумация на примамката от деца, домашни любимци и нецелев животни, особено кучета, котки, прасета и домашни птици.Да се измиват ръцете и изложената на биоцида кожа преди хранене и след употреба на биоцида.Да се премахват умрелите гризачи на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват и/или презареждат. Мъртвите гризачи да се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и да се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД.При професионална употреба да се обозначи

зоната, в която се ползва биоцида и да се постави предупреждение за опасност от първично и вторично отравяне, както и мерките за първа помощ. При поглъщане веднага да се предизвика повръщане и да се свърже с необходимия специалист като се покаже опаковката и етикета.

4.1.2. Use-specific risk mitigation measures

Примамката в пликчета с тегло 15, 17 или 20 g се поставя в дератизационни кутии, устойчиви и обезопасени против отваряне, защитени от непрофесионална манипулация и маркирани за съответната употреба. Примамките в дератизационните кутии да са обезопасени и закрепени, за да се изключи разпиляването им от гризачи. Дератизационните кутии с примамки, в количество съобразно теглото на единичните опаковки-пликчета и посочените по-долу дози се поставят в засегнатите зони, там където има активност на гризачи, по пътищата на движение или на местата, най-често посещавани от тях за хранене. Норми на приложение – за професионални и непрофесионални потребители: Плъхове – 3-5 пликчета по 15 g или 45-75 g; 3-5 пликчета по 17 g или 51-85 g на дератизационна кутия; 3-5 пликчета по 20 g или 60-100 g на дератизационна кутия. Домашна мишка – 2 пликчета по 15 g или 30 g; 2 пликчета по 17 g или 34 g на дератизационна кутия; 2 пликчета по 20 g или 40 g на дератизационна кутия. Необходимият брой дератизационни кутии със съответните количества примамка се поставят на разстояние от 5-10 метра една от друга, в зависимост от нивото на заселеност и площта на засегнатия участък. Да се контролира редовно консумирането на примамката и подменя изразходваната или унищожена примамка до спиране на приема и липса на активност на гризачи. Биоцидът не е предназначен за постоянно ползване и е необходимо да се контролира и управлява процеса на приложение, така че да продължи до 6 седмици. Инструкции за безопасна употреба: винаги да се чете етикета преди употреба и да се следват указанията в посочените инструкции. Да се избягва ненужното излагане, особено да се избягва поглъщането. Примамките трябва да са разположени по сигурен начин в дератизационни кутии или други покрития, за да се намали риска от консумация на примамката от деца, домашни любимци и нецелесъобразни животни, особено кучета, котки, прасета и домашни птици. Да се измиват ръцете и изложената на биоцида кожа преди хранене и след употреба на биоцида. Да се премахват умрелите гризачи на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват и/или презареждат. Мъртвите гризачи да се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и да се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД. При професионална употреба да се обозначи зоната, в която се ползва биоцида и да се постави предупреждение за опасност от първично и вторично отравяне, както и мерките за първа помощ. При поглъщане веднага да се предизвика повръщане и да се свърже с необходимия специалист като се покаже опаковката и етикета.

4.1.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Примамката в пликчета с тегло 15, 17 или 20 g се поставя в дератизационни кутии, устойчиви и обезопасени против отваряне, защитени от непрофесионална манипулация и маркирани за съответната употреба. Примамките в дератизационните кутии да са обезопасени и закрепени, за да се изключи разпиляването им от гризачи. Дератизационните кутии с примамки, в количество съобразно теглото на единичните опаковки-пликчета и посочените по-долу дози се поставят в засегнатите зони, там където има активност на гризачи, по пътищата на движение или на местата, най-често посещавани от тях за хранене. Норми на приложение – за професионални и непрофесионални потребители: Плъхове – 3-5 пликчета по 15 g или 45-75 g; 3-5 пликчета по 17 g или 51-85 g на дератизационна кутия; 3-5 пликчета по 20 g или 60-100 g на дератизационна кутия. Домашна мишка – 2 пликчета по 15 g или 30 g; 2 пликчета по 17 g или 34 g

на дератизационна кутия; 2 пликчета по 20 g или 40 g на дератизационна кутия.Необходимият брой дератизационни кутии със съответните количества примамка се поставят на разстояние от 5-10 метра една от друга, в зависимост от нивото на заселеност и площта на засегнатия участък. Да се контролира редовно консумирането на примамката и подменя изразходваната или унищожена примамка до спиране на приема и липса на активност на гризачи.Биоцидът не е предназначен за постоянно ползване и е необходимо да се контролира и управлява процеса на приложение, така че да продължи до 6 седмици.Инструкции за безопасна употребаВинаги да се чете етикета преди употреба и да се следват указанията в посочените инструкции. Да се избягва ненужното излагане, особено да се избягва поглъщането. Примамките трябва да са разположени по сигурен начин в дератизационни кутии или други покрития, за да се намали риска от консумация на примамката от деца, домашни любимци и нецелев животни, особено кучета, котки, прасета и домашни птици.Да се измиват ръцете и изложената на биоцида кожа преди хранене и след употреба на биоцида.Да се премахват умрелите гризачи на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват и/или презареждат. Мъртвите гризачи да се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и да се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД.При професионална употреба да се обозначи зоната, в която се ползва биоцида и да се постави предупреждение за опасност от първично и вторично отравяне, както и мерките за първа помощ.При поглъщане веднага да се предизвика повръщане и да се свърже с необходимия специалист като се покаже опаковката и етикета.

4.1.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Примамката в пликчета с тегло 15, 17 или 20 g се поставя в дератизационни кутии, устойчиви и обезопасени против отваряне, защитени от непрофесионална манипулация и маркирани за съответната употреба.Примамките в дератизационните кутии да са обезопасени и закрепени, за да се изключи разпиляването им от гризачи.Дератизационните кутии с примамки, в количество съобразно теглото на единичните опаковки-пликчета и посочените по-долу дози се поставят в засегнатите зони, там където има активност на гризачи, по пътищата на движение или на местата, най-често посещавани от тях за хранене.Норми на приложение – за професионални и непрофесионални потребители:Плъхове – 3-5 пликчета по 15 g или 45-75 g; 3-5 пликчета по 17 g или 51-85 g на дератизационна кутия; 3-5 пликчета по 20 g или 60-100 g на дератизационна кутия.Домашна мишка – 2 пликчета по 15 g или 30 g; 2 пликчета по 17 g или 34 g на дератизационна кутия; 2 пликчета по 20 g или 40 g на дератизационна кутия.Необходимият брой дератизационни кутии със съответните количества примамка се поставят на разстояние от 5-10 метра една от друга, в зависимост от нивото на заселеност и площта на засегнатия участък. Да се контролира редовно консумирането на примамката и подменя изразходваната или унищожена примамка до спиране на приема и липса на активност на гризачи.Биоцидът не е предназначен за постоянно ползване и е необходимо да се контролира и управлява процеса на приложение, така че да продължи до 6 седмици.Инструкции за безопасна употребаВинаги да се чете етикета преди употреба и да се следват указанията в посочените инструкции. Да се избягва ненужното излагане, особено да се избягва поглъщането. Примамките трябва да са разположени по сигурен начин в дератизационни кутии или други покрития, за да се намали риска от консумация на примамката от деца, домашни любимци и нецелев животни, особено кучета, котки, прасета и домашни птици.Да се измиват ръцете и изложената на биоцида кожа преди хранене и след употреба на биоцида.Да се премахват умрелите гризачи на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват и/или презареждат. Мъртвите гризачи да се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и да се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда,

определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД. При професионална употреба да се обозначи зоната, в която се ползва биоцида и да се постави предупреждение за опасност от първично и вторично отравяне, както и мерките за първа помощ. При поглъщане веднага да се предизвика повръщане и да се свърже с необходимия специалист като се покаже опаковката и етикета.

4.1.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Примамката в пликчетата с тегло 15, 17 или 20 g се поставя в дератизационни кутии, устойчиви и обезопасени против отваряне, защитени от непрофесионална манипулация и маркирани за съответната употреба. Примамките в дератизационните кутии да са обезопасени и закрепени, за да се изключи разпиляването им от гризачи. Дератизационните кутии с примамки, в количество съобразно теглото на единичните опаковки-пликчета и посочените по-долу дози се поставят в засегнатите зони, там където има активност на гризачи, по пътищата на движение или на местата, най-често посещавани от тях за хранене. Норми на приложение – за професионални и непрофесионални потребители: Плъхове – 3-5 пликчета по 15 g или 45-75 g; 3-5 пликчета по 17 g или 51-85 g на дератизационна кутия; 3-5 пликчета по 20 g или 60-100 g на дератизационна кутия. Домашна мишка – 2 пликчета по 15 g или 30 g; 2 пликчета по 17 g или 34 g на дератизационна кутия; 2 пликчета по 20 g или 40 g на дератизационна кутия. Необходимият брой дератизационни кутии със съответните количества примамка се поставят на разстояние от 5-10 метра една от друга, в зависимост от нивото на заселеност и площта на засегнатия участък. Да се контролира редовно консумирането на примамката и подменя изразходваната или унищожена примамка до спиране на приема и липса на активност на гризачи. Биоцидът не е предназначен за постоянно ползване и е необходимо да се контролира и управлява процеса на приложение, така че да продължи до 6 седмици. Инструкции за безопасна употреба: винаги да се чете етикета преди употреба и да се следват указанията в посочените инструкции. Да се избягва ненужното излагане, особено да се избягва поглъщането. Примамките трябва да са разположени по сигурен начин в дератизационни кутии или други покрития, за да се намали риска от консумация на примамката от деца, домашни любимци и нецелесъобразни животни, особено кучета, котки, прасета и домашни птици. Да се измиват ръцете и изложената на биоцида кожа преди хранене и след употреба на биоцида. Да се премахват умрелите гризачи на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват и/или презареждат. Мъртвите гризачи да се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и да се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД. При професионална употреба да се обозначи зоната, в която се ползва биоцида и да се постави предупреждение за опасност от първично и вторично отравяне, както и мерките за първа помощ. При поглъщане веднага да се предизвика повръщане и да се свърже с необходимия специалист като се покаже опаковката и етикета.

5. GENERAL DIRECTIONS FOR USE¹

5.1. Instructions for use

5.2. Risk mitigation measures

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

¹Instructions for use, risk mitigation measures and other directions for use under this section are valid for any authorised uses.

6. OTHER INFORMATION