

# Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

**Naziv proizvoda:** Dip es lac DL

**Vrsta(e) proizvoda:** Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

**Broj odobrenja:** EU-0028957-00000

**Referentni broj odluke u registru  
biocidnih proizvoda (R4BP 3):** EU-0028957-0002

## Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	2
2. Sastav i formulacija proizvoda	2
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Oznake opasnosti i obavijesti	3
4. Odobrena uporaba	3
5. Opće upute za uporabu	4
5.1. Upute za uporabu	4
5.2. Mjere za smanjenje rizika	5
5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	5
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	5
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja	5
6. Ostale informacije	5

## Administrativne informacije

### 1.1. Trgovački naziv proizvoda

Dip es lac DL
Traylac O-F
Baktostop Lactic
Lacti-Bac Dip
DS 1.0 F

### 1.2. Nositelj odobrenja

<b>Naziv i adresa nositelja odobrenja</b>	Naziv	CVAS Development GmbH
	Adresa	Am Hafen 16 68526 Ladenburg Njemačka
<b>Broj odobrenja</b>	EU-0028957-00000 1-1	
<b>Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)</b>	EU-0028957-0002	
<b>Datum odobrenja</b>	18/07/2023	
<b>Datum isteka odobrenja</b>	30/06/2033	

### 1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

<b>Naziv proizvođača</b>	Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
<b>Adresa proizvođača</b>	Pfaffensteinstraße 1 83115 Neubeuern Njemačka
<b>Lokacija proizvodnih pogona</b>	Pfaffensteinstraße 1 83115 Neubeuern Njemačka

#### 1.4. Proizvođači aktivnih tvari

<b>Aktivna tvar</b>	1322 - L-(+)-mliječna kiselina
<b>Naziv proizvođača</b>	Purac Biochem bv
<b>Adresa proizvođača</b>	Arkelsedijk 46 4206AC Gorinchem Nizozemska
<b>Lokacija proizvodnih pogona</b>	Arkelsedijk 46 4206AC Gorinchem Nizozemska

## 2. Sastav i formulacija proizvoda

### 2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
L-(+)-mliječna kiselina		Aktivna tvar	79-33-4	201-196-2	1,92
Metansulfonska kiselina	Metansulfonska kiselina	Neaktivna tvar	75-75-2	200-898-6	0
Fosforna kiselina	Fosforna kiselina	Neaktivna tvar	7664-38-2	231-633-2	0
Sumporna kiselina	Sumporna kiselina	Neaktivna tvar	7664-93-9	231-639-5	0
Izononanska kiselina	Izononanska kiselina	Neaktivna tvar	3302-10-1	221-975-0	0

### 2.2. Vrsta formulacije

### 3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja

Oznake obavijesti

### 4. Odobrena uporaba

#### 4.1 Opis uporabe

#### Uporaba 1 - Uporaba # 1.1 - Dezinfekcija vimena nakon mužnje ručnim ili automatskim uranjanjem

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi)  
(uključujući razvojnu fazu)Znanstveno ime: nema podataka  
Uobičajeno ime: Bakterije  
Stadij razvoja: nema podatakaZnanstveno ime: nema podataka  
Uobičajeno ime: Kvasci  
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

Dezinfekcija vimena nakon mužnje

Načini primjene

Metoda: Uranjanje  
Detaljan opis:  
Dezinfekcija vimena nakon mužnje  
Ručno uranjanje pomoću čašice za uranjanje  
Automatsko uranjanje robotom

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: Proizvod spreman za uporabu, 1,92-1,96 % L-(+)-mliječna kiselina  
Razrjeđivanje (%): -  
Broj i vremenski raspored primjene:  
2 – 3 puta dnevno (nakon svake mužnje)

**Kategorije korisnika**

profesionalac

**Veličine pakiranja i ambalažni materijal**Kanistar od polietilena visoke gustoće (HDPE): 5-60 kg  
Bubanj od polietilena visoke gustoće (HDPE): 60-200 kg  
Međuspremnik za terete (IBC) od polietilena visoke gustoće (HDPE): 600-1000 kg**4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu**

Vidjeti opću uputu o uporabi.

**4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu**

Vidjeti opću uputu o uporabi.

**4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Vidjeti opću uputu o uporabi.

**4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Vidjeti opću uputu o uporabi.

**4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja**

Vidjeti opću uputu o uporabi.

**5. Opće upute za uporabu****5.1. Upute za uporabu**

Proizvod mora biti na temperaturi između 20 °C i 30 °C prije uporabe.  
Preporučuje se uporaba dozirne pumpe za punjenje proizvodom u opremu za nanošenje.  
Spremnik s dozirnom pumpom napuniti proizvodom spremnim za uporabu. Izbjegavati ispuštanje viška tekućina.  
Proizvod nanositi ručnim ili automatskim uranjanjem. Paziti da sise budu potpuno pokriveno dezinficijensom. Količine primjene za krave i bivolice - 5 ml/obrada, a za ovce i koze - 3 ml/obrada.  
Proizvod ostaviti na sisama do iduće mužnje. Nakon obrade, osigurati da životinje stoje najmanje 5 minuta.  
Nakon dezinfekcije, očistiti opremu za nanošenje ispiranjem vodom.

## 5.2. Mjere za smanjenje rizika

Nema

## 5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

### Upute za prvu pomoć

AKO SE UDIŠE: ako se pojave simptomi, pozvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati kožu vodom. Ako se pojave simptomi, pozvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: ako simptomi i dalje traju, isprati vodom. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Pozvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

AKO SE PROGUTA: ako se pojave simptomi, pozvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

### Mjere u slučaju izvanredne situacije za zaštitu okoliša

Mjere zaštite okoliša: ne dopustiti da proizvod dospije u kanalizaciju ili vodna tijela.

Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje: upiti pomoću materijala koji veže tekućinu (pijesak, diatomit, univerzalno vezivo).

Ne upotrebljavati zapaljivi materijal, primjerice

pijevinu. Odlagati prikupljeni materijal u skladu s lokalnim propisima.

## 5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Na kraju obrade, odložiti nekorišteni proizvod i ambalažu u skladu s lokalnim propisima.

Korišteni proizvod može doći u gradsku kanalizaciju ili se može odložiti na odlagalište za gnojivo ovisno o lokalnim propisima.

## 5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Rok trajanja: 24 mjeseca

Ne skladištiti na temperaturi višoj od 40 °C.

Zaštititi od topline i izravne sunčeve svjetlosti.

Zaštititi od mraza.

Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

## 6. Ostale informacije

Nije relevantno