

SL

PRILOGA

POVZETEK ZNAČILNOSTI BIOCIDNEGA PROIZVODA

ACTIPASTA-BROD

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi

Številka dovoljenja: SI-0018481-0000

Številka proizvoda v R4BP: SI-0018481-0000

Poglavje 1. UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovska imena proizvoda

Trgovsko ime	NEO ACTIPASTA-BROD
--------------	--------------------

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	Activa s.r.l.
	Naslov	via Feltre, 32 20132 Milano Italija
Številka dovoljenja		SI-0018481-0000
Številka proizvoda v R4BP		SI-0018481-0000
Datum dovoljenja		24/01/2018
Datum izteka veljavnosti dovoljenja		31/12/2026

1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda

Ime proizvajalca	Activa s.r.l.,
Naslov proizvajalca	via Feltre, 32, 20132 Milano, Italija
Kraj proizvodnih obratov	Colkim s.r.l., via Piemonte 50, 40064 Ozzano Emilia (BO), Italija

1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

Aktivna snov	Brodifakum
Ime proizvajalca	Activa S.r.l.
Naslov proizvajalca	via Feltre, 32, 20132 Milano, Italija
Kraj proizvodnih obratov	Tezza S.r.l., via Tre Ponti 22, 37050 S. Maria di Zevio (VR), Italija

Poglavje 2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Brodifakum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	aktivna snov	56073-10-0	259-980-5	0,0025

2.2. Vrsta(-e) formulacije

RB Gotova vaba

Poglavje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI

Stavki o nevarnosti	H373: Lahko škoduje organom (srčno-žilni sistem) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti {1:navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti:}.
Previdnostni stavki	P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P301 + P310: PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite zdravnika. P308 + P313: PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč. P501: Odstraniti vsebino v skladu z nacionalnimi predpisi.

Poglavje 4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)

4.1. Opis uporabe

Tabela 1. Hišne miši – poklicni uporabniki – notranji prostori

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni relevantno za rodenticide.
Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Splošno ime: house mouse Razvojna faza: drugo: Juveniles to adults
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Notranjost, znotraj
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah za nastavljanje vab, ki so varne pred zunanjimi dejavniki.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 20 - 40 g vabe na postajo Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Če je potrebnih več postaj za nastavljanje vab, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Od 1,5 kg do 25 kg (mehka vaba v vrečkah po 10-20 g). Embalaža: PE / aluminij / poliester

4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Postaje pregledujte najmanj enkrat na dva do tri dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta in ali so postaje nedotaknjene, ter da odstranite poginule glodavce. Po potrebi ponovno napolnite vabo.

4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.1.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.1.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

4.1.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

4.1.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

4.2. Opis uporabe

Tabela 2. Podgane – poklicni uporabniki – notranji prostori

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni relevantno za rodenticide.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: brown rat Razvojna faza: drugo: Juveniles to adults
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Notranjost, znotraj
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah za nastavljanje vab, ki so varne pred zunanjimi dejavniki.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 100 - 200 g vabe na postajo Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Če je potrebnih več postaj za nastavljanje vab, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Od 1,5 kg do 25 kg (mehka vaba v vrečkah po 10-20 g). Embalaža: PE / aluminij / poliester

4.2.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Postaje pregledujte najmanj enkrat na 5-7 dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta ali ne. Po potrebi postaje ponovno napolnite vabo. Poginule glodavce varno odstranite.

4.2.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.2.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Pri nameščanju postaj blizu sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.2.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

4.2.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

4.2.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

4.3. Opis uporabe

Tabela 3. Hišne miši in/ali podgane – poklicni uporabniki – zunaj okrog stavb

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni relevantno za rodenticide.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Splošno ime: house mouse Razvojna faza: drugo: Juveniles to adults Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: brown rat Razvojna faza: drugo: Juveniles to adults
Področje(-a) uporabe	uporaba na prostem Zunaj okrog stavb.
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah za nastavljanje vab, ki so varne pred zunanjimi dejavniki.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Hišne miši: 20 - 40 g vabe na postajo; Rjave podgane: 100 - 200 g vabe na postajo; Postaje pregledujte [pri miših – najmanj enkrat na dva do tri dni] [pri podganah – vsakih pet do sedem dni] od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta, ali so postaje nedotaknjene, in da odstranite poginule glodavce. Po potrebi ponovno napolnite vabo. Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe:

	Če je potrebnih več postaj za nastavljanje vab, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Število pakiranih vrečk na embalažo: Grami/kg vabe na pakirno vrečko: Od 1,5 kg do 25 kg (mehka vaba v vrečkah po 10-20 g). Embalaža: PE / aluminij / poliester

4.3.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Zavarujte vabo pred vremenskimi vplivi (npr. dež, sneg). Postaje namestite na območja, ki niso izpostavljena vodi.

Postaje pregledujte pri miših na 2-3 dni, pri podganah na 5-7 dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta ali ne. Po potrebi postaje ponovno napolnite vabo. Poškodovano vabo zamenjajte s svežo. Poginule glodavce varno odstranite.

4.3.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.3.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ne nastavlajte vabe direktno v rove.

4.3.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pri nameščanju postaj blizu površinskih vod (npr. rek, ribnikov, vodnih kanalov, jezov, namakalnih jarkov) ali sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.3.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

4.3.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

4.4. Opis uporabe

Tabela 4. Hišne miši – splošni uporabniki – notranji prostori

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni relevantno za rodenticide.

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Splošno ime: house mouse Razvojna faza: drugo: Juveniles to adults
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Notranjost, znotraj
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah za nastavljanje vab, ki so varne pred zunanjimi dejavniki.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 20 - 40 g vabe na postajo. Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Če je potrebnih več postaj za nastavljanje vab, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov.
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Do 150 g (mehka vaba v vrečkah po 10-20 g). Embalaža: PE / aluminij / poliester

4.4.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Postaje pregledujte najmanj enkrat na 2-3 dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta ali ne. Po potrebi postaje ponovno napolnite vabo. Poginule glodavce varno odstranite.

4.4.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.4.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.4.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

4.4.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

4.4.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

4.5. Opis uporabe

Tabela 5. Podgane – splošni uporabniki – notranji prostori

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
-----------------	--

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni relevantno za rodenticide.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: brown rat Razvojna faza: drugo: Juveniles to adults
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Notranjost, znotraj
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 100 g - 200 g vabe na postajo Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Če je potrebnih več postaj za nastavljanje vab, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov.
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Do 150 g (mehka vaba v vrečkah po 10-20 g). Embalaža: PE / aluminij / poliester

4.5.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Postaje pregledujte najmanj enkrat na 5-7 dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta ali ne. Po potrebi postaje ponovno napolnite vabo. Poginule glodavce varno odstranite.

4.5.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.5.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.5.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

4.5.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

4.5.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

4.6. Opis uporabe

Tabela 6. Podgane – poklicni in splošni uporabniki – zunaj okrog stavb

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
-----------------	--

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni pomembno za rodenticide
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: brown rat Razvojna faza: drugo: Juveniles to adults
Področje(-a) uporabe	uporaba na prostem Zunaj okrog stavb.
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah za nastavljanje vab, ki so varne pred zunanjimi dejavniki.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 100 - 200 g vabe na postajo Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Če je potrebnih več postaj za nastavljanje vab, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak ; splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Do 150 g (mehka vaba v vrečkah po 10-20 g). Embalaža: PE / aluminij / poliester

4.6.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Postaje namestite na območja, ki niso izpostavljena poplavljanju.

- Zamenjajte vabe v postaji, ki so bile poškodovane zaradi vode ali onesnažene z umazanijo.

- Postaje pregledujte najmanj enkrat na pet do sedem dni po začetku tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta, ali so postaje nedotaknjene, in da odstranite poginule glodavce. Po potrebi napolnite vabo.

4.6.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.6.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Za poklicno uporabo okoli staub: Proizvoda ne nastavljajte neposredno v rove.

4.6.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Za poklicno uporabo: Pri nameščanju postaj blizu sistemov za odvajanje vode, se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.6.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

4.6.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Poglavje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO¹

5.1. Navodila za uporabo

Poklicni uporabniki :

- Preden začnete uporabljati proizvod, preberite in upoštevajte navodila za uporabo proizvoda in druge informacije, ki so priložene proizvodu ali so na voljo na prodajnem mestu.
- Izvedite pregled prizadetega območja pred nastavljanjem vabe in oceno na mestu uporabe, da opredelite vrste glodavcev in njihova mesta aktivnosti ter da določite verjeten razlog in obseg napada škodljivcev.

Odstranite hrano, ki je glodavcem na doseg (npr. razsuto zrnje ali odpadki hrane). Poleg tega pred nastavljanjem vabe prizadetega območja ne čistite, saj to zmoti populacijo glodavcev in vabo težje sprejmejo.

- Proizvod se sme uporabljati samo kot del celostnega sistema zatiranja škodljivcev, ki med drugim vključuje higienske ukrepe in, kjer je mogoče, fizične metode nadzora.

Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (v čim večji meri zamažite luknje, odstranite morebitno hrano in pijačo), da se izboljša zaužitje proizvoda in zmanjša verjetnost ponovne invazije.

- Postaje za nastavljanje vab postavite v neposredno bližino območij, kjer je bila opažena aktivnost glodavcev (npr. poti premikanja, legla, krmišča, luknje, rovi itd.).

- Kjer je mogoče, pritrdite postaje na tla ali druge strukture.

- Postaje za nastavljanje vab morajo vsebovati jasno oznako, da vsebujejo rodenticide in da jih ni dovoljeno premikati ali odpirati (za informacije, ki morajo biti navedene na etiketi, glejte poglavje 5.3).

[...] Kadar proizvod uporabljate na javnih območjih, morajo biti območja učinkovanja označena in v bližini vab mora biti obvestilo z razlago tveganja primarne ali sekundarne zastrupitve z antikoagulantom ter navedbo prvih ukrepov v primeru zastrupitve.

- Vaba mora biti pritrdjena, da je ni možno odvreči iz postaje za nastavljanje vab.
- Proizvod namestite zunaj dosega otrok, ptic, hišnih in domačih živali ter drugih neciljnih živali.
- Proizvod namestite stran od hrane, pijače in krme za živali, in tudi stran od pripomočkov ali površin, ki so v stiku z njimi.

[Kadar je potrebno za oceno tveganja:

Med rokovanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic mora navesti imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).

Kjer je ustrezno, navedite druga osebna varovalna sredstva (npr. očala ali masko), potrebna za ravnanje s proizvodom]

Med uporabo proizvoda ne jejte, pijte ali kadite.

Po uporabi proizvoda si umijte roke in kožo, ki je bila neposredno izpostavljena.

- Če je zaužitje vabe relativno nizko glede na velikost napada škodljivcev, razmislite o premestitvi postaj za nastavljanje vab ali zamenjavi pripravka v vabi.

Če se uživanje pripravka iz vab po obdobju učinkovanja 35 dni nadaljuje in ni opaziti zmanjšanja aktivnosti glodavcev, je treba ugotoviti verjeten razlog.

Če so bili drugi elementi izključeni, obstaja verjetnost, da so glodavci odporni, zato, kjer je mogoče, uporabite rodenticid, ki ni antikoagulacijski, ali močnejši antikoagulacijski rodenticid. Razmislite tudi o uporabi pasti kot alternativni ukrep nadzora.

- Ob koncu obdobja učinkovanja odstranite preostalo vabo ali postaje za nastavljanje vab.

Navodila za uporabo, ki so specifična za vabe:

Vabe v vrečkah: Ne odpirajte vrečk, ki vsebujejo vabe.

Splošni uporabniki:

- Pred uporabo proizvoda preberite in upoštevajte navodila za uporabo in druge ki so priložene proizvodu ali so na voljo na prodajnem mestu.

¹Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

-
- Pred uporabo rodenticidov razmislite o **nekemičnih** metodah nadzora (npr. pasti).
 - Odstranite hrano, ki je glodavcem na doseg (npr. razsuto zrnje ali odpadki hrane). Poleg tega pred nastavljanjem vabe napadeno **območja ne čistite**, saj to zmoti populacijo glodavcev in vabo težje sprejmejo.
 - Postaje postavite v neposredno bližino **območja**, kjer je bila opažena aktivnost glodavcev (npr. poti premikanja, legla, krmišča, luknje, rovi itd.).
 - Kjer je **mogoče**, pritrdite postaje na tla ali druge strukture.
 - Postaje namestite izven dosega otrok, ptic, hišnih in **domačih** živali ter drugih neciljnih živali.
 - Postaje namestite stran od hrane, **pijače** in krme za živali ter od **pripomočkov** ali površin, ki so v stiku z njimi.
 - Postaj ne **nameščajte** blizu sistemov za odtok vode, kjer bi lahko prišle v stik z vodo.
 - Med uporabo proizvoda ne jejte, pijte ali kadite. Po uporabi proizvoda si umijte roke in kožo, ki je bila neposredno izpostavljena.
 - Ob koncu obdobja **učinkovanja** odstranite preostalo vabo ali postaje za nastavljanje vab.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Poklicni uporabniki :

Kjer je **mogoče**, pred **začetkom** tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe (npr. uporabnike **območja** učinkovanja vabe in okolice) o tretiranju za nadzor glodavcev [v skladu z veljavnim kodeksom dobre prakse, če je na voljo]".

Za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve **iščite** in odstranjujte poginule glodavce dovolj pogosto med obdobjem tretiranja (npr. najmanj dvakrat tedensko).

- Proizvoda ne smete uporabljati **več** kot 35 dni brez evalvacije stanja napada škodljivcev in učinkovitosti proizvoda.
- Ne uporabljajte antikoagulacijskih rodenticidov kot stalne vabe za **preprečevanje** napada glodavcev ali odkrivanje njihove aktivnosti.

Iz informacij o proizvodu (tj. etiketa in/ali letak) mora biti jasno razvidno, da:

- proizvod ni na voljo za splošno uporabo (npr. „samo za poklicne uporabnike“);
- se mora proizvod uporabljati v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki;
- morajo uporabniki pravilno **označiti** postaje z informacijami iz poglavja 5.3 povzetka **značilnosti** proizvoda (npr. **označevanje** postaj za nastavljanje vab v skladu s **priporočili** za proizvod).

Z uporabo tega proizvoda se lahko glodavcev znebite v 35 dneh. Iz informacij o proizvodu (tj. etiketa in/ali letak) mora biti jasno razvidno **priporočilo**, da mora uporabnik v primeru **pričakovanega** pomanjkanja učinkovitosti do konca obdobja učinkovanja (tj. aktivnost glodavcev je še vedno prisotna) pri dobavitelju proizvoda povprašati za nasvet ali poklicati službo za zatiranje škodljivcev.

- Med tretiranjem ne umivajte postaj za nastavljanje vab z vodo.
- Odstranite poginule glodavce v skladu z nacionalno zakonodajo

Splošni uporabniki

Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (v čim **večji** meri zamašite luknje, odstranite morebitno hrano in **pijačo**), da se izboljša zaužitje proizvoda in zmanjša verjetnost ponovne invazije.

- Antikoagulacijskih rodenticidov ne uporabljajte kot stalne vabe (npr. za **preprečevanje** napada glodavcev ali odkrivanje njihove aktivnosti).

Iz informacij o proizvodu (tj. etiketa in/ali letak) mora biti jasno razvidno, da:

- se mora proizvod uporabljati v postajah, **zaščitenih** pred zunanjimi dejavniki;
- morajo uporabniki pravilno **označiti** postaje z informacijami iz poglavja 5.3 povzetka **značilnosti** proizvoda (npr. **označevanje** postaj v skladu s **priporočili** za proizvod).

- Z uporabo tega proizvoda naj bi glodavce odstranili v 35 dneh. Iz informacij o proizvodu (tj. etiketa in/ali letak) mora biti jasno razvidno **priporočilo**, da mora uporabnik v primeru **pričakovanega** pomanjkanja učinkovitosti do konca obdobja učinkovanja (tj. aktivnost glodavcev je še vedno prisotna) pri dobavitelju proizvoda povprašati za nasvet ali poklicati službo za zatiranje škodljivcev (DDD služba).

- **Poiščite** in odstranite poginule glodavce med obdobjem učinkovanja vsaj tako pogosto, kot preverjate postaje.
- Poginule glodavce zapakirajte v dvojno **plastično vrečko** in odstranite kot komunalni odpadek.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Za poklicne in splošne uporabnike:

Ta proizvod vsebuje antikoagulant. Če ga zaužijete, se lahko, tudi z zakasnitvijo, pojavijo simptomi, ki lahko vključujejo krvavitve iz nosu in dlesni. V resnih primerih lahko nastanejo podplutbe ali se pojavi kri v blatu ali urinu.

- Antidot: Vitamin K1, ki ga sme dajati samo zdravstveno/veterinarsko osebje.

- V primeru:

- izpostavljenosti kože, umijte kožo z vodo in nato z vodo in milom.

- izpostavljenosti oči, izpirajte oči s tekočino za izpiranje oči ali vodo, veke držite odprte najmanj 10 minut.

- oralne izpostavljenosti, previdno izperite usta z vodo. Nezavestni osebi ne dajajte ničesar v usta. Ne izzivajte bruhanja. Če proizvod pogoltnete, nemudoma poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo proizvoda. Če proizvod zaužije žival, se obrnite na veterinarja [...].

Postaje morajo biti označene z naslednjimi informacijami: „Ne premikajte in ne odpirajte.“; „Vsebuje rodenticid.“; „ime proizvoda in številka odobritve“; „aktivne snovi“ in „V primeru zaužitja poiščite zdravniško pomoč ali pokličite 112.“.

- Nevarno za divje živali.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Po končanem obdobju tretiranja odstranite nezaužito vabo in embalažo v skladu z nacionalno zakonodajo s področja ravnanja z odpadki.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hranite na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hranite v zaprti posodi, stran od direktne sončne svetlobe.

Hranite na mestih, kamor nimajo dostopa otroci, ptice, hišne in domače živali.

Rok uporabnosti: 2 leti

Poglavje 6. DRUGE INFORMACIJE

- Zaradi zakasnitve delovanja se učinkovitost antikoagulacijskih rodenticidov pokaže v obdobju od 4 do 10 dni po zaužitju vabe.
- Glodavci so lahko prenašalci bolezni. Ne dotikajte se poginulih glodavcev z golimi rokami, ampak pri njihovem odstranjevanju uporabite rokavice ali orodje, npr. kleščice.
- Ta proizvod vsebuje grenko snov in barvilo.