

# Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

**Denumirea produsului:** AGRORAT BRODI-3 PELLETT

**Tipul (tipurile) de produs (produse):** TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

**Numărul curent:** RO/2020/0260MRS/ES/BB(MR)-2019-14-00606

**Numărul curent R4BP 3:** RO-0026768-0000

## Cuprins

Informații administrative	1
1.1. Denumirea comercială a produsului	1
1.2. Detinatorul autorizației	1
1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide	1
1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active	2
2. Compoziția și formularea produsului	2
2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid	2
2.2. Tipul preparatului	2
3. Fraze de pericol și de precauție	2
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)	3
5. Direcții generale de utilizare	18
5.1. Instrucțiuni de utilizare	18
5.2. Măsuri de reducere a riscurilor	20
5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	22
5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia	22
5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	22
6. Alte informații	23

## Informații administrative

### 1.1. Denumirea comercială a produsului

AGRORAT BRODI-3 PELLET
TOXIRAT BRODY PLUS 30

### 1.2. Detinatorul autorizației

<b>Numele și adresa detinatorului autorizației</b>	Numele	Laboratorios Agrochem S.L.
	Adresa	C/Tres Rieres, 10 - Pol. Ind. Sud 08292 Esparreguera Spania
<b>Numărul curent</b>	RO/2020/0260MRS/ES/BB(MR)-2019-14-00606	
<b>Numărul curent R4BP 3</b>	RO-0026768-0000	
<b>Data autorizației</b>	21/05/2019	
<b>Data de expirare a autorizației</b>	01/07/2024	

### 1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

<b>Numele producatorului</b>	LABORATORIOS AGROCHEM S.L
<b>Adresa producătorului</b>	Tres Rieres, 10 Pol Ind. Sur 08292 Esparreguera Spania
<b>Adresa locurilor de producție</b>	Tres Rieres, 10 Pol. Ind. Sur 08292 Esparreguera Spania

<b>Numele producatorului</b>	SC AGROSEM ZAHIU ECOFITOPLANT S.R.L.
<b>Adresa producătorului</b>	Sat Pitulicea, Comuna Godeanu Sarat, Pitulicea, nr. 200 127258 Judet Buzau România
<b>Adresa locurilor de producție</b>	Sat Pitulicea, Comuna Godeanu Sarat, Pitulicea, nr. 200 127258 Judet Buzau România

#### 1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

<b>Substanța activă</b>	11 - Brodifacum
<b>Numele producătorului</b>	Activa s.r.l
<b>Adresa producătorului</b>	via Feltre 32 20132 Milano Italia
<b>Adresa locurilor de producție</b>	Tezza S.r.l - via Tre Ponti 22 37050 S. Maria Di Zevio Italia

## 2. Compoziția și formularea produsului

### 2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Brodifacum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Substanța activă	56073-10-0	259-980-5	0,0025

### 2.2. Tipul preparatului

RB - Bait (gata de utilizare)

## 3. Fraze de pericol și de precauție

**Fraze de pericol**

Poate provoca leziuni ale organelor (blood) în caz de expunere prelungită sau repetată.

**Fraze de precauție**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați imediat POISON CENTER or a doctor.

ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: Consultați medicul.

Aruncați conținutul la according to the national rules.

**4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)****4.1 Modul de utilizare****Utilizarea 1 - Utilizați numărul 1 - Șoareci obișnuiți - Public general - Interior****Tipul produsului**

TP 14 - Rodenticide

**Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz**

Nu este relevant pentru rozătoare

**Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)**

denumirea științifică: Mus musculus  
denumirea comună: House mouse  
etapă de dezvoltare: juveniles to adults

**Domeniul de utilizare**

de interior

**Metoda (metodele) de aplicare**

Metoda: cerere momeală  
Descriere detaliată:  
Momeală de peletă pungă, pregătită pentru utilizarea în momeli rezistente la modificări.

**Doza (dozele) și frecvența de aplicare**

Frecvența de aplicare: 20 - 40 grame momeală pe suport de momeală  
Diluare (%): 0  
Numărul și calendarul de aplicare:  
20 - 40 de grame de momeală pe momeală. Dacă trebuie utilizată mai mult de o momeală, distanța minimă între momeli va fi de 5 metri

**Categoria (categoriile) de utilizatori**

Publicul larg (neprofesionist)

**Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare**

Dimensiunea maximă a containerului: Până la 50 g

Numărul de suporturi de momeală și / sau reumplere pentru fiecare container: Până la 50 g

Grame de momeală pe suport de momeală și / sau reumplere: Sachets de 10, 15 și 20 g.

#### 4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Purtătorii de momeli trebuie verificați cel puțin o dată la 2-3 zile la începutul tratamentului și cel puțin o dată pe săptămână după aceea pentru a verifica acceptarea momecii, ca suporturile de momeală să fie intacte și să îndepărteze rozătoarele moarte. Reîncărcați suportul momeală atunci când este necesar.

Mănuși sunt recomandate publicului larg

Vezi secțiunea 5.1.

#### 4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Vezi secțiunea 5.2.

#### 4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Vezi secțiunea 5.3.

#### 4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Vezi secțiunea 5.4.

#### 4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vezi secțiunea 5.5

## 4.2 Modul de utilizare

### Utilizarea 2 - Utilizați numărul 2 - Șobolani - Public general - Interior

<b>Tipul produsului</b>	TP 14 - Rodenticide
<b>Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz</b>	Nu este relevant pentru rozătoare
<b>Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)</b>	denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: other
<b>Domeniul de utilizare</b>	de interior
<b>Metoda (metodele) de aplicare</b>	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală de peletă pungă, pregătită pentru utilizarea în momeli rezistente la modificări.
<b>Doza (dozele) și frecvența de aplicare</b>	Frecvența de aplicare: 100 g - 200 g per stație de momeală .. Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare:  100 - 200 gramos de cebo por portacebo. Si se necesita utilizar más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 5 metros
<b>Categoria (categoriile) de utilizatori</b>	

#### **Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare**

Publicul larg (neprofesionist)

Dimensiunea maximă a containerului: Până la 150 g  
Numărul de suporturi de momeală și / sau reumplere pentru fiecare container: Până la 150 g  
Grame de momeală pe suport de momeală și / sau reumplere: Sachets de 10, 15 și 20 g.  
Material de ambalare: PE / aluminiu / poliester

#### **4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare**

Purtătorii de momeli trebuie verificați la 5 - 7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin o dată pe săptămână după aceea pentru a verifica acceptarea momecii, ca suporturile de momeală să fie intacte și să îndepărteze rozătoarele moarte. Reîncărcați suportul momeală atunci când este necesar.

Mănuși sunt recomandate publicului larg  
Vezi secțiunea 5.1.

#### **4.2.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare**

Vezi secțiunea 5.2.

#### **4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Vezi secțiunea 5.3.

#### **4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia**

Vezi secțiunea 5.4.

#### **4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**



Vezi secțiunea 5.5.

#### 4.3 Modul de utilizare

##### Utilizarea 3 - Utilizați numărul 3 - Șobolani - Public general - În jurul clădirilor

<b>Tipul produsului</b>	TP 14 - Rodenticide
<b>Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz</b>	Nu este relevant pentru rozătoare
<b>Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)</b>	denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: other
<b>Domeniul de utilizare</b>	Altele În jurul clădirilor
<b>Metoda (metodele) de aplicare</b>	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală de peleți gata de utilizare pentru a fi utilizată în stațiile de momeală rezistente la modificări.
<b>Doza (dozele) și frecvența de aplicare</b>	Frecvența de aplicare: 100-200 grame de momeală pe suport de momeală Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: 100-200 grame de momeală pe suport de momeală. Dacă trebuie utilizată mai mult de o momeală, distanța minimă între momeli va fi de 5 metri
<b>Categoria (categoriile) de utilizatori</b>	Publicul larg (neprofesionist)
<b>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</b>	100-200 grame de momeală pe suport de momeală. Dacă trebuie utilizată mai mult de o momeală, distanța minimă între momeli va fi de 5 metri

#### 4.3.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Așezați cutia de momeală în zonele care nu sunt inundate.  
Înlocuiți momelile care au fost deteriorate de apă sau contaminate de murdărie.  
Purtătorii de momeli trebuie verificați la 5 - 7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin o dată pe săptămână după aceea pentru a verifica acceptarea momecii, ca suporturile de momeală să fie intacte și să îndepărteze rozătoarele moarte. Reîncărcați suportul momeală atunci când este necesar.  
Mănuși sunt recomandate publicului larg  
Vezi secțiunea 5.1.

#### 4.3.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Vezi secțiunea 5.2.

#### 4.3.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Vezi secțiunea 5.3.

#### 4.3.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Vezi secțiunea 5.4.

#### 4.3.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vezi secțiunea 5.5.

### 4.4 Modul de utilizare

#### Utilizarea 4 - Utilizați numărul 4 - Șoareci obișnuiți - Profesioniști - interiori

<b>Tipul produsului</b>	TP 14 - Rodenticide
<b>Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz</b>	Nu este relevant pentru rozătoare
<b>Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)</b>	denumirea științifică: Mus musculus denumirea comună: House mouse etapă de dezvoltare: other
<b>Domeniul de utilizare</b>	de interior
<b>Metoda (metodele) de aplicare</b>	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală de peleți gata de utilizare pentru a fi utilizată în stațiile de momeală rezistente la modificări.

**Doza (dozele) și frecvența de aplicare**

Frecvența de aplicare: 20 g - 40 g momeală de peleți per punct de momeală.  
Diluare (%): 0  
Numărul și calendarul de aplicare:  
20 - 40 de grame de momeală pe momeală. Dacă trebuie utilizată mai mult de o momeală, distanța minimă între momeli va fi de 5 metri

**Categoria (categoriile) de utilizatori**

profesional

**Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare**

Dimensiunea minimă a containerului de 3 kg.  
Numărul de pungi individuale pe container: Până la 25 kg.  
Gramme / kilogram de momeală pe pungă: Ambalarea este limitată la pungi ambalate individual, cu o dimensiune maximă de 10 kg.  
Material de ambalare: PE / aluminiu / poliester

**4.4.1 Instrucțiuni specifice de utilizare**

Purtătorii de momeli trebuie verificați cel puțin o dată la 2-3 zile la începutul tratamentului și cel puțin o dată pe săptămână după aceea pentru a verifica acceptarea momecii, ca suporturile de momeală să fie intacte și să îndepărteze rozătoarele moarte. Reîncărcați suportul momeală atunci când este necesar. Urmați instrucțiunile suplimentare oferite de Manualul de bune practici. Vezi secțiunea 5.1.

**4.4.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare**

Vezi secțiunea 5.2.

**4.4.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Când suporturile de momeală sunt amplasate în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa. Vezi secțiunea 5.3.

**4.4.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia**

Vezi secțiunea 5.4.

**4.4.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Vezi secțiunea 5.5.

## 4.5 Modul de utilizare

### Utilizarea 5 - Utilizați numărul 5 - Șobolani - Profesional - Interior

<b>Tipul produsului</b>	TP 14 - Rodenticide
<b>Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz</b>	Nu este relevant pentru rozătoare
<b>Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)</b>	denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: other
<b>Domeniul de utilizare</b>	de interior
<b>Metoda (metodele) de aplicare</b>	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală de peleți gata de utilizare pentru a fi utilizată în stațiile de momeală rezistente la modificări.
<b>Doza (dozele) și frecvența de aplicare</b>	Frecvența de aplicare: 100-200 grame de momeală pe suport de momeală Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: 100-200 grame de momeală pe suport de momeală. Dacă trebuie utilizată mai mult de o momeală, distanța minimă între momeli va fi de 5 metri
<b>Categoria (categoriile) de utilizatori</b>	profesional
<b>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</b>	Dimensiunea minimă a containerului de 3 kg. Numărul de pungi individuale pe container: Până la 25 kg. Gramme / kilogram de momeală pe pungă: Ambalarea este limitată la pungi ambalate individual, cu o dimensiune maximă de 10 kg. Material de ambalare: PE / aluminiu / poliester

#### 4.5.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Purtătorii de momeli trebuie verificați la 5 - 7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin o dată pe săptămână după aceea pentru a verifica acceptarea momecii, ca suporturile de momeală să fie intacte și să îndeplinească rozătoarele moarte. Reîncărcați suportul momeală atunci când este necesar.  
Urmați instrucțiunile suplimentare oferite de Manualul de bune practici.  
Vezi secțiunea 5.1.

#### 4.5.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Vezi secțiunea 5.2.

#### 4.5.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Când suporturile de momeală sunt amplasate în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.  
Vezi secțiunea 5.3.

#### 4.5.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Vezi secțiunea 5.4.

#### 4.5.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vezi secțiunea 5.4.

### 4.6 Modul de utilizare

#### Utilizarea 6 - Utilizați numărul 6 - Șobolani - Profesioniști - În jurul clădirilor

<b>Tipul produsului</b>	TP 14 - Rodenticide
<b>Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz</b>	Nu este relevant pentru rozătoare
<b>Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)</b>	denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: other
<b>Domeniul de utilizare</b>	Altele În jurul clădirilor
<b>Metoda (metodele) de aplicare</b>	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală de peleți gata de utilizare pentru a fi utilizată în stațiile de momeală rezistente la modificări.
<b>Doza (dozele) și frecvența de aplicare</b>	Frecvența de aplicare: 100-200 grame de momeală pe suport de momeală Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: 100-200 grame de momeală pe suport de momeală. Dacă trebuie utilizată mai mult de o momeală, distanța minimă între momeli va fi de 5 metri

**Categoria (categoriile) de utilizatori**

profesional

**Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare**

Dimensiunea minimă a containerului de 3 kg.  
Numărul de pungi individuale pe container: Până la 25 kg.  
Gramme / kilogram de momeală pe pungă: Ambalarea este limitată la pungi ambalate individual, cu o dimensiune maximă de 10 kg.  
Material de ambalare: PE / aluminiu / poliester

**4.6.1 Instrucțiuni specifice de utilizare**

Protejați momelile de condițiile atmosferice (ex: ploaie, zăpadă etc.). Așezați cutia de momeală în zonele care nu sunt inundate.

Purtătorii de momeli trebuie verificați la 5 - 7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin o dată pe săptămână după aceea pentru a verifica acceptarea momecii, ca suporturile de momeală să fie intacte și să îndepărteze rozătoarele moarte. Reîncărcați suportul momeală atunci când este necesar.

Înlocuiți momelile care au fost deteriorate de apă sau contaminate de murdărie.

Urmați instrucțiunile suplimentare oferite de Manualul de bune practici.

Vezi secțiunea 5.1.

**4.6.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare**

Nu aplicați produsul direct în grape.  
Vezi secțiunea 5.2.

**4.6.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Când suporturile de momeală sunt amplasate în apropierea apei de suprafață (de exemplu, râuri, lacuri, canale de apă, diguri, canal de irigare / șanț) sau sistemele de drenare a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.  
Vezi secțiunea 5.3.

**4.6.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia**

Vezi secțiunea 5.4.

#### 4.6.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vezi secțiunea 5.5.

#### 4.7 Modul de utilizare

##### Utilizarea 7 - Utilizați numărul 7 - Șoareci - Personal profesional specializat - Interior

<b>Tipul produsului</b>	TP 14 - Rodenticide
<b>Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz</b>	Nu este relevant pentru rozătoare
<b>Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)</b>	denumirea științifică: Mus musculus denumirea comună: House mouse etapă de dezvoltare: other
<b>Domeniul de utilizare</b>	de interior Altele În jurul clădirilor
<b>Metoda (metodele) de aplicare</b>	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală de peleți gata de utilizare pentru a fi utilizată în stațiile de momeală rezistente la modificări.
<b>Doza (dozele) și frecvența de aplicare</b>	Frecvența de aplicare: 20-40 grame momeală pe suport de momeală Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: -
<b>Categoria (categoriile) de utilizatori</b>	instruiți profesional
<b>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</b>	Dimensiunea minimă a containerului de 3 kg. Numărul de pungi individuale pe container: Până la 25 kg. Gramme / kilogram de momeală pe pungă: Ambalarea este limitată la pungi ambalate individual, cu o dimensiune maximă de 10 kg. Material de ambalare: PE / aluminiu / poliester

#### 4.7.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Eliminați excesul de produs la sfârșitul tratamentului.

Urmați instrucțiunile suplimentare oferite de Manualul de bune practici.

Vezi secțiunea 5.1.

#### 4.7.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Ori de câte ori este posibil, informați trecătorii (de exemplu, utilizatorii din sau în jurul zonei tratate) despre campania de control a rozătoarelor înainte de tratament.  
Aplicați măsuri de control preventiv (de ex. Găuri de priză, îndepărtați mâncarea și băutura cât mai mult posibil) pentru a îmbunătăți aportul de momeală și pentru a reduce probabilitatea de a fi invadată.  
Pentru a reduce riscul de intoxicații secundare, căutați și eliminați rozătoarele moarte la intervale frecvente în timpul tratamentului, în conformitate cu prevederile din Manualul de bune practici.  
Nu folosiți produsul ca momeală permanentă pentru a preveni infestările de rozătoare sau pentru a monitoriza activitatea rozătoarelor.  
Nu folosiți produsul în tratamente de amorsare a pulsului.  
Vezi secțiunea 5.2

#### 4.7.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Când suporturile de momeală sunt amplasate în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

Vezi secțiunea 5.3.

#### 4.7.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Vezi secțiunea 5.4.

#### 4.7.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vezi secțiunea 5.5.

### 4.8 Modul de utilizare

Utilizarea 8 - Utilizați numărul 8 - Șobolani - Personal profesional specializat - Interior



<b>Tipul produsului</b>	TP 14 - Rodenticide
<b>Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz</b>	Nu este relevant pentru rozătoare
<b>Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)</b>	denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: other
<b>Domeniul de utilizare</b>	de interior  -
<b>Metoda (metodele) de aplicare</b>	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală de peleți gata de utilizare pentru a fi utilizată în stațiile de momeală rezistente la modificări.
<b>Doza (dozele) și frecvența de aplicare</b>	Frecvența de aplicare: 100-200 grame de momeală pe suport de momeală Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: -
<b>Categoria (categoriile) de utilizatori</b>	instruiți profesional
<b>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</b>	Dimensiunea minimă a containerului de 3 kg. Numărul de pungi individuale pe container: Până la 25 kg. Gramme / kilogram de momeală pe pungă: Ambalarea este limitată la pungi ambalate individual, cu o dimensiune maximă de 10 kg. Material de ambalare: PE / aluminiu / poliester

#### 4.8.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Eliminați excesul de produs la sfârșitul tratamentului.

Urmați instrucțiunile suplimentare oferite de Manualul de bune practici.

Vezi secțiunea 5.1.

#### 4.8.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Ori de câte ori este posibil, informați trecătorii (de exemplu, utilizatorii din sau în jurul zonei tratate) despre campania de control a rozătoarelor înainte de tratament.  
Aplicați măsuri de control preventiv (de ex. Găuri de priză, îndepărtați mâncarea și băutura cât mai mult posibil) pentru a îmbunătăți aportul de momeală și pentru a reduce probabilitatea de a fi invadată.  
Pentru a reduce riscul de intoxicații secundare, căutați și eliminați rozătoarele moarte la intervale frecvente în timpul tratamentului, în conformitate cu prevederile din Manualul de bune practici.  
Nu folosiți produsul ca momeală permanentă pentru a preveni infestările de rozătoare sau pentru a monitoriza activitatea rozătoarelor.  
Nu folosiți produsul în tratamente de amorsare a pulsului.  
Vezi secțiunea 5.2.

#### 4.8.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Când suporturile de momeală sunt amplasate în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.  
Vezi secțiunea 5.3.

#### 4.8.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Vezi secțiunea 5.4.

#### 4.8.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vezi secțiunea 5.5.

### 4.9 Modul de utilizare

#### Utilizarea 9 - Utilizați numărul 9 - Șobolani - Personal profesional specializat - În jurul clădirilor

<b>Tipul produsului</b>	TP 14 - Rodenticide
<b>Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz</b>	Nu este relevant pentru rozătoare
<b>Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)</b>	denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: other
<b>Domeniul de utilizare</b>	Altele În jurul clădirilor
<b>Metoda (metodele) de aplicare</b>	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală de peleți gata de utilizare pentru a fi utilizată în stațiile de momeală rezistente

	la modificări.
<b>Doza (dozele) și frecvența de aplicare</b>	Frecvența de aplicare: 100-200 grame de momeală pe suport de momeală Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: -
<b>Categoria (categoriile) de utilizatori</b>	instruiți profesional
<b>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</b>	Dimensiunea minimă a containerului de 3 kg. Numărul de pungi individuale pe container: Până la 25 kg. Gramme / kilogram de momeală pe pungă: Ambalarea este limitată la pungi ambalate individual, cu o dimensiune maximă de 10 kg. Material de ambalare: PE / aluminiu / poliester

#### 4.9.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

<p>Protejați momelile de condițiile atmosferice (de exemplu, ploaie, zăpadă etc.). Așezați cutia de momeală în zonele care nu sunt inundate.</p> <p>Înlocuiți momelile care au fost deteriorate de apă sau contaminate de murdărie.</p> <p>Eliminați excesul de produs la sfârșitul tratamentului.</p> <p>Urmați instrucțiunile suplimentare oferite de Manualul de bune practici.</p> <p>Vezi secțiunea 5.1.</p>
---

#### 4.9.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

<p>Ori de câte ori este posibil, informați trecătorii (de exemplu, utilizatorii din sau în jurul zonei tratate) despre campania de control a rozătoarelor înainte de tratament.</p> <p>Aplicați măsuri de control preventiv (de ex. Găuri de priză, îndepărtați mâncarea și băutura cât mai mult posibil) pentru a îmbunătăți aportul de momeală și pentru a reduce probabilitatea de a fi invadată.</p> <p>Pentru a reduce riscul de intoxicații secundare, căutați și eliminați rozătoarele moarte la intervale frecvente în timpul tratamentului, în conformitate cu prevederile din Manualul de bune practici.</p> <p>Nu folosiți produsul ca momeală permanentă pentru a preveni infestările de rozătoare sau pentru a detecta activitatea rozătoarelor.</p> <p>Nu folosiți produsul în tratamente de amorsare a pulsului.</p> <p>Nu aplicați produsul direct în grape.</p> <p>Vezi secțiunea 5.2</p>
--

### **4.9.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Când suporturile de momeală sunt amplasate în apropierea apei de suprafață (de exemplu, râuri, lacuri, căi navigabile, diguri, canal de irigație / șanț) sau sistemele de drenare a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.  
Vezi secțiunea 5.3.

### **4.9.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia**

Vezi secțiunea 5.4.

### **4.9.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Vezi secțiunea 5.5.

## **5. Direcții generale de utilizare**

### **5.1. Instrucțiuni de utilizare**

## Publicul larg

Citiți și urmați informațiile despre produs, precum și orice alte informații care însoțesc produsul sau furnizate la punctul de vânzare înainte de a-l utiliza.

Înainte de a utiliza produse cu rozătoare, se recomandă utilizarea unor metode non-chimice (de exemplu capcane).

Îndepărtați alimentele ușor disponibile rozătoarelor (de exemplu, cereale libere sau reziduuri alimentare). În afară de aceasta, nu curățând zona care trebuie tratată chiar înainte de tratament, acest lucru va deranja doar rozătoarele și acceptarea momealelor va fi mai dificil de realizat.

Purtătorii de momeli trebuie să fie așezați în imediata apropiere a locurilor în care s-a observat activitatea rozătoarelor (zone de tranzit, situri de cuibărire, pâcuri, găuri, burcuri ...)

Când este posibil, cutia de momeală trebuie să fie atașată la sol sau la alte structuri.

Nu deschideți punga care conține momeala.

Așezați suporturile de momeală la îndemâna copiilor, păsărilor, animalelor de companie, animalelor de fermă și altor animale pentru care produsul nu este destinat.

Nu trebuie aplicat în zonele în care produsele alimentare / furajele, băuturile, ustensilele de bucătărie sau suprafețele de prelucrare a alimentelor pot intra în contact cu sau pot fi contaminate de produs.

Nu așezați suporturile de momeală în apropierea sistemelor de scurgere a apei unde momeala poate intra în contact cu apa.

În timpul utilizării produsului, nu mâncați, nu beți și nu fumați. Spălați mâinile și zonele de piele expuse după utilizarea produsului.

Îndepărtați excesul de momeală și suport de momeală la sfârșitul tratamentului

## Profesionist

Citiți și urmați informațiile despre produs, precum și orice alte informații care însoțesc produsul sau furnizate la punctul de vânzare înainte de a-l utiliza.

Efectuați o anchetă de pretratare a zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica speciile de rozătoare, zonele lor de activitate și a determina cauza și întinderea infestării.

Îndepărtați alimentele ușor disponibile rozătoarelor (de exemplu, cereale libere sau reziduuri alimentare). În afară de aceasta, nu curățând zona care trebuie tratată chiar înainte de tratament, acest lucru va deranja doar rozătoarele și acceptarea momealelor va fi mai dificil de realizat.

Produsul trebuie utilizat ca parte a unui plan cuprinzător de combatere a dăunătorilor, incluzând, fără a se limita la, măsuri de igienă și, dacă este posibil, metode de control fizic.

Aplicați măsuri de control preventiv (de exemplu, găuri de priză, îndepărtați mâncarea și băutura cât mai mult posibil) pentru a îmbunătăți aportul de momeală și pentru a reduce probabilitatea de reavașare.

Purtătorii de momeli trebuie să fie așezați în imediata apropiere a locurilor unde s-a observat activitatea rozătoarelor (zone de tranzit, situri de cuibărire, pâcuri, găuri, burcuri ...).

Când este posibil, suportul de momeală trebuie atașat la sol sau la alte structuri

Purtătorii de momeli trebuie să fie etichetați clar pentru a indica faptul că conțin produs rodenticid și nu trebuie mutați sau deschiși (Vezi secțiunea 5.3. Pentru informații care trebuie incluse pe etichetă).

Atunci când produsul este utilizat în zonele publice, zonele tratate trebuie marcate în perioada de tratament și un semn explicativ ar trebui să informeze despre riscul de intoxicații anticoagulante primare și secundare, precum și despre măsurile de prim ajutor.

Momețele trebuie să fie asigurate pentru a nu fi târâte din momeală.

Așezați suporturile de momeală la îndemâna copiilor, păsărilor, animalelor de companie, animalelor de fermă și altor animale pentru care produsul nu este destinat.

Nu trebuie aplicat în zonele în care produsele alimentare / furajele, băuturile, ustensilele de bucătărie sau suprafețele de prelucrare a alimentelor pot intra în contact cu sau pot fi contaminate de produs.

Purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice în faza de manipulare (materialul mănușii trebuie furnizat de către deținătorul autorizației în informațiile despre produs).

În timpul utilizării produsului, nu mâncați, nu beți și nu fumați. Spălați mâinile și zonele de piele expuse după utilizarea produsului

Dacă cantitatea de momeală ingerată este mică în raport cu dimensiunea aparentă a infestării, trebuie luată în considerare plasarea mai multor momeli și posibilitatea de a trece la o altă formulare de momeală.

Dacă după o perioadă de tratament de 35 de zile, momelile continuă să fie consumate și activitatea rozătoarelor nu scade, trebuie stabilită cauza. Când au fost excluse alte elemente, rozătoarele rezistente ar putea fi nevoite să ia în considerare utilizarea unui

rodenticid non-anticoagulant sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic. Utilizarea capcanelor trebuie, de asemenea, considerată o măsură alternativă de control.

Îndepărtați excesul de momeală și suport de momeală la sfârșitul tratamentului

Pentru momeală împachetată în pelete: Nu deschideți punga care conține momeala

Pentru peleți deschiși: așezați momeala în suportul momeții folosind un distribuitor. Specificați metodele de minimizare a prafului (de exemplu, pânză umedă).

Personal profesionist specializat

Citiți și urmați informațiile despre produs, precum și orice alte informații care însoțesc produsul sau furnizate la punctul de vânzare înainte de a-l utiliza.

Efectuați o anchetă de pretratare a zonei infestată și o evaluare la fața locului pentru a identifica speciile de rozătoare, zonele lor de activitate și a determina cauza și întinderea infestării.

Îndepărtați alimentele ușor disponibile rozătoarelor (de exemplu, cereale libere sau reziduuri alimentare). În afară de aceasta, nu curățând zona care trebuie tratată chiar înainte de tratament, acest lucru va deranja doar rozătoarele și acceptarea momealelor va fi mai dificil de realizat.

Produsul trebuie utilizat ca parte a unui plan cuprinzător de combatere a dăunătorilor, incluzând, fără a se limita la, măsuri de igienă și, dacă este posibil, metode de control fizic.

Produsul trebuie plasat în imediata apropiere a locurilor în care a fost observată activitatea rozătoarelor (zone de tranzit, situri de cuibărire, pâlcuri, găuri, burule ...).

Când este posibil, suportul de momeală trebuie atașat la sol sau la alte structuri

Purtătorii de momelă trebuie să fie etichetați clar pentru a indica faptul că conțin rodenticide și nu trebuie mutați sau deschiși (Vezi secțiunea 5.3. Pentru informații care trebuie incluse pe etichetă).

Atunci când produsul este utilizat în zonele publice, zonele tratate ar trebui marcate în perioada de tratament și un semn explicativ ar trebui să informeze despre riscul de intoxicații anticoagulante primare și secundare, precum și despre măsurile de prim ajutor.

Momețele trebuie să fie asigurate pentru a nu fi târâte din momeală.

Plasarea momelilor la îndemâna copiilor, păsărilor, animalelor de companie, animalelor de fermă și a altor animale care nu vizează

Nu trebuie aplicat în zonele în care produsele alimentare / furajele, băuturile, ustensilele de bucătărie sau suprafețele de prelucrare a alimentelor pot intra în contact cu sau pot fi contaminate de produs.

Purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice în faza de manipulare (materialul mănușii trebuie furnizat de către deținătorul autorizației în informațiile despre produs) în timpul utilizării produsului, nu mâncați, nu beți și nu fumați. Spălați mâinile și zonele de piele expuse după utilizarea produsului

Frecvența vizitelor în zonele tratate ar trebui să fie la discreția solicitantului, pe baza sondajelor efectuate la începutul tratamentului.

Această frecvență trebuie să fie în concordanță cu recomandările oferite de Manualul de bune practici.

Dacă cantitatea de momeală ingerată este mică în raport cu dimensiunea aparentă a infestării, trebuie luată în considerare plasarea mai multor momeli și posibilitatea de a trece la o altă formulare de momeală.

Dacă după o perioadă de tratament de 35 de zile, momelile continuă să fie consumate și activitatea rozătoarelor nu scade, trebuie stabilită cauza. Când au fost excluse alte elemente, rozătoarele rezistente ar putea fi nevoite să ia în considerare utilizarea unui rodenticid non-anticoagulant sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic. Utilizarea capcanelor trebuie, de asemenea, considerată o măsură alternativă de control.

Pentru momeală împachetată în pelete: Nu deschideți punga care conține momeala

Pentru peleți deschiși: așezați momeala în suportul momeții folosind un distribuitor. Specificați metodele de minimizare a prafului (de exemplu, pânză umedă).

## 5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

## Publicul larg

Aplicați măsuri de control preventiv (de exemplu, găuri de priză, îndepărtați mâncarea și băutura cât mai mult posibil) pentru a îmbunătăți aportul de momeală și pentru a reduce probabilitatea de revașare.

Nu folosiți produsul ca momeală permanentă pentru a preveni infestările de rozătoare sau pentru a detecta activitatea rozătoarelor.

Informațiile despre produs (ex: etichetă și / sau broșură) trebuie să indice clar:

- Produsul va fi utilizat în momeli rezistente la modificări (de exemplu, „utilizați numai în momeli rezistente la modificări”).
- Utilizatorii trebuie să eticheteze corect suporturile de momeală cu informațiile incluse în secțiunea 5.3. din SPC (de exemplu: „etichetați suporturile de momeală conform recomandărilor produsului”).

Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informațiile despre produs (ex: etichetă și / sau broșură) ar trebui să recomande ca, în caz de suspiciune de lipsă de eficacitate la sfârșitul tratamentului (ex: activitatea rozătoarelor este încă respectată), utilizatorul ar trebui să contacteze furnizorul produsului sau să apeleze la un serviciu de combatere a dăunătorilor.

Căutați și îndepărtați rozătoarele moarte în timpul tratamentului, cel puțin ori de câte ori sunt verificate suporturile de momeală.

Elimină rozătoarele moarte ca deșeuri periculoase în conformitate cu prevederile ordonanțelor municipale.

## Profesionist

Ori de câte ori este posibil, informați trecătorii (de exemplu, utilizatorii zonei tratate sau împrejurimile sale) despre campania de control a rozătoarelor înainte de tratament (în conformitate cu codul de bune practici aplicabil, dacă este cazul).

Pentru a reduce riscul de intoxicații secundare, căutați și eliminați rozătoarele moarte la intervale frecvente în timpul tratamentului (de exemplu, cel puțin de două ori pe săptămână) (dacă este cazul, specificați dacă este necesară o inspecție mai frecventă sau zilnică).

Produsele nu trebuie utilizate mai mult de 35 de zile fără o evaluare a stării infestării și a eficacității tratamentului.

Nu folosiți momeli care conțin substanțe active anticoagulante ca momeli permanente pentru prevenirea infestărilor cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor.

Informațiile despre produs (ex: etichetă și / sau broșură) trebuie să indice clar:

- Produsul nu trebuie furnizat publicului larg (de exemplu: „numai pentru profesioniști”).
- Produsul va fi utilizat în momeli rezistente la modificări (de exemplu, „utilizați numai în momeli rezistente la modificări”).
- Utilizatorii trebuie să eticheteze corect suporturile de momeală cu informațiile incluse în secțiunea 5.3. din SPC (de exemplu: „etichetați suporturile de momeală conform recomandărilor produsului”).

Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informațiile despre produs (ex: etichetă și / sau broșură) ar trebui să recomande ca, în caz de suspiciune de lipsă de eficacitate la sfârșitul tratamentului (ex: activitatea rozătoarelor este încă respectată), utilizatorul ar trebui să contacteze furnizorul produsului sau să apeleze la un serviciu de combatere a dăunătorilor.

Nu spălați suportul de momeală cu apă între aplicații.

Elimină rozătoarele moarte ca deșeuri periculoase în conformitate cu prevederile ordonanțelor municipale.

## Profesionist specializat

Ori de câte ori este posibil, informați trecătorii despre campania de control a rozătoarelor înainte de tratament (în conformitate cu codul de bune practici aplicabil, dacă există).

Informațiile despre produs (ex: etichetă și / sau broșură) vor indica în mod clar că produsul va fi furnizat numai utilizatorilor profesioniști specializați care au un certificat de pregătire. (de exemplu, "numai pentru personal profesional specializat").

Nu folosiți în zonele în care este suspectată rezistența la substanța activă.

Produsele nu trebuie utilizate mai mult de 35 de zile fără o evaluare a stării infestării și a eficacității tratamentului (cu excepția cazului în care se autorizează amorsarea permanentă).

Nu alternați utilizarea diferitelor substanțe active anticoagulante cu potențe comparabile sau mai mici pentru a gestiona rezistența.

Dacă este alternată, luați în considerare utilizarea rozătoarelor non-anticoagulante, dacă există, sau un rodenticid anticoagulant mai puternic.

Nu spălați suportul de momeală sau alte ustensile utilizate în punctele de momeală acoperite sau protejate cu apă între aplicații.

Eliminați rozătoarele moarte printr-un gestionar autorizat de deșeuri periculoase, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Incinerarea este recomandată ca metodă de tratament.

### 5.3. Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Acest produs conține o substanță anticoagulantă. În caz de ingestie, simptomele pot deveni evidente în 72 de ore. Manifestările clinice pot include sângerare din nas și gingii. În cazuri severe, pot fi vântăți și sânge în scaun sau urină.

Antidot: Vitamina K1 administrată numai de personalul medical / veterinar.

În caz de :

- Expunere dermică, spălați pielea cu apă și apoi cu săpun și apă.
  - Expunerea ochilor, verificați întotdeauna prezența lentilelor de contact și îndepărtați-le, clătiți ochii cu lichid pentru a clăti ochii sau apă, mențineți ochii deschiși cel puțin 10 minute.
  - Expunere orală, clătiți gura cu grijă cu apă. Nu da nimic pe gură unei persoane inconștiente. Nu provocați vomă. În caz de înghițire, solicitați sfatul medicului, țineți eticheta sau recipientul aproape la îndemână și consultați SERVICIUL DE INFORMAȚII TOXICOLOGICE (telefon 91 562 04 20). Luați legătura cu un veterinar în cazul în care un animal de companie îl înghită.
- Deținătorii de momeli trebuie să fie etichetați cu următoarele informații: „nu vă mișcați și nu deschideți”; „Conține un rodenticid”; „Numele produsului sau numărul autorizației”; „Substanță (substanțe) active (e)”; „În caz de accident, sunați la SERVICIUL DE INFORMAȚII TOXICOLOGICE (telefon 91 562 04 20)”

### 5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Mănuși sunt recomandate publicului larg.

Public general și profesionist

- La sfârșitul tratamentului, aruncați momeala neconsumată și containerul ca deșeuri periculoase, în conformitate cu prevederile ordonanțelor municipale.

Pe eticheta suportului de momeală se indică următoarele:

- Eliminați suporturile de momeală, la sfârșitul vieții utile, ca deșeuri periculoase, în conformitate cu prevederile ordonanțelor municipale.

Profesionist specializat

- La sfârșitul tratamentului, eliminați momeala și recipientul neconsumate printr-un gestionar autorizat de deșeuri periculoase, în conformitate cu reglementările în vigoare.

- Incinerarea este recomandată ca metodă de tratament.

Pe eticheta suportului de momeală se indică următoarele:

- Eliminați suporturile de momeală, la sfârșitul vieții utile, printr-un gestionar autorizat de deșeuri periculoase, în conformitate cu reglementările actuale.

### 5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

- Depozitați într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Păstrați recipientul închis și ferit de lumină.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor, a păsărilor, a animalelor de companie și a animalelor de fermă.

Produsul este stabil de 2 ani



## 6. Alte informații

Datorită modului de acțiune întârziat, rodenticidele anticoagulante pot dura 4 până la 10 zile pentru a deveni eficiente după consumarea momecii.

Rozătoarele sunt transmitatoare ale bolilor. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâinile goale, nu folosiți mănuși sau ustensile precum penseta pentru îndepărtarea lor.

Acest produs conține un agent de amărăciune și un colorant.

Definiții de interes în contextul folosirii în Spania a rozătoarelor anticoagulante:

Personalul neprofesional (publicul general) este considerat a fi utilizatori non-profesioniști care aplică produsul în contextul vieții lor private.

Personalul profesional este acela care își desfășoară activitatea profesională în mediul animalelor sau în activități strâns legate de exploatarea lor.

Solicitantul de produse biocide, care a beneficiat de instruire specifică în controlul rodenticidelor, este considerat personal profesionist specializat, în conformitate cu legislația în vigoare.

Date necesare după autorizare:

Titularul autorizației trebuie să informeze autoritățile competente înainte de următoarea reînnoire a produsului despre orice incident pe care îl suspectează că s-a produs cu faună sălbatică, animale domestice sau animale care ar fi putut fi cauzate de utilizarea produsului. Datele pot fi colectate de la clinici veterinare, ONG-uri pentru protecția animalelor sau reclamații ale cetățenilor.