



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
Ufficio I - Affari generali e prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

I.5.i.d.2/1038

0048682-04/09/2018
Ministero della Salute - DGDMF - MDS - P

DGDMF

0048682-P-04/09/2018
I.5.i.d.2/2017/1038



Spett.le
ZAPI S.p.A.
Via Terza Strada, 12
35026 Conselve (Padova)

**OGGETTO: Prodotto biocida BRODITEC WB-25
Trasmissione decreto di modifica autorizzazione**

Si trasmette, in allegato, il D.D. di modifica del 4 SET 2018 relativo al prodotto biocida indicato in oggetto AUT. N. **IT/2018/000481-0000/AUT**.


Si richiama l'attenzione in merito a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione del 19 luglio 2016 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che troverà applicazione nei tempi previsti dall'articolo 2 del medesimo regolamento.

“Si rammenta, inoltre, che codesta Società ha l'obbligo, ex art. 5 del decreto del Ministro della Salute del 10 febbraio 2015 recante: “Disciplina dell'iter procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell'autorità competente previsti dal Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi” (G.U. Serie Generale, n. 106 del 09/05/2015), di adeguare autonomamente gli stampati del prodotto alla vigente normativa in materia di etichettatura e alle sue eventuali modifiche.”

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dr.ssa Paola D'Alessandro

Referente tecnico: Francesca Ravaioli 06.5994 3085
email: f.ravaioli@sanita.it

Referente amministrativo: D'Amico Nina 06.5994 3806
email: n.damico@sanita.it



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Ufficio I – Affari Generali e prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici

I.S.i.d./2012/1038

IT/2018/00481/AUT

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 15 della Legge n. 97 del 06 agosto 2013 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013";

VISTO il Regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso del biocidi;

VISTO il Regolamento di esecuzione del 18 aprile 2013 n.354/2013 recante il Regolamento sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del Regolamento (UE) n.528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1381 della Commissione del 25 luglio 2017 che rinnova l'approvazione del **BRODIFACOUM** come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14";

VISTO il decreto datato 8 marzo 2018 n.IT/2018/00481/AUT, con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio del prodotto biocida denominato **BRODITEC WB-25** esca rodenticida in blocco paraffinato pronta all'uso, per uso non professionale e professionale (professionisti);

ATTESO che la titolarità del biocida predetto è attualmente attribuita alla società **ZAPI S.p.A.** con sede legale in Via Terza Strada 35026 Conselve Padova. Codice Fiscale n.01143740288;

VISTA l'istanza su Registro R4BP3 con case number bc-PA039736-41 con cui la suddetta Società ZAPI S.p.A. ha chiesto la modifica amministrativa dell'autorizzazione, relativa all'aggiunta dei nomi: **PROTEMAX BLOCCO BF, RODIMOND BF BLOCCO, ALBAROD BF BLOCCO** alle denominazioni già precedentemente autorizzata del prodotto biocida **BRODITEC WB-25, BRODITOP NEXT 25, BRODITOP NEXT BLOCK 25, BRODITOP SENSITIVE BLOCK 25, ZED BF BLOCK 25, DEVILTOP SENSITIVE BLOCK 25, RODIBROD SENSITIVE BLOCK 25;**

VISTA la documentazione presentata dalla società richiedente a sostegno della suddetta istanza:

RITENUTA la conformità di detta documentazione alla normativa vigente in materia di immissione sul mercato di biocidi;

DECRETA:

L'autorizzazione del prodotto biocida è così modificata:

DENOMINAZIONI	BRODITEC WB-25, BRODITOP NEXT 25, BRODITOP NEXT BLOCK 25, BRODITOP SENSITIVE BLOCK 25, ZED BF BLOCK 25, DEVILTOP SENSITIVE BLOCK 25, RODIBROD SENSITIVE BLOCK 25, PROTEMAX BLOCCO BF, RODIMOND BF BLOCCO, ALBAROD BF BLOCCO;
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sede legale ▪ Direzione commerciale 	ZAPI S.p.A. Via Terza Strada. 12 35026 Conselve (PD)



OFFICINA DI PRODUZIONE	ZAPI S.p.A. Via Terza Strada, 12 35026 Conselve (Padova)
SOSTANZA ATTIVA	BRODIFACOUM (CAS N. 56073-10-0)
PT	14
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	Esca rodenticida in blocco paraffinato pronta all'uso
CONFEZIONI/TAGLIE	Confezioni: per le taglie e confezioni autorizzate, fare riferimento all'SPC.
CATEGORIA DI UTILIZZATORI	Per uso non professionale, professionale (professionisti)
STABILITÀ DEL PRODOTTO	24 mesi
NUMERO DI AUTORIZZAZIONE	IT/2018/00481/AUT
ASSET Number	IT/0019018-0000
SCADENZA AUTORIZZAZIONE	5 anni dalla data del presente decreto 31-12-2022

È approvato e fa parte integrante del presente decreto il sommario delle caratteristiche del prodotto (allegato 1) con cui il biocida è immesso sul mercato.

Si allega copia delle etichette. Le modifiche a tali etichette non rientranti tra quelle indicate nell'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n.354/2013 della Commissione del 18 aprile 2013, possono essere apportate dalla società titolare autonomamente e sotto la propria responsabilità (allegato 2).

Il prodotto biocida **BRODITEC WB-25, BRODITOP NEXT 25, BRODITOP NEXT BLOCK 25, BRODITOP SENSITIVE BLOCK 25, ZED BF BLOCK 25, DEVILTOP SENSITIVE BLOCK 25, RODIBROD SENSITIVE BLOCK 25, PROTEMAX BLOCCO BF, RODIMOND BF BLOCCO, ALBAROD BF BLOCCO** rimane registrato al progressivo numerico IT/2018/00481/AUT e continuerà ad essere prodotto presso l'officina indicata con la medesima composizione autorizzata.

L'esatto nome del biocida, alternativamente in una delle denominazioni autorizzate come sopra, dovrà comunque essere individuabile attraverso una colorazione e caratteri unici in contrasto con le eventuali colorazioni e caratteri usati nel testo degli stampati.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto viene redatto in duplice originale, di cui un esemplare è notificato in via amministrativa alla ditta interessata e l'altro è conservato agli atti.

Roma, lì - 4 SET. 2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
D.ssa Paola Alessandro





Summary of product characteristics for a biocidal product

1. Administrative information

1.1. Trade names of the product

Market area	Trade name(s)
Italy	BRODITEC WB-25
Italy	BRODITOP NEXT 25
Italy	BRODITOP NEXT BLOCK 25
Italy	BRODITOP SENSITIVE BLOCK 25
Italy	ZED BF BLOCK 25
Italy	DEVILTOP SENSITIVE BLOCK 25
Italy	RODIBROD SENSITIVE BLOCK 25
Italy	PROTEMAX BLOCCO BF
Italy	RODIMOND BF BLOCCO
Italy	ALBAROD BF BLOCCO

1.2. Authorisation holder

Authorisation number

Not defined

Date of the authorisation

Not defined

Expiry date of the authorisation

Not defined

Name and address of the authorisation holder

Name

Not defined

Address

Not defined

1.3. Manufacturers of the product

Name of the manufacturer	Zapi S.p.A.			
Address of the manufacturer	Via Terza Strada 12	35026	Conselve	Italy
Location of manufacturing sites	Via Terza Strada 12	35026	Conselve	Italy

1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)

BAS number: 11

Name of the manufacturer	Activa S.r.l			
Address of the manufacturer	via Feltre, 32	20132	Milano	Italy
Location of manufacturing sites	Tezza S.r.l, via Tre Ponti 22	37050	S. Maria di Zewo (VR)	Italy

2. Product composition and formulation

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the product

BAS number	EC number	CAS number	Common name	IUPAC name	Function	Content (%)
11	259-980-5	56373-10-0	Brodifacoum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycaumann	Active Substance	0.0025

2.2. Type of formulation

RB - Bait (ready for use)

3. Hazard and precautionary statements

Hazard statements

May cause damage to organs (blind) through prolonged or repeated exposure

Precautionary statements Keep out of reach of children.
 IF SWALLOWED: immediately call a **POISON CENTER** or a **doctor/physician**.
 IF exposed or concerned Get medical **advice**.
 Dispose of contents to **hazardous waste facilities** in accordance with national regulations.

4. Authorised use(s)

4.1. House mice – professional – indoor

Product type(s)	PT14 - Rodenticides (Pest control)		
Where relevant, an exact description of the authorised use	Not relevant for rodenticides		
Field(s) of use	Indoor		
Category(ies) of users	Professional		
Target organisms	Scientific name	Common name	Development stage
	Mus musculus	House mouse	Juveniles to adults
Application method(s)			
Method	Bait application		
Description	Ready-to-use wax block bait to be used in tamper-resistant bait stations.		
Rate:	20 g - 40 g block bait per bait point		
Dilution:	0,0025%		
Timing:	If more than one bait station is needed, the minimum distance between bait stations should be of 5 meters		

Pack sizes and packaging material From 1,5 Kg up to 25Kg (containing rodenticide baits of 10-20 g in wax blocks)

Packaging material PE/Aluminium/Polyester

4.1.1. Use-specific instructions for use

The bait stations should be visited at least every 2 to 3 days at the beginning of the treatment and at least weekly afterwards, in order to check whether the bait is accepted, the bait stations are intact and to remove rodent bodies. Re-fill bait when necessary.

4.1.2. Use-specific risk mitigation measures

4.1.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

When placing bait stations close to water drainage systems, ensure that bait contact with water is avoided.

4.1.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

4.1.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

4.2. Rats – professional – indoor


Product type(s)	PT14 - Rodenticides (Pest control)		
Where relevant, an exact description of the authorised use	Not relevant for rodenticides		
Field(s) of use	Indoor		
Category(ies) of users	Professional		
Target organisms	Scientific name	Common name	Development stage
	Rattus norvegicus	Brown rat	Juveniles to adults
Application method(s)			
Method	Bait application		
Description	Ready-to-use wax block bait to be used in tamper-resistant bait stations		
Rate:	100 g - 200 g per bait station		
Dilution:	0,0025%		
Timing:	If more than one bait station is needed, the minimum distance between bait stations should be of 5 meters		

Pack sizes and packaging material From 1,5 Kg up to 25Kg (containing rodenticide baits of 10-20 g in wax blocks)
 Packaging material: PE/Aluminium/Polyester

4.2.1. Use-specific instructions for use

The bait stations should be visited only 5 to 7 days after the beginning of the treatment and at least weekly afterwards, in order to check whether the bait is accepted, the bait stations are intact and to remove rodent bodies. Re-fill bait when necessary.

4.2.2. Use-specific risk mitigation measures



When placing bait stations close to water drainage systems, ensure that bait contact with water is avoided.

4.2.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

4.2.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

4.3. House mice and Rats – professionals – around buildings

Product type(s)	PT14 - Rodenticides (Pest control)		
Where relevant, an exact description of the authorised use	Not relevant for rodenticides		
Field(s) of use	Other Around buildings		
Category(ies) of users	Professional		
Target organisms	Scientific name	Common name	Development stage
	Mus musculus	House mouse	Juveniles to adults
	Rattus norvegicus	Brown rat	Juveniles to adults
Application method(s)			
Method	Bait application		
Description	Ready-to-use wax block bait to be used in tamper-resistant bait stations		
Rate:	House mice: 20 – 40 g wax block bait per bait point; Brown rat: 100 g - 200 g wax block bait per bait point		
Dilution:	0,0025%		
Timing:	If more than one bait station is needed, the minimum distance between bait stations should be of 5 meters		
Pack sizes and packaging material	Number of packed bags per packaging: Grams/kg of bait per packed bag: from 1,5 Kg up to 25Kg (containing rodenticide baits of 10-20 g in wax block)		
Packaging material:	PE/Aluminium/Polyester		

4.3.1. Use-specific instructions for use

- Protect bait from the atmospheric conditions (e.g. rain, snow, etc.). Place the bait stations in areas not liable to flooding.
- The bait stations should be visited [for mice - at least every 2 to 3 days at] [for rats - only 5 to 7 days after] the beginning of the treatment and at least weekly afterwards, in order to check whether the bait is accepted, the bait stations are intact and to remove rodent bodies. Re-fill bait when necessary.
- Replace any bait in a bait station in which bait has been damaged by water or contaminated by dirt

4.3.2. Use-specific risk mitigation measures

Do not apply this product directly in the burrows.

4.3.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

When placing bait stations close to surface waters (e.g. rivers, ponds, water channels, dykes, irrigation ditches) or water drainage systems, ensure that bait contact with water is avoided

4.3.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

4.3.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

4.4. House mice – general public – indoor

Product type(s)	PT14 - Rodenticides (Pest control)		
Where relevant, an exact description of the authorised use	Not relevant for rodenticides		
Field(s) of use	Indoor		
Category(ies) of users	General public (non-professional)		
Target organisms	Scientific name	Common name	Development stage
	Mus musculus	House mouse	Juveniles to adults
Application method(s)			
Method	Bait application		
Description	Ready-to-use wax block bait to be used in tamper-resistant bait stations.		
Rate:	20 g - 40 g wax block bait per bait point.		
Dilution:	0,0025%		
Timing:	If more than one bait station is needed, the minimum distance between bait stations should be of 5 meters		
Pack sizes and packaging material	Up to 300 g (containing rodenticide baits of 10-20 g in wax blocks) Packaging material: PE/Aluminium/Polyester		

4.4.1. Use-specific instructions for use

The bait stations should be visited at least every 2 to 3 days at the beginning of the treatment and at least weekly afterwards in order to check whether the bait is accepted, the bait stations are intact and to remove rodent bodies. Re-fill bait when necessary

4.4.2. Use-specific risk mitigation measures

4.4.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

For professional use.

When placing bait stations close to water drainage systems, ensure that bait contact with water is avoided.

4.4.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

4.4.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

4.5. Rats – general public – indoor

Product type(s)	PT14 - Rodenticides (Pest control)		
Where relevant, an exact description of the authorised use	Not relevant for rodenticides		
Field(s) of use	Indoor		
Category(ies) of users	General public (non-professional)		
Target organisms	Scientific name	Common name	Development stage
	Rattus norvegicus	Brown rat	Juveniles to adults
Application method(s)			
Method	Bait application		
Description	Ready-to-use wax block bait to be used in tamper-resistant bait stations.		
Rate:	100 g - 200 g per bait point.		
Dilution:	0,0025%		
Timing:	If more than one bait station is needed, the minimum distance between bait stations should be of 5 meters.		
Pack sizes and packaging material	Up to 300 g (containing rodenticide baits of 10-20 g in wax blocks) Packaging material: PE/Aluminium/Polyester		

4.5.1. Use-specific instructions for use

The bait stations should be visited only 5 to 7 days after the beginning of the treatment and at least weekly afterwards, in order to check whether the bait is accepted, the bait stations are intact and to remove rodent bodies. Re-fill bait when necessary.

4.5.2. Use-specific risk mitigation measures

4.5.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

For professional use:

When placing bait stations close to water drainage systems, ensure that bait contact with water is avoided.

4.5.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

4.5.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

4.6. Rats – general public – around buildings

Product type(s)	PT14 - Rodenticides (Pest control)		
Where relevant, an exact description of the authorised use	Not relevant for rodenticides		
Field(s) of use	Other Around buildings		
Category(ies) of users	General public (non-professional)		
Target organisms	Scientific name	Common name	Development stage
	Rattus norvegicus	Brown rat	Juveniles to adults
Application method(s)			
Method	Bait application		
Description	Ready-to-use wax block bait to be used in tamper-resistant bait stations		
Rate:	100 g - 200 g wax block bait per bait point.		
Dilution:	0 0025%		
Timing:	If more than one bait station is needed, the minimum distance between bait stations should be of 5 meters.		
Pack sizes and packaging material	Up to 300 g (containing rodenticide baits of 10-20 g in block bait) Packaging material: PE/Aluminium/Polyester		

4.6.1. Use-specific instructions for use

- Place the bait stations in areas not liable to flooding
- Replace any bait in a bait station in which bait has been damaged by water or contaminated by dirt.
- The bait stations should be visited only 5 to 7 days after the beginning of the treatment and at least weekly afterwards, in order to check whether the bait is accepted, the bait stations are intact and to remove rodent bodies. Re-fill bait when necessary.

4.6.2. Use-specific risk mitigation measures

For professional use around buildings:

- Do not apply this product directly in the burrows.

- Do not wash the bait stations with water between applications.
- Dispose dead rodents in accordance with local requirements.

For general public use

- Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
- Do not eat, drink or smoke when using this product.
- Consider preventive control measures (plug holes, remove potential food and drinking as far as possible) to improve product intake and reduce the likelihood of reinvasion.
- Do not use anticoagulant rodenticides as permanent baits (e.g. for prevention of rodent infestation or to detect rodent activity).
- The product information (i.e. label and/or leaflet) shall clearly show that the product shall be used in adequate tamper resistant bait stations (e.g. "use in tamper resistant bait stations only").
- Users shall properly label bait stations with the information referred to in section 5.3 of the SPC (e.g. "Label bait stations according to the product recommendations").
- Using this product should eliminate rodents within 35 days. The product information (i.e. label and/or leaflet) shall clearly recommend that in case of suspected lack of efficacy by the end of the treatment (i.e. rodent activity is still observed), the user should seek advice from the product supplier or call a pest control service.
- Search for and remove dead rodents during treatment, at least as often as bait stations are inspected.
- Dispose dead rodents in accordance with local requirements.

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

For professional and general public use:

- This product contains an anticoagulant substance. If ingested, symptoms, which may be delayed, may include nosebleed and bleeding gums. In severe cases, there may be bruising and blood present in the faeces or urine.
- Antidote: Vitamin K1 administered by medical/veterinary personnel only.
- In case of:
 - Dermal exposure, wash skin with water and then with water and soap.
 - Eye exposure, rinse eyes with eyes-rinse liquid or water, keep eyes lids open at least 10 minutes.
 - Oral exposure, rinse mouth carefully with water. Never give anything by mouth to unconscious person. Do not provoke vomiting. If swallowed, seek medical advice immediately and show the product's container or label. Contact a veterinary surgeon in case of ingestion by a pet.

Further instruction to professional use:

- Bait stations must be labelled with the following information: "do not move or open", "contains a rodenticide", "product name or authorisation number", "active substance(s)" and "in case of incident, call a poison centre."
- Hazardous to wildlife

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

At the end of the treatment, dispose the uneaten bait and the packaging in accordance with local requirements.

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

- Store in a dry, cool and well ventilated place. Keep the container closed and away from direct sunlight.
- Store in places prevented from the access of children, birds, pets and farm animals
- Shelf life: 2 years

6. Other information

- Because of their delayed mode of action, anticoagulant rodenticides take from 4 to 10 days to be effective after consumption of the bait.
- Rodents can be disease carriers. Do not touch dead rodents with bare hands, use gloves or use tools such as tongs when disposing them.
- This product contains a bittering agent and a dye.

MINISTER
1952

MINISTER
1952

BRODITEC WB-25

BRODITOP NEXT 25¹/BRODITOP NEXT BLOCK
25¹/BRODITOP SENSITIVE BLOCK 25¹/ZED BF BLOCK
25¹/DEVILTOP SENSITIVE BLOCK 25¹/RODIBROD SENSITIVE BLOCK 25¹/PROTEMAX BLOCCO BF¹/RODIMOND
BF BLOCCO¹/ALBAROD BF BLOCCO¹.


Esca rodenticida in blocco paraffinato pronta all'uso

USO NON PROFESSIONALE

AREA DI UTILIZZO INTERNO ed INTORNO AGLI EDIFICI

Composizione:

100 g di prodotto contengono:
Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0) g 0,0025
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6) g 0,001
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a g 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H373 Può provocare danni al sangue in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P301+ P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P308 +P313 IN CASO DI esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)

Autorizzazione del Ministero della Salute n.
IT/2018/00481/AUT

Titolare dell'autorizzazione Zapi S.p.A. via Terza Strada, 12 -
35026 Conselve (Padova) - Tel. 049-9597737

Officina di produzione ZAPI S.p.A. - Via Terza Strada, 12 -
35026 Conselve (PD)

Confezione: confezioni da 10g fino a 300g, contenenti blocchi paraffinati pronti all'uso da 10g o 20g ciascuno.

Validità: 2 anni

Lotto n. del

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Questo prodotto contiene una sostanza anticoagulante. Se ingerito, i sintomi, che possono essere ritardati, possono includere sanguinamento dal naso o dalle gengive. In casi gravi, possono manifestarsi ematomi e presenza di sangue nelle feci ed urine.

Antidoto: Vitamina K1 somministrabile solo da personale medico/veterinario.

In caso di:

Esposizione cutanea, lavare la pelle con acqua e poi con acqua e sapone.

Esposizione oculare, risciacquare gli occhi con acqua o con liquido per lavaggio oculare, tenere le palpebre aperte per almeno 10 minuti.

Esposizione orale, sciacquare accuratamente la bocca con acqua. Non somministrare nulla per bocca ad una persona priva di sensi. Non provocare il vomito.

In caso d'ingestione, contattare immediatamente un medico e mostrarli il contenitore o l'etichetta del prodotto. Contattare un medico veterinario in caso d'ingestione da parte di un animale domestico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

BRODITEC WB-25/BRODITOP NEXT 25/BRODITOP NEXT BLOCK 25/BRODITOP SENSITIVE BLOCK 25/ZED BF BLOCK 25/DEVILTOP SENSITIVE BLOCK 25/RODIBROD SENSITIVE BLOCK 25/PROTEMAX BLOCCO BF/RODIMOND BF BLOCCO/ALBAROD BF BLOCCO è un'esca rodenticida in blocco pronta all'uso a base di Brodifacoum, sostanza attiva fortemente efficace con una singola ingestione. BRODITEC WB-25/BRODITOP NEXT 25/BRODITOP NEXT BLOCK 25/DEVILTOP SENSITIVE BLOCK 25/RODIBROD SENSITIVE BLOCK 25/PROTEMAX

Etichetta e Foglio illustrativo
BLOCCO BF/RODIMOND BF BLOCCO/ALBAROD BF BLOCCO elimina topi domestici e ratto (*Mus musculus*, *Rattus norvegicus*), senza destare alcun sospetto verso l'esca da parte degli altri componenti della colonia. L'esca in blocco contiene sostanze zuccherine e ingredienti alimentari che la rendono appetibile per le specie di roditori indicate. La consistenza del blocco risulta attrattiva per la naturale attitudine dei roditori di rosicchiare e il contenuto in paraffina rende l'esca particolarmente resistente ed adatta al suo impiego in ambienti umidi. BRODITEC WB-25/BRODITOP NEXT 25/BRODITOP NEXT BLOCK 25/BRODITOP SENSITIVE BLOCK 25/ZED BF BLOCCO 25/DEVILTOP SENSITIVE BLOCK 25/RODIBROD SENSITIVE BLOCK 25/PROTEMAX BLOCCO BF/RODIMOND BF BLOCCO/ALBAROD BF BLOCCO ha un foro centrale che permette di fissarlo in modo stabile ai supporti dei contenitori di sicurezza delle esche (bait station). Questa caratteristica ha una doppia funzione:

- Facilita la verifica del consumo di esca

- Riduce la possibilità di essere portato fuori dai contenitori di sicurezza

BRODITEC WB-25/BRODITOP NEXT 25/BRODITOP NEXT BLOCK 25/BRODITOP SENSITIVE BLOCK 25/ZED BF BLOCK 25/DEVILTOP SENSITIVE BLOCK 25/RODIBROD SENSITIVE BLOCK 25/PROTEMAX BLOCCO BF/RODIMOND BF BLOCCO/ALBAROD BF BLOCCO contiene una sostanza amaro-amariccia per prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini. BRODITEC WB-25/BRODITOP NEXT 25/BRODITOP NEXT BLOCK 25/BRODITOP SENSITIVE BLOCK 25/ZED BF BLOCK 25/DEVILTOP SENSITIVE BLOCK 25/RODIBROD SENSITIVE BLOCK 25/PROTEMAX BLOCCO BF/RODIMOND BF BLOCCO/ALBAROD BF BLOCCO può essere usato all'interno ed intorno degli edifici quali, ad esempio, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà.

ORGANISMI TARGET

Topolino domestico (*Mus musculus*), sia giovani che adulti, Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), sia giovani che adulti.

MODALITÀ APPLICATIVE

BRODITEC WB-25/BRODITOP NEXT 25/BRODITOP NEXT BLOCK 25/DEVILTOP SENSITIVE BLOCK 25/RODIBROD SENSITIVE BLOCK 25/PROTEMAX BLOCCO BF/RODIMOND BF BLOCCO/ALBAROD BF BLOCCO è un'esca pronta all'uso in forma di blocco paraffinato, da utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati

per esche a prova di manomissione, debitamente marcati

per esche a prova di manomissione, debitamente marcati

per esche a prova di manomissione, debitamente marcati

per esche a prova di manomissione, debitamente marcati

per esche a prova di manomissione, debitamente marcati

per esche a prova di manomissione, debitamente marcati

VISTOCOL
LAI
(Dott. SSA / ...)

Etichetta e Foglio Illustrativo
 nei contenitori se danneggiati da acqua o contaminati da sporcizia. I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente in seguito, al fine di controllare se l'esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori. Riempire il contenitore quando necessario.

MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Considerare misure preventive di controllo al fine di favorire l'assunzione del prodotto e ridurre la probabilità di reinfestazione (ad esempio ostruire possibili aperture, rimuovere potenziali fonti di cibo e beverage quanto più possibile). Non utilizzare i rodenticidi anticoagulanti come esche permanenti (ad esempio per prevenire eventuali infestazioni o per monitorare attività dei roditori). L'utilizzo di questo prodotto dovrebbe eliminare i roditori entro 35 giorni. In caso di sospetta inefficacia al termine del trattamento (ad esempio si osserva ancora attività di roditori), chiedere suggerimenti al fornitore di prodotto o chiamare un Servizio di disinfestazione. Verificare la presenza di roditori morti e rimuoverli durante il trattamento, almeno con la stessa frequenza di visita dei contenitori per esche. Smettere i roditori morti secondo la normativa vigente. Alla fine del trattamento, smaltire l'esca non consumata e la confezione secondo la normativa vigente. Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Conservare il contenitore chiuso e al riparo dalla luce diretta del sole. Conservare in un luogo inaccessibile per bambini, uccelli, animali domestici e da fattoria.

ALTRE INFORMAZIONI

A causa della loro modalità d'azione ritardata, i rodenticidi anticoagulanti possono richiedere dai 4 ai 10 giorni dopo l'assunzione dell'esca per essere efficaci. I roditori possono essere portatori di malattie. Non toccare i roditori morti con le mani nude: per il loro smaltimento, utilizzare guanti o strumenti quali pinze. Questo prodotto contiene un agente amaricante ed un colorante.

VISTO SI AFFIDA
LA FARMACIA
 (Dott.ssa Francesca Karavel)
 ZARLIGNA
 Via S. Maria
 33010
 11/8
 Francesca Karavel

25/RODIBROD SENSITIVE BLOCK 25/PROTEMAX BLOCCO BF/RODIMOND BF BLOCCO/ALBAROD BF BLOCCO per contenitore, pari a 1-2 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 2-4 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 10-15 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri. I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 2-3 giorni all'inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente. Ciò al fine di verificare l'integrità del contenitore, il consumo dell'esca, ed eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori. Quando necessario reintegrare l'esca.

Uso all'interno di edifici Per il controllo del Ratto grigio (Rattus norvegicus)

Posizionare 100-200 g di BRODITEC WB-25/BRODITOP NEXT 25/BRODITOP NEXT BLOCK 25/BRODITOP SENSITIVE BLOCK 25/ZED BF BLOCK 25/DEVILTOP SENSITIVE BLOCK 25/RODIBROD SENSITIVE BLOCK 25/ PROTEMAX BLOCCO BF/RODIMOND BF BLOCCO/ALBAROD BF BLOCCO per contenitore, pari a 5-10 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 10-20 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri. I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente. Ciò al fine di verificare l'integrità del contenitore, il consumo dell'esca, ed eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori. Quando necessario reintegrare l'esca.

Uso all'interno intorno agli edifici Per il controllo del Ratto grigio (Rattus norvegicus).

Posizionare 100-200 g di BRODITEC WB-25/BRODITOP NEXT 25/BRODITOP NEXT BLOCK 25/BRODITOP SENSITIVE BLOCK 25/ZED BF BLOCK 25/DEVILTOP SENSITIVE BLOCK 25/RODIBROD SENSITIVE BLOCK 25/PROTEMAX BLOCCO BF/RODIMOND BF BLOCCO/ALBAROD BF BLOCCO per contenitore, pari a 5-10 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 10-20 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri. Posizionare i contenitori con le esche in aree non soggette ad allagamenti. Sostituire le esche

protette dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente.

INDICAZIONI PER L'USO E AVVERTENZE

Prima dell'uso leggere e seguire le istruzioni sul prodotto così come le informazioni in accompagnamento al prodotto o fornite presso il punto vendita. Considerare meccanismi di controllo non-chimico (ad esempio trappole) prima di utilizzare prodotti rodenticidi. Rimuovere le fonti di cibo facilmente raggiungibili da parte dei roditori (ad esempio granaglie fuoriuscite o scarti di cibo). Inoltre, non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento, dato che ciò disturba solitamente la popolazione di roditori e rende più difficile ottenere l'accettazione dell'esca. I contenitori con l'esca devono essere posizionati nelle immediate vicinanze di luoghi in cui l'attività dei roditori è stata verificata in precedenza (ad esempio camminamenti, nidi, recinti d'entrata di bestiame, aperture, tane, ecc.). Ove possibile, fissare i contenitori per esca al suolo o ad altre strutture. Posizionare il prodotto fuori dalla portata di bambini, uccelli, animali domestici, animali da fattoria e altri animali non bersaglio. Posizionare il prodotto lontano da cibi, bevande e alimenti per animali, nonché da utensili o superfici che possono entrare in contatto con il prodotto. Non porre i contenitori per esche accanto a sistemi di drenaggio delle acque poiché l'esca potrebbe entrare in contatto con l'acqua. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso del prodotto. Lavare le mani e la pelle direttamente esposta dopo l'utilizzo del prodotto. Alla fine del periodo di trattamento rimuovere le esche rimaste o i contenitori contenenti le esche. Usare solo in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati con le seguenti indicazioni: BRODITEC WB-25/BRODITOP NEXT 25/BRODITOP NEXT BLOCK 25/BRODITOP SENSITIVE BLOCK 25/ZED BF BLOCK 25/DEVILTOP SENSITIVE BLOCK 25/RODIBROD SENSITIVE BLOCK 25/PROTEMAX BLOCCO BF/RODIMOND BF BLOCCO/ALBAROD BF BLOCCO - Autorizzazione n° IT/2018/00481/AUT - Sostanza attiva: brodifacoum - Contiene un rodenticida - In caso d'incidente, consultare un Centro Antveleni o il 118 (Emergenza Sanitaria) - Non spostare o aprire. Pericoloso per la fauna selvatica.

DOSE E MODI IMPIEGO

Uso all'interno di edifici Per il controllo del Topolino domestico (Mus musculus).
 Posizionare 20-40 g di BRODITEC WB-25/BRODITOP NEXT 25/BRODITOP NEXT BLOCK 25/BRODITOP SENSITIVE BLOCK 25/ZED BF BLOCK 25/DEVILTOP SENSITIVE BLOCK.

BRODITEC WB-25

BRODITOP NEXT 25¹/BRODITOP NEXT BLOCK
25¹/BRODITOP SENSITIVE BLOCK 25¹/ZED BF BLOCK
25¹/DEVILTOP SENSITIVE BLOCK 25¹/RODIBROD
SENSITIVE BLOCK 25¹/PROTEMAX BLOCCO

BF¹/RODIMOND BF BLOCCO¹/ALBAROD BF BLOCCO¹


Esca rodenticida pronta all'uso in forma di blocco paraffinato

USO PROFESSIONALE

CATEGORIA DI UTILIZZATORI: PROFESSIONISTI
AREA DI UTILIZZO INTERNO ed INTORNO AGLI
EDIFICI

Composizione:

100 g di prodotto contengono:
Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0) g 0,0025
Denatonio Benzato (N°CAS 3734-33-6) g 0,001
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a g 100



ZAPI S.p.A.
Via Venezia 10-73
36018 Colognola (VI)

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H373 Può provocare danni al sangue in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P301+ P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P308 +P313 IN CASO DI ESPOSIZIONE o di possibile esposizione, consultare un medico.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)

Autorizzazione del Ministero della Salute n.

IT/2018/00481/AUT

Titolare dell'autorizzazione Zapi S.p.A. via Terza Strada,
12 - 35026 Conselve (Padova) - Tel. 049-9597737

Officina di produzione ZAPI S.p.A. - Via Terza Strada, 12 -
35026 Conselve (PD)

Confezione: confezioni a partire da 1,5kg fino a 25kg, contenenti blocchi paraffinati pronti all'uso da 10g o 20g ciascuno.

Validità: 2 anni

Lotto n. del

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Questo prodotto contiene una sostanza anticoagulante. Se ingerito, i sintomi, che possono essere ritardati, possono includere sanguinamento dal naso o dalle gengive. In casi gravi, possono manifestarsi ematomi e presenza di sangue nelle feci ed urine.

Antidoto: Vitamina K1 somministrabile solo da personale medico/veterinario.

In caso di:

Esposizione cutanea, lavare la pelle con acqua e poi con acqua e sapone.

Esposizione oculare, risciacquare gli occhi con acqua o con liquido per lavaggio oculare, tenere le palpebre aperte per almeno 10 minuti.

Esposizione orale, sciacquare accuratamente la bocca con acqua. Non somministrare nulla per bocca ad una persona priva di sensi. Non provocare il vomito.

In caso d'ingestione, contattare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Contattare un medico veterinario in caso d'ingestione da parte di un animale domestico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

BRODITEC WB-25/BRODITOP NEXT 25¹/BRODITOP NEXT BLOCK 25¹/BRODITOP SENSITIVE BLOCK 25¹/ZED BF BLOCK 25¹/DEVILTOP SENSITIVE BLOCK 25¹/RODIBROD SENSITIVE BLOCK 25¹/PROTEMAX BLOCCO BF/RODIMOND BF BLOCCO/ALBAROD BF BLOCCO è un rodenticida in blocco estruso pronto all'uso a base di Brodifacoum, principio attivo che agisce con efficacia eliminando topi (*Mus musculus*) e ratti (*Rattus norvegicus*), con una singola ingestione dell'esca permettendo il controllo dell'infestazione senza destare alcun sospetto verso l'esca da parte degli altri

Etrichetta e Foglio illustrativo componenti della colonia. L'esca in blocco contiene sostanze-zucchering e ingredienti alimentari che lo rendono appetibile per le specie di roditori indicate. La consistenza del blocco risulta attrattiva per la naturale attitudine dei roditori di rosicchiare e il contenuto in paraffina rende l'esca particolarmente resistente ed adatta al suo impiego in ambienti umidi.

BRODITEC WB-25/BRODITOP NEXT 25¹/BRODITOP NEXT BLOCK 25¹/BRODITOP SENSITIVE BLOCK 25¹/ZED BF BLOCK 25¹/DEVILTOP SENSITIVE BLOCK 25¹/RODIBROD SENSITIVE BLOCK 25¹/PROTEMAX BLOCCO BF/RODIMOND BF BLOCCO/ALBAROD BF BLOCCO ha un foro centrale che permette di fissarlo in modo stabile ai supporti dei contenitori di sicurezza delle esche (bait station). BRODITEC WB-25/BRODITOP NEXT 25¹/BRODITOP NEXT BLOCK 25¹/BRODITOP SENSITIVE BLOCK 25¹/ZED BF BLOCK 25¹/DEVILTOP SENSITIVE BLOCK 25¹/RODIBROD SENSITIVE BLOCK 25¹/PROTEMAX BLOCCO BF/RODIMOND BF BLOCCO/ALBAROD BF BLOCCO contiene una sostanza amara-cante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini. BRODITEC WB-25/BRODITOP NEXT 25¹/BRODITOP NEXT BLOCK 25¹/BRODITOP SENSITIVE BLOCK 25¹/ZED BF BLOCK 25¹/DEVILTOP SENSITIVE BLOCK 25¹/RODIBROD SENSITIVE BLOCK 25¹/PROTEMAX BLOCCO BF/RODIMOND BF BLOCCO può essere usato all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza.

Topolino domestico (*Mus musculus*), sia giovani che adulti, Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), sia giovani che adulti.

MODALITÀ APPLICATIVE

BRODITEC WB-25/BRODITOP NEXT 25¹/BRODITOP NEXT BLOCK 25¹/BRODITOP SENSITIVE BLOCK 25¹/ZED BF BLOCK 25¹/DEVILTOP SENSITIVE BLOCK 25¹/RODIBROD SENSITIVE BLOCK 25¹/PROTEMAX BLOCCO BF/RODIMOND BF BLOCCO/ALBAROD BF BLOCCO è un'esca pronta all'uso in forma di blocco paraffinato, da utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, protette dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente.

INDICAZIONI PER L'USO E AVVERTENZE

Prima dell'uso leggere e seguire le istruzioni sul prodotto. Così come le informazioni in accompagnamento al prodotto.

Posizionare 100-200 g di BRODITEC WB-25/BRODITOP NEXT 25/BRODITOP NEXT BLOCK 25/BRODITOP SENSITIVE BLOCK 25/ZED BF BLOCK 25/DEVILTOP SENSITIVE BLOCK 25/RODIBROD SENSITIVE BLOCK 25/PROTEMAX BLOCCO BF/RODIMOND BF BLOCCO/ALBAROD BF BLOCCO per contenitore, pari a 5-10 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 10-20 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri. I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente. Ciò al fine di verificare l'integrità dei contenitori, il consumo dell'esca, ed eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori. Quando necessario reintegrare l'esca. Seguire ogni ulteriore istruzione prevista nelle buone pratiche pertinenti.

Uso all'interno di edifici Per il controllo del Topolino Domestico (Mus musculus).

Posizionare 20-40 g di BRODITEC WB-25/BRODITOP NEXT 25/BRODITOP NEXT BLOCK 25/BRODITOP SENSITIVE BLOCK 25/ZED BF BLOCK 25/DEVILTOP SENSITIVE BLOCK 25/RODIBROD SENSITIVE BLOCK 25/PROTEMAX BLOCCO BF/RODIMOND BF BLOCCO/ALBAROD BF BLOCCO per contenitore, pari a 1-2 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 2-4 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri. Proteggere l'esca dalle condizioni atmosferiche (ad es. pioggia, neve, ecc). Posizionare i contenitori con le esche dovrebberghe ad allagamenti. I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 2-3 giorni all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente in seguito, al fine di controllare se l'esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori. Riempire nuovamente il contenitore quando necessario. Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate dall'acqua o contaminate dalla sporcizia. Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.

Posizionare 20-40 g di BRODITEC WB-25/BRODITOP NEXT 25/BRODITOP NEXT BLOCK 25/BRODITOP SENSITIVE BLOCK 25/ZED BF BLOCK 25/DEVILTOP SENSITIVE BLOCK 25/RODIBROD SENSITIVE BLOCK 25/PROTEMAX BLOCCO BF/RODIMOND BF BLOCCO/ALBAROD BF BLOCCO - Autorizzazione n° IT/2018/00481/AUT - Sostanza attiva: brodifacoum - Contiene un rodenticida - In caso d'incidente, consultare un Centro Antiveleni o il 118 (Emergenza Sanitaria) - Non spostare o aprire. Pericoloso per la fauna selvatica.

DOSIE MODI IMPIEGO

Uso all'interno di edifici Per il controllo del Topolino Domestico (Mus musculus).

Posizionare 20-40 g di BRODITEC WB-25/BRODITOP NEXT 25/BRODITOP NEXT BLOCK 25/BRODITOP SENSITIVE BLOCK 25/ZED BF BLOCK 25/DEVILTOP SENSITIVE BLOCK 25/RODIBROD SENSITIVE BLOCK 25/PROTEMAX BLOCCO BF/RODIMOND BF BLOCCO/ALBAROD BF BLOCCO per contenitore, pari a 1-2 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 2-4 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 10-15 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri. I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 2-3 giorni all'inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente. Ciò al fine di verificare l'integrità dei contenitori, il consumo dell'esca, ed eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori. Quando necessario reintegrare l'esca.

Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.

Uso all'interno di edifici Per il controllo del Ratto grigio

(Rattus norvegicus)

to o fornite presso il punto vendita. Prima del posizionamento delle esche, procedere ad un sopralluogo dell'area infestata e ad una valutazione in loco al fine d'identificare la specie di roditori, i luoghi d'attività e determinare la probabile causa e l'entità dell'infestazione. Rimuovere le fonti di cibo facilmente raggiungibili da parte dei roditori (ad esempio granaglie fuoriuscite o scarti di cibo). Inoltre, non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento, dato che ciò disturba solamente la popolazione di roditori e rende più difficile ottenere l'accettazione dell'esca. Il prodotto deve essere usato unicamente all'interno del sistema di gestione integrata delle infestazioni (IPM), che include, fra l'altro, anche misure d'igiene e, dove possibile, metodi fisici di controllo. Considerare misure preventive di controllo (ad esempio: chiusura dei buchi, rimozione, per quanto possibile, di tutte le fonti di cibo e acqua) in modo da verificare la quantità di prodotto consumata e ridurre la possibilità di re-infestazione. I contenitori con l'esca devono essere posizionati nelle immediate vicinanze di luoghi in cui l'attività dei roditori è stata verificata in precedenza (ad esempio camminamenti, nidi, recinti d'entrata di bestiame, aperture, tane, ecc.). Ove possibile, fissare i contenitori per esca al suolo o ad altre strutture. I contenitori per esche devono essere chiaramente etichettati segnalando che contengono rodenticidi e che non devono essere rimossi o aperti. Quando il prodotto è utilizzato in aree pubbliche, le zone trattate devono essere segnalate durante il periodo di trattamento. Accanto alle esche, deve essere reso disponibile un avviso indicante il rischio di avvelenamento primario e secondario da seguire in caso di avvelenamento. L'esca deve essere fissata in modo da non essere trascinata fuori dal contenitore per esche. Posizionare il prodotto fuori dalla portata di bambini, uccelli, animali domestici, animali da fattoria e altri animali non bersaglio. Posizionare il prodotto lontano da cibi, bevande e alimenti per animali, nonché da utensili o superfici che possono entrare in contatto con il prodotto. Durante la fase di manipolazione del prodotto, indossare guanti di protezione resistenti alle sostanze chimiche. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso del prodotto. Lavare le mani e la pelle direttamente esposta dopo l'utilizzo del prodotto. Se il consumo dell'esca è basso rispetto alla dimensione evidente dell'infestazione, valutare il riposizionamento dei contenitori e la possibilità di cambiare tipo

LA FARMACISTA
 (Dott.ssa Francesca RAVI)

sinfezzazione. Fra un'applicazione e la successiva, non lavare con acqua i contenitori per esche. Smettere i roditori morti secondo la normativa vigente. Alla fine del trattamento, smaltire l'esca non consumata e la confezione secondo la normativa vigente. Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Conservare il contenitore chiuso e al riparo dalla luce diretta del sole. Conservare in un luogo inaccessibile per bambini, uccelli, animali domestici e da fattoria.

ALTRE INFORMAZIONI

A causa della loro modalità d'azione ritardata, i rodenticidi anticoagulanti possono richiedere dai 4 ai 10 giorni dopo l'assunzione dell'esca per essere efficaci. I roditori possono essere portatori di malattie. Non toccare i roditori morti con le mani nude; per il loro smaltimento, utilizzare guanti o strumenti quali pinze. Questo prodotto contiene un agente amaro ed un colorante.

Use of the product, around buildings for the control of the Rat-grigio (Rattus norvegicus).
Position 100-200 g di BRODITEC WB-25/BRODITOP
NEXT-25/BRODITOP NEXT BLOCK 25/BRODITOP SENSITIVE
BLOCK 25/ZED BF BLOCK 25/DEVILTOP SENSITIVE BLOCK
25/RODIBROD SENSITIVE BLOCK 25/PROTEMAX BLOCCO
BF/RODIMOND BF BLOCCO/ALBAROD BF BLOCCO per con-
tenitore, pari a 5-10 esche in blocchi paraffinati pronti
all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 10-20 esche
in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno.
Laddove dovessero essere necessari più contenitori posi-
zionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro
e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri. Pro-
teggere l'esca dalle condizioni atmosferiche (ad es. pioggia,
neve, ecc). Posizionare i contenitori con l'esca in zone
non soggette ad allagamenti. I contenitori con le esche
dovrebbero essere controllati almeno ogni 5-7 giorni
all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente in se-
guito, al fine di controllare se l'esca è accettata; i conteni-
tori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori.
Rimprire nuovamente il contenitore quando necessario.
Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate
dall'acqua o contaminate dalla sporcizia. Seguire ogni ul-
teriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.

MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili
astanti della campagna di derattizzazione in corso. Per ri-
durre il rischio di avvelenamento secondario, ricercare e
rimuovere a intervalli frequenti i roditori morti durante il
trattamento (ad esempio almeno due volte la settimana).
Quando si posizionano i contenitori vicino alle acque su-
perficiali (ad es. fiumi, laghetti, corsi d'acqua, dighe, fosse
di irrigazione) o sistemi di scolo, evitare che l'esca venga
in contatto con l'acqua. Non applicare questo prodotto di-
rettamente nelle tane. Il prodotto non deve essere usato
per oltre 35 giorni senza una valutazione dello stato di in-
festazione e dell'efficacia del trattamento. Non utilizzare le
esche contenenti sostanze attive anticoagulanti come
esche permanenti per scopi preventivi o di monitoraggio
delle attività dei roditori. L'utilizzo di questo prodotto do-
vrebbe eliminare i roditori entro 35 giorni. In caso di so-
spetta inefficacia al termine del trattamento (ad esempio
si osserva ancora attività di roditori), chiedere suggerimen-
ti al fornitore di prodotto o chiamare un Servizio di di-

Francese David

VISTO SI APPROVA
LA FARMACIA CISTINI
(Dott.ssa Francesca David)

24/01/2018
Via S. Maria 10
50139 Firenze

Francese David

Stamped labels and barcodes. Labels include:
- MARCA DA BOLLO Ministero dell'Economia e delle Finanze. Agenzia Entrate. WDSR2001 03/09/2018 12:58:59. C91019987E1358DA. IDENTIFICATIVO: 0117001346454. €16,00.
- MARCA DA BOLLO Ministero dell'Economia e delle Finanze. Agenzia Entrate. WDSR2001 03/09/2018 13:00:04. 65AEE7A840Z771. IDENTIFICATIVO: 0117001346454. €16,00.
- MARCA DA BOLLO Ministero dell'Economia e delle Finanze. Agenzia Entrate. WDSR2001 03/09/2018 13:00:09. D6E639E5EF415166. IDENTIFICATIVO: 0117001346454. €16,00.



