

# Résumé des caractéristiques du produit pour une famille de produits biocides

**Nom:** Lactic acid Family - Quatchem

**Type(s) de produit:** TP03 - Hygiène vétérinaire

**Numéro de l'autorisation:** EU-0030143-0000

**Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3:** EU-0030143-0000

## Table des matières

Partie 1. - Premier niveau d'information	1
1. Informations administratives	1
2. Composition et formulation de la famille de produits	2
Partie 2. - Deuxième niveau d'information - méta-RCP	2
1. Informations administratives sur le méta-RCP - <b>meta SPC 1</b>	3
2. Composition du méta-RCP	3
3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP	3
4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP	4
5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP	7
6. Autres informations	9
7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP	9
1. Informations administratives sur le méta-RCP - <b>meta SPC 2</b>	11
2. Composition du méta-RCP	12
3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP	12
4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP	13
5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP	16
6. Autres informations	17
7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP	18

## Partie 1. - Premier niveau d'information

### 1. Informations administratives

#### 1.1. Nom

Lactic acid Family - Quatchem

#### 1.2. Type(s) de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

#### 1.3. Titulaire de l'autorisation

##### Nom et adresse du titulaire de l'autorisation

Nom	Arrow Regulatory (Ireland) Limited
Adresse	The Black Church St. Mary's Place D07 P4AX Dublin Irlande

##### Numéro de l'autorisation

EU-0030143-0000

##### Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3

EU-0030143-0000

##### Date de l'autorisation

03/10/2023

##### Date d'expiration de l'autorisation

30/09/2033

#### 1.4. Fabricant(s) des produits biocides

##### Nom du fabricant

Quat-Chem Ltd. A Neogen Company

##### Adresse du fabricant

1-4 Sandfield Industrial Park, Dodgson Street, Rochdale OL16 5SJ Lancashire Royaume-Uni

##### Emplacement des sites de fabrication

1-4 Sandfield Industrial Park, Dodgson Street, Rochdale OL16 5SJ Lancashire Royaume-Uni

## 1.5. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

<b>Substance active</b>	1322 - Acide L-(+)-lactique
<b>Nom du fabricant</b>	Purac Biochem bv
<b>Adresse du fabricant</b>	Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Pays-Bas
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Pays-Bas
<b>Substance active</b>	1322 - Acide L-(+)-lactique
<b>Nom du fabricant</b>	Jungbunzlauer S. A
<b>Adresse du fabricant</b>	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 FR-67390 Marckolsheim France
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 FR-67390 Marckolsheim France

## 2. Composition et formulation de la famille de produits

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	4 - 4

### 2.2. Type(s) de formulation

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution
---

## Partie 2. - Deuxième niveau d'information - méta-RCP

# 1. Informations administratives sur le méta-RCP

## 1.1. Identificateur du méta-RCP

meta SPC 1

## 1.2. Suffixe du numéro d'autorisation

1-1

## 1.3 Type(s) de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

# 2. Composition du méta-RCP

## 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	4 - 4

## 2.2. Type(s) de formulation du méta-RCP

Formulation(s)

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

# 3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP

Mention de danger

Provoque une irritation cutanée.  
Provoque des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence

Porter des gants de protection.

Porter un équipement de protection des yeux.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.

En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin.

En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin.

Enlever les vêtements contaminés. Et les laver avant réutilisation.

Éliminer le contenu dans un point de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation nationale

Éliminer le récipient dans un point de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation nationale

## 4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP

### 4.1 Description de l'utilisation

#### Utilisation 1 - Utilisation n° 1.1 – Désinfection des trayons après la traite – trempage manuel

<b>Type de produit</b>	TP03 - Hygiène vétérinaire
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	-
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bacteria Stade de développement: -  Nom scientifique: Levures Nom commun: Yeasts Stade de développement: -
<b>Domaine d'utilisation</b>	Intérieur  Désinfection de trayons après la traite par trempage manuel à l'aide d'un gobelet de trempage
<b>Méthode(s) d'application</b>	Méthode d'application: Trempage manuel en utilisant un gobelet de trempage Description détaillée:  Temps de contact pour le trempage à 30 °C dans des conditions sales : - 5 minutes pour les bactéries et les levures.

**Taux et fréquences d'application**

Taux d'application: de 5 à 10 ml par trayon  
Dilution (%): produit prêt à l'emploi  
Nombre et fréquence des applications:  
jusqu'à 2 fois par jour

**Catégorie(s) d'utilisateurs**

Professionnel

**Dimensions et matériaux d'emballage**

Récipient en polyéthylène haute densité (HDPE) de 1 000 litres à fermeture en HDPE ;  
Fût en matière plastique de 200 litres à fermeture en HDPE ;  
Bidon en HDPE de 25 litres à bouchon vissé en HDPE DIN 61 ou équivalent ;  
Bidon en HDPE de 5 litres à bouchon vissé en HDPE DIN 51 ou équivalent.

**4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques**

Voir les instructions générales d'utilisation.  
Produit à appliquer après la traite par utilisation d'un gobelet de trempage.  
Nettoyer au préalable le trayon avec un chiffon sec, verser le produit dans le réservoir du gobelet de trempage. En cas d'utilisation d'un gobelet de trempage, le gobelet est appliqué sur chaque trayon à tour de rôle et l'opérateur presse le réservoir pour faire passer le produit dans le gobelet. Le gobelet est doté d'un clapet anti-retour, de sorte qu'aucun produit résiduel ne peut retourner dans le réservoir.

**4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques**

Voir les instructions générales d'utilisation.

**4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

Voir les instructions générales d'utilisation.

**4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

Voir les instructions générales d'utilisation.

#### 4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d'utilisation.

#### 4.2 Description de l'utilisation

##### Utilisation 2 - Utilisation n° 1.2 – Désinfection des trayons après la traite - pulvérisation

<b>Type de produit</b>	TP03 - Hygiène vétérinaire
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	-
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bacteria Stade de développement: -  Nom scientifique: Levures Nom commun: Yeasts Stade de développement: -
<b>Domaine d'utilisation</b>	Intérieur  Désinfection des trayons après la traite par utilisation d'un pulvérisateur à main
<b>Méthode(s) d'application</b>	Méthode d'application: Pulvérisation manuelle à l'aide d'un pulvérisateur à main Description détaillée:  Temps de contact pour une pulvérisation à 30 °C dans des conditions sales : - 5 minutes pour les bactéries et les levures.
<b>Taux et fréquences d'application</b>	Taux d'application: de 5 à 10 ml par trayon Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: jusqu'à 2 fois par jour
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Professionnel
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	Récipient en HDPE de 1 000 litres à fermeture en HDPE ; Fût en matière plastique de 200 litres à fermeture en HDPE ; Bidon en HDPE de 25 litres à bouchon vissé en HDPE DIN 61 ou équivalent ; Bidon en HDPE de 5 litres à bouchon vissé en HDPE DIN 51 ou équivalent.



#### 4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Voir les instructions générales d'utilisation.  
Produit à appliquer après la traite par utilisation d'un pulvérisateur à main.  
Nettoyer au préalable le trayon avec un chiffon sec, verser le produit dans le réservoir du pulvérisateur. L'opérateur fera chaque animal une seule fois après la traite.

#### 4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir les instructions générales d'utilisation.  
Les utilisateurs professionnels doivent s'assurer de l'absence d'usagers professionnels de la zone de traitement au cours du processus de désinfection par pulvérisation. Si la présence d'usagers professionnels est nécessaire, les utilisateurs professionnels doivent s'assurer que ceux-ci portent le même type d'EPI que l'opérateur.

#### 4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir les instructions générales d'utilisation.

#### 4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d'utilisation.

#### 4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d'utilisation.

### 5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP

#### 5.1. Consignes d'utilisation

Voir les instructions d'utilisation spécifiques du méta-RCP 1.

Toujours lire l'étiquette ou la notice avant utilisation.

Le produit doit être amené à température ambiante avant utilisation. La quantité de produit appliqué par trayon dépend de l'animal à traiter. Pour les grands mammifères (vaches, chamelles) – jusqu'à 10 ml par trayon, et pour les petits mammifères (brebis, chèvres) – jusqu'à 5 ml par trayon. S'assurer que les trayons sont entièrement recouverts de désinfectant. Pour garantir un temps de contact suffisant, veiller à ce que le produit ne soit pas éliminé après application (par ex., maintenir les vaches debout pendant au moins 5 minutes).

## 5.2. Mesures de gestion des risques

L'utilisation de lunettes de protection conformes à la norme européenne EN ISO 16321 ou équivalent est obligatoire lors de la manipulation du produit.

Éviter tout transfert des mains aux yeux.

Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (gants nitrile - conforme aux normes européennes EN ISO 374 ou EN 455 ou équivalentes).

Les titres complets des normes européennes indiquées ici sont disponibles dans la rubrique 6.

## 5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

**EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :** Immédiatement laver abondamment à l'eau. Ensuite, enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Continuer à rincer la peau à l'eau pendant 15 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Immédiatement rincer à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler le 112/une ambulance pour une assistance médicale.

**EN CAS D'INHALATION :** Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. En cas de symptômes : Appeler le 112/une ambulance pour une assistance médicale. Si aucun symptôme : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

**EN CAS D'INGESTION :** Rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la personne exposée est en mesure d'avaler. NE PAS faire vomir. Appeler le 112/une ambulance pour une assistance médicale.

## 5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

À la fin du traitement, éliminer le produit non utilisé et son emballage conformément aux exigences locales. Les produits usagés peuvent être évacués vers les égouts ou vers le dépôt de fumier en fonction des exigences locales. Éviter le rejet vers une fosse septique ou des installations individuelles de traitement des eaux usées.

## 5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Tenir hors de portée des enfants.

Stocker dans le récipient d'origine, bien fermé.

Conserver à des températures entre 0°C et +30°C.

Durée de conservation : 24 mois

## 6. Autres informations

Les titres complets des normes européennes mentionnés dans la rubrique 5.2 « Mesures de gestion des risques » sont les suivants :

EN ISO 16321 - Protection des yeux et du visage à usage professionnel

EN ISO 374 – Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux

EN 455 - Gants médicaux non réutilisables

## 7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP

### 7.1 Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

#### Nom commercial

Synodex	Marché: EU
Lactopost	Marché: EU
Lactopost Y	Marché: EU
Lactopost Plus	Marché: EU
Lactopost Extra	Marché: EU
Synodex Y	Marché: EU
Synodex Extra	Marché: EU
Synodex Plus	Marché: EU
Udder X	Marché: EU
Teat Care	Marché: EU

Lacto Gold	Marché: EU
Lacto Extra	Marché: EU
Lactogold	Marché: EU
Lacto Spray	Marché: EU
<b>Numéro de l'autorisation</b> (Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3 - Autorisation nationale) EU-0030143-0001 1-1	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	4

**Nom commercial**

Laxsan	Marché: EU
Hexsan	Marché: EU
Lactopost R	Marché: EU
Laxsan R	Marché: EU
Hexfoam	Marché: EU

Deosan LA1	Marché: EU
Hexsan Extra	Marché: EU
Hexsan Plus	Marché: EU
Laxsan Plus	Marché: EU
Laxsan Extra	Marché: EU
Hexsan R	Marché: EU
LA1	Marché: EU
Condition Pink	Marché: EU
<b>Numéro de l'autorisation</b>  (Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3 - Autorisation nationale)  EU-0030143-0002 1-1	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	4

## 1. Informations administratives sur le méta-RCP

### 1.1. Identificateur du méta-RCP

meta SPC 2

## 1.2. Suffixe du numéro d'autorisation

1-2

## 1.3 Type(s) de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

## 2. Composition du méta-RCP

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	4 - 4

### 2.2. Type(s) de formulation du méta-RCP

Formulation(s)

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

## 3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP

Mention de danger

Provoque une irritation cutanée.  
Provoque des lésions oculaires graves.  
Contient de l'essence de menthe poivrée. Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence

Porter des gants de protection.  
Porter un équipement de protection des yeux.  
Se laver les mains soigneusement après manipulation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.

En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin.

En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin.

Enlever les vêtements contaminés. Et les laver avant réutilisation.

Éliminer le contenu dans un point de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation nationale

Éliminer le récipient dans un point de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation nationale

## 4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP

### 4.1 Description de l'utilisation

#### Utilisation 1 - Utilisation n° 3.1 – Désinfection des trayons après la traite – trempage manuel

Type de produit	TP03 - Hygiène vétérinaire
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bacteria Stade de développement: -  Nom scientifique: Levures Nom commun: Yeasts Stade de développement: -
Domaine d'utilisation	Intérieur  Désinfection de trayons après la traite par trempage manuel à l'aide d'un gobelet de trempage
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Trempage manuel en utilisant un gobelet de trempage Description détaillée:  Temps de contact pour le trempage à 30 °C dans des conditions sales : - 5 minutes pour les bactéries et les levures.
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: de 5 à 10 ml par trayon Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: jusqu'à 2 fois par jour

**Catégorie(s) d'utilisateurs**

Professionnel

**Dimensions et matériaux d'emballage**

Récipient en HDPE de 1 000 litres à fermeture en HDPE ;  
Fût en matière plastique de 200 litres à fermeture en HDPE ;  
Bidon en HDPE de 25 litres à bouchon vissé en HDPE DIN 61 ou équivalent ;  
Bidon en HDPE de 5 litres à bouchon vissé en HDPE DIN 51 ou équivalent.

**4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques**

Voir les instructions générales d'utilisation.

Produit à appliquer après la traite par utilisation d'un gobelet de trempage.

Nettoyer au préalable le trayon avec un chiffon sec, verser le produit dans le réservoir du gobelet de trempage. En cas d'utilisation d'un gobelet de trempage, le gobelet est appliqué sur chaque trayon à tour de rôle et l'opérateur presse le réservoir pour faire passer le produit dans le gobelet. Le gobelet est doté d'un clapet anti-retour, de sorte qu'aucun produit résiduel ne peut retourner dans le réservoir.

**4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques**

Voir les instructions générales d'utilisation.

**4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

Voir les instructions générales d'utilisation.

**4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

Voir les instructions générales d'utilisation.

**4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Voir les instructions générales d'utilisation.



--

## 4.2 Description de l'utilisation

### Utilisation 2 - Utilisation n° 3.2 – Désinfection des trayons après la traite - pulvérisation

<b>Type de produit</b>	TP03 - Hygiène vétérinaire
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	-
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bacteria Stade de développement: -  Nom scientifique: Levures Nom commun: Yeasts Stade de développement: -
<b>Domaine d'utilisation</b>	Intérieur  Désinfection des trayons après la traite par utilisation d'un pulvérisateur à main
<b>Méthode(s) d'application</b>	Méthode d'application: Pulvérisation manuelle à l'aide d'un pulvérisateur à main Description détaillée:  Temps de contact pour une pulvérisation à 30 °C dans des conditions sales : - 5 minutes pour les bactéries et les levures.
<b>Taux et fréquences d'application</b>	Taux d'application: de 5 à 10 ml par trayon Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: jusqu'à 2 fois par jour
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Professionnel
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	Récipient en HDPE de 1 000 litres à fermeture en HDPE ; Fût en matière plastique de 200 litres à fermeture en HDPE ; Bidon en HDPE de 25 litres à bouchon vissé en HDPE DIN 61 ou équivalent ; Bidon en HDPE de 5 litres à bouchon vissé en HDPE DIN 51 ou équivalent.

#### 4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

#### 4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Voir les instructions générales d'utilisation.  
Produit à appliquer après la traite par utilisation d'un pulvérisateur à main.  
Nettoyer au préalable le trayon avec un chiffon sec, verser le produit dans le réservoir du pulvérisateur. L'opérateur fera chaque animal une seule fois après la traite.

#### 4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir les instructions générales d'utilisation.  
Les utilisateurs professionnels doivent s'assurer de l'absence d'usagers professionnels de la zone de traitement au cours du processus de désinfection par pulvérisation. Si la présence d'usagers professionnels est nécessaire, les utilisateurs professionnels doivent s'assurer que ceux-ci portent le même type d'EPI que les opérateurs.

#### 4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir les instructions générales d'utilisation.

#### 4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d'utilisation.

#### 4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d'utilisation.

### 5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP

#### 5.1. Consignes d'utilisation

Voir les instructions d'utilisation spécifiques du méta-RCP 2.  
Toujours lire l'étiquette ou la notice avant utilisation.  
Le produit doit être amené à température ambiante avant utilisation. La quantité de produit appliqué par trayon dépend de l'animal à traiter. Pour les grands mammifères (vaches, chèvres) – jusqu'à 10 ml par trayon, et pour les petits mammifères (brebis, chèvres) – jusqu'à 5 ml par trayon. S'assurer que les trayons sont entièrement recouverts de désinfectant. Pour garantir un temps de contact suffisant, veiller à ce que le produit ne soit pas éliminé après application (par ex., maintenir les vaches debout pendant au moins 5 minutes).

## 5.2. Mesures de gestion des risques

L'utilisation de lunettes de protection conformes à la norme européenne EN ISO 16321 ou équivalent est obligatoire lors de la manipulation du produit.  
Éviter tout transfert des mains aux yeux.  
Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (gants nitrile - conforme aux normes européennes EN ISO 374 ou EN 455 ou équivalentes).  
Les titres complets des normes européennes indiquées ici sont disponibles dans la rubrique 6.

## 5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Immédiatement laver abondamment à l'eau. Ensuite, enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Continuer à rincer la peau à l'eau pendant 15 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Immédiatement rincer à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler le 112/une ambulance pour une assistance médicale.  
EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. En cas de symptômes : Appeler le 112/une ambulance pour une assistance médicale. Si aucun symptôme : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.  
EN CAS D'INGESTION : Rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la personne exposée est en mesure d'avaler. NE PAS faire vomir. Appeler le 112/une ambulance pour une assistance médicale.

## 5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

À la fin du traitement, éliminer le produit non utilisé et son emballage conformément aux exigences locales. Les produits usagés peuvent être évacués vers les égouts ou vers le dépôt de fumier en fonction des exigences locales. Éviter le rejet vers une fosse septique ou des installations individuelles de traitement des eaux usées.

## 5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Tenir hors de portée des enfants.  
Stocker dans le récipient d'origine, bien fermé.  
Conserver à des températures entre 0°C et +30°C.  
Durée de conservation : 24 mois

## 6. Autres informations

Les titres complets des normes EN auxquelles il est fait référence à la rubrique 5.2 sont les suivants :  
EN ISO 16321 - Protection des yeux et du visage à usage professionnel  
EN ISO 374 – Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux  
  
EN 455 - Gants médicaux non réutilisables

## 7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP

### 7.1 Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

#### Nom commercial

Synoshield	Marché: EU
Lactopost G	Marché: EU
Synoshield P	Marché: EU
Lactopost P	Marché: EU
Synoshield G	Marché: EU
Lactoshield	Marché: EU
Lactoshield Plus	Marché: EU
Lactoshield Extra	Marché: EU
Synoshield Extra	Marché: EU
Synoshield Plus	Marché: EU
Lactopost Protect	Marché: EU
Udder Shield	Marché: EU
Teat Care	Marché: EU
Mint Lacto Plus	Marché: EU

Lacto Care G	Marché: EU
Lactosal	Marché: EU
Lacto Care P	Marché: EU
Previoshield	Marché: EU
<b>Numéro de l'autorisation</b> (Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3 - Autorisation nationale) EU-0030143-0003 1-2	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	4