

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

Κ.Ο. RAT BRODIFAOCUM 25 ppm

Τύπος(οι) προϊόντος

PT14: Τρωκτικοκτόνα

Αριθμός άδειας: ΤΠ14-0154

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: GR-0020892-0000

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

| | |
|-------------------|---|
| Εμπορική ονομασία | K.O. RAT BRODIFACOUM 25 ppm KIT RAT JERRY'S WAX NOMUS WAXKIT MAMA'S KIT RAT 4ALLRATS LISTO FINDEMUS CELLESTE TEZA MICE BAIT |
|-------------------|---|

1.2. Κάτοχος άδειας

| | | |
|--|-----------|---|
| Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας | Όνομασία | MYLVA S.A. |
| | Διεύθυνση | Via Augusta, 48 08006 Barcelona Ισπανία |
| Αριθμός άδειας | | ΤΠ14-0154 |
| Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i> | | GR-0020892-0000 |
| Ημερομηνία έκδοσης της άδειας | | 04/06/2019 |
| Ημερομηνία λήξης της άδειας | | 31/12/2026 |

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

| | |
|---------------------------------------|--|
| Επωνυμία παρασκευαστή | Activa srl |
| Διεύθυνση παρασκευαστή | via Feltre, 32, 20132 Milano Ιταλία |
| Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής | Colkim srl., via Piemonte 50 40064 Ozzano Emilia (BO) Ιταλία |

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Δραστική ουσία | Brodifacoum (βρωδιφακούμη) |
| Επωνυμία παρασκευαστή | Activa S.r.l |
| Διεύθυνση παρασκευαστή | via Feltre, 32 20132 Milano Ιταλία |
| Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής | Tezza S.r.l, via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio (VR) Ιταλία |

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|-------------------------------|--|----------------|-------------|------------|--------------------|
| Brodifacoum (βρωδιφακούμη) | 3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro -1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin | δραστική ουσία | 56073-10-0 | 259-980-5 | 0,0025 |

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

RB Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

| | |
|--------------------------|---|
| Δηλώσεις επικινδυνότητας | H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση {1:αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης:}. |
| Δηλώσεις προφύλαξης | P102: Μακριά από παιδιά. P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό. P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε Συμβουλευθείτε. P501: Διάθεση του περιεχομένου σε εγκαταστάσεις επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.. |

Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Κατά των ποντικών σε εσωτερικούς χώρους απο επαγγελματίες

| | |
|---|--|
| Τύπος προϊόντος | PT14: Τρωκτικοκτόνα |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα |
| Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Επιστημονική ονομασία: Mus musculus Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: νεαρά και ενήλικα (άτομα) |
| Πεδίο(α) χρήσης | χρήση σε εσωτερικό χώρο Δολωματική εφαρμογή Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) |
| Μέθοδος(οι) εφαρμογής | Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση δόλωμα κηρώδους κύβου για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς, ανθεκτικούς στην παραβίαση. |
| Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής | Δόση εφαρμογής: 20 g - 40 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό Αραίωση (%): 0,0025 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 μέτρα. |
| Κατηγορία(ες) χρηστών | επαγγελματίας |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 1,5 Kg και μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 25 Kg (περιέχει τρωκτικοκτόνο δόλωμα σε μορφή κηρώδους κύβου των 10-20 g) Υλικό συσκευασίας: PE/Aluminium/Polyester |

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Η επίσκεψη των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον κάθε 2 έως 3 ημέρες στην αρχή της θεραπείας και στη συνέχεια τουλάχιστον κάθε εβδομάδα, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, αν οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και να αφαιρεθούν τα νεκρά τρωκτικά. Επαναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.1.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.1.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό.

4.1.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

4.1.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2. Κατά των αρουραίων σε εσωτερικούς χώρους από επαγγελματίες

| | |
|---|--|
| Τύπος προϊόντος | PT14: Τρωκτικοκτόνα |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα |
| Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: καφέ ή νορβηγικός αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: νεαρά και ενήλικα (άτομα) |
| Πεδίο(α) χρήσης | χρήση σε εσωτερικό χώρο Δολωματική εφαρμογή Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) |
| Μέθοδος(οι) εφαρμογής | Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση δόλωμα κηρώδους κύβου για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς, ανθεκτικούς στην παραβίαση. |
| Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής | Δόση εφαρμογής: 100 g - 200 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό Αραίωση (%): 0,0025 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 μέτρα. |
| Κατηγορία(ες) χρηστών | επαγγελματίας |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 1,5 Kg και μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 25 Kg (περιέχει τρωκτικοκτόνο δόλωμα σε μορφή κυρλωδη κύβου των 10-20 g) |

| |
|---|
| Υλικό συσκευασίας: PE/Aluminium/Polyester |
|---|

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Η επίσκεψη των δολωματικών σταθμών πρέπει να γίνεται μόνο 5 έως 7 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας και στη συνέχεια τουλάχιστον κάθε εβδομάδα, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και να αφαιρεθούν τα στέλεχος τρωκτικών. Επαναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.2.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.2.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό

4.2.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

4.2.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

4.3. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 3. Κατά των ποντικών και αρουραίων περιμετρικά των κτιρίων από επαγγελματίες χρήστες

| | |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος | PT14: Τρωκτικοκτόνα |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα |
| Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Επιστημονική ονομασία: Mus musculus Κοινή ονομασία: άλλο: οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: νεαρά και ενήλικα (άτομα) Επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: άλλο: καφέ ή νορβηγικός αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: νεαρά και ενήλικα (άτομα) |
| Πεδίο(α) χρήσης | άλλο: Other Περιμετρικά των κτιρίων |
| Μέθοδος(οι) εφαρμογής | Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή |

| | |
|--|---|
| | Λεπτομερής περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση δόλωμα κηρώδους κύβου για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς, ανθεκτικός στην παραβίαση. |
| Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής | Δόση εφαρμογής: ποντίκια: 20-40 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό αρουραίοι: 100-200 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό Αραίωση (%): 0,0025 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 μέτρα. |
| Κατηγορία(ες) χρηστών | επαγγελματίας |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Αριθμός συσκευασμένων σάκων ανά συσκευασία: g / kg δόλωμα ανά συσκευασμένο σάκκο: από 1,5 Kg έως 25 Kg (που περιέχει δολώματα τρωκτικοκτόνου 10-20 g σε κηρό) Υλικό συσκευασίας: PE/Aluminium/Polyester |

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Προστατέψτε τα δολώματα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι κ.λπ.). Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς σε περιοχές που δεν είναι πιθανόν να πλημμυρίσουν.
- Η επίσκεψη των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να γίνεται [για ποντίκια - τουλάχιστον κάθε 2 έως 3 ημέρες σε] [για αρουραίους - μόνο 5 έως 7 ημέρες μετά] την έναρξη της θεραπείας και στη συνέχεια τουλάχιστον εβδομαδιαίως, για να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και για την αφαίρεση των νεκρών τρωκτικών. Επαναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.
- Αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα σε ένα δολωματικό σταθμό στο οποίο το δόλωμα έχει καταστραφεί από το νερό ή έχει επιμολυνθεί με ακαθαρσίες.

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.3.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Μην εφαρμόζετε αυτό το προϊόν απευθείας στις στοές των τρωκτικών.

4.3.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Κατά την τοποθέτηση δολωματικών σταθμών κοντά σε επιφανειακά νερά (π.χ. ποτάμια, λίμνες, κανάλια νερού, αναχώματα, σχάρες άρδευσης) ή συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό.

4.3.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

4.3.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

4.4. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 4. Κατά των ποντικών σε εσωτερικούς χώρους από το ευρύ κοινό

| | |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος | PT14: Τρωκτικοκτόνα |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα |
| Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: νεαρά και ενήλικα (άτομα) |
| Πεδίο(α) χρήσης | χρήση σε εσωτερικό χώρο Δολωματική εφαρμογή Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) |
| Μέθοδος(οι) εφαρμογής | Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση δόλωμα κηρώδους κύβου για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση. |
| Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής | Δόση εφαρμογής: 20- 40 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό Αραίωση (%): 0,0025 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένα δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών πρέπει να είναι 5 μέτρα. |
| Κατηγορία(ες) χρηστών | ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες) |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Μέχρι 300 g (που περιέχουν δολώματα τρωκτικοκτόνου 10-20 g σε κηρώδεις κύβους) Υλικό συσκευασίας: PE / Aluminium / Polyester |

4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Η επίσκεψη των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον κάθε 2 έως 3 ημέρες στην αρχή της θεραπείας και στη συνέχεια τουλάχιστον κάθε εβδομάδα, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και να αφαιρεθούν τα νεκρά τρωκτικών. Επαναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.4.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.4.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Για επαγγελματική χρήση:

Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό.

4.4.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

4.4.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

4.5. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 5. Κατά των αρουραίων σε εσωτερικούς χώρους από το ευρύ κοινό

| | |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος | PT14: Τρωκτικοκτόνα |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα |
| Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: καφέ ή νορβηγικός αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: νεαρά και ενήλικα (άτομα) |
| Πεδίο(α) χρήσης | χρήση σε εσωτερικό χώρο Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικοί στην παραβίαση) |
| Μέθοδος(οι) εφαρμογής | Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση δόλωμα κηρώδους κύβου για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς, ανθεκτικό στις παραβιάσεις. |
| Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής | Δόση εφαρμογής: 100 - 200 g ανά δολωματικό σταθμό Αραίωση (%): 0,0025 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών πρέπει να είναι 5 μέτρα. |
| Κατηγορία(ες) χρηστών | ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες) |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Μέχρι 300 g (που περιέχουν δολώματα τρωκτικοκτόνου 10-20 g σε κηρώδεις κύβους) |

Υλικό συσκευασίας: PE / Aluminium / Polyester

4.5.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Η επίσκεψη στους δολωματικούς σταθμούς θα πρέπει να γίνεται μόνο 5 έως 7 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας και στη συνέχεια τουλάχιστον κάθε εβδομάδα, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και να αφαιρεθούν τα νεκρά τρωκτικά. Επαναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

4.5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.5.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.5.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Για επαγγελματική χρήση:

Όταν τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό.

4.5.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

4.5.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

4.6. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 6. Κατά των αρουραίων περιμετρικά των κτιρίων από το ευρύ κοινό

| | |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος | PT14: Τρωκτικοκτόνα |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα |
| Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: καφέ ή νορβηγικός αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: νεαρά και ενήλικα (άτομα) |
| Πεδίο(α) χρήσης | άλλο: Other Περιμετρικά κτιρίων |
| Μέθοδος(οι) εφαρμογής | Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση δόλωμα κηρώδους κύβου για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς, ανθεκτικούς στην παραβίαση. |
| Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής | Δόση εφαρμογής: 100- 200 g ανά δολωματικό σταθμό Αραίωση (%): 0,0025 |

| | |
|--|--|
| | Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους πρέπει να είναι 5 μέτρα. |
| Κατηγορία(ες) χρηστών | ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες) |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Μέχρι 300 g (που περιέχουν δολώματα τρωκτικοκτόνου 10-20 g σε δόλωμα κηρώδους κύβου) Υλικό συσκευασίας: PE / Aluminium / Polyester |

4.6.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς σε περιοχές που δεν είναι δυνατόν να πλημμυρίσουν.
- Αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα σε ένα δολωματικό σταθμό στον οποίο το δόλωμα έχει καταστραφεί από το νερό ή έχει επιμολυνθεί από ακαθαρσίες.
- Η επίσκεψη στους δολωματικούς σταθμούς θα πρέπει να γίνεται μόνο 5 με 7 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας και στη συνέχεια τουλάχιστον κάθε εβδομάδα, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και να αφαιρεθούν τα νεκρά τρωκτικά. Επαναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

4.6.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.6.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για επαγγελματική χρήση γύρω από τα κτίρια:

- Μην εφαρμόζετε αυτό το προϊόν απευθείας στις στοές των τρωκτικών.

4.6.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Για επαγγελματική χρήση:

Κατά την τοποθέτηση δολωματικών σταθμών κοντά σε επιφανειακά νερά (π.χ. ποτάμια, λίμνες, κανάλια νερού, αναχώματα, σχάρες άρδευσης) ή συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό.

4.6.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

4.6.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

Επαγγελματική χρήση:

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Διεξάγετε μια έρευνα πριν από την έναρξη της εφαρμογής, διεξάγεται μια έρευνα στην προσβεβλημένη περιοχή και μια επιτόπια αξιολόγηση για να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους τόπους δραστηριότητάς τους και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και την έκταση της προσβολής.
- Απομακρύνετε τα τρόφιμα που είναι εύκολα προσβάσιμα για τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Εκτός από αυτό, μην καθαρίζετε την προσβεβλημένη περιοχή λίγο πριν τη θεραπεία, καθώς αυτό διαταράσσει μόνο τον πληθυσμό των τρωκτικών και καθιστά την αποδοχή των δολωμάτων πιο δύσκολη.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης παρασίτων (IPM), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικές μεθόδους ελέγχου.
- Εξετάστε τα μέτρα προληπτικού ελέγχου (π.χ. περιορίστε τα ανοίγματα, απομακρύνετε πιθανά τρόφιμα και πηγές νερού όσο το δυνατόν περισσότερο) για να βελτιώσετε την πρόσληψη του προϊόντος και να μειώσετε την πιθανότητα επανεμφάνισης των τρωκτικών.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γειτνίαση με τα μέρη όπου παρατηρήθηκε προηγουμένως δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διαδρομές μετακίνησης, περιοχές φωλεοποίησης, σημεία λήψης τροφής, στοές κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να είναι σαφώς επισημασμένοι ώστε να δείχνουν ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται.
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές που υποβάλλονται σε αγωγή πρέπει να επισημαίνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας και μια ειδοποίηση που εξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό, καθώς και την ένδειξη των μέτρων πρώτων βοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης να διατεθούν μαζί με τα δολώματα.
- Το δόλωμα πρέπει να στερεώνεται έτσι ώστε να μην μπορεί να απομακρυνθεί από το δολωματικό σταθμό.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια ζώα και ζώα εκτροφής και άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έχουν επαφή με αυτά.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Εάν η κατανάλωση των δολωμάτων είναι χαμηλή σε σχέση με το εμφανές μέγεθος της προσβολής, σκεφτείτε την αντικατάσταση των δολωματικών σταθμών σε περαιτέρω θέσεις και τη δυνατότητα αλλαγής σε άλλο δόλωμα.
- Εάν μετά από μια περίοδο θεραπείας 35 ημερών τα δολώματα συνεχίζουν να καταναλώνονται και δεν παρατηρείται μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία. Όπου έχουν εξαιρεθεί άλλοι παράγοντες, είναι πιθανό ότι υπάρχουν τρωκτικά που είναι ανθεκτικά στα αντιπηκτικά, οπότε εξετάστε τη χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου υπάρχει, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, θεωρήστε τη χρήση παγίδων ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
- Αφαιρέστε το υπόλοιπο δόλωμα ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου θεραπείας.

Χρήση από το ευρύ κοινό:

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

-
- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.
 - Πριν από τη χρήση τρωκτικοκτόνων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μη χημικές μέθοδοι ελέγχου (π.χ. παγίδες).
 - Απομακρύνετε τα τρόφιμα που είναι εύκολα προσβάσιμα για τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Εκτός από αυτό, μην καθαρίζετε την μολυσμένη περιοχή λίγο πριν τη θεραπεία, καθώς αυτό διαταράσσει μόνο τον πληθυσμό των τρωκτικών και καθιστά την αποδοχή των δολωμάτων πιο δύσκολη.
 - Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γεινίαση όπου παρατηρείται δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διαδρομές, μονοτάπιπια, περιοχές φωλεοποίησης, σημεία λήψης τροφής, στοές κ.λπ.).
 - Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
 - Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια ζώα, ζώα εκμετάλλευσης και άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο.
 - Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έχουν επαφή με αυτά.
 - Μην τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποχέτευσης νερού όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με το νερό.
 - Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
 - Αφαιρέστε το υπόλοιπο δόλωμα ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου θεραπείας.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Για επαγγελματική χρήση:

- Μη χειρίζεστε το προϊόν μέχρι να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Όπου είναι δυνατόν, πριν από τη εφαρμογή, ενημερώστε τους πιθανούς παρευρισκόμενους (π.χ. τους χρήστες/ κατοίκους της περιοχής σχετικά με τις επεμβάσεις ελέγχου τρωκτικών) σχετικά με την εκστρατεία ελέγχου τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, αν υπάρχει].
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά σε συχνά διαστήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας (π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα). [Όπου χρειάζεται, προσδιορίστε εάν απαιτείται συχνότερη ή καθημερινή επιθεώρηση].
- Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μετά από 35 ημέρες χωρίς αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.
- Μην χρησιμοποιείτε δολώματα που περιέχουν αντιπηκτικές δραστικές ουσίες ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των τρωκτικών.
- Οι πληροφορίες για το προϊόν (ήτοι η ετικέτα ή / και το φύλλο οδηγιών) πρέπει να δείχνουν σαφώς ότι: το προϊόν δεν πρέπει να παρέχεται στο ευρύ κοινό (π.χ. "μόνο για επαγγελματίες"). το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατάλληλους δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση (π.χ. "χρήση μόνο σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση").

οι χρήστες πρέπει να επισημαίνουν σωστά τους δολωματικούς σταθμούς με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο τμήμα 5.3 της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος (π.χ. ετικέτες δολωματικών σταθμών σύμφωνα με τις συστάσεις του προϊόντος).

- Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ. ετικέτα ή / και φύλλο οδηγιών) συνιστούν σαφώς ότι σε περίπτωση υποψίας μειωμένης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της θεραπείας (δηλαδή παρατηρείται ακόμη δραστηριότητα τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ή να καλέσει εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

- Μην πλένετε τους δολωματικούς σταθμούς με νερό μεταξύ των εφαρμογών.

- Απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Χρήση από το ευρύ κοινό

- Μη χειρίζεστε μέχρι να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας.

- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

- Εξετάστε τα μέτρα προληπτικού ελέγχου (περιορισμός ανοιγμάτων, απομακρύνετε πιθανά τρόφιμα και πηγές νερού όσο το δυνατόν περισσότερο) για να βελτιώσετε την πρόσληψη προϊόντων και να μειώσετε την πιθανότητα επανεμφάνισης.

- Μη χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για την ανίχνευση της δραστηριότητας των τρωκτικών).

- Οι πληροφορίες για το προϊόν (ήτοι η ετικέτα ή / και το φύλλο οδηγιών) πρέπει να δείχνουν σαφώς ότι:

το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατάλληλους δολωματικούς σταθμούς που είναι ανθεκτικοί στην παραβίαση (π.χ. "χρήση μόνο σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση"). οι χρήστες πρέπει να επισημαίνουν σωστά τους δολωματικούς σταθμούς με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο τμήμα 5.3 της ΠΧΠ (π.χ. "επισημαίνετε τους δολωματικούς σταθμούς με ετικέτες σύμφωνα με τις συστάσεις του προϊόντος").

- Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ. ετικέτα ή / και φύλλο οδηγιών) συνιστούν σαφώς ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της θεραπείας (δηλαδή παρατηρείται ακόμη δραστηριότητα τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος.

- Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας, τουλάχιστον όσο συχνά ελέγχονται οι δολωματικοί σταθμοί.

- Απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Για επαγγελματική και χρήση από το ευρύ κοινό:

- Αυτό το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία των ούλων. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα.

- Αντίδοτο: Η βιταμίνη K1 χορηγείται μόνο από ιατρικό / κτηνιατρικό προσωπικό.

- Σε περίπτωση:

-
- Δερματικής έκθεσης: πλύνετε το δέρμα με νερό και στη συνέχεια με νερό και σαπούνι.
 - Έκθεσης των οφθαλμών: ξεβγάλτε τα μάτια με υγρό κατάλληλο για πλύση των οφθαλμών ή νερό, κρατώντας τα καπάκια των ματιών ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.
 - Έκθεσης από το στόμα: ξεπλύνετε προσεκτικά το στόμα με νερό. Ποτέ μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο.

Περαιτέρω οδηγίες για χρήση από επαγγελματίες:

- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις: "Μη μετακινείτε ή ανοίγετε". "περιέχει τρωκτικοκτόνο". "όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης". "δραστική ουσία (-ές)" και "σε περίπτωση συμβάντος, καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων.
- Επικίνδυνο για την άγρια πανίδα.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Στο τέλος των εφαρμογών, απορρίψτε το δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Αποθηκεύστε σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε τη συσκευασία κλειστή και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν επιτρέπεται η πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικιδίων και οικόσιτων ζώων.
- Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα χρειάζονται από 4 έως 10 ημέρες για να είναι αποτελεσματικά μετά την κατανάλωση του δολώματος.
- Τα τρωκτικά μπορούν να είναι φορείς ασθένειας. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή χρησιμοποιείτε εργαλεία όπως λαβίδες όταν τα απορρίπτετε.
- Αυτό το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα και χρωστική.