

# Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega proizvoda:** Biopren mosquito larvicide tablet

**Vrsta(-e) proizvoda(-ov):** Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

**Številka dovoljenja:** SI-0020843-0000

**Referenčna številka vnosa v R4BP 3:** SI-0020843-0000

## Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	2
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	2
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	8
5.1. Navodila za uporabo	8
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	8
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	8
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	8
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	9
6. Druge informacije	9

## Upravne informacije

### 1.1. Trgovska imena proizvoda

Biopren tableta za zatiranje ličink komarjev
Protect tableta za zatiranje ličink komarjev

### 1.2. Imetnik dovoljenja

<b>Ime in naslov imetnika dovoljenja</b>	Ime in priimek	Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd.
	Naslov	Szállás u. 6. H-1107 Budapest Madžarska
<b>Številka dovoljenja</b>	SI-0020843-0000	
<b>Referenčna številka vnosa v R4BP 3</b>	SI-0020843-0000	
<b>Datum dovoljenja</b>	07/04/2021	
<b>Datum izteka veljavnosti dovoljenja</b>	20/01/2031	

### 1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

<b>Ime proizvajalca</b>	Ferbi s.r.l.,
<b>Naslov proizvajalca</b>	Viale 1 Maggio c/da Ripoli, 64023 Mosciano S.Angelo, Italija
<b>Lokacije proizvodnje</b>	Viale 1 Maggio c/da Ripoli, 64023 Mosciano S.Angelo, Italija

<b>Ime proizvajalca</b>	Babolna Bio Ltd,
<b>Naslov proizvajalca</b>	Szállás utca 6, 1107 Budapest, Madžarska
<b>Lokacije proizvodnje</b>	Köves J. u 1, 2943 Babolna, Madžarska

#### 1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

<b>Aktivna snov</b>	1386 - S-metopren
<b>Ime proizvajalca</b>	Babolna Bio Ltd,
<b>Naslov proizvajalca</b>	Szállás utca 6, 1107 Budapest, Madžarska
<b>Lokacije proizvodnje</b>	Szállás utca 6, 1107 Budapest, Madžarska

## 2. Sestava in formulacija proizvoda

### 2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
S-metopren	Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate	Aktivna snov	65733-16-6		0,5

### 2.2. Vrsta formulacije

TB - tableta
--------------

## 3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

**Stavki o nevarnosti**

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Vsebuje 12-hidroksi-oktadekanojsko kislino s polimerjem .alfa.-hidro-.omega.-hidroksipoli(oksi-1,2-etanediiil). Lahko povzroči alergijski odziv.

**Previdnostni stavki**

Hraniti zunaj dosega otrok.

Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

Preprečiti sproščanje v okolje.

Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi predpisi.

Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

Če nastopi draženje kože:Poišcite zdravniško pomoč.

Če nastopi draženje kože:Poišcite zdravniško pomoč.

**4. Dovoljena(e) uporaba****4.1 Opis uporabe****Uporaba 1 - 1 tabela. # 1 – Splošna uporaba za nepoklicne uporabnike**

<b>Vrsta proizvoda</b>	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
<b>Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno</b>	Šumeča tableta za zatiranje komarjev v vodi
<b>Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)</b>	Znanstveno ime: Culicidae: Splošno ime: Aedes mosquitoes Razvojni stadij: Ličinke (L3-L4)  Znanstveno ime: Culicidae: Splošno ime: Culex mosquitoes Razvojni stadij: Ličinke (L3-L4)
<b>Področje uporabe</b>	Zunanost, zunaj  Izdelek je namenjen za uporabo v stoječih vodah, ki se ne uporabljajo za pitno vodo in vzgojo okrasnih rib ter so lahko primerni za sezonski ali neprekinjeni razvoj ličink komarjev, kot so na primer: -vrtni ribniki -vodometi -neizkoriščeni bazeni - odtoki za deževnico - kateri koli drugi, naravni ali umetni zbiralnih vode Tretirana voda ne sme biti v stiku z živo vodo ali čistilno napravo.
<b>Način(-i) uporabe</b>	Metoda: Ročni nanos Podroben opis:

Ročno doziranje  
Sredstvo je treba uporabljati v skladu z navedenim odmerkom.  
Ročni način uporabe.  
Aktivno snov začne tableta izločati ob stiku z vodo, zato poskrbite, da je tableta v popolnoma prekrita z vodo. Za maksimalni učinek je tretiranje potrebno začeti pred sezono komarjev, takoj, ko se pojavijo ličinke. Postopek ponovite enkrat na mesec skozi celotno sezono komarjev (od aprila do oktobra.)  
Tretirane vode ne uporabljajte za zalivanje rastlin, namenjenih uživanju (zelenjava, zelišča).

#### Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: 1x0,5 g tableta/250 litrov vode ali 1x2 g tableta /1000 litrov vode  
Redčenje (%): 0  
Število in časovni raspored uporabe:  
Izdelek se uporablja v vodah, kjer so prisotne ličinke komarjev.

Pred začetkom tretiranja ocenite količino vode in na podlagi tega določite potreben odmerek

#### Skupina(-e) uporabnikov

Splošna javnost (nepoklicna)

#### Velikosti in material embalaže

Pretisni omot:  
trda PVC folija + kartonska škatla z lakirano zadnjo površino  
0.5 g tableta, 1x5 ali 2x5 kos/pretisni omot, teža maks. 500 g neto teže

Pretisni omot:  
trda PVC folija + kartonska škatla z lakirano zadnjo površino  
2 g tableta, 1x5 ali 2x5 kos/pretisni omot, teža maks. 500 g neto teže

Plastična vrečka:  
LDPE  
0.5 g tableta, tableta v plastični vrečki in kartonski škatli, teža maks. 500 g neto teže

Plastična vrečka:  
LDPE  
2 g tableta, tableta v plastični vrečki in kartonski škatli, teža maks. 500 g neto teže

Plastenka:  
PP ali plastika coex PE/PA (ni notranje vrečke)  
0.5 tableta, teža maks. 500 g neto teže

Plastenka:  
PP ali plastika coex PE/PA (ni notranje vrečke)  
2 g tableta, teža maks. 500 g neto teže

#### 4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

-

#### 4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Pred uporabo vedno preberite navodila za uporabo in jih upoštevajte pri uporabi.  
Če po tretiranju okužba kljub temu ne mine, poiščite pomoč strokovnjaka za zatiranje škodljivcev.  
Če tretiranje ni učinkovito, kontaktirajte imetnika dovoljenja.

#### 4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

-

#### 4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

#### 4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

#### 4.2 Opis uporabe

##### Uporaba 2 - 2 tabela. # 2 – Poklicna in usposobljena poklicna uporaba

**Vrsta proizvoda**

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

**Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno**

Šumeča tableta za zatiranje komarjev v vodi

**Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)**

Znanstveno ime: Culicidae:  
Splošno ime: Aedes mosquitoes  
Razvojni stadij: Ličinke (L3-L4)

Znanstveno ime: Culicidae:  
Splošno ime: Culex mosquitoes  
Razvojni stadij: Ličinke (L3-L4)

**Področje uporabe**

Zunanost, zunaj

Zunanja uporaba  
Izdelek je namenjen za uporabo v stoječih vodah, ki se ne uporabljajo za pitno vodo in vzgojo okrasnih rib ter so lahko primerni za sezonski ali neprekinjeni razvoj ličink komarjev, kot so na primer:

- vrtni ribniki
- vodometi
- neizkoriščeni bazeni
- odtoki za deževnico
- kateri koli drugi, naravni ali umetni zbiralnih vode

Tretirana voda ne sme biti v stiku z živo vodo ali čistilno napravo.

**Način(-i) uporabe**

Metoda: Ročni nanos  
Podroben opis:

Ročno doziranje  
Sredstvo je treba uporabljati v skladu z navedenim odmerkom.  
Ročni način uporabe.

Aktivno snov začne tableta izločati ob stiku z vodo, zato poskrbite, da je tableta v popolnoma prekrita z vodo. Za maksimalni učinek je tretiranje potrebno začeti pred sezono komarjev, takoj, ko se pojavijo ličinke. Postopek ponovite enkrat na mesec skozi celotno sezono komarjev (od aprila do oktobra.)  
Tretirane vode ne uporabljajte za zalivanje rastlin, namenjenih uživanju (zelenjava, zelišča).

**Odmerki in pogostost uporabe**

Odmerek: Doziranje je odvisno od kakovosti vode. 2 g tableta: čista voda: 1x2 g tableta/1000 L vode; voda, onesnažena z organskimi snovmi: 1x2 g tableta/500-1000 L vode; ; voda z visoko vsebnostjo organskih snovi (na primer zbiralnik za deževnico): 1x2 g tableta/50 L vode; 0.5 g tableta: čista voda: 4x0.5 g tableta/1000 L vode; voda, onesnažena z organskimi snovmi: 4x0.5 g tableta/500-1000 L vode; voda z visoko vsebnostjo organskih snovi (na primer zbiralnik za deževnico): 4x0.5 g tableta/50 L vode  
Redčenje (%): 0

Število in časovni raspored uporabe:  
Izdelek se uporablja v vodah, kjer so prisotne ličinke komarjev.  
Pred začetkom tretiranja ocenite količino vode in na podlagi tega določite potreben odmerek.

**Skupina(-e) uporabnikov**

Strokovnjak z licenco

Poklicni

## Velikosti in material embalaže

Dimenzije in materiali embalaže

0.5g tableta:  
2000 kosov

2g tableta:  
500 kosov

Zapakirano v kilogramske LDPE vrečke in nameščeno v vedro (PP ali HDPE)  
teža: največ 25 kg  
načrtovana pakiranja: 1,2,5,10,20 in 25 kg.

### 4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

-

### 4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Pred uporabo vedno preberite podatke na etiketi in upoštevajte posredovane informacije.  
Priporočamo izmenično uporabo sredstev z različnim mehanizmom delovanja (za zatiranje odpornih primerkov).  
Izogibajte se stalni uporabi izdelka.  
Pri načrtovanju tretiranja upoštevajte življenjski cikel in značilnosti žuželk v času tretiranja. Posebno pozornost namenite najobčutljivejši življenjski fazi škodljivcev, urniku uporabe in značilnostim tretiranega območja.  
Uporabljajte integrirano metodo zatiranja, kombinacijo fizičnih, kemijskih drugih metod zatiranja v javnem zdravstvu, ob upoštevanju krajevnih podnebnih razmer (ciljne vrste, pogoje uporabe itd.).  
O pojavih odpornosti mora imetniki dovoljenja obvestiti pristojne in druge ustrezne organe.  
O neučinkovitosti tretiranja je treba obvestiti imetnika dovoljenja za prodajo.

### 4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

-

### 4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

#### 4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

## 5. Splošna navodila za uporabo

### 5.1. Navodila za uporabo

Glej točko 4.1 neprofesionalna in točko 4.2 profesionalna uporaba

### 5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Uporablja se izključno za zatiranje ličink komarja in samo v skladu z navodili o uporabi.

Med uporabo izdelka je prepovedano jesti, piti ali kaditi.  
Upoštevajte navodila za uporabo in predpise o varnosti in zdravja pri delu, s čimer se izognete nevarnosti za ljudi in okolje.

Izpust tretirane vode v naravne/žive vode je prepovedana.

### 5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Verjetni neposredni in posredni vplivi:  
Lahko povzroči alergijske reakcije.

Prva pomoč:

-Pri stiku s kožo: Kožo sperite z milom in vodo.

-Pri stiku z očmi: Oči nekaj minut spirajte z veliko vode. Če uporabljate kontaktne leče, jih odstranite, če je to mogoče, nato pa nadaljujte z izpiranjem. V primeru draženja oči ali težav z vidom poiščite zdravniško pomoč.

-Pri zaužitju: Usta izperite z vodo.

V primeru pojava, obstoja ali poslabšanja znakov ali simptomov, kontaktirajte lokalni center za zastrupitve in poiščite zdravniško pomoč; po potrebi poškodovanca odpeljite v bolnišnico in, če je možno, osebju pokažite etiketo ali embalažo izdelka.

Poškodovanca ne puščajte brez nadzora!

Priporočilo za zdravstveno osebje: zagotoviti je treba simptomatsko in podporno zdravljenje.

Če potrebujete zdravniško pomoč, imejte s seboj embalažo ali etiketo, in kontaktirajte lokalni center za zastrupitve (112).

### 5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Neuporabljenega izdelka ali ostankov ne odvrzite na tla, v vodotoke ali vodovod (umivalni, WC itd.).  
Neuporabljen izdelek in embalažo je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

## 5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Na podlagi razpoložljivih podatkov je rok trajanja izdelka 2 leti.  
Izdelek shranjujte v originalni, zaprti embalaži ter v suhem, hladnem (temperatura ne sme biti višja od 45° C) in zračnem prostoru, zaščiteno pred neposrednimi sončnimi žarki.  
Izdelek shranjujte izven dosega otrok in domačih živali.

NE shranjujte skupaj z živili, pijačo, krmo, semeni in umetnim gnojilom.

## 6. Druge informacije

Obvladovanje odpornosti  
Za preprečevanje razvoja odpornosti priporočamo uporabo sredstev z različnim mehanizmom delovanja.

Pozor  
Kakovost tretirane vode (visoka vsebnost organskih snovi) lahko vpliva na učinkovitost in trajnost sredstva.