

Summary of product characteristics for a biocidal product

Product name: Autan Family Dry Spray

Product type(s): PT19 - Repellents and attractants (Pest control)

PT19 - Repellents and attractants (Pest control)

Authorisation number: 2115-4

R4BP 3 asset reference number: BG-0010782-0000

Table Of Contents

Administrative information	1
1.1. Trade names of the product	1
1.2. Authorisation holder	1
1.3. Manufacturer(s) of the biocidal products	1
1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)	1
2. Product composition and formulation	2
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	2
2.2. Type of formulation	2
3. Hazard and precautionary statements	2
4. Authorised use(s)	2
5. General directions for use	11
5.1. Instructions for use	11
5.2. Risk mitigation measures	13
5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment	15
5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging	17
5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage	19
6. Other information	21

Administrative information

1.1. Trade names of the product

Autan Family Dry Spray

1.2. Authorisation holder

Name and address of the authorisation holder	Name	SC Johnson Wax SRL
	Address	Strada Plantelor, Nr. 37A Sector 2 Bucuresti Romania
Authorisation number	2115-4	
R4BP 3 asset reference number	BG-0010782-0000	
Date of the authorisation	30/03/2017	
Expiry date of the authorisation	20/02/2027	

1.3. Manufacturer(s) of the biocidal products

Name of the manufacturer	Colep CCL Polska SP. ZO. O.
Address of the manufacturer	UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Poland
Location of manufacturing sites	UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Poland

1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)

Active substance	23 - N,N-diethyl-meta-toluamide
Name of the manufacturer	Vertellus Performance Materials Inc
Address of the manufacturer	2110 High Point Road NC 27402 Greensboro United States
Location of manufacturing sites	2110 High Point Road NC 27402 Greensboro United States

2. Product composition and formulation

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
N,N-diethyl-meta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	Active Substance	134-62-3	205-149-7	15

2.2. Type of formulation

aerosol

3. Hazard and precautionary statements

Hazard statements	
Precautionary statements	

4. Authorised use(s)

4.1 Use description

Use 1 - Repellents

Product type

PT19 - Repellents and attractants (Pest control)

Where relevant, an exact description of the authorised use

Биоцидът
е готов за употреба (аерозол). Преди употреба опаковката да се разклати добре.

Прилага
се върху откритите части на тялото, които са изложени на ухапвания, като се пръска от разстояние 15 – 20 cm от повърхността за около 1 секунда и се нанася на равен, тънък слой. Да се нанася най-малкото количество, достатъчно да омокри участъците от кожата, които трябва да бъдат защитени.

Разходна норма: 1 g биоцид на 645cm² кожа.

За възрастни: прилага се внимателно върху кожата на лице, врат, длани, долните части на ръцете и краката.

За деца над 2 години: прилага внимателно на по-ограничени части от тялото - лице, врат, долната части на краката.

Да
не се прилага при деца под 2 годишна възраст.

Да
не се прилага повече от два пъти за 24 часа и да се избягва прекалената употреба.

Да
не се пръска директно върху лицето. При обработка на лицето, продукта първо се пръска върху дланта и след това се нанася внимателно, без да се засягат очите и устата.

За
деца между 2 и 12 години обработката на кожата да се извършва от възрастен, който нанася препаратa на дланите на ръцете си и обтрива кожата на детето.

Репелентът
да не се нанася върху дланите и ръцете на деца под 12 годишна възраст.

Да
не се прилага под дрехите. Препоръчва се останалата нетретирана част от тялото да се защитава от дрехите (по възможност дълги панталони или дрехи с дълги ръкави) и така да се ограничи достъпа на хапеци насекоми до кожата.

След
прекратяване на контакта с насекоми и кърлежи, участъкът от кожата, върху който е нанесен биоцида да се измие обилно с вода и сапун.

Да
не се замърсяват с продукта храни и напитки, съдове предназначени за тяхната употреба и повърхности, които влизат в контакт с храни.

Да
се използва само на открито или на добре проветриво място и да не се вдишват парите.

Продължителност на репелентния ефект:
комари до 4 часа.

Интервал между обработките: Да не се прилага повече от два пъти за 24 часа.

Target organism(s) (including development stage)

Scientific name: Culicidae:
Common name: Mosquitoes
Development stage: mosquitos

Field(s) of use

Outdoor

Application method(s)

Method: aerosol dispenser
Detailed description:

Application rate(s) and frequencies

Apply at the rate of 1.0 g product per 645 cm² (0.23 mg DEET cm²).

Repels mosquitoes immediately that may carry Yellow Fever, Dengue Fever, and West Nile Virus for up to 4 hours per application.

Do not apply more than twice in a 24 hour period and avoid over-application.

Application Rate: Apply at the rate of 1.0 g product per 645 cm² (0.23 mg DEET cm²).
Dilution (%): 15
Number and timing of application:

Биоцидът е готов за употреба (аерозол). Преди употреба опаковката да се разклати добре.

Прилага се върху откритите части на тялото, които са изложени на ухапвания, като се пръска от разстояние 15 – 20 cm от повърхността за около 1 секунда и се нанася на равен, тънък слой. Да се нанася най-малкото количество, достатъчно да омокри участъците от кожата, които трябва да бъдат защитени.

Разходна норма:
1 g
биоцид на 645cm² кожа.

Category(ies) of users

General public (non-professional)

Pack sizes and packaging material

Аерозолни флакони от калайдисана стомана, с обем 100 ml.

4.1.1 Use-specific instructions for use

Биоцидът е готов за употреба (аерозол). Преди употреба опаковката да се разклати добре.

Прилага

се върху откритите части на тялото, които са изложени на ухапвания, като се пръска от разстояние 15 – 20 cm от повърхността за около 1 секунда и се нанася на равен, тънък слой. Да се нанася най-малкото количество, достатъчно да омокри участъците от кожата, които трябва да бъдат защитени.

Разходна норма: 1 g биоцид на 645cm² кожа.

4.1.2 Use-specific risk mitigation measures

Биоцидът

е готов за употреба (аерозол). Преди употреба опаковката да се разклати добре.

Прилага

се върху откритите части на тялото, които са изложени на ухапвания, като се пръска от разстояние 15 – 20 cm от повърхността за около 1 секунда и се нанася на равен, тънък слой. Да се нанася най-малкото количество, достатъчно да омокри участъците от кожата, които трябва да бъдат защитени.

Разходна норма: 1 g биоцид на 645cm² кожа.

4.1.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Биоцидът

е готов за употреба (аерозол). Преди употреба опаковката да се разклати добре.

Прилага

се върху откритите части на тялото, които са изложени на ухапвания, като се пръска от разстояние 15 – 20 cm от повърхността за около 1 секунда и се нанася на равен, тънък слой. Да се нанася най-малкото количество, достатъчно да омокри участъците от кожата, които трябва да бъдат защитени.

Разходна норма: 1 g биоцид на 645cm²

кожа.

4.1.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Биоцидът е готов за употреба (аерозол). Преди употреба опаковката да се разклати добре.

Прилага се върху откритите части на тялото, които са изложени на ухапвания, като се пръска от разстояние 15 – 20 cm от повърхността за около 1 секунда и се нанася на равен, тънък слой. Да се нанася най-малкото количество, достатъчно да омокри участъците от кожата, които трябва да бъдат защитени.

Разходна норма: 1 g биоцид на 645cm² кожа.

4.1.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Биоцидът е готов за употреба (аерозол). Преди употреба опаковката да се разклати добре.

Прилага се върху откритите части на тялото, които са изложени на ухапвания, като се пръска от разстояние 15 – 20 cm от повърхността за около 1 секунда и се нанася на равен, тънък слой. Да се нанася най-малкото количество, достатъчно да омокри участъците от кожата, които трябва да бъдат защитени.

Разходна норма: 1 g биоцид на 645cm² кожа.

4.2 Use description

Use 2 - репелент

Product type

PT19 - Repellents and attractants (Pest control)

Where relevant, an exact description of the authorised use

Биоцидът е готов за употреба (аерозол). Преди употреба опаковката да се разклати добре.

Прилага се върху откритите части на тялото, които са изложени на ухапвания, като се пръска от разстояние 15 – 20 cm от повърхността за около 1 секунда и се нанася на равен, тънък слой. Да се нанася най-малкото количество, достатъчно да омокри участъците от кожата, които трябва да бъдат защитени.

Разходна норма: 1 g биоцид на 645cm² кожа.

Target organism(s) (including development stage)

Scientific name: mosquitos
Common name: mosquitos
Development stage: Adults

Field(s) of use

Outdoor

Application method(s)

Method: Aerosol dispenser
Detailed description:

Apply at the rate of 1.0 g product per 645 cm² (0.23 mg DEET cm²).

Repels mosquitoes immediately that may carry Yellow Fever, Dengue Fever, and West Nile Virus for up to 4 hours per application.

Do not apply more than twice in a 24 hour period and avoid over-application

Application rate(s) and frequencies

Application Rate: Apply at the rate of 1.0 g product per 645 cm² (0.23 mg DEET cm²).
Dilution (%): 15
Number and timing of application:

	<p>Apply at the rate of 1.0 g product per 645 cm² (0.23 mg DEET cm²).</p> <p>Repels mosquitoes immediately that may carry Yellow Fever, Dengue Fever, and West Nile Virus for up to 4 hours per application.</p> <p>Do not apply more than twice in a 24 hour period and avoid over-application</p>
Category(ies) of users	General public (non-professional)
Pack sizes and packaging material	Аерозолни флакони от калайдисана стомана, с обем 100 ml

4.2.1 Use-specific instructions for use

<p>Биоцидът е готов за употреба (аерозол). Преди употреба опаковката да се разклати добре.</p> <p>Прилага се върху откритите части на тялото, които са изложени на ухапвания, като се пръска от разстояние 15 – 20 cm от повърхността за около 1 секунда и се нанася на равен, тънък слой. Да се нанася най-малкото количество, достатъчно да омокри участъците от кожата, които трябва да бъдат защитени.</p> <p>Разходна норма: 1 g биоцид на 645cm² кожа.</p>
--

4.2.2 Use-specific risk mitigation measures

<p>Биоцидът е готов за употреба (аерозол). Преди употреба опаковката да се разклати добре.</p>
--

Прилага

се върху откритите части на тялото, които са изложени на ухапвания, като се пръска от разстояние 15 – 20 cm от повърхността за около 1 секунда и се нанася на равен, тънък слой. Да се нанася най-малкото количество, достатъчно да омокри участъците от кожата, които трябва да бъдат защитени.

Разходна норма: 1 g биоцид на 645cm² кожа.

4.2.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Биоцидът

е готов за употреба (аерозол). Преди употреба опаковката да се разклати добре.

Прилага

се върху откритите части на тялото, които са изложени на ухапвания, като се пръска от разстояние 15 – 20 cm от повърхността за около 1 секунда и се нанася на равен, тънък слой. Да се нанася най-малкото количество, достатъчно да омокри участъците от кожата, които трябва да бъдат защитени.

Разходна норма: 1 g биоцид на 645cm² кожа.

4.2.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Биоцидът

е готов за употреба (аерозол). Преди употреба опаковката да се разклати добре.

Прилага

се върху откритите части на тялото, които са изложени на ухапвания, като се пръска от разстояние 15 – 20 cm от повърхността за около 1 секунда и се нанася на равен, тънък слой. Да се нанася най-малкото количество, достатъчно да омокри участъците от кожата, които трябва да бъдат защитени.

Разходна норма: 1 г биоцид на 645cm²
кожа.

4.2.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Биоцидът
е готов за употреба (аерозол). Преди употреба опаковката да се разклати добре.

Прилага
се върху откритите части на тялото, които са изложени на ухапвания, като се пръска от разстояние 15 – 20 cm от повърхността за около 1 секунда и се нанася на равен, тънък слой. Да се нанася най-малкото количество, достатъчно да омокри участъците от кожата, които трябва да бъдат защитени.

Разходна норма: 1 г биоцид на 645cm²
кожа.

5. General directions for use

5.1. Instructions for use

Биоцидът е готов за употреба (аерозол). Преди употреба опаковката да се разклати добре.

Прилага
се върху откритите части на тялото, които са изложени на ухапвания, като се пръска от разстояние 15 – 20 cm от повърхността за около 1 секунда и се нанася на равен, тънък слой. Да се нанася най-малкото количество, достатъчно да омокри участъците от кожата, които трябва да бъдат защитени.

Разходна норма: 1 g биоцид на 645cm² кожа.

За възрастни: прилага се внимателно върху кожата на лице, врат, длани, долните части на ръцете и краката.

За деца над 2 години: прилага внимателно на по-ограничени части от тялото - лице, врат, долната части на краката.

Да
не се прилага при деца под 2 годишна възраст.

Да
не се прилага повече от два пъти за 24 часа и да се избягва прекалената употреба.

Да
не се пръска директно върху лицето. При обработка на лицето, продукта първо се пръска върху дланта и след това се нанася внимателно, без да се засягат очите и устата.

За
деца между 2 и 12 години обработката на кожата да се извършва от възрастен, който нанася препарата на дланите на ръцете си и обтрива кожата на детето.

Репелентът
да не се нанася върху дланите и ръцете на деца под 12 годишна възраст.

Да

не се прилага под дрехите. Препоръчва се останалата нетретирана част от тялото да се защитава от дрехите (по възможност дълги панталони или дрехи с дълги ръкави) и така да се ограничи достъпа на хапещи насекоми до кожата.

След прекратяване на контакта с насекоми и кърлежи, участъкът от кожата, върху който е нанесен биоцида да се измие обилно с вода и сапун.

Да не се замърсяват с продукта храни и напитки, съдове предназначени за тяхната употреба и повърхности, които влизат в контакт с храни.

Да се използва само на открито или на добре проветриво място и да не се вдишват парите.

Продължителност на репелентния ефект:
комари до 4 часа.

Интервал между обработките: Да не се прилага повече от два пъти за 24 часа.

5.2. Risk mitigation measures

Биоцидът е готов за употреба (аерозол). Преди употреба опаковката да се разклати добре.

Прилага
се върху откритите части на тялото, които са изложени на ухапвания, като се пръска от разстояние 15 – 20 cm от повърхността за около 1 секунда и се нанася на равен, тънък слой. Да се нанася най-малкото количество, достатъчно да омокри участъците от кожата, които трябва да бъдат защитени.

Разходна норма: 1 g биоцид на 645cm² кожа.

За възрастни: прилага се внимателно върху кожата на лице, врат, длани, долните части на ръцете и краката.

За деца над 2 години: прилага внимателно на по-ограничени части от тялото - лице, врат, долната части на краката.

Да
не се прилага при деца под 2 годишна възраст.

Да
не се прилага повече от два пъти за 24 часа и да се избягва прекалената употреба.

Да
не се пръска директно върху лицето. При обработка на лицето, продукта първо се пръска върху дланта и след това се нанася внимателно, без да се засягат очите и устата.

За
деца между 2 и 12 години обработката на кожата да се извършва от възрастен, който нанася препарата на дланите на ръцете си и обтрива кожата на детето.

Репелентът
да не се нанася върху дланите и ръцете на деца под 12 годишна възраст.

Да

не се прилага под дрехите. Препоръчва се останалата нетретирана част от тялото да се защитава от дрехите (по възможност дълги панталони или дрехи с дълги ръкави) и така да се ограничи достъпа на хапещи насекоми до кожата.

След
прекратяване на контакта с насекоми и кърлежи, участъкът от кожата, върху който е нанесен биоцида да се измие обилно с вода и сапун.

Да
не се замърсяват с продукта храни и напитки, съдове предназначени за тяхната употреба и повърхности, които влизат в контакт с храни.

Да
се използва само на открито или на добре проветриво място и да не се вдишват парите.

Продължителност на репелентния ефект:
комари до 4 часа.

Интервал между обработките: Да не се прилага повече от два пъти за 24 часа.

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Биоцидът е готов за употреба (аерозол). Преди употреба опаковката да се разклати добре.

Прилага
се върху откритите части на тялото, които са изложени на ухапвания, като се пръска от разстояние 15 – 20 cm от повърхността за около 1 секунда и се нанася на равен, тънък слой. Да се нанася най-малкото количество, достатъчно да омокри участъците от кожата, които трябва да бъдат защитени.

Разходна норма: 1 g биоцид на 645cm² кожа.

За възрастни: прилага се внимателно върху кожата на лице, врат, длани, долните части на ръцете и краката.

За деца над 2 години: прилага внимателно на по-ограничени части от тялото - лице, врат, долната части на краката.

Да
не се прилага при деца под 2 годишна възраст.

Да
не се прилага повече от два пъти за 24 часа и да се избягва прекалената употреба.

Да
не се пръска директно върху лицето. При обработка на лицето, продукта първо се пръска върху дланта и след това се нанася внимателно, без да се засягат очите и устата.

За
деца между 2 и 12 години обработката на кожата да се извършва от възрастен, който нанася препарата на дланите на ръцете си и обтрива кожата на детето.

Репелентът
да не се нанася върху дланите и ръцете на деца под 12 годишна възраст.

Да

не се прилага под дрехите. Препоръчва се останалата нетретирана част от тялото да се защитава от дрехите (по възможност дълги панталони или дрехи с дълги ръкави) и така да се ограничи достъпа на хапещи насекоми до кожата.

След
прекратяване на контакта с насекоми и кърлежи, участъкът от кожата, върху който е нанесен биоцида да се измие обилно с вода и сапун.

Да
не се замърсяват с продукта храни и напитки, съдове предназначени за тяхната употреба и повърхности, които влизат в контакт с храни.

Да
се използва само на открито или на добре проветриво място и да не се вдишват парите.

Продължителност на репелентния ефект:
комари до 4 часа.

Интервал между обработките: Да не се прилага повече от два пъти за 24 часа.

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

Биоцидът е готов за употреба (аерозол). Преди употреба опаковката да се разклати добре.

Прилага
се върху откритите части на тялото, които са изложени на ухапвания, като се пръска от разстояние 15 – 20 cm от повърхността за около 1 секунда и се нанася на равен, тънък слой. Да се нанася най-малкото количество, достатъчно да омокри участъците от кожата, които трябва да бъдат защитени.

Разходна норма: 1 g биоцид на 645cm² кожа.

За възрастни: прилага се внимателно върху кожата на лице, врат, длани, долните части на ръцете и краката.

За деца над 2 години: прилага внимателно на по-ограничени части от тялото - лице, врат, долната части на краката.

Да
не се прилага при деца под 2 годишна възраст.

Да
не се прилага повече от два пъти за 24 часа и да се избягва прекалената употреба.

Да
не се пръска директно върху лицето. При обработка на лицето, продукта първо се пръска върху дланта и след това се нанася внимателно, без да се засягат очите и устата.

За
деца между 2 и 12 години обработката на кожата да се извършва от възрастен, който нанася препарата на дланите на ръцете си и обтрива кожата на детето.

Репелентът
да не се нанася върху дланите и ръцете на деца под 12 годишна възраст.

Да

не се прилага под дрехите. Препоръчва се останалата нетретирана част от тялото да се защитава от дрехите (по възможност дълги панталони или дрехи с дълги ръкави) и така да се ограничи достъпа на хапещи насекоми до кожата.

След
прекратяване на контакта с насекоми и кърлежи, участъкът от кожата, върху който е нанесен биоцида да се измие обилно с вода и сапун.

Да
не се замърсяват с продукта храни и напитки, съдове предназначени за тяхната употреба и повърхности, които влизат в контакт с храни.

Да
се използва само на открито или на добре проветриво място и да не се вдишват парите.

Продължителност на репелентния ефект:
комари до 4 часа.

Интервал между обработките: Да не се прилага повече от два пъти за 24 часа.

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Биоцидът е готов за употреба (аерозол). Преди употреба опаковката да се разклати добре.

Прилага
се върху откритите части на тялото, които са изложени на ухапвания, като се пръска от разстояние 15 – 20 cm от повърхността за около 1 секунда и се нанася на равен, тънък слой. Да се нанася най-малкото количество, достатъчно да омокри участъците от кожата, които трябва да бъдат защитени.

Разходна норма: 1 g биоцид на 645cm² кожа.

За възрастни: прилага се внимателно върху кожата на лице, врат, длани, долните части на ръцете и краката.

За деца над 2 години: прилага внимателно на по-ограничени части от тялото - лице, врат, долната части на краката.

Да
не се прилага при деца под 2 годишна възраст.

Да
не се прилага повече от два пъти за 24 часа и да се избягва прекалената употреба.

Да
не се пръска директно върху лицето. При обработка на лицето, продукта първо се пръска върху дланта и след това се нанася внимателно, без да се засягат очите и устата.

За
деца между 2 и 12 години обработката на кожата да се извършва от възрастен, който нанася препарата на дланите на ръцете си и обтрива кожата на детето.

Репелентът
да не се нанася върху дланите и ръцете на деца под 12 годишна възраст.

Да

не се прилага под дрехите. Препоръчва се останалата нетретирана част от тялото да се защитава от дрехите (по възможност дълги панталони или дрехи с дълги ръкави) и така да се ограничи достъпа на хапещи насекоми до кожата.

След
прекратяване на контакта с насекоми и кърлежи, участъкът от кожата, върху който е нанесен биоцида да се измие обилно с вода и сапун.

Да
не се замърсяват с продукта храни и напитки, съдове предназначени за тяхната употреба и повърхности, които влизат в контакт с храни.

Да
се използва само на открито или на добре проветриво място и да не се вдишват парите.

Продължителност на репелентния ефект:
комари до 4 часа.

Интервал между обработките: Да не се прилага повече от два пъти за 24 часа.

6. Other information