

ΚΥΠΡΙΑΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. BC-ΧΕ021992-33 για την τροποποίηση της άδειας του βιοκτόνου **Rodex Whole Wheat** ως προς τη σήμανση και ταξινόμησή του,

Ι. Τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο βιοκτόνο **Rodex Whole Wheat** ως ακολούθως:

Α) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0023

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

21/10/2013

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/08/2020

2. Κάτοχος της άδειας:

PeiGar International Ltd
Unit 13, Newman Lane, Alton, Hants, GU34 2QR, United Kingdom

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση
στην τοπική αγορά:

L. Lambrou Agro Ltd
T.K. 24839, 1304 Λευκωσία

4. Διανομέας / Διανομείς:

L. Lambrou Agro Ltd
T.K. 24839, 1304 Λευκωσία

Β) Ταυτότητα Βιοκτόνου

1. Εμπορικό Όνομα:

Rodex Whole Wheat

2. Τύπος Προϊόντων: ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα

3. Κατηγορία χρηστών: Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση

4. Μορφή: ΑΒ - Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε σπόρους σιτηρών

5. Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστική ουσία:
bromadiolone 0,005% β/β
Περιέχει τον πικραντικό-αποτρεπτικό παράγοντα denatonium benzoate
Χρώμα: κόκκινο
Βοηθητικές ουσίες: 99,995% β/β

6. Παρασκευαστής σκευάσματος: PelGar International Ltd, Ην. Βασίλειο

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: bromadiolone

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 98%

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: PelGar International Ltd, Ην. Βασίλειο

II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.

III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

- 1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 31/08/2020.
- 2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
- 3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους της πρώτης έγκρισης του σκευάσματος, όπως αυτή χορηγήθηκε από το κράτος-μέλος αξιολόγησης.
2. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
3. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

Ημερομηνία:19/07/2017.....



**Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
RODEX WHOLE WHEAT**

Αρ. Άδειας: KY-0023

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
Rodex Whole Wheat	Κύπρος

1.2. Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας	Όνομα	PelGar International Ltd
	Διεύθυνση	Unit 13, Newman Lane, Alton, Hants, GU34 2QR, United Kingdom
Αριθμός άδειας	KY-0023	
Ημερομηνία χορήγησης άδειας	21/10/2013	
Ημερομηνία λήξης άδειας	31/08/2020	

1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	PelGar International Ltd
Διεύθυνση παρασκευαστή	Unit 13, Newman Lane, Alton, Hants, GU34 2QR, United Kingdom
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Unit 13, Newman Lane, Alton, Hants, GU34 2QR, United Kingdom

1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστηκής/ών ουσίας/ιών

Δραστηκή ουσία	Bromadiolone
Όνομα παρασκευαστή	PelGar International Ltd
Διεύθυνση παρασκευαστή	Unit 13, Newman Lane, Alton, Hants, GU34 2QR, United Kingdom
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Prazska 54 28002, Kolin, Czech Republic

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Bromadiolone	-	Δραστική ουσία	28772-56-7	249-205-9	0,005

Βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος

2.2. Τύπος σκευάσματος

RB-Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Κατηγορία κινδύνου	-
Δήλωση επικινδυνότητας	EU208 Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one . Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. EU401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	-
Δηλώσεις επικινδυνότητας	-
Δηλώσεις προφύλαξης	P102 Μακριά από παιδιά. P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. P220 Αποθηκεύστε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια P301 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ. P404 Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501 Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Παρατηρήσεις	Στις συσκευασίες που προορίζονται μόνο για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να αναγράφεται η φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε Συνεργεία Εκτέλεσης Επαγγελματικών Εργασιών Εφαρμογής Βιοκτόνων που έχουν άδεια από την Αρμόδια Αρχή».
--------------	---

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 1. Ερασιτεχνική χρήση – Μέσα/Γύρω από τα κτήρια

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους γύρω από τα κτήρια. Για χρήση κατά των ποντικών, προτείνονται εμπορικά διαθέσιμοι δολωματικοί σταθμοί (προδολωμένοι ή επαναχρησιμοποιούμενοι) ή καθορισμένα προστατευμένα σημεία δόλωσης. Για χρήση κατά των αρουραίων, προτείνονται μόνο δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας που διατίθεται στο εμπόριο (προδολωμένοι ή επαναχρησιμοποιούμενοι). Και για τις δύο περιπτώσεις αρουραίων και ποντικών, το δόλωμα πρέπει να παρέχεται σε μορφή σπόρων σιτηρών (που εμπεριέχονται σε φακελάκια) και έκαστος δολωματικός σταθμός να περιέχει την απαιτούμενη ποσότητα δολώματος για κάθε σημείο δόλωσης (για αρουραίο ή ποντικό). Το όλο πακέτο θα πρέπει να περιέχει κατ' ανώτατο όριο 1.5kg δολώματος. Οι δολωματικοί σταθμοί / τα σημεία δόλωσης τοποθετούνται με το χέρι στη προσβεβλημένη με τρωκτικά περιοχή. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεωθούν στο έδαφος. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί τυχαία.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Rattus norvegicus</i> (Καφέ Αρουραίος) Νεαρά και Ενήλικα <i>Mus musculus</i> (Οικιακό ποντίκι) Νεαρά και Ενήλικα
Πεδίο εφαρμογής	Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους γύρω από τα κτήρια. Τα δολώματα τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών (σταθμοί ασφαλείας) που είναι στερεωμένοι στο έδαφος ή σε προστατευμένα σημεία δόλωσης (μόνο για ποντικούς). Τα δολώματα σε τέτοιους δολωματικούς σταθμούς μπορούν επίσης να ασφαλιζονται στη θέση τους ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απομάκρυνση και η διασπορά από τα τρωκτικά. Όταν τα δολώματα τοποθετούνται σε καλυμμένα σημεία δόλωσης θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά από οργανισμούς-μη στόχους. Τα δολώματα δεν θα πρέπει να τοποθετούνται τυχαία.
Μέθοδος εφαρμογής	<u>Δολωματική εφαρμογή</u> Εφαρμογή δολώματος σε δολωματικούς σταθμούς (αρουραίοι ή ποντίκια), Καλυπτόμενα / προστατευμένα σημεία δόλωσης(ποντίκια μόνο).

	<p><u>Λεπτομερής περιγραφή της μεθόδου:</u> Τα δολώματα τοποθετούνται όπου υπάρχουν ενδείξεις δραστηριότητας τρωκτικών, όπως φρέσκα περιπτώματα, μέσα ή κοντά σε φωλιές και λαγούμια, σε διαδρόμους και χώρους σίτισης τρωκτικών. Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποκλείεται, όσο το δυνατόν περισσότερο, η έκθεση σε παιδιά, πουλιά και ζώα που δεν αποτελούν στόχο (κυρίως σκύλους, γάτες, χοίρους και πουλερικά). Κάνετε συχνές επιθεωρήσεις στα σημεία δόλωσης κατά τις πρώτες 10-14 μέρες και αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα έχει φαγωθεί από τρωκτικά ή ότι έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες. Εάν δεν υπάρχουν σημάδια δραστηριότητας αρουραίων κοντά σε ένα σημείο δόλωσης μετά από 7-10 ημέρες, να το μετακινήσετε σε μια περιοχή μεγαλύτερης δραστηριότητας. Αν όλο το δόλωμα έχει φαγωθεί σε ορισμένες περιοχές, αυξήστε την ποσότητα του δολώματος, τοποθετώντας περισσότερες θέσεις δόλωσης. Μην αυξάνετε την ποσότητα του δολώματος. Είναι γενικά πολύ πιο αποτελεσματικό να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερο αριθμό σημείων δόλωσης σε σύγκριση με ένα μικρότερο αριθμό και με μεγαλύτερη ποσότητα δολώματος. Μεγάλες ποσότητες δολώματος αυξάνουν τον κίνδυνο για την άγρια ζωή και τα άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο. Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος, τουλάχιστον τόσο συχνά, όπως όταν τα δολώματα ελέγχονται ή / και αναπληρώνονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται καθημερινή επιθεώρηση. Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.</p>
<p>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</p>	<p>Για προσβολές αρουραίων χρησιμοποιήστε μέχρι 200γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετήστε τα σημεία δόλωσης σε αποστάσεις 10 m μεταξύ τους, σε περιπτώσεις υψηλής προσβολής μειώστε την απόσταση σε 5 m.</p> <p>Για προσβολές ποντικών χρησιμοποιήστε μέχρι 40γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετήστε τα σημεία δόλωσης σε αποστάσεις 5 m μεταξύ τους, σε περιπτώσεις υψηλής προσβολής μειώστε την απόσταση σε 2 m.</p> <p>Η συχνότητα εφαρμογής είναι συνήθως 2-4 φορές το έτος, ανά 3-6 μήνες. Τα προγράμματα δόλωσης επαναλαμβάνονται βάσει των αναγκών, συνήθως κάθε 3-6 μήνες, λόγω εκ νέου επαναπροσβολής. Η διάρκεια του προγράμματος είναι συνήθως έως 6 εβδομάδες.</p>
<p>Κατηγορίες χρηστών</p>	<p>Μη επαγγελματίες (Ερασιτέχνες χρήστες)</p>
<p>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</p>	<p>A) Μη διάτρητα φακελάκια από PP ή PE που περιέχουν δόλωμα των 10, 25, 30, 40, 50, 100 ή 200 g τοποθετημένα σε:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Κάδο από PP, έως 1,5kg Περιγραφή: 2) Βαρέλι από PP ή PE, έως 1,5kg 3) Σακούλα από PET/PE, PP/PE or paper/PE, έως 1,5kg 4) Κουτιά, έως 1kg

	<p>B) Δολωματικός Σταθμός, HDPE ή PP, έως 800g Περιγραφή: τα φακελάκια συσκευάζονται σε ένα, μιας ή πολλαπλών χρήσεων δολωματικό σταθμό ασφαλείας για ποντίκια, HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 σε ένα εξωτερικό χαρτοκιβώτιο.</p> <p>- Όλες οι παραπάνω συσκευασίες είναι σφραγισμένες.</p>
--	---

Πίνακας 2. Επαγγελματική χρήση – Μέσα/Γύρω από τα κτήρια

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	<p>Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους γύρω από τα κτήρια.</p> <p>Τα δολώματα τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών που μπορούν να στερεωθούν στο έδαφος (σταθμοί ασφαλείας), ή σε προστατευμένα σημεία δόλωσης. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να ασφαλιζονται ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα απομάκρυνσης και η διασπορά του δολώματος από τα τρωκτικά. Το προϊόν μπορεί επίσης να τοποθετείται σε καλυμμένα σημεία δόλωσης με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζεται η πρόσβαση από οργανισμούς-μη στόχους. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί τυχαία.</p>
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<p><i>Rattus norvegicus</i> (Καφέ Αρουραίος) Νεαρά και Ενήλικα</p> <p><i>Mus musculus</i> (Οικιακό ποντίκι) Νεαρά και Ενήλικα</p>
Πεδίο εφαρμογής	<p>Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους γύρω από τα κτήρια.</p> <p>Τα δολώματα τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών (σταθμοί ασφαλείας) που είναι στερεωμένοι στο έδαφος ή σε προστατευμένα σημεία δόλωσης.</p> <p>Τα δολώματα σε τέτοιους δολωματικούς σταθμούς μπορούν επίσης να ασφαλιζονται στη θέση τους ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απομάκρυνση και η διασπορά από τα τρωκτικά.</p> <p>Όταν τα δολώματα τοποθετούνται σε καλυμμένα σημεία δόλωσης θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά από οργανισμούς-μη στόχους.</p> <p>Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί τυχαία.</p>
Μέθοδος εφαρμογής	<p><u>Δολωματική εφαρμογή</u></p> <p><u>Μέθοδος εφαρμογής:</u> εφαρμογή δολώματος σε δολωματικούς σταθμούς (αρουραίοι ή ποντίκια). Καλυπτόμενα / προστατευμένα σημεία δόλωσης (ποντίκια μόνο).</p> <p><u>Λεπτομερής περιγραφή της μεθόδου:</u> Τοποθετήστε δόλωμα όπου υπάρχουν ενδείξεις δραστηριότητας τρωκτικών, όπως φρέσκα περιπτώματα, μέσα ή κοντά σε φωλιές και λαγούμια, σε διαδρόμους και χώρους σίτισης τρωκτικών. Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποκλείεται, όσο το δυνατόν περισσότερο, η έκθεση</p>

	<p>σε παιδιά, πουλιά και ζώα που δεν αποτελούν στόχο (κυρίως σκύλους, γάτες, χοίρους και πουλερικά). Κάνετε συχνές επιθεωρήσεις στα σημεία δόλωσης κατά τις πρώτες 10-14 μέρες και αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα έχει φαγωθεί από τρωκτικά ή ότι έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες. Εάν δεν υπάρχουν σημάδια δραστηριότητας αρουραίων κοντά σε ένα σημείο δόλωσης μετά από 7-10 ημέρες, να το μετακινήσετε σε μια περιοχή μεγαλύτερης δραστηριότητας. Αν όλο το δόλωμα έχει φαγωθεί σε ορισμένες περιοχές, αυξήστε την ποσότητα του δολώματος, τοποθετώντας περισσότερες θέσεις δόλωσης. Μην αυξάνετε την ποσότητα του δολώματος. Είναι γενικά πολύ πιο αποτελεσματικό να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερο αριθμό σημείων δόλωσης σε σύγκριση με ένα μικρότερο αριθμό και με μεγαλύτερη ποσότητα δολώματος. Μεγάλες ποσότητες δολώματος αυξάνουν τον κίνδυνο για την άγρια ζωή και τα άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο. Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος, τουλάχιστον τόσο συχνά, όπως όταν τα δολώματα ελέγχονται ή / και αναπληρώνονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται καθημερινή επιθεώρηση. Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.</p>
<p>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</p>	<p>Για προσβολές αρουραίων χρησιμοποιήστε μέχρι 200γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετήστε τα σημεία δόλωσης σε αποστάσεις 10 m μεταξύ τους, σε περιπτώσεις υψηλής προσβολής μειώστε την απόσταση σε 5 m.</p> <p>Για προσβολές ποντικών χρησιμοποιήστε μέχρι 40γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετήστε τα σημεία δόλωσης σε αποστάσεις 5 m μεταξύ τους, σε περιπτώσεις υψηλής προσβολής μειώστε την απόσταση σε 2 m.</p> <p>Η συχνότητα εφαρμογής είναι συνήθως 2-4 φορές το έτος, ανά 3-6 μήνες. Τα προγράμματα δόλωσης επαναλαμβάνονται βάσει των αναγκών, συνήθως κάθε 3-6 μήνες, λόγω εκ νέου επαναπροσβολής.</p> <p>Η διάρκεια του προγράμματος είναι συνήθως έως 6 εβδομάδες.</p>
<p>Κατηγορίες χρηστών</p>	<p>Επαγγελματίες χρήστες</p>
<p>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</p>	<p>A) Χαρτοκιβώτιο με διπλά τοιχώματα ή με fibreboard επενδυμένο με πολυαιθυλένιο, έως 25 kg Σακούλα από πολυαιθυλένιο/χαρτί σε χαρτοκιβώτιο (fibreboard), έως 2kg Σάκος από προπυλένιο ή χαρτοσακούλα πολλαπλών φύλλων ή σάκος πολυαιθυλενίου / πολυπροπυλενίου, έως 25 kg Κάδος ή βαρέλι από PP ή PE, έως 20 κιλά</p> <p>B) Σακουλάκια, PE ή PP/χαρτί ή προσαρμοσμένο PP ή PE/αλουμίνιο ή PE/χαρτί/ αλουμίνιο, έως 1000g Παρέχεται χωρίς εξωτερική συσκευασία ή με χαρτόνι (fibreboard) με ή χωρίς επένδυση πολυαιθυλενίου ή σε συσκευασία από πολυαιθυλένιο ή σε συσκευασία από πολυπροπυλένιο ή σε συσκευασία blister, έως 20kg στην εξωτερική συσκευασία.</p> <p>Γ) Σακούλα, PP ή πολυστρωματικό PP ή PET/PE ή PE/χαρτί/αλουμίνιο, έως 15kg Παρέχεται χωρίς εξωτερική συσκευασία ή με χαρτόνι</p>

	<p>(fibreboard) με ή χωρίς επένδυση από πολυαιθυλένιο ή σε συσκευασία από πολυαιθυλένιο ή σε συσκευασία από πολυπροπυλένιο ή σε συσκευασία blister, έως 20kg στην εξωτερική συσκευασία.</p> <p>Δ) Μη διάτρητα φακελάκια, PE ή PP/χαρτί ή προσαρμοσμένο PP ή PE/αλουμίνιο ή PE/χαρτί/αλουμίνιο, των 10, 25, 30, 40, 50, 100 ή 200g.</p> <p>Σακουλάκια με ή χωρίς εξωτερικό χαρτόνι.</p> <p>Ε) Σακούλα από πολυπροπυλένιο ή πολυστρωματικό χαρτί, έως 25kg</p> <p>Κάδος, PP, έως 20kg</p> <p>Βαρέλι, PP ή PE, έως 2kg</p> <p>Σακούλα, PET/PE ή PP/PE ή χαρτί/PE, έως 10kg</p> <p>Δοχείο που διαθέτει καπάκι ασφαλείας, PP ή PE, έως 3kg</p> <p>Κουτί (fibreboard), έως 1kg</p> <p>Δόλωμα σε διάτρητα ή μη διάτρητα φακελάκια πολυπροπυλενίου/χαρτιού ή PET/ πολυαιθυλενίου ή πολυαιθυλενίου/χαρτιού ή πολυαιθυλενίου/αλουμινίου (10, 25, 30, 40, 50, 100 ή 200 g) στην παραπάνω εξωτερική συσκευασία.</p> <p>Ζ) Εξωτερικό χαρτόνι, έως 6.4 κιλά</p> <p>Περιγραφή: τα φακελάκια συσκευάζονται σε ένα, μιας ή πολλαπλών χρήσεων δολωματικό σταθμό ασφαλείας για ποντίκια, HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 σε ένα εξωτερικό χαρτοκιβώτιο, έως 0,8 kg.</p> <p>- Όλες οι παραπάνω συσκευασίες είναι σφραγισμένες.</p> <p>Στις συσκευασίες που προορίζονται μόνο για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να αναγράφεται η φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε Συνεργεία Εκτέλεσης Επαγγελματικών Εργασιών Εφαρμογής Βιοκτόνων που έχουν άδεια από την Αρμόδια Αρχή».</p>
--	---

Πίνακας 3. Επαγγελματική χρήση – Σε υπονόμους

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	<p>Για χρήση σε υπονόμους από επαγγελματίες.</p> <p>Το δόλωμα τοποθετείτε με τέτοιο τρόπο (στους υπονόμους) ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση στο δόλωμα από οργανισμούς μη-στόχους. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί τυχαία.</p>
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Rattus norvegicus</i> (Καφέ Αρουραίος) Νεαρά και Ενήλικα
Πεδίο εφαρμογής	<p>Εσωτερικοί Χώροι</p> <p>Για χρήση σε υπονόμους. Το δόλωμα τοποθετείτε με τέτοιο τρόπο (στους υπονόμους) ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση στο δόλωμα από οργανισμούς μη-στόχους. Η ευπάθεια (πρόσβαση από οργανισμούς-μη στόχους) σε ένα συγκεκριμένο τόπο, εκτιμάται από την απόφαση για τη μέθοδο εγκατάστασης που χρησιμοποιήθηκε. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί τυχαία.</p>

Μέθοδος εφαρμογής	<p><u>Δολωματική εφαρμογή</u></p> <p>Εφαρμογή δολώματος σε δολωματικούς σταθμούς ή σε καλυμμένα / προστατευμένα σημεία δόλωσης. Το δόλωμα τοποθετείται ανά θέση σε υπάρχουσες κατασκευές ώστε να εξασφαλίσετε ότι το δόλωμα δεν θα παρασυρθεί με το νερό. Να γίνεται τακτικός έλεγχος των δολωμάτων και αντικατάσταση όσων έχουν καταναλωθεί ή καταστραφεί, μέχρι να σταματήσει η κατανάλωση. Να γίνεται επανάληψη του προγράμματος σε περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις νέας προσβολής.</p>
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Για προσβολές αρουραίων χρησιμοποιήστε μέχρι 200γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης.</p> <p>Η συχνότητα εφαρμογής είναι συνήθως 2-4 φορές το έτος, ανά 3-6 μήνες. Τα προγράμματα δόλωσης επαναλαμβάνονται βάσει των αναγκών, συνήθως κάθε 3-6 μήνες, λόγω εκ νέου επαναπροσβολής.</p> <p>Η διάρκεια του προγράμματος είναι συνήθως έως 6 εβδομάδες.</p>
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>A) Χαρτοκιβώτιο με διπλά τοιχώματα ή με fibreboard επενδυμένο με πολυαιθυλένιο, έως 25 kg Σακούλα από πολυαιθυλένιο/χαρτί σε χαρτοκιβώτιο (fibreboard), έως 2kg Σάκος από προπυλένιο ή χαρτοσακούλα πολλαπλών φύλλων ή σάκος πολυαιθυλενίου / πολυπροπυλενίου, έως 25 kg Κάδος ή βαρέλι από PP ή PE, έως 20 κιλά</p> <p>B) Σακουλάκια, PE ή PP/χαρτί ή προσαρμοσμένο PP ή PE/αλουμίνιο ή PE/χαρτί/ αλουμίνιο, έως 1000g Παρέχεται χωρίς εξωτερική συσκευασία ή με χαρτόνι (fibreboard) με ή χωρίς επένδυση πολυαιθυλενίου ή σε συσκευασία από πολυαιθυλένιο ή σε συσκευασία από πολυπροπυλένιο ή σε συσκευασία blister, έως 20kg στην εξωτερική συσκευασία.</p> <p>Γ) Σακούλα, PP ή πολυστρωματικό PP ή PET/PE ή PE/χαρτί/αλουμίνιο, έως 15kg Παρέχεται χωρίς εξωτερική συσκευασία ή με χαρτόνι (fibreboard) με ή χωρίς επένδυση από πολυαιθυλένιο ή σε συσκευασία από πολυαιθυλένιο ή σε συσκευασία από πολυπροπυλένιο ή σε συσκευασία blister, έως 20kg στην εξωτερική συσκευασία.</p> <p>Δ) Μη διάτρητα φακελάκια, PE ή PP/χαρτί ή προσαρμοσμένο PP ή PE/αλουμίνιο ή PE/χαρτί/αλουμίνιο, των 10, 25, 30, 40, 50, 100 ή 200g. Σακουλάκια με ή χωρίς εξωτερικό χαρτόνι.</p> <p>Ε) Σακούλα από πολυπροπυλένιο ή πολυστρωματικό χαρτί, έως 25kg Κάδος, PP, έως 20kg Βαρέλι, PP ή PE, έως 2kg Σακούλα, PET/PE ή PP/PE ή χαρτί/PE, έως 10kg Δοχείο που διαθέτει καπάκι ασφαλείας, PP ή PE, έως 3kg Κουτί (fibreboard), έως 1kg Δόλωμα σε διάτρητα ή μη διάτρητα φακελάκια πολυπροπυλενίου/χαρτιού ή PET/ πολυαιθυλενίου ή πολυαιθυλενίου/χαρτιού ή πολυαιθυλενίου/αλουμινίου (10, 25, 30, 40, 50, 100 ή 200 g) στην παραπάνω εξωτερική συσκευασία.</p>

	<p>Z) Εξωτερικό χαρτόνι, έως 6.4 κιλά</p> <p>Περιγραφή: τα φακελάκια συσκευάζονται σε ένα, μιας ή πολλαπλών χρήσεων δολωματικό σταθμό ασφαλείας για ποντίκια, HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 σε ένα εξωτερικό χαρτοκιβώτιο, έως 0,8 kg.</p> <p>- Όλες οι παραπάνω συσκευασίες είναι σφραγισμένες.</p> <p>Στις συσκευασίες που προορίζονται μόνο για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να αναγράφεται η φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε Συνεργεία Εκτέλεσης Επαγγελματικών Εργασιών Εφαρμογής Βιοκτόνων που έχουν άδεια από την Αρμόδια Αρχή».</p>
--	---

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1. Οδηγίες χρήσης

Τοποθετήστε το δόλωμα όπου υπάρχουν ενδείξεις δραστηριότητας τρωκτικών, όπως φρέσκα περιπτώματα, μέσα ή κοντά σε φωλιές και λαγούμια, διαδρόμους και χώρους σίτισης τρωκτικών.

Τα σημεία δόλωσης επιλέγονται ώστε να καλύπτουν όλη την προσβεβλημένη περιοχή.

Κάνετε συχνές επιθεωρήσεις στα σημεία δόλωσης κατά τις πρώτες 10-14 μέρες και αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα έχει φαγωθεί από τρωκτικά ή ότι έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες. Εάν δεν υπάρχουν σημάδια δραστηριότητας αρουραίων κοντά σε κάποιο σημείο δόλωσης μετά από 7-10 ημέρες, να το μετακινήσετε σε μια περιοχή μεγαλύτερης δραστηριότητας.

Εμποδίστε την πρόσβαση στο δόλωμα από παιδιά, πουλιά και ζώα που δεν αποτελούν στόχο (κυρίως σκύλους, γάτες, χοίρους και πουλερικά). Όπου είναι δυνατόν, ασφαλίστε τα δολώματα έτσι ώστε να μην μπορούν να παρασυρθούν. Οι κύβοι των δολωμάτων να ασφαρίζονται με σύρμα ή να καρφώνονται στη θέση τους.

Αν όλο το δόλωμα έχει φαγωθεί σε ορισμένες περιοχές, αυξήστε την ποσότητα του δολώματος, τοποθετώντας περισσότερες θέσεις δόλωσης. Μην αυξάνετε την ποσότητα του δολώματος. Είναι γενικά πολύ πιο αποτελεσματικό να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερο αριθμό σημείων δόλωσης σε σύγκριση με ένα μικρότερο αριθμό και με μεγαλύτερη ποσότητα δολώματος.

Μεγάλες ποσότητες δολώματος αυξάνουν τον κίνδυνο για την άγρια ζωή και τα άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο. Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος, τουλάχιστον τόσο συχνά, όπως όταν τα δολώματα ελέγχονται ή / και αναπληρώνονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται καθημερινή επιθεώρηση.

Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ: Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να επισημαίνονται για όλη την περίοδο εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης των δολωμάτων στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο όπως επίσης και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης. Όταν χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας, θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και να μην

παραβιάζονται.

5.2. Μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου

Τα δολώματα πρέπει να τοποθετούνται με ασφαλή τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να καταναλωθούν από άλλα ζώα ή παιδιά.

Όπου είναι δυνατόν, ασφαλίστε τα δολώματα έτσι ώστε να μην μπορούν να παρασυρθούν.

Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος (εκτός και αν πρόκειται για υπονόμους), τουλάχιστον τόσο συχνά, όπως όταν τα δολώματα ελέγχονται ή / και αναπληρώνονται. Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Εκτός και αν υπάρχει η επίβλεψη ενός επαγγελματία απεντομωτή ή άλλου αρμόδιου προσώπου, μην χρησιμοποιείται τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα σαν μόνιμα δολώματα. Μετά το τέλος του προγράμματος απομακρύνεται και απορρίψτε τα δολώματα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Εμπεριέχεται πικραντικός παράγοντας (0,01% denatonium benzoate) σε όλες τις συνθέσεις.

Στις συσκευασίες που προορίζονται μόνο για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να αναγράφεται η φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε Συνεργεία Εκτέλεσης Επαγγελματικών Εργασιών Εφαρμογής Βιοκτόνων που έχουν άδεια από την Αρμόδια Αρχή».

5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος

Η βρωμαδιολόνη (*bromadiolone*) είναι ένα αντιπηκτικό που ενδεχομένως να προκαλέσει αιμορραγία. Η έναρξη της αιμορραγίας μπορεί να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες μετά την έκθεση. Αν δεν υπάρχει ενεργή αιμορραγία, θα πρέπει να καταμετρηθεί ο χρόνος προθρομβίνης (INR) στην εμφάνιση του περιστατικού και σε 48-72 ώρες μετά την έκθεση. Αν ο χρόνος προθρομβίνης (INR) είναι μεγαλύτερος από 4, χορηγήστε 5-10 mg βιταμίνης K1 (φυτομεναδιόνη) μέσω αργής ενδοφλέβιας έγχυσης (100 μg/kg σωματικού βάρους για παιδιά). Ενδεχομένως να χρειαστεί θεραπεία με βιταμίνη K1 (από το στόμα ή ενδοφλεβίως) για αρκετές εβδομάδες

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

Απορρίψτε τη συσκευασία, αχρησιμοποίητο προϊόν και τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διατηρείται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Διάρκεια ζωής έως και 2 χρόνια.

6. Άλλες πληροφορίες

-
