



Bratislava, 13. októbra 2022  
Naša značka: 41049/2022-4320-97046  
Ref. číslo: bio/3746/O/22/RB

## ROZHODNUTIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 5 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ustanovení § 3 písm. a) a § 4 zákona č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) v znení neskoršej novely (ďalej len „biocídny zákon“) vo veci žiadosti žiadateľa **Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, SI 1360 Vrhnika, Slovinsko** identifikačné číslo **BC-BJ074354-44** o autorizáciu rovnakého biocídneho výrobku zo dňa **11. marca 2022**, podanej podľa čl. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 414/2013 zo 6. mája 2013 v znení neskorších predpisov, ktorým sa spresňuje postup autorizácie rovnakých biocídnych výrobkov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (ďalej len „nariadenie o rovnakých biocídnych výrobkoch“) rozhodlo tak, že

### **autorizuje biocídny výrobok postupom autorizácie rovnakých biocídnych výrobkov**

*Názov výrobku:* **RATIMOR BRODIFACOUM OBILNÁ NÁSTRAHA**  
*Číslo autorizácie:* **SK22-023**  
*Platnosť autorizácie do:* **1. júla 2024**

na základe autorizácie súvisiaceho referenčného výrobku AGRORAT BRODI-3 č. autorizácie SK22-019 udelenej rozhodnutím bio/3297/O/22/RP zo dňa 17.8.2022 a za podmienok uvedených v zhrnutí charakteristík biocídneho výrobku v Prílohe 1 tohto rozhodnutia,

a pre prípad, keď nebude predložená žiadosť o obnovenie tejto autorizácie v lehote podľa čl. 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012, poskytuje dodatočnú lehotu na sprístupnenie existujúcich zásob tohto biocídneho výrobku na trhu do 18. decembra 2024 a ďalšiu lehotu na jeho použitie do 6. júna 2025 v súlade s príslušnou legislatívou.

### **O d ô v o d n e n i e :**

Žiadateľ Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, SI 1360, Vrhnika, Slovinsko doručeníím žiadosti č. BC-BJ074354-44 zo dňa 11. marca 2022 prostredníctvom registra pre biocídne výrobky v zmysle čl. 71 nariadenia o biocídnych výrobkoch požiadal Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej tiež „MH SR“) o autorizáciu rovnakého biocídneho výrobku RATIMOR BRODIFACOUM OBILNÁ NÁSTRAHA na základe autorizácie súvisiaceho referenčného výrobku AGRORAT BRODI-3 č. autorizácie SK22-019 udelenej rozhodnutím MH SR č. bio/3297/O/22/RP zo dňa 17.8.2022 a platnej do 1.7.2024, ktorá bola udelená na základe žiadosti o postupné/paralelné vzájomné uznanie vnútroštátnej autorizácie biocídneho výrobku.

MH SR preskúmalo žiadosť č. BC-BJ074354-44 v súlade s čl. 5 nariadenia o rovnakých biocídnych výrobkoch a zistilo, že obsah žiadosti o autorizáciu rovnakého výrobku spĺňa podmienky čl. 2 nariadenia o rovnakých biocídnych výrobkoch a že biocídny výrobok definovaný v predloženej zhrnutí charakteristík biocídneho výrobku spĺňa podmienky pre autorizáciu rovnakého biocídneho výrobku v zmysle čl. 1 nariadenia o rovnakých biocídnych výrobkoch.

V súlade s čl. 7 ods. 1 nariadenia o rovnakých biocídnych výrobkoch rovnaký biocídny výrobok má odlišné číslo autorizácie ako súvisiaci referenčný výrobok.

Na základe toho bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia sa biocídny výrobok môže sprístupňovať na trhu v Slovenskej republike.

Informácie o autorizáciách biocídnych výrobkov je možné nájsť prostredníctvom web stránky Európskej chemickej agentúry <https://echa.europa.eu/sk/information-on-chemicals/biocidal-products>.

Držiteľ autorizácie zabezpečí, aby sa biocídny výrobok sprístupňoval na trhu v Slovenskej republike v súlade so schváleným zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku a v súlade s ustanoveniami nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Držiteľ autorizácie je zodpovedný za klasifikáciu, balenie a označovanie biocídneho výrobku v súlade s čl. 69 a je zodpovedný za kartu bezpečnostných údajov v súlade s článkom 70 nariadenia o biocídnych výrobkoch.

V súlade s čl. 7 ods. 1 nariadenia o rovnakých biocídnych výrobkoch zmeny rovnakého výrobku sa oznamujú alebo sa o ne žiada nezávisle od súvisiaceho referenčného výrobku v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 354/2013. Autorizáciu rovnakého výrobku možno zmeniť alebo zrušiť nezávisle od súvisiaceho referenčného výrobku.

V súlade s čl. 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 je možná obnova autorizácie biocídneho výrobku.

Podľa § 14 ods. 1 písm. b) biocídneho zákona MH SR vyberá ročné platby za biocídne výrobky sprístupnené na trhu Slovenskej republiky. Podľa § 14 ods. 9 biocídneho zákona sú ročné platby splatné každoročne do 30. júna kalendárneho roka po vydaní príslušného rozhodnutia o sprístupnení biocídneho výrobku na trh. V prípade nezaplatenia ročnej platby MH SR vydá rozhodnutie o ukončení sprístupňovania biocídneho výrobku na trhu v Slovenskej republike. Ročné platby sú splatné bez výzvy. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2013 Z. z. ustanovuje predmet, náležitosti a sadzbu úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie.

#### **Poučenie:**

Podľa článku 71 ods. 6 nariadenia o biocídnych výrobkoch sa doručenie tohto rozhodnutia prostredníctvom registra pre biocídne výrobky (R4BP) považuje za oznámenie rozhodnutia.

Podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia podať rozklad na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom za podmienok stanovených v § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.



RNDr. Ján Čepček, PhD.  
generálny riaditeľ  
Centrum pre chemické látky a prípravky

Doručiť: Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, SI 1360 Vrhnika, Slovinsko

# Príloha 1

Bratislava, 13. októbra 2022  
Naša značka: 41049/2022-4320-97046  
Ref. číslo: bio/3746/O/22/RB

## 1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

### 1.1. Výrobok

Názov výrobku	RATIMOR BRODIFACOUM OBILNÁ NÁSTRAHA
Obchodné názvy výrobku	RATIMOR BRODIFACOUM OBILNÁ NÁSTRAHA

### 1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov	Unichem d.o.o.
	Adresa	Sinja Gorica 2, SI 1360 Vrhnika, Slovinsko
Číslo autorizácie	SK22-023	
<i>R4BP žiadosť o autorizáciu č.</i>	BC-BJ074354-44	
Dátum autorizácie	13. októbra 2022	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	1. júla 2024	

### 1.3. Výrobca výrobku

Názov výrobcu	Unichem d.o.o.
Adresa výrobcu	Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovinsko
Miesto výrobných priestorov	Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovinsko

### 1.4. Výrobca účinnej látky

Účinná látka	Brodifakum
Názov výrobcu	ACTIVA S.r.l.
Adresa výrobcu	ACTIVA S.r.l., Via Feltre, 32, 20132 – Milano, Milano, Taliansko
Miesto výrobných priestorov	Dr. TEZZA S.r.l. - Via Tre Ponti, 22, 37050 S. Maria di Zevio, (VR), Taliansko

## 2. ZLOŽENIE A ÚPRAVA VÝROBKU

### 2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Brodifakum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Účinná látka	56073-10-0	259-980-5	0,0029

### 2.2. Typ úpravy

Pripravené na použitie: zrno

## 3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Výstražné upozornenia	H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (krv) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii .
Bezpečnostné upozornenia	P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/earosóly. P280 Noste ochranné rukavice. P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad v registrovanej prevádzke alebo podniku v súlade s platnými predpismi.

## 4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIA

### 4.1. Opis použitia

**Použitie 1 – Myši domáce a/alebo potkany hnedé – široká verejnosť – v interiéri**

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Nie je relevantné pre rodenticídy.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: dospelé jedince  Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: Mláďatá  Vedecký názov: Mus musculus

	<p>Bežný názov: Myš domáca Vývojové štádium: dospelé jedince</p> <p>Vedecký názov: Mus musculus Bežný názov: Myš domáca Vývojové štádium: Mláďatá</p>
Oblasti použitia	Vnútorne V interiéri
Spôsob aplikácie	Spôsob: V boxoch na návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Dávkovanie a frekvencia	<p>Aplikačná dávka: Myši: boxy na návnadu so 60 g výrobku každých 5 – 10 m; Potkany: boxy na návnadu so 100 g výrobku každých 5 – 10 m.</p> <p>Počet a časový rozvrh aplikácie: Myši: boxy na návnadu so 60 g výrobku každých 5 – 10 m. 60 g návnady na návnadovú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi návnadovými stanicami by mala byť 5 – 10 m (5 m v prípade silného zamorenia a 10 m v prípade slabého zamorenia).</p> <p>Potkany: boxy na návnadu so 100 g výrobku každých 5 – 10 m. 100 g návnady na návnadovú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi návnadovými stanicami by mala byť 5 – 10 metrov (5 m v prípade silného zamorenia a 10 m v prípade slabého zamorenia).</p>
Kategória používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	<p>Maximálna veľkosť balenia 150g. Počet balených vreciek v balení: do 150 g. Gramov/kg návnady na balené vrecko: jednotlivé vrecúška od 10 g do 100 g. Obalový materiál: vrecká, vrecia, vedrá, tuby, fľaše a vrecúška. Materiál: Kartón alebo PE alebo PP alebo PET alebo LDPE alebo PET /PET MET / PE alebo PET / ALU / PE alebo PET / PE alebo PA / PE alebo HDPE alebo PVC.</p>

#### 4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

#### 4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite časť: Návod na použitie.

#### 4.1.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite časť: Návod na použitie.

#### 4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite časť: Návod na použitie.

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite časť: Návod na použitie.

#### 4.2. Opis použitia

##### Použitie 2 – Potkany hnedé – široká verejnosť – Vonku v blízkosti budov

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i> Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: dospelé jedince  Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i> Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: Mláďatá
Oblasti použitia	Vonkajšie Vonku Vonku v blízkosti budov
Spôsob aplikácie	Spôsob: V boxoch na návnady  Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Potkany: boxy na návnady so 100 g výrobku každých 5 – 10 m.  Počet a časový rozvrh aplikácie: Potkany: boxy na návnady so 100 g výrobku každých 5 – 10 m. 100 g návnady na návnadovú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi návnadovými stanicami by mala byť 5 – 10 metrov (5 m v prípade silného zamorenia a 10 m v prípade slabého zamorenia).
Kategória používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Maximálna veľkosť balenia 150 g. Počet balených vreciek v balení: do 150 g. Gramov/kg návnady na balené vrecko: jednotlivé vrecúška od 10 g do 100 g. Obalový materiál: Vrecká, vrecia, vedrá, tuby, fľaše a vrecúška. Materiál: Kartón, PE alebo PP alebo PET alebo LDPE alebo PET / PET MET / PE alebo PET / ALU / PE alebo PET /PE alebo PA / PE alebo HDPE alebo PVC.

##### 4.2.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Umiestnite deratizačné staničky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

##### 4.2.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite časť: Návod na použitie.

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite časť: Návod na použitie.

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite časť: Návod na použitie.

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite časť: Návod na použitie.

### 4.3. Opis použitia

#### Použitie 3 – Myši domáce – profesionáli – v interiéri

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Nie je relevantné pre rodenticídy.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: <i>Mus musculus</i> Bežný názov: Myš domáca Vývojové štádium: dospelé jedince  Vedecký názov: <i>Mus musculus</i> Bežný názov: Myš domáca Vývojové štádium: Mláďatá
Oblasti použitia	Vnútorne V interiéri
Spôsob aplikácie	Spôsob: V boxoch na návnady  Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii, vo vrecúškach alebo v podobe sypkého zrna.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Myši: boxy na návnadu so 60 g výrobku každých 5 – 10 m.  Počet a časový rozvrh aplikácie: Myši: Boxy na návnady so 60 g výrobku každých 5 – 10 m. 60 g návnady na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 5 - 10 metrov (5 m v prípade silného zamorenia a 10 m v prípade slabého zamorenia).
Kategória používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Minimálna veľkosť balenia 3 kg. Počet balených vreciek v balení: do 30 kg. Gramov/kg návnady na balené vrecko: jednotlivé vrecúška od 10 g do 60 g. Obalový materiál: Vrecká, vrecia, vedrá, tuby, fľaše a vrecúška. Materiál: Kartón, PE alebo PP alebo PET alebo LDPE alebo PET / PET MET / PE alebo PET / ALU / PE alebo PET /PE alebo PA / PE alebo HDPE alebo PVC. Okrem toho môže byť výrobok dodávaný v podobe sypkého zrna priamo vo vyššie uvedenom sekundárnom obale. V tomto prípade je maximálna veľkosť balenia 10 kg.

#### 4.3.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

#### 4.3.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite časť: Návod na použitie.

#### 4.3.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

#### 4.3.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite časť: Návod na použitie.

#### 4.3.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite časť: Návod na použitie.

### 4.4. Opis použitia

#### Použitie 4 – Potkany hnedé – profesionáli – v interiéri

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Nie je relevantné pre rodenticídy.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i> Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: dospelé jedince  Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i> Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: Mláďatá
Oblasti použitia	Vnútorne V interiéri
Spôsob aplikácie	Spôsob: V boxoch na návnady  Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii, vo vrecúškach alebo v podobe sypkého zrna.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Potkan: boxy na návnady so 100 g výrobku každých 5 – 10 m.  Počet a časový rozvrh aplikácie: Potkan: boxy na návnady so 100 g výrobku 5 – 10 m. 100 g návnady na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 5 - 10 metrov).
Kategória používateľov	Profesionálne



Veľkosti balenia a obalový materiál	<p>Mínimálna veľkosť balenia 3 kg.          Počet balených vreciek v balení: do 30 kg.          Gramov/kg návnady na balené vrecko: jednotlivé netkané vrecúška od 10 g do 100 g.          Obalový materiál: Vrecká, vrecia, vedrá, tuby, fľaše a vrecúška. Materiál: Kartón, PE alebo PP alebo PET alebo LDPE alebo PET / PET MET / PE alebo PET / ALU / PE alebo PET /PE alebo PA / PE alebo HDPE alebo PVC.          Okrem toho môže byť výrobok dodávaný v podobe sypkého zrna priamo vo vyššie uvedenom sekundárnom obale. V tomto prípade je maximálna veľkosť balenia 10 kg.</p>
-------------------------------------	---

#### 4.4.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

#### 4.4.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite časť: Návod na použitie.

#### 4.4.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

#### 4.4.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite časť: Návod na použitie.

#### 4.4.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite časť: Návod na použitie.

### 4.5. Opis použitia

#### Použitie 5 – Myši domové a/alebo potkany hnedé – profesionáli – vonku v blízkosti budov

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Nie je relevantné pre rodenticídy.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	<p>Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i>          Bežný názov: Potkan hnedý          Vývojové štádium: dospelé jedince</p> <p>Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i>          Bežný názov: Potkan hnedý          Vývojové štádium: Mláďatá</p> <p>Vedecký názov: <i>Mus musculus</i>          Bežný názov: Myš domáca          Vývojové štádium: dospelé jedince</p> <p>Vedecký názov: <i>Mus musculus</i></p>

	Bežný názov: Myš domáca Vývojové štádium: Mláďatá
Oblasti použitia	Vonkajšie Vonku Vonku v blízkosti budov
Spôsob aplikácie	Spôsob: V boxoch na návnady  Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii, vo vrecúškach alebo v podobe sypkého zrna.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Potkany: boxy na návnadu so 100 g výrobku každých 5 – 10 m; Myši: boxy na návnadu so 60 g výrobku, každých 5 – 10 m.  Počet a časový rozvrh aplikácie: Potkan: boxy na návnadu so 100 g každých výrobku 5 – 10 m. 100 g návnady na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 5 - 10 metrov (5 m v prípade silného zamorenia a 10 m v prípade slabého zamorenia).  Myši: boxy na návnady so 60 g výrobku každých 5 – 10m. 60 g návnady na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 5 - 10 metrov (5 m v prípade silného zamorenia a 10 m v prípade slabého zamorenia).
Kategória používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Minimálna veľkosť balenia 3 kg. Počet balených vreciek v balení: do 30 kg. Gramov/kg návnady na balené vrecko: jednotlivé vrecúška od 10 g do 100 g. Obalový materiál: Vrecká, vrecia, vedrá, tuby, fľaše a vrecúška. Materiál: Kartón alebo PE alebo PP alebo PET alebo LDPE alebo PET / PET MET / PE alebo PET / ALU / PE alebo PET/ PE alebo PA / PE alebo HDPE alebo PVC. Okrem toho môže byť výrobok dodávaný v podobe sypkého zrna priamo vo vyššie uvedenom sekundárnom obale. V tomto prípade je maximálna veľkosť balenia 10 kg.

#### 4.5.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami (napr. dážď, sneh atď.). Umiestnite deratizačné staničky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Deratizačné staničky sa majú prezerat' [v prípade myší – najmenej každé 2 až 3 dni] [v prípade potkanov – len každých 5 až 7 dní] na začiatku procesu deratizácie, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu. Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

#### 4.5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Nepoužívajte tento výrobok priamo v brlohoch.

#### 4.5.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedošlo k styku s vodou.

4.5.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite časť: Návod na použitie.

4.5.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite časť: Návod na použitie.

#### 4.6. Opis použitia

##### Použitie 6 – Myši domáce a/alebo potkany hnedé – vyškolení profesionáli – v interiéri

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Nie je relevantné pre rodenticídy.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i> Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: dospelé jedince  Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i> Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: Mláďatá  Vedecký názov: <i>Mus musculus</i> Bežný názov: Myš domáca Vývojové štádium: dospelé jedince  Vedecký názov: <i>Mus musculus</i> Bežný názov: Myš domáca Vývojové štádium: Mláďatá
Oblasti použitia	Vnútorne V interiéri
Spôsob aplikácie	Spôsob: V boxoch na návnady  Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii, vo vrecúškach alebo v podobe sypkého zrna.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Potkany: boxy na návnadu so 100 – 200 g výrobku; Myši: boxy na návnadu so 60 – 100 g výrobku.  Počet a časový rozvrh aplikácie: Potkany: boxy na návnadu so 100 – 200 g výrobku na miesto uloženia návnady. Myši: boxy na návnadu so 60 – 100 g výrobku na miesto uloženia návnady.
Kategória používateľov	Vyškolený profesionál
Veľkosti balenia a obalový materiál	Minimálna veľkosť balenia 3 kg. Počet balených vreciek v balení: do 30 kg. Gramov/kg návnady na balené vrecko: jednotlivé vrecúška od 10 g do 200 g. Obalový materiál: Vrecká, vrecia, vedrá, tuby, fľaše a vrecúška. Materiál: Kartón alebo PE alebo PP alebo PET alebo LDPE alebo PET / PET MET / PE alebo PET / ALU / PE alebo PET/ PE alebo PA / PE alebo HDPE alebo PVC. Okrem toho môže byť výrobok dodávaný v podobe sypkého zrna priamo vo vyššie uvedenom sekundárnom obale. V tomto prípade je maximálna veľkosť balenia 10 kg.

#### 4.6.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok.

#### 4.6.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce v súlade s odporúčaniami uvedenými v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na zamedzenie zamoreniu hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.

Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návnad.

Tento výrobok sa smie používať len vo vnútorných priestoroch a na miestach, ktoré nie sú prístupné deťom alebo necieľovým zvieratám.

#### 4.6.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete deratizačné stanice blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

#### 4.6.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite časť: Návod na použitie.

#### 4.6.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite časť: Návod na použitie.

### 4.7. Opis použitia

#### Použitie 7 – Myši domáce a/ alebo potkany hnedé – vyškolení profesionáli – vonku v blízkosti budov

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Nie je relevantné pre rodenticídy.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i> Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: dospelé jedince  Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i> Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: Mlád'atá  Vedecký názov: <i>Mus musculus</i> Bežný názov: Myš domáca Vývojové štádium: dospelé jedince  Vedecký názov: <i>Mus musculus</i> Bežný názov: Myš domáca Vývojové štádium: Mlád'atá

Oblasti použitia	Vonkajšie Vonku Vonku v blízkosti budov
Spôsob aplikácie	Spôsob: V boxoch na návnady  Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii, vo vrecúškach alebo v podobe sypkého zrna. Priama aplikácia návnady na okamžité použitie do brlohu.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Potkany: boxy na návnadu so 100 – 200 g výrobku; Myši: boxy návnadu so 60 – 100 g výrobku.  Počet a časový rozvrh aplikácie: Potkany: boxy na návnadu so 100 – 200 g výrobku na miesto uloženia návnady. Myši: boxy na návnadu so 60 – 100 g výrobku na miesto uloženia návnady. Brloh: 200 g návnady na brloh.
Kategória používateľov	Vyškolенý profesionál
Veľkosti balenia a obalový materiál	Mínimálna veľkosť balenia 3 kg. Počet balených vreciek v balení: do 30 kg. Gramov/kg návnady na balené vrecko: jednotlivé vrecúška od 10 g do 200 g. Obalový materiál: vrecká, vrecia, vedrá, tuby, fľaše a vrecúška. Materiál: Kartón alebo PE alebo PP alebo PET alebo LDPE alebo PET /PET MET / PE alebo PET / ALU / PE alebo PET / PE alebo PA / PE alebo HDPE alebo PVC Ďalej je možné výrobok dodať v podobe sypkého zrna priamo vo vyššie uvedenom sekundárnom obale. V tomto prípade je maximálna veľkosť balenia 10 kg.

#### 4.7.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami. Umiestnite návnadu v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie. Vymeňte návnadu na miestach s návnadou, kde bola návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok (okrem prípadu, keď bol aplikovaný priamo do brlohu). Návnady musia byť umiestnené tak, aby sa minimalizovalo vystavenie necieľovým druhom zvierat a deťom. Zakryte alebo zablokujte vchody do brlohu s návnadou, aby ste znížili riziko odmietnutia a rozliatia návnady.

#### 4.7.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hľadavcov.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce v súlade s odporúčaniami uvedenými v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na zamedzenie zamoreniu hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.

Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návnad.

#### 4.7.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete návnady blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.7.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite časť: Návod na použitie.

4.7.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite časť: Návod na použitie.

#### 4.8. Opis použitia

##### Použitie 8 – Potkany hnedé – vyškolení profesionáli – Vonkajšie otvorené priestranstvá a skládky odpadu

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Nie je relevantné pre rodenticídy.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i> Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: dospelé jedince  Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i> Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: Mláďatá
Oblasti použitia	Vonkajšie Vonku Vonkajšie otvorené priestranstvá Vonkajšie skládky odpadu
Spôsob aplikácie	Spôsob: V boxoch na návnady  Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii, vo vrecúškach alebo v podobe sypkého zrna. Priama aplikácia návnady na okamžité použitie do brlohu.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Potkany: boxy na návnadu so 100 – 200 g výrobku.; Brloh: 200 g návnady na brloh.  Počet a časový rozvrh aplikácie: Potkany: boxy na návnadu so 100 – 200 g výrobku na miesto uloženia návnady. Brloh: 200 g návnady na brloh.
Kategória používateľov	Vyškolený profesionál
Veľkosti balenia a obalový materiál	Minimálna veľkosť balenia 3kg. Počet balených vreciek v balení: do 30 kg. Gramov/kg návnady na balené vrecko: jednotlivé vrecúška od 10 g do 200 g. Obalový materiál: vrecká, vrecia, vedrá, tuby, fľaše a vrecúška. Materiál: Kartón alebo PE alebo PP alebo PET alebo LDPE alebo PET /PET MET / PE alebo PET / ALU / PE alebo PET / PE alebo PA / PE alebo HDPE alebo PVC. Ďalej je možné výrobok dodať v podobe sypkého zrna priamo vo vyššie uvedenom sekundárnom obale.

##### 4.8.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami. Umiestnite návnadu v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie. Vymeňte návnadu na miestach s návnadou, kde bola návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná

nečistotou.

Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok (okrem prípadu, keď bol aplikovaný priamo do brlohu). Návnady musia byť umiestnené tak, aby sa minimalizovalo vystavenie necieľovým druhom zvierat a deťom. Zakryte alebo zablokujte vchody do brlohu s návnadou, aby ste znížili riziko odmietnutia a rozliatia návnady.

#### 4.8.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce.

Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na zamedzenie zamoreniu hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.

Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návnad.

#### 4.8.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Keď umiestňujete návnady blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

#### 4.8.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite časť: Návod na použitie.

#### 4.8.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite časť: Návod na použitie.

## 5. VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽITIE

### 5.1. Pokyny na používanie

Široká verejnosť:

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred použitím rodenticidných výrobkov by sa malo zvážiť použitie nechemických kontrolných metód (napr. pasce).

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad).

Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťaží dosiahnutie prijatia návnady.

Deratizačné staničky by mali byť umiestnené do bezprostrednej blízkosti oblasti, kde bola pozorovaná aktivita hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelechy, brlohy atď.).

Keď to je možné, musia byť deratizačné staničky pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Neotvárajte vrecúška s návnadou.

Umiestnite deratizačné staničky mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat.

Umiestnite deratizačné staničky mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Neumiestňujte deratizačné staničky blízko kanalizačnej siete, kde môžu prísť do styku s vodou.

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú

pokožku.

Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu alebo deratizačné staničky.

Profesionáli:

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred umiestnením návnady vykonajte prieskum zamorenej oblasti a vykonajte posúdenie na mieste na identifikáciu druhov hlodavcov, ich miest aktivity a určite pravdepodobnú príčinu a rozsah zamorenia.

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad).

Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťaží dosiahnutie prijatia návnady.

Výrobok by sa mal používať len ako súčasť systému integrovanej ochrany proti škodcom, ktorý okrem iného zahŕňa hygienické opatrenia a, ak je to možné, fyzické metódy kontroly.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Deratizačné staničky by mali byť umiestnené do bezprostrednej blízkosti miest, kde bola predtým pozorovaná aktivita hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelechy, brlohy atď.).

Keď to je možné, musia byť deratizačné staničky pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Deratizačné staničky musia byť jasne označené, že obsahujú rodenticídy a že sa s nimi nesmie hýbať a nesmú sa otvoriť (pozri oddiel 5.3 pre informácie, ktoré majú byť uvedené na etikete).

Keď sa výrobok používa na verejných priestranstvách, tieto by mali byť počas deratizácie označené a pri návnadách musí byť oznam s vysvetlením rizika primárnej alebo sekundárnej otravy antikoagulantom a musí byť uvedená aj prvá pomoc, ktorá sa má poskytnúť v prípade otravy.

Návnada by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odtrhnúť preč od deratizačnej staničky.

Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat.

Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Ak je príjem návnady pomerne malý v porovnaní so zjavným rozsahom zamorenia, zvážte presun deratizačných staničiek na vzdialenejšie miesta a možnosť zmeny formulácie návnady.

Ak sú návnady po období deratizácie 35 dní naďalej konzumované a nie je možné pozorovať pokles činnosti hlodavcov, treba určiť pravdepodobnú príčinu.

Ak boli vylúčené iné prvky, je pravdepodobné, že hlodavce sú rezistentné, takže zvážte použitie rodenticídu bez antikoagulantu, kde je to možné, alebo silnejšieho antikoagulantného rodenticídu.

Zvážte tiež použitie pascí ako alternatívneho opatrenia na kontrolu hlodavcov.

Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu alebo deratizačné staničky.

Návnada vo vreckách: neotvárajte vrecká obsahujúce návnadu.

Voľné zrná: umiestnite návnadu do deratizačnej staničky s použitím dávkovacieho zariadenia. Špecifikujte metódy na minimalizáciu prachu (napr. utieranie za mokra).

Vyškolení profesionáli:

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred umiestnením návnady vykonajte prieskum zamorenej oblasti a vykonajte posúdenie na mieste na identifikáciu druhov hlodavcov, ich miest aktivity a určite pravdepodobnú príčinu a rozsah zamorenia.

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťaží dosiahnutie prijatia návnady.

Výrobok by sa mal používať len ako súčasť systému integrovanej ochrany proti škodcom, ktorý okrem iného zahŕňa hygienické opatrenia a, ak je to možné, fyzické metódy kontroly.

výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Deratizačné staničky by mali byť umiestnené do bezprostrednej blízkosti miest, kde bola predtým pozorovaná aktivita hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelechy, brlohy atď.).

Keď to je možné, musia byť deratizačné staničky pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.



Deratizačné staničky musia byť jasne označené, že obsahujú rodenticídy a že sa s nimi nesmie hýbať a nesmú sa otvoriť (pozrite oddiel 5.3 pre informácie, ktoré majú byť uvedené na etikete).

Keď sa výrobok používa na verejných priestranstvách, tieto by mali byť počas deratizácie označené a pri návadách musí byť oznam s vysvetlením rizika primárnej alebo sekundárnej otravy antikoagulantom a musí byť uvedená aj prvá pomoc, ktorá sa má poskytnúť v prípade otravy.

Návnada by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odtrhnúť preč od deratizačnej staničky.

Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat.

Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (materiál rukavíc bližšie určí držiteľ povolenia v informáciách o výrobku).

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Frekvencia prezerania deratizovanej oblasti by mala byť ponechaná na vlastné uváženie vykonávateľa vzhľadom na prieskum vykonaný na začiatku deratizácie.

Ak je príjem návnady pomerne malý v porovnaní so zjavným rozsahom zamorenia, zvážte presun deratizačných staničiek na vzdialenejšie miesta a možnosť zmeny formulácie návnady.

Ak sú návnady po období deratizácie 35 dní naďalej konzumované a nie je možné pozorovať pokles činnosti hlodavcov, treba určiť pravdepodobnú príčinu. Ak boli vylúčené iné prvky, je pravdepodobné, že hlodavce sú rezistentné, takže zvážte použitie rodenticídu bez antikoagulantu, kde je to možné, alebo silnejšieho antikoagulantného rodenticídu. Zvážte tiež použitie pascí ako alternatívneho opatrenia na kontrolu hlodavcov. Voľné zno: umiestnite návnadu do deratizačnej staničky s použitím dávkovacieho zariadenia. Špecifikujte metódy na minimalizáciu prachu (napr. utieranie za mokra).

## 5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Široká verejnosť:

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Nepoužívajte antikoagulantné rodenticídy ako trvalé návnady (napr. na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na zisťovanie aktivity hlodavcov).

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) musí byť jasne uvedené, že:

- Výrobok sa má používať v primeraných deratizačných staničkách odolných voči manipulácii (napr. „použitie len v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii“),
- Používatelia musia náležite označiť deratizačné staničky s informáciami uvedenými v oddiele 5.3 SPC (napr. „označte deratizačné staničky podľa odporúčaní o výrobku“).
- Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní. V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.

Hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce počas procesu deratizácie, minimálne tak často, ako sa kontrolujú deratizačné staničky.

Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami.

Profesionáli:

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce v častých intervaloch (napr. najmenej dvakrát týždenne).

Výrobky sa nesmú používať dlhšie ako 35 dní bez zhodnotenia stavu zamorenia a účinnosti deratizácie.

Nepoužívajte návnady s obsahom antikoagulantných účinných látok ako trvalé návnady na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) musí byť jasne uvedené, že:

- výrobok sa nesmie dodávať širokej verejnosti (napr. „len pre profesionálov“).
- výrobok sa má používať v primeraných deratizačných staničkách odolných voči manipulácii (napr. „použitie len v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii“),
- používatelia musia náležite označiť deratizačné staničky s informáciami uvedenými v oddiele 5.3 SPC (napr.

„označte deratizačné staničky podľa odporúčaní o výrobku“).

Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní. V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnejšej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.

Medzi použitiami neumývajte deratizačné staničky s vodou.

Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami.

**Vyškolení profesionáli:**

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

V informáciách o výrobku (t. j. na etikete a/alebo letáku) musí byť jasne uvedené, že výrobok sa môže dodávať len vyškoleným profesionálnym používateľom s osvedčením, ktorým sa preukazuje dodržiavanie platných požiadaviek na odbornú prípravu (napr. „len pre vyškolených profesionálnych používateľov“).

Nepoužívajte v oblastiach, kde je podozrenie na rezistenciu na účinnú látku.

Výrobky sa nesmú používať dlhšie ako 35 dní bez zhodnotenia stavu zamorenia a účinnosti deratizácie.

Nestriedajte použitie rôznych antikoagulantov s porovnateľnou alebo slabšou potenciou na účely zvládnutia rezistencie. Na striedavé použitie zväzťe použitie neantikoagulantného rodenticídu, ak je k dispozícii, alebo silnejšieho antikoagulantu.

Medzi aplikáciami neumývajte vodou stanice na návnadu ani pomôcky, ktoré sa používajú na prikrytých a chránených miestach s návnadou.

Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami.

### **5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

Tento výrobok obsahuje antikoagulantnú látku. Pri prehltnutí môžu symptómy, ktoré môžu nastať s oneskoreným účinkom, zahŕňať krvácanie z nosa a krvácajúce d'asna. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť modriny a krv v stolici alebo moči.

Protilátka: vitamín K1 podaný výlučne zdravotníckym/veterinárnym personálom.

V prípade:

- Dermálnej expozície umyte pokožku vodou, a potom vodou a mydlom.

- Zasiahnutia očí vypláchnite oči tekutinou na výplach očí alebo vodou, nechajte si oči otvorené najmenej 10 minút.

- Orálnej expozície dôkladne vypláchnite ústa vodou. Nikdy nepodávajte nič cez ústa osobe v bezvedomí.

Nevyvolávajúce zvracanie.

Pri prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu výrobku. Ak výrobok prehltnie domáce zviera, spojte sa s veterinárnym lekárom.

Deratizačné staničky musia byť označené týmito informáciami: „nehýbte ani neotvárajte“ „obsahuje rodenticíd“; „názov výrobku alebo číslo autorizácie“, „účinné látky“ a „v prípade incidentu zavolajte do toxikologického centra [+421 2 5477 4166]“.

Nebezpečné pre voľne žijúce zvieratá. "

### **5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Na konci deratizácie zlikvidujte neskonsumovanú návnadu a obalový materiál v súlade s miestnymi požiadavkami. Odporúča sa používanie rukavíc.

### **5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Uchovávajte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu držte zatvorenú a mimo priameho slnečného žiarenia.

Uchovávajte na miestach chránených pred prístupom detí, vtákov, domácich zvierat a hospodárskych zvierat.

Doba použiteľnosti: dva roky.

## 6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Vzhľadom na ich oneskorený spôsob účinku trvá 4 až 10 dní po konzumácii návnady, kým antikoagulačné rodenticidy začnú pôsobiť. Hlodavce môžu byť prenášačmi ochorení. Nedotýkajte sa uhynutých hlodavcov holými rukami a pri ich likvidácii používajte rukavice alebo nástroje ako napr. kliešte. Tento výrobok obsahuje horkú látku a farbu.

Správne znenie bezpečnostných upozornení je:

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad v registrovanej prevádzke alebo podniku v súlade s platnými predpismi.

- koniec dokumentu -