

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Sakarat B Graan

Productsoort(en): PT 14 - Rodenticiden

PT 14 - Rodenticiden

PT 14 - Rodenticiden

Toelatingsnummer: BE2020-0015

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0024988-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	10
5.1. Gebruiksvoorschrift	10
5.2. Risicobeperkende maatregelen	10
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	11
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	12
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	12
6. Overige informatie	13

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Sakarot B Graan
Bromag Graan

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Killgerm GmbH
	Adres	Bussardweg 16 41468 Neuss Dusseldorf Duitsland
Toelatingsnummer		BE2020-0015
Referentienummer van de asset in R4BP 3		BE-0024988-0000
Toelatingsdatum		19/03/2020
Vervaldatum		01/07/2024

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Killgerm Chemicals Ltd
Adres van de fabrikant	115 Wakefield Rd wf5 9ar Ossett Verenigd Koninkrijk
Productielocatie	Killgerm Chemicals Ltd 115 Wakefield Rd Ossett Verenigd Koninkrijk

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	12 - Bromadiolon
Naam van de fabrikant	Agrochem
Adres van de fabrikant	Tres Rieres 10 08292 Esparreguera (Barcelona) Spanje
Productielocatie	Tres Rieres 10 08292 Esparreguera (Barcelona) Spanje

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Bromadiolon	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Werkzame stof	28772-56-7	249-205-9	0,005

2.2. Formuleringstype

Ready-to-use: grain

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie	Kan het ongeboren kind schaden. Veroorzaakt schade aan organen (bloed) bij langdurige of herhaalde blootstelling ..
Veiligheidsaanbevelingen	Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft Stof niet inademen. Na het werken met dit product ... grondig wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Beschermdende handschoenen dragen.

Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Achter slot bewaren.

Inhoud naar Inhoud/verpakking als gevaarlijk afval afvoeren in overeenstemming met van toepassing zijnde nationale/regionale voorschriften.

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Gebruik 1 - Huismuizen en/of bruine ratten - opgeleide professionele gebruikers - binnen

Productsoort

PT 14 - Rodenticiden

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Niet van toepassing op rodenticiden

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus
Triviale naam: Brown rat
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus
Triviale naam: Brown rat
Ontwikkelingsstadia: Juvenilen

Wetenschappelijke naam: Mus musculus
Triviale naam: House mouse
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Wetenschappelijke naam: Mus musculus
Triviale naam: House mouse
Ontwikkelingsstadia: Juvenilen

Toepassingsgebied

Binnen

Binnenshuis

Toepassingsmethode(n)

Methode: In lokdozen
Gedetailleerde beschrijving:

Kant-en-klaar lokaas te gebruiken in vandalismebestendige lokaaskisten.

Dosering en frequentie van de toepassing

Toe te passen dosis: Ratten: lokaaskisten met 100 - 200 gram lokaas per lokaaspunt; huismuizen: lokaaskisten met 60 - 100 gram lokaas per lokaaspunt

Verdunning (%): 0

Aantal en timing van de toepassing:

- Ratten: lokaaskisten met 100 - 200 gram lokaas per lokaaspunt; huismuizen: lokaaskisten met 60 - 100 gram lokaas per lokaaspunt
- Permanent baiting [niet van toepassing in Spanje]

Categorie/categorieën gebruikers

Getrainde professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Minimale verpakkingsgrootte van 3 kg.
Graan in zakjes: individuele zakjes van 10, 15, 20, 25, 50, 75, 90, 100 en 200 gram in pakken van sachets tot 30 kg.
Los graan: verpakkingen met los graan tot 30 kg. De verpakking is beperkt tot afzonderlijk verpakte zakken met een maximum van 10 kg per verpakte zak.
Verpakkingsmateriaal: papier of sachets van PP of PE of PET of LDPE of PET/PET MET/PE of PET/ALU/PE of PET/PE of PA/PE. Plastic flessen of emmers: HDPE of PE of PP of PET of PVC. Kartonnen zakken uit PET of LDPE of kraftpapier. Kartonnen dozen.

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode.
- Volg alle aanvullende instructies van de overeenkomstige code van goede praktijk.
- Aanvullende specifieke instructie voor gebruik voor permanent baiting: indien mogelijk wordt aanbevolen om het behandelde gebied uiterlijk om de 4 weken opnieuw te bezoeken, om de selectie van een resistente populatie te vermijden [Niet van toepassing in Spanje].
- [Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende instructies van de overeenkomstige code van goede praktijk.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Indien mogelijk, voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en hun omgeving) informeren over de knaagdierbestrijdingscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke code van goede praktijk, indien van toepassing].
- Overweeg preventieve beheersingsmaatregelen (bijv. gaten dichtmaken, eventueel eten en drinken zoveel mogelijk verwijderen) om de inname van het product te verbeteren en de kans op herinvasie te verkleinen.
- Om het risico op secundaire vergiftiging te verkleinen, moet u tijdens de behandelingsperiode regelmatig dode knaagdieren zoeken en verwijderen, in overeenstemming met de aanbevelingen van de overeenkomstige code van goede praktijk.
- Gebruik het product niet als permanent lokaas voor de preventie van knaagdierplagen of het volgen van knaagdieractiviteiten.
- Gebruik het product niet voor pulsed baiting behandelingen.
- Dit product mag alleen binnenshuis worden gebruikt en in gebieden die niet toegankelijk zijn voor kinderen of niet-doeldieren.
- Aanvullende specifieke instructie voor gebruik voor permanent baiting [niet van toepassing in Spanje]:
- Permanent baiting is strikt beperkt tot locaties met een groot potentieel voor herinvasie wanneer andere controlemethoden onvoldoende zijn gebleken.
- De strategie voor permanent baiting moet periodiek worden herzien in het kader van geïntegreerde plaagdierbestrijding (IPM) en de beoordeling van het risico van herbesmetting.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

- Zorg ervoor dat bij plaatsing van lokaaskisten in de buurt van waterafvoersystemen het lokaas nooit in contact kan komen met het water

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie Gebruiksaanwijzingen

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie Gebruiksaanwijzingen

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Gebruik 2 - Huismuizen en/of bruine ratten – opgeleide professionele gebruikers - buiten rond gebouwen

Productsoort

PT 14 - Rodenticiden

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Niet van toepassing op rodenticiden

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus
Triviale naam: Brown rat
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus
Triviale naam: Brown rat
Ontwikkelingsstadia: Juvenilen

Wetenschappelijke naam: Mus musculus
Triviale naam: House mouse
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Wetenschappelijke naam: Mus musculus
Triviale naam: House mouse
Ontwikkelingsstadia: Juvenilen

Toepassingsgebied

Buiten

Buiten rond gebouwen

Toepassingsmethode(n)

Methode: In lokdozen
Gedetailleerde beschrijving:
Kant-en-klaar lokaas te gebruiken in vandalismebestendige lokaaskisten, in zakjes of als los graan.

Dosering en frequentie van de toepassing

Toe te passen dosis: Ratten: lokaaskisten met 100 - 200 gram lokaas per lokaaspunt; huismuizen: lokaaskisten met 60 - 100 gram lokaas per lokaaspunt - Holen: 200 gram lokaas per hol
Verdunning (%): 0
Aantal en timing van de toepassing:

- Ratten: lokaaskisten met 100 - 200 gram lokaas per lokaaspunt; huismuizen: lokaaskisten met 60 - 100 gram lokaas per lokaaspunt - Holen: 200 gram lokaas per hol
- Permanent baiting [niet van toepassing in Spanje]

Categorie/categorieën gebruikers

Getrainde professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Minimale verpakkingsgrootte van 3 kg.
Graan in zakjes: individuele zakjes van 10, 15, 20, 25, 50, 75, 90, 100 en 200 gram in pakken van sachets tot 30 kg.
Los graan: verpakkingen met los graan tot 30 kg. De verpakking is beperkt tot afzonderlijk verpakte zakken met een maximum van 10 kg per verpakte zak.
Verpakkingsmateriaal: papier of sachets van PP of PE of PET of LDPE of PET/PET MET/PE of PET/ALU/PE of PET/PE of PA/PE. Plastic flessen of emmers: HDPE of PE of PP of PET of PVC. Kartonnen zakken uit PET of LDPE of kraftpapier. Kartonnen dozen.

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Bescherm het lokaas tegen atmosferische omstandigheden. Plaats lokaaskisten in niet-overstroombare gebieden.
 - Vervang lokaas in lokaaskisten waar het lokaas beschadigd is door water of verontreinigd is met vuil.
 - Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode.
 - Volg alle aanvullende instructies van de overeenkomstige code van goede praktijk. [niet van toepassing in Spanje].
- Aanvullende specifieke instructie voor gebruik voor permanent baiting:
- Indien mogelijk wordt aanbevolen om het behandelde gebied uiterlijk om de 4 weken opnieuw te bezoeken, om de selectie van een resistente populatie te vermijden.
 - [Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende instructies van de overeenkomstige code van goede praktijk.

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Indien mogelijk, voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en hun omgeving) informeren over de knaagdierbestrijdingscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke code van goede praktijk, indien van toepassing].
 - Overweeg preventieve beheersingsmaatregelen (bijv. gaten dichtmaken, eventueel eten en drinken zoveel mogelijk verwijderen) om de inname van het product te verbeteren en de kans op herinvasie te verkleinen.
 - Om het risico op secundaire vergiftiging te verkleinen, moet u tijdens de behandelingsperiode regelmatig dode knaagdieren zoeken en verwijderen, in overeenstemming met de aanbevelingen van de overeenkomstige code van goede praktijk.
 - Gebruik het product niet als permanent lokaas voor de preventie van knaagdierplagen of het volgen van knaagdieractiviteiten. [tenzij toegelaten voor permanent baiting behandelingen].
 - Gebruik het product niet voor pulsed baiting behandelingen.
 - Dit product niet rechtstreeks in holen toepassen.
- [Niet van toepassing in ES]:
- Aanvullende specifieke instructie voor gebruik voor permanent baiting:
- Permanent baiting is strikt beperkt tot locaties met een groot potentieel voor herinvasie wanneer andere controlemethoden onvoldoende zijn gebleken.
 - De strategie voor permanent lokken moet periodiek worden herzien in het kader van geïntegreerde plaagbestrijding (IPM) en de beoordeling van het risico van herbesmetting.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

- Zorg bij plaatsing van lokaaskisten in de buurt van oppervlaktewater (bijv. rivieren, vijvers, waterwegen, dijken, irrigatiekanalen) of waterafvoersystemen dat het lokaas nooit in contact kan komen met water.

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie Gebruiksaanwijzingen

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie Gebruiksaanwijzingen

4.3 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 3 - Gebruik 3 - Bruine ratten – opgeleide professionele gebruikers – open gebieden en vuilstortplaatsen

Productsoort	PT 14 - Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet van toepassing op rodenticiden
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: Brown rat Ontwikkelingsstadia: Adulten Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: Brown rat Ontwikkelingsstadia: Juvenilen
Toepassingsgebied	Buiten Open gebieden (buiten) Vuilstortplaatsen (buiten)
Toepassingsmethode(n)	Methode: In lokdozen Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas te gebruiken in vandalismebestendige lokaaskisten, in zakjes of

	als los graan.
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>Toe te passen dosis: Ratten: lokaaskisten met 100 - 200 gram lokaas per lokaaspunt; Holen: 200 gram lokaas per hol Verdunning (%): 0 Aantal en timing van de toepassing:</p> <p>- Ratten: lokaaskisten met 100 - 200 gram lokaas per lokaaspunt; Holen: 200 gram lokaas per hol</p> <p>- Permanent baiting [niet van toepassing in Spanje]</p>
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<p>Minimale verpakkingsgrootte van 3 kg. Graan in zakjes: individuele zakjes van 10, 15, 20, 25, 50, 75, 90, 100 en 200 gram in pakken van sachets tot 30 kg. Los graan: verpakkingen met los graan tot 30 kg. De verpakking is beperkt tot afzonderlijk verpakte zakken met een maximum van 10 kg per verpakte zak. Verpakkingsmateriaal: papier of sachets van PP of PE of PET of LDPE of PET/PET MET/PE of PET/ALU/PE of PET/PE of PA/PE. Plastic flessen of emmers: HDPE of PE of PP of PET of PVC. Kartonnen zakken uit PET of LDPE of kraftpapier. Kartonnen dozen.</p>

4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Bescherm het lokaas tegen atmosferische omstandigheden. Plaats lokaaskisten in niet-overstroombare gebieden.
 - Vervang lokaas in lokaaskisten waar het lokaas beschadigd is door water of verontreinigd is met vuil.
 - Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode.
 - Volg alle aanvullende instructies van de overeenkomstige code van goede praktijk. [niet van toepassing in Spanje].
- Aanvullende specifieke instructie voor gebruik voor permanent baiting:
- Indien mogelijk wordt aanbevolen om het behandelde gebied uiterlijk om de 4 weken opnieuw te bezoeken, om de selectie van een resistente populatie te vermijden.
 - [Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende instructies van de overeenkomstige code van goede praktijk.

4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Indien mogelijk, voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en hun omgeving) informeren over de knaagdierbestrijdingscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke code van goede praktijk, indien van toepassing].

- Om het risico op secundaire vergiftiging te verkleinen, moet u tijdens de behandelingsperiode regelmatig dode knaagdieren zoeken en verwijderen, in overeenstemming met de aanbevelingen van de overeenkomstige code van goede praktijk.
 - Gebruik het product niet als permanent lokaas voor de preventie van knaagdierplagen of het volgen van knaagdieractiviteiten. [tenzij toegelaten voor permanent baiting behandelingen].
 - Gebruik het product niet voor pulsed baiting behandelingen.
 - Dit product niet rechtstreeks in hopen toepassen.
- [Niet van toepassing in ES]:
- Aanvullende specifieke instructie voor gebruik voor permanent baiting:
- Permanent baiting is strikt beperkt tot locaties met een groot potentieel voor herinvasie wanneer andere controlemethoden onvoldoende zijn gebleken.
 - De strategie voor permanent lokken moet periodiek worden herzien in het kader van geïntegreerde plaagbestrijding (IPM) en de beoordeling van het risico van herbesmetting.

4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

- Zorg bij plaatsing van lokaaskisten in de buurt van oppervlaktewater (bijv. rivieren, vijvers, waterwegen, dijken, irrigatiekanalen) of waterafvoersystemen dat het lokaas nooit in contact kan komen met water.

4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie Gebruiksaanwijzingen

4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie Gebruiksaanwijzingen

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

- Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken.
 - Voer voorafgaand aan de behandeling een onderzoek uit in het geïnfesteerde gebied om te bepalen om welke knaagdiersoort het gaat en waar de knaagdieren actief zijn, en om de waarschijnlijke oorzaak en de ernst van de plaag te achterhalen.
 - Verwijder voedsel dat gemakkelijk toegankelijk is voor knaagdieren (bijvoorbeeld gemorst graan of voedselafval). Maak afgezien daarvan het geïnfesteerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt.
 - Het product mag uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd plaagbeheersysteem (IPM), met onder andere hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke bestrijdingsmethoden.
 - Het product dient te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar eerder knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, voerplaatsen, holen, nesten enz.).
 - Waar mogelijk moeten de lokaasdozen aan de grond of aan andere structuren worden vastgemaakt.
 - Lokaasdozen moeten duidelijke etiketten hebben waarop staat dat ze rodenticiden bevatten en dat ze niet verplaatst of geopend mogen worden.
- Wanneer het product op openbare plaatsen wordt gebruikt, moeten de behandelde gebieden tijdens de behandelingsperiode worden voorzien van een waarschuwing met uitleg over het risico van primaire of secundaire vergiftiging door het antistollingsmiddel, evenals de eerstehulpmaatregelen die moeten worden genomen in geval van vergiftiging. Deze informatie moet beschikbaar zijn naast het lokaas.
- Het lokaas dient zo vastgemaakt te worden dat het niet weggesleept kan worden van de lokaasdoos.
 - Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten.
 - Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruiksvorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee alle taken waarbij contact met het product mogelijk is.
 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van dit product.
 - Draag chemicaliënbestendige veiligheidshandschoenen tijdens de productbehandelingsfase (het handschoenmateriaal moet door de autorisatiehouder in de productinformatie worden gespecificeerd).
 - De professional beslist hoe vaak hij het behandelde gebied bezoekt, op basis van de resultaten van het onderzoek dat bij aanvang van de behandeling is uitgevoerd. Deze frequentie moet in overeenstemming zijn met de aanbevelingen van de overeenkomstige code van goede praktijk.
- Als de inname van het lokaas laag is ten opzichte van de schijnbare omvang van de plaag, overweeg dan verplaatsing van de lokaasdozen naar verderop gelegen plaatsen en de mogelijkheid om over te gaan op een andere lokaasformulering.
- Als het lokaas na een behandelingsperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt en geen afname in knaagdieractiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld. Wanneer andere elementen zijn uitgesloten, is het waarschijnlijk dat er resistente knaagdieren zijn. Overweeg dan het gebruik van een niet-bloedverdunnende rodenticide, als die beschikbaar is, of een sterkere bloedverdunnende rodenticide. Overweeg ook het gebruik van vallen als alternatieve beheersingsmaatregel.
- Lokaas in sachets: sachets nooit openen!
 - Los graan: plaats het lokaas in de lokaaskist met behulp van een doseerapparaat. Vermijd stofvorming, denk bijvoorbeeld aan nat afnemen.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

- Voor zover mogelijk, voorafgaand aan de behandeling, eventuele passanten informeren over de knaagdierbestrijdingscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke code van goede praktijk].
- Productinformatie (d.w.z. etiket en / of bijsluiter) moet duidelijk vermelden dat het product alleen mag worden geleverd aan getrainde professionele gebruikers die gecertificeerd zijn om aan te tonen dat aan de vereisten wordt voldaan toepasselijke training (bijv. "alleen voor getrainde professionals").
- Niet gebruiken in gebieden waar resistentie tegen de werkzame stof kan worden vermoed.
- De producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder evaluatie van de toestand van de besmetting en de doeltreffendheid van de behandeling [behalve wanneer toestemming is verleend voor behandelingen met permanent baiting].
- Wissel het gebruik van verschillende anticoagulantia met vergelijkbare of lagere potentie voor resistentiebeheer niet af. Overweeg voor afwisselend gebruik een niet-bloedverdunnende rodenticide, indien beschikbaar, of een krachtigere anticoagulantia.
- Was de lokaaskisten of gebruiksvorwerpen die worden gebruikt in overdekte en beschermde lokaaskisten niet met water tussen de toepassingen.
- Voer dode knaagdieren af in overeenstemming met de lokale vereisten [De verwijderingsmethode moet specifiek worden beschreven in de nationale SPC en worden weergegeven op het productetiket].

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

- Dit product bevat een antistollingsmiddel. Bij inslikken kunnen symptomen, die met vertraging optreden, onder meer een bloeding uit de neus en tandvlees zijn. In ernstige gevallen is de aanwezigheid van blauwe plekken en bloed in de ontlasting of urine niet uitgesloten.

- Tegengif: Vitamine K1 - wordt alleen toegediend door medisch / veterinaire personeel.

- In het geval van :

- Blootstelling van de huid: was de huid met water en daarna met water en zeep.

- Blootstelling van de ogen, altijd contactlenzen controleren en verwijderen, ogen met oogdouches of water spoelen, oogleden minstens 10 minuten open houden.

- Blootstelling via de mond: de mond grondig spoelen met water. Nooit een bewusteloos persoon iets via de mond toedienen. Geen braken opwekken. Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het productetiket tonen. Neem contact op met een dierenarts in geval van inslikken door een huisdier.

- Lokaasstations moeten worden gelabeld met de volgende informatie: "niet verplaatsen of openen"; "bevat een rodenticide"; "productnaam of toelatingsnummer"; "werkzame stof(fen)" en "in geval van een vergiftiging, neem contact op met een professionele hulpverlener die contact kan opnemen met het vergiftigingeninformatiecentrum (tel. +32 (0)70 245 245)".

- Gevaarlijk voor dieren in het wild.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

- Verwijder ongegeten lokaas en de verpakking aan het eind van de behandeling in overeenstemming met lokale vereisten. De verpakking en (ongegeten) restanten van rodenticiden worden beschouwd als gevaarlijk afval. Het afvoeren en vernietigen dient te gebeuren door een hiertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

- Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. De verpakking afgesloten en niet in direct zonlicht bewaren.
- Op een plaats bewaren die niet toegankelijk is voor kinderen, vogels, huis- en landbouwdieren.
- Houdbaarheid: 2 jaar.

6. Overige informatie

- Vanwege de vertraagde werking kan het na inname van het lokaas 4 tot 10 dagen duren tot bloedverdünnende rodenticiden effectief zijn.
- Knaagdieren kunnen ziekten bij zich dragen. Raak dode knaagdieren niet met blote handen aan, draag handschoenen of gebruik hulpmiddelen zoals een tang bij het verwijderen.
- Dit product bevat een bitterstof en een kleurstof.