

HR

PRILOG

SAŽETAK SVOJSTAVA PROIZVODA ZA SKUPINU BIOCIDNIH PROIZVODA

ALPHACHLORALOSE GRAIN

Vrsta(e) proizvoda

PT14: Rodenticidi

Broj autorizacije KLASA:UP/I-543-04/21-12/34

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP) HR-0028054-0000

I. PRVA RAZINA INFORMACIJA	3
1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE	4
2. SASTAV I FORMULACIJA SKUPINE BIOCIDNIH PROIZVODA	5
II. DRUGA RAZINA INFORMACIJA – METASAŽETCI SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA	6
1. METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE	7
2. SASTAV U META SPC-U 1	8
3. OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1	9
4. AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA	10
5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1	14
6. OSTALE INFORMACIJE	16
7. TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1	17

Dio I.
PRVA RAZINA INFORMACIJA

Poglavlje 1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Naziv skupine

Ime/naziv	ALPHACHLORALOSE GRAIN
-----------	-----------------------

1.2. Vrsta(e) proizvoda

Vrsta(e) proizvoda	PT14: Rodenticidi
--------------------	-------------------

1.3. Nositelj autorizacije

Naziv i adresa nositelja autorizacije	Ime/naziv	LODI S.A.S.
	Adresa	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Francuska
Broj autorizacije		KLASA:UP/I-543-04/21-12/34
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)		HR-0028054-0000
Datum autorizacije		19/03/2013
Datum isteka autorizacije		31/12/2024

1.4. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	LODI S.A.S.
Adresa proizvođača	PARC D'ACTIVITES DES QUATRE ROUTES 35390 GRAND FOUGERAY Francuska
Lokacija proizvodnih pogona	PARC D'ACTIVITES DES QUATRE ROUTES 35390 GRAND FOUGERAY Francuska

1.5. Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari

Aktivna tvar	Alfakloraloza
Naziv proizvođača	LODI S.A.S.
Adresa proizvođača	PARC D'ACTIVITES DES QUATRE ROUTES 35390 GRAND FOUGERAY Francuska
Lokacija proizvodnih pogona	HIKAL LTD. T-21. MIDC INDUSTRIAL AREA TALOJA RAIGAD DISTRICT 410 208 MAHARASHTRA Indija SUNTTON CO. LTD JINGYI ROAD, XINYI TANGDIAN CHEMICAL ZONE 221415 JIANGSU Kina SAREX, Plot n°N129, N130, N131, N132 & N232, MIDC, Tarapur, 401 506 Maharashtra Indija

Poglavlje 2. SASTAV I FORMULACIJA SKUPINE BIOCIDNIH PROIZVODA

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu skupine

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Alfakloraloza	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)- α-D-glucofuranose	aktivna tvar	15879-93-3	240-016-7	4 - 4 % (w/w)

2.2. Vrsta(e) formulacija

Vrsta(e) formulacije	RB Mamac (spreman za uporabu)
----------------------	-------------------------------

Dio II.
DRUGA RAZINA INFORMACIJA – METASAŽETCI
SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

**Poglavlje 1. METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1
ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 1 identifikacijska oznaka

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: Meta RCP 1
-------------------------	----------------------

1.2. Dodatak broju autorizacije

Broj	1-1
------	-----

1.3. Vrsta(e) proizvoda

Vrsta(e) proizvoda	PT14: Rodenticidi
--------------------	-------------------

Poglavlje 2. SASTAV U META SPC-U 1

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasazetku svojstava biocidnog proizvoda 1

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Alfakloraloza	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)- a-D-glucofuranose	aktivna tvar	15879-93-3	240-016-7	4 - 4 % (w/w)

2.2. Vrsta(e) formulacije(a) u metasazetku svojstava biocidnog proizvoda 1

Vrsta(e) formulacije	RB Mamac (spreman za uporabu)
----------------------	-------------------------------

Poglavlje 3. OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1

Oznake upozorenja	H410: Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P391: Sakupiti proliveno/rasuto. P501: Odložiti sadržaj u/na skladu s lokalnim propisima – predajom tvrtki ovlaštenoj za sakupljanje opasnog otpada.

Poglavlje 4. AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

4.1. Opis uporabe 1

Tablica 1. Rodenticidni mamac u obliku impregniranog žita - profesionalac, široka javnost (amaterska uporaba)

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	rodenticidni mamac
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: ostalo: kućni miš Stadij razvoja: mladunci Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: ostalo: kućni miš Stadij razvoja: odrasli
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome U zatvorenom prostoru, u privatnim i javnim zgradama, u zaštitnim (deratizacijskima) kutijama za mamce otpornim na neovlašteno otvaranje ili pokrivenim postajama s mamcem.
Način(i) primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: kutija za mamce -u zaštitnim (deratizacijskima) kutijama za mamce otpornim na neovlašteno otvaranjebiocidni učinak nastupa 1-3 dana nakon ingestije mamca
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Za jake infestacije: po mjestu postavljanja treba upotrijebiti 10 - 25 g pripravka. Za blage infestacije: po mjestu postavljanja treba upotrijebiti 10 - 25 g pripravka. Razrjeđenje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Način postavljanja mamca ili broj vrećica po mjestu postavljanja mamca (zaštitnoj kutiji) mora biti prilagođen učinkovitoj razini. Broj zaštitnih kutija za mamce i prekrivenih mjesta za mamce ovisi o veličini infestiranog područja i opsegu (jačini) infestacije. Preporučene udaljenosti između mjesta postavljanja mamaca moraju se poštivati. Zaštitne kutije za mamce ili prekrivena mjesta na koja su postavljeni mamci treba pregledati i nadopuniti nekoliko dana nakon što su postavljeni, a zatim barem jednom tjedno sve dok se mamac konzumira. Način primjene u zatvorenim prostorima: Kućni miš (<i>Mus musculus</i>) - za jake infestacije: po mjestu postavljanja treba upotrijebiti 10 - 25 g pripravka po mjestu postavljanja mamca. Razmak između mjesta postavljanja treba biti 3 metra. - za blage infestacije: po mjestu postavljanja treba upotrijebiti 10 - 25 g pripravka po mjestu postavljanja mamca. Razmak između mjesta postavljanja treba biti 5 metara
Kategorija(e) korisnika	profesionalac ; opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Proizvod je pakiran u:

- pojedinačne PE ili PE/papirne vrećice od 10 ili 25 g
 Papirne vrećice (10 ili 25g) pakirane u:
 - Kartonske kutije (40g, 80g, 120g, 160g, 200g, 240g, 280g, 320g, 360g, 400g, 440g, 480g, 520g, 560g)
 - Krute "doypack" vrećice (200, 500g)
 - Metalne kutije + PP vrećica (40g, 80g, 120g, 160g, 200g, 240g, 280g, 320g, 360g, 400g, 440g, 480g, 520g, 560g)
 - Metalne kutije (40g, 80g, 120g, 160g, 200g, 240g, 280g, 320g, 360g, 400g, 440g, 480g, 520g, 560g)
 - PP kante (500g)
 - PP ili PE vrećice (40g, 80g, 120g, 160g, 200g, 240g, 280g, 320g, 360g, 400g, 440g, 480g, 520g, 560g)
 - Kartonske kutije od 1 do 10 stanica za mamac napunjene s 1 ili 2 vrećice od 10 g

4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

-

4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

-

4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

-

4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.1.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

4.2. Opis uporabe 2

Tablica 2. Rodenticidni mamac u obliku impregniranog žita - osposobljeni profesionalac

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	rodenticidni mamac
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: ostalo: kućni miš Stadij razvoja: mladunci Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: ostalo: kućni miš Stadij razvoja: odrasli
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome U zatvorenom prostoru, u privatnim, javnim i poljoprivrednim zgradama, u zaštitnim (deratizacijskima) kutijama za mamce otpornim na neovlašteno otvaranje ili pokrivenim postajama s mamcem.
Način(i) primjene	Metoda: primjena mamaca

	Detaljan opis: u zaštitnim (deratizacijskima) kutijama za mamce otpornim na neovlašteno otvaranje, na prekrivenim mjestima za mamce, biocidni učinak nastupa 1-3 dana nakon ingestije mamca
Količina(e) kod primjene i učestalost	<p>Stopa primjene: Za jake infestacije: po mjestu postavljanja treba upotrijebiti 10 - 25 g pripravka. Za blage infestacije: po mjestu postavljanja treba upotrijebiti 10 - 25 g pripravka</p> <p>Razrjeđenje (%): -</p> <p>Broj i vremenski raspored primjene: Način postavljanja mamca ili broj vrećica po mjestu postavljanja mamca (zaštitnoj kutiji ili prekrivenom mjestu) mora biti prilagođen učinkovitoj razini. Broj zaštitnih kutija za mamce i prekrivenih mjesta za mamce ovisi o veličini infestiranog područja i opsegu (jačini) infestacije. Preporučene udaljenosti između mjesta postavljanja mamaca moraju se poštivati. Zaštitne kutije za mamce ili prekrivena mjesta na koja su postavljeni mamci treba pregledati i nadopuniti nekoliko dana nakon što su postavljeni, a zatim barem jednom tjedno sve dok se mamac konzumira. Način primjene u zatvorenim prostorima: Kućni miš (<i>Mus musculus</i>) - za jake infestacije: po mjestu postavljanja treba upotrijebiti 10 - 25 g pripravka po mjestu postavljanja mamca. Razmak između mjesta postavljanja treba biti 3 metra. - za blage infestacije: po mjestu postavljanja treba upotrijebiti 10 - 25 g pripravka po mjestu postavljanja mamca. Razmak između mjesta postavljanja treba biti 5 metara</p>
Kategorija(e) korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Proizvod je pakiran u:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pojedinačna vrećica (PE ili PE/papir): 10 ili 25g PE ili PE/papirne vrećice (10 ili 25g) pakirane u: <ul style="list-style-type: none"> - Kante (PP): 1 kg, 2, 5 kg, 5 kg - Kartonske kutije: 1 kg, 2, 5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8kg, 9 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg.

4.2.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Izmjenjujte proizvode s aktivnim tvarima s različitim načinima djelovanja kako biste izbjegli pojavu rezistencije.

Koristite integrirane metode kao što su kombinacija kemijske i fizičke kontrole te higijenskih mjera.

Učinkovitost proizvoda provjerite na licu mjesta: ako je potrebno, potražite uzroke smanjenja učinkovitosti kako bi se osiguralo da ne dođe do otpornosti na proizvod.

Nemojte koristiti proizvod u područjima gdje se sumnja na rezistenciju ili je već utvrđena.

Obavijestite nositelja odobrenja u slučaju neučinkovitosti proizvoda ili znakova koji se mogu protumačiti kao razvoj rezistencije.

4.2.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

-

4.2.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

-

4.2.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.2.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Poglavlje 5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1

5.1. Upute za uporabu

- Ne otvarajte vrećice u kojima se nalazi mamac.
- Tijekom uporabe proizvoda nemojte jesti, piti ili pušiti. Operite ruke i izravno izloženu kožu nakon uporabe proizvoda.
- Postavite mamce dalje od hrane, pića, stočne hrane, pribora za jelo i površina koje mogu doći u dodir s hranom.
- Postavite mamce izvan dohvata djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih neciljanih životinja.
- U kutije za mamce ili postaje za mamce smiju se stavljati samo rodenticidi.
- Uklonite nepojedeni mamac i postaju za mamac na kraju postupka deratizacije.
- Postavite kutije ili postaje s mamcem u prostor zaštićen od poplave.
- Ne postavljajte stanice za mamac u blizini sustava odvodnje vode gdje mogu doći u dodir s vodom.
- Preporučuje se nošenje rukavica radi zaštite od bolesti koje prenose glodavci.

Korisnici moraju ispravno označiti stanice za mamac sa sljedećim:

- Ne otvarajte postaje za mamac.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

- Označite na pakiranju, pomoći dobro vidljivog piktograma, opasnost za ljude i neciljane organizme
- Na pakiranju navesti da je za primjenu rodenticida potrebno koristiti kutiju za mamac.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

U slučaju izloženosti bilo kojim putem, odmah nazovite Centar za kontrolu trovanja (01 2348 342) ili liječnika, pri tome imajte pri ruci originalno pakiranje proizvoda.

U slučaju udisanja: odmah izađite na svjež zrak i mirujte, nazovite Centar za kontrolu trovanja (01 2348 342) ili liječnika.

U slučaju dodira s kožom: odmah skinite kontaminiranu odjeću, operite kožu vodom i sapunom. Nemojte koristiti otapala ili razrjeđivače. Nazovite Centar za kontrolu trovanja (01 2348 342) ili liječnika.

U slučaju dodira s očima: odmah isprati oči nekoliko minuta pod mlazom mlake tekuće vode, pri tome držati kapke otvorene. Nazovite Centar za kontrolu trovanja (01 2348 342) ili liječnika.

U slučaju gutanja: nemojte izazivati povraćanje, domah nazovite nazovite Centar za kontrolu trovanja (01 2348 342) ili liječnika. Nemojte jesti niti piti. U slučaju naglih nekontroliranih pokreta ili grčenja mišića, unesrećenog stavite u ležeći bočni položaj i zaštitite ga od ozljeda, potražite pomoć hitne medicinske službe pozivom na telefonski broj 112. Do dolaska službe pratite disanje unesrećenog i slijedite savjet liječnika.

Informacije za liječnike:

Ovaj proizvod sadrži rodenticid koji uzrokuje depresiju središnjeg živčanog sustava i uz to može izazvati konvulzije i bronhijalnu kongestiju. Liječenje je simptomatsko, nema specifičnog antidota.

Sve navedeno treba biti naznačeno na postajama s mamcem.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Nemojte odlagati ovaj proizvod i njegov spremnik bez poduzimanja svih mjera opreza:

- Nemojte ispuštati proizvod u okoliš ili kanalizaciju.
- Upotrijebljene postaje ili kutije za mamce odložite u odgovarajući centar za sakupljanje otpada.
- Ambalaža se ne smije ponovno koristiti ili reciklirati.

-
- Nepojedeni ili neiskorišteni mamci, mamci koje su miševi izvukli iz postaje ili kutije s mamcem i mrtvi glodavaca moraju se sakupiti i odložiti u odgovarajući centar za sakupljanje.
 - Nemojte čistiti kutije za mamac ili postaje za mamac između dvije primjene.

5.5. Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Čuvati izvan dohvata djece.

- Držati podalje od hrane i pića, uključujući stočnu hranu.
- Čuvajte samo u originalnom spremniku.
- Rok trajanja proizvoda je 2 godine od datuma proizvodnje.

Informacije za javnost koje trebaju biti inaznačene na postajama za mamac:

- Čuvajte izvan dohvata djece.
- Držati podalje od hrane i pića, uključujući stočnu hranu.

Poglavlje 6. OSTALE INFORMACIJE

- Na vrećicama i etiketi mora biti navedeno "Ne otvarajte vrećice".
- Kutije za mamac otporne na neovlašteno otvaranje smatraju se one u kojima je mamac nedostupan djeci i neciljanim životinjama. Moraju biti osigurane posebnim mehanizmom za zatvaranje kako bi se spriječilo da ih djeca otvore. Nositelj odobrenja za stavljanje u promet mora osigurati dostupnost sigurnih neprozirnih kutija za mamac.
- Primjerene postaje za mamce smatraju se one koje osiguravaju istu razinu zaštite ljudi i okoliša kao i kutije za mamac. Trebaju biti pričvršćene tako da se ne mogu pomicati, čime se sprječava dodir mamaca s okolinom. Ovi uređaji moraju biti dizajnirani tako da mamci budu nedostupni javnosti i neciljanim životinjama te ih štite od vremenskih uvjeta.
- Na etiketi proizvoda mora biti naznačeno da sadrži silicijev dioksid (nano).

Poglavlje 7. TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1

7.1. Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv(i)	BLACK PEARL GRAIN	područje prodaje: HR
	MAXI STARR ZITNI MAMAC	područje prodaje: HR
	FLASH GRAIN	područje prodaje: HR
	GRAIN AF	područje prodaje: HR
	MAGIK GRAIN	područje prodaje: HR
Broj autorizacije	HR-0028054-0001 1-1	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Alfakloraloza	(R)-1,2-O-(2.2,2-Trichloroethylidene)- a-D-glucofuranose	aktivna tvar	15879-93-3	240-016-7	4

7.2. Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv(i)	RED PEARL GRAIN	područje prodaje: HR
	MAXI STARR ZITNI MAMAC crvena	područje prodaje: HR
Broj autorizacije	HR-0028054-0002 1-1	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Alfakloraloza	(R)-1,2-O-(2.2,2-Trichloroethylidene)- a-D-glucofuranose	aktivna tvar	15879-93-3	240-016-7	4