

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

AGROBLOCK BD-3

Τύπος(οι) προϊόντος

PT14: Τρωκτικοκτόνα

Αριθμός άδειας: ΤΠ14-0215

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: GR-0030086-0000

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	3
1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος	3
1.2. Κάτοχος άδειας	3
1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος	3
1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)	3
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	4
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος	4
2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης	4
3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ	5
4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ	6
4.1. Περιγραφή χρήσης	6
4.2. Περιγραφή χρήσης	7
4.3. Περιγραφή χρήσης	8
4.4. Περιγραφή χρήσης	10
4.5. Περιγραφή χρήσης	12
4.6. Περιγραφή χρήσης	14
5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	16
5.1. Οδηγίες χρήσης	16
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	17
5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος	18
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του	18
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	18
6. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	19

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	AGROBLOCK BD-3 HAMELIN BLOQUE
-------------------	----------------------------------

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Όνομασία	Laboratorios Agrochem S.L.
	Διεύθυνση	C/Tres Rieres, 10 - Pol. Ind. Sud 08292 Esparreguera Ισπανία
Αριθμός άδειας	ΤΠ14-0215	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>	GR-0030086-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	15/12/2022	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	01/07/2024	

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	LABORATORIOS AGROCHEM, S.L.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Tres Rieres 10, P.I. Sur 08292 Esparreguera-Barcelona Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	LABORATORIOS AGROCHEM, S.L. -Tres Rieres 10, P.I. Sur 08292 Esparreguera-Barcelona Ισπανία

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	Βρωμαδιολόνη
Επωνυμία παρασκευαστή	LABORATORIOS AGROCHEM S.L
Διεύθυνση παρασκευαστή	Tres Rieres 10, P.I. Sur 08292 Esparreguera (Barcelona) Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Tres Rieres 10, P.I. Sur 08292 Esparreguera (Barcelona) Ισπανία

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Βρωμαδιολόνη	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	δραστική ουσία	28772-56-7	249-205-9	0,0029

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

XX Άλλο: Έτοιμο προς χρήση : μπλοκ

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση ..
Δηλώσεις προφύλαξης	P102: Μακριά από παιδιά. P103: Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια. P314: Συμβουλευθείτε Συμβουλευθείτε εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P501: Διάθεση του περιεχομένου σε και/ή δοχείο ως επικίνδυνο απόβλητο σε εγγεγραμμένη εγκατάσταση ή επιχείρηση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Κεφάλαιο 4. ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Χρήση 1 – Οικιακοί ποντικοί και/ή Αρουραίοι – Ευρύ κοινό – Εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ενήλικα Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ενήλικα Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σε δολωματικούς σταθμούς Λεπτομερής περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς σε παραβιάσεις
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Ποντίκια: δολωματικοί σταθμοί με 60g προϊόντος το καθένα ανά 5-10m ; Αρουραίοι: δολωματικοί σταθμοί με 100g προϊόντος το καθένα ανά 5-10m Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Ποντίκια: δολωματικοί σταθμοί με 60g προϊόντος το καθένα ανά 5-10m 60 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν χρειάζονται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών πρέπει να είναι 5-10m (5m σε περίπτωση ισχυρής προσβολής και 10m σε περίπτωση ασθενούς προσβολής). Αρουραίοι: δολωματικοί σταθμοί με 100g προϊόντος το καθένα ανά 5-10m 100g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν χρειάζονται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών πρέπει να είναι 5-10 μέτρα (5 μέτρα σε περίπτωση ισχυρής προσβολής και 10 μέτρα σε περίπτωση αδύναμης προσβολής).
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 300g. Αριθμός συσκευασμένων σακουλών ανά συσκευασία: έως 300g Γραμμάρια/κιλό δολώματος ανά συσκευασμένη σακούλα: τεμάχια 5 έως 100 g Υλικό συσκευασίας: φακελάκι, πλαστικός κουβάς/κάδος, χάρτινο κουτί και σάκοι. Υλικό: PE ή PP, HDPE.
--	--

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισκέπτονται [για ποντίκια - τουλάχιστον κάθε 2 έως 3 ημέρες κατά] [για αρουραίους - μόνο 5 έως 7 ημέρες μετά] την έναρξη της θεραπείας και τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα μετά, προκειμένου να ελέγχεται εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και για την αφαίρεση σωμάτων τρωκτικών. Γεμίστε ξανά τον δολωματικό σταθμό όταν χρειάζεται.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε αυτήν την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε αυτήν την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε αυτήν την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε αυτήν την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2. Χρήση 2 – Αρουραίοι – Ευρύ κοινό – Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά των κτιρίων

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ενήλικα Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά των κτιρίων
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σε δολωματικούς σταθμούς Λεπτομερής περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς σε παραβιάσεις

Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Αρουραίοι: δολωματικοί σταθμοί με 100g προϊόντος το καθένα ανά 5-10 μέτρα Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Αρουραίοι: δολωματικοί σταθμοί με 100g προϊόντος το καθένα ανά 5-10m 100g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν χρειάζονται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών πρέπει να είναι 5-10 μέτρα (5 μέτρα σε περίπτωση ισχυρής προσβολής και 10 μέτρα σε περίπτωση αδύναμης προσβολής).
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 300g. Αριθμός συσκευασμένων σακουλών ανά συσκευασία: έως 300g Γραμμάρια/κιλό δολώματος ανά συσκευασμένη σακούλα: τεμάχια κεριού 5 έως 100 g Υλικό συσκευασίας: φακελάκι, πλαστικός κουβάς/κάδος, χάρτινο κουτί και σάκοι. Υλικό: PE ή PP, HDPE.

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε πλημμύρες.
- Αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα σε δολωματικό σταθμό στον οποίο το δόλωμα έχει καταστραφεί από νερό ή έχει μολυνθεί από βρωμιά.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισκέπτονται μόνο 5 έως 7 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα μετά, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και να αφαιρεθούν τα σώματα τρωκτικών. Γεμίστε ξανά τον δολωματικό σταθμό όταν χρειάζεται.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε αυτήν την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε αυτήν την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε αυτήν την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε αυτήν την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης

4.3. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 3. Χρήση 3 - Οικιακοί ποντικοί και/ή Αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες – Εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα

Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ενήλικα Επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά Επιστημονική ονομασία: Mus musculus Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ενήλικα Επιστημονική ονομασία: Mus musculus Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σε δολωματικούς σταθμούς Λεπτομερής περιγραφή: - Έτοιμο προς χρήση δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς σε παραβίαση
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Αρουραίοι: 100-200 γραμμάρια ανά δολωματικό σταθμό. Ποντίκια: 60-100 γραμμάρια ανά δολωματικό σταθμό Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Αρουραίοι: 100-200 γραμμάρια ανά δολωματικό σταθμό Ποντίκια: 60-100 γραμμάρια ανά δολωματικό σταθμό
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg. Αριθμός συσκευασμένων σακουλών ανά συσκευασία: έως 30 κιλά. Γραμμάρια/κιλό δολώματος ανά συσκευασμένο σάκκο: τεμάχια κεριού 5 έως 100 γραμμαρίων Υλικό συσκευασίας: φακελάκι, πλαστικός κουβάς/κάδος, χάρτινο κουτί και σάκοι. Υλικό: PE ή PP, HDPE.

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Αφαιρέστε το υπολειπόμενο προϊόν στο τέλος της περιόδου θεραπείας.
- Ακολουθήστε τυχόν πρόσθετες οδηγίες που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.
Πρόσθετη ειδική οδηγία χρήσης για μόνιμο δόλωση:
- Όπου είναι δυνατόν, συνιστάται η επανεξέταση της υπό θεραπεία περιοχής το αργότερο κάθε 4 εβδομάδες, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιλογή ανθεκτικού πληθυσμού.
- [Όταν είναι διαθέσιμο] Ακολουθήστε τυχόν πρόσθετες οδηγίες που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Όπου είναι δυνατόν, πριν από τη θεραπεία ενημερώστε τυχόν παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της περιοχής που υποβλήθηκε σε θεραπεία και του περιβάλλοντός τους) σχετικά με την εκστρατεία καταπολέμησης τρωκτικών.

- Λάβετε υπόψη τα προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. στεγανοποίηση οπών, αφαίρεση πιθανών τροφών και ποτών όσο το δυνατόν περισσότερο) για τη βελτίωση της πρόσληψης του προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας επανεισβολής.
 - Για τη μείωση του κινδύνου δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας σε συχνά διαστήματα, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.
 - Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των τρωκτικών [εκτός εάν έχει εξουσιοδοτηθεί για μόνιμες θεραπείες δολώματος].
 - Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε επαναλαμβανόμενες θεραπείες.
 - Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους και σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε παιδιά ή ζώα που δεν είναι στόχοι.
- Πρόσθετα ειδικά μέτρα μετριασμού του κινδύνου για μόνιμη δόλωση:
- Η μόνιμη δόλωση περιορίζεται αυστηρά σε τοποθεσίες με υψηλή πιθανότητα επανεισβολής όταν άλλες μέθοδοι ελέγχου έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς.
 - Η στρατηγική μόνιμης δόλωσης θα επανεξετάζεται περιοδικά στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM) και της αξιολόγησης του κινδύνου για εκ νέου προσβολή.

4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

- Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή του δολώματος με το νερό.

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε αυτήν την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε αυτήν την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης

4.4. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 4. Χρήση 4 – Οικιακοί ποντικοί και/ή Αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες – Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά των κτιρίων

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ενήλικα Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ενήλικα Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά

Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά των κτιρίων
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σε δολωματικούς σταθμούς Λεπτομερής περιγραφή: - Έτοιμο προς χρήση δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς σε παραβίαση.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Αρουραίοι: 100-200 γραμμάρια ανά δολωματικό σταθμό. Ποντίκια: 60-100 γραμμάρια ανά δολωματικό σταθμό Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Αρουραίοι: 100-200 γραμμάρια ανά δολωματικό σταθμό Ποντίκια: 60-100 γραμμάρια ανά δολωματικό σταθμό Λαγούμι: 200 γραμμάρια δολώματος ανά λαγούμι μόνο μέσα σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg. Αριθμός συσκευασμένων σακουλών ανά συσκευασία: έως 30 κιλά. Γραμμάρια/κιλό δολώματος ανά συσκευασμένο σάκκο: τεμάχια κεριού 5 έως 100 γραμμαρίων Υλικό συσκευασίας: φακελάκι, πλαστικός κουβάς/κάδος, χάρτινο κουτί και σάκοι. Υλικό: PE ή PP, HDPE.

4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Προστατέψτε το δόλωμα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς σε περιοχές που δεν είναι επιρρεπείς σε πλημμύρες.
- Αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα σε δολωματικό σταθμό στα οποία το δόλωμα έχει καταστραφεί από νερό ή έχει μολυνθεί από βρωμιά.
- Αφαιρέστε το υπολειπόμενο προϊόν στο τέλος της περιόδου θεραπείας (εκτός εάν εφαρμόζεται απευθείας σε λαγούμια μέσα σε σταθμούς δολώματος ανθεκτικά σε παραβιάσεις).
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να καλύπτονται και να τοποθετούνται σε στρατηγικές τοποθεσίες για να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε είδη που δεν αποτελούν στόχο.
- Καλύψτε ή μπλοκάρτε τις εισόδους των δολωμένων λαγουμιών για να μειώσετε τους κινδύνους απόρριψης και χυσίματος του δολώματος.
- Ακολουθήστε τυχόν πρόσθετες οδηγίες που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής. Πρόσθετη ειδική οδηγία χρήσης για μόνιμη δόλωση:
- Όπου είναι δυνατόν, συνιστάται η επανεξέταση της υπό θεραπεία περιοχής το αργότερο κάθε 4 εβδομάδες, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιλογή ανθεκτικού πληθυσμού.
- [Όταν είναι διαθέσιμο] Ακολουθήστε τυχόν πρόσθετες οδηγίες που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.

4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Όπου είναι δυνατόν, πριν από τη θεραπεία ενημερώστε τυχόν παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της περιοχής που υποβάλλεται σε θεραπεία και του περιβάλλοντός τους) σχετικά με την εκστρατεία καταπολέμησης τρωκτικών.
- Εξετάστε τα μέτρα προληπτικού ελέγχου (κλείσιμο τρυπών, αφαίρεση πιθανών τροφών και ποτών όσο το δυνατόν περισσότερο) για να βελτιώσετε την πρόσληψη του προϊόντος και να μειώσετε την πιθανότητα επανεισβολής.
- Για τη μείωση του κινδύνου δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας σε συχνά διαστήματα, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των τρωκτικών. [εκτός εάν έχει εγκριθεί για μόνιμες θεραπείες δολώματος].

- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε επαναλαμβανόμενες θεραπείες.

- Μην εφαρμόζετε αυτό το προϊόν απευθείας στα λαγούμια.

Πρόσθετα ειδικά μέτρα μετριασμού του κινδύνου για μόνιμο δόλωμα:

- Η μόνιμη δόλωση περιορίζεται αυστηρά σε τοποθεσίες με υψηλή πιθανότητα επανεισβολής όταν άλλες μέθοδοι ελέγχου έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς.

- Η στρατηγική μόνιμης δόλωσης θα επανεξετάζεται περιοδικά στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM) και της αξιολόγησης του κινδύνου για εκ νέου προσβολή.

4.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε επιφανειακά νερά (π.χ. ποτάμια, λιμνούλες, κανάλια νερού, αναχώματα, αρδευτικά κανάλια) ή συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή του δολώματος με το νερό.

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε αυτήν την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης

4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε αυτήν την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης

4.5. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 5. Χρήση 5 – Αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες – Εξωτερικοί ανοιχτοί χώροι & χωματερές

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ενήλικα Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο Εξωτερικοί ανοιχτοί χώροι και χωματερές
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σε δολωματικούς σταθμούς Λεπτομερής περιγραφή: - Έτοιμο προς χρήση δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς σε παραβίαση
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Αρουραίοι: 100-200 γραμμάρια ανά δολωματικό σταθμό Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:

	Αρουραίοι: 100-200 γραμμάρια ανά δολωματικό σταθμό. Λαγούμι: 200 γραμμάρια δολώματος ανά λαγούμι μόνο μέσα σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg. Αριθμός συσκευασμένων σακουλών ανά συσκευασία: έως 30 κιλά. Γραμμάρια/κιλό δολώματος ανά συσκευασμένη σακούλα: τεμάχια κεριού 5 έως 100 g Υλικό συσκευασίας: φακελάκι, πλαστικός κουβάς/κάδος, χάρτινο κουτί και σάκοι. Υλικό: PE ή PP, HDPE

4.5.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Προστατέψτε το δόλωμα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε πλημμύρες.
- Αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα σε δολωματικό σταθμό στα οποία το δόλωμα έχει καταστραφεί από νερό ή έχει μολυνθεί από βρωμιά.
- Αφαιρέστε το υπόλοιπο προϊόν στο τέλος της περιόδου θεραπείας (εκτός εάν εφαρμόζεται απευθείας σε λαγούμια μέσα σε σταθμούς δολώματος ανθεκτικά σε παραβιάσεις).
- Πρέπει να τοποθετούνται δολώματα για να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε είδη και παιδιά που δεν αποτελούν στόχο.
- Καλύψτε ή μπλοκάρτε τις εισόδους των δολωμένων λαγουμιών για να μειώσετε τους κινδύνους απόρριψης και χυσίματος του δολώματος.
- Ακολουθήστε τυχόν πρόσθετες οδηγίες που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής. Πρόσθετη ειδική οδηγία χρήσης για μόνιμη δόλωση:
 - Όπου είναι δυνατόν, συνιστάται η επανεξέταση της υπό θεραπεία περιοχής το αργότερο κάθε 4 εβδομάδες, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιλογή ανθεκτικού πληθυσμού.
 - [Όταν είναι διαθέσιμο] Ακολουθήστε τυχόν πρόσθετες οδηγίες που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.

4.5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Όπου είναι δυνατόν, πριν από τη θεραπεία ενημερώστε τυχόν παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της περιοχής που υποβλήθηκε σε θεραπεία και του περιβάλλοντός τους) σχετικά με την εκστρατεία καταπολέμησης τρωκτικών.
 - Για να μειώσετε τον κίνδυνο δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας σε συχνά διαστήματα, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.
 - Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των τρωκτικών [εκτός εάν έχει εγκριθεί για μόνιμες θεραπείες δολώματος].
 - Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε επαναλαμβανόμενες θεραπείες.
 - Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να καλύπτονται και να τοποθετούνται σε στρατηγικές τοποθεσίες για να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε είδη που δεν αποτελούν στόχο.
 - Μην εφαρμόζετε αυτό το προϊόν απευθείας στα λαγούμια.
- Πρόσθετα ειδικά μέτρα μετριασμού του κινδύνου για μόνιμη δόλωση:
- Η μόνιμη δόλωση περιορίζεται αυστηρά σε τοποθεσίες με υψηλή πιθανότητα επανεισβολής όταν άλλες μέθοδοι ελέγχου έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς.
 - Η στρατηγική μόνιμης δόλωσης θα επανεξετάζεται περιοδικά στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM) και της αξιολόγησης του κινδύνου για εκ νέου προσβολή.

4.5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε επιφανειακά νερά (π.χ. ποτάμια, λιμνούλες, κανάλια νερού, αναχώματα, αρδευτικά κανάλια) ή συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή του δολώματος με το νερό.

4.5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε αυτήν την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης

4.5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε αυτήν την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης

4.6. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 6. Χρήση 6 – Αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες – Υπόνομοι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ενήλικα Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά
Πεδίο(α) χρήσης	άλλο: Otro Υπόνομοι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σε δολωματικούς σταθμούς Λεπτομερής περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση δόλωμα σε δολωματικούς σταθμούς εμποδίζοντας το δόλωμα να έρθει σε επαφή με τα λύματα.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Αρουραίοι: δολωματικοί σταθμοί με 100-200 g ανά φρεάτιο Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Αρουραίοι: δολωματικοί σταθμοί με 100-200 g ανά φρεάτιο
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg. Αριθμός συσκευασμένων σακουλών ανά συσκευασία: έως 30 κιλά. Γραμμάρια/κιλό δολώματος ανά συσκευασμένη σακούλα: τεμάχια κεριού 5 έως 200 g. Υλικό συσκευασίας: φακελάκι, πλαστικός κουβάς/κάδος, χάρτινο κουτί και σάκοι. Υλικό: PE ή PP, HDPE.

4.6.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Τα δολώματα πρέπει να εφαρμόζονται με τρόπο ώστε να μην έρχονται σε επαφή με το νερό και να μην ξεπλένονται.
- Ακολουθήστε τυχόν πρόσθετες οδηγίες που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.

4.6.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- [Εάν το απαιτεί η εθνική πολιτική ή νομοθεσία] Τοποθετήστε τα δολώματα μόνο σε αποχετευτικά συστήματα που είναι συνδεδεμένα με τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.

- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε επαναλαμβανόμενες θεραπείες.

4.6.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε αυτήν την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης

4.6.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε αυτήν την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης

4.6.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε αυτήν την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

Ευρύ κοινό:

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες του προϊόντος καθώς και κάθε πληροφορία που συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Πριν από τη χρήση τρωκτικοκτόνων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μη χημικές μέθοδοι καταπολέμησης (π.χ. παγίδες).
- Αφαιρέστε τρόφιμα που είναι εύκολα προσβάσιμα για τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή υπολείμματα τροφών). Εκτός από αυτό, μην καθαρίζετε την μολυσμένη περιοχή ακριβώς πριν από τη θεραπεία, καθώς αυτό ενοχλεί μόνο τον πληθυσμό των τρωκτικών και καθιστά πιο δύσκολη την επίτευξη της αποδοχής του δολώματος.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γειτνίαση όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (περιοχές πεζοπορίας, σημεία φωλεοποίησης, τροφοδότες, τρύπες, λαγούμια...)
- Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- [Μην ανοίγετε τα φακελάκια που περιέχουν το δόλωμα - κατά περίπτωση για τη σύνθεση δολώματος στο προϊόν].
- Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια, ζώα φάρμας και άλλα ζώα που δεν είναι στόχοι.
- Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έχουν επαφή με αυτά.
- Μην τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού όπου μπορεί να έρθουν σε επαφή με το νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το άμεσα εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Αφαιρέστε το υπολειπόμενο δόλωμα ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου θεραπείας.

Επαγγελματίες:

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες του προϊόντος καθώς και κάθε πληροφορία που συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Πραγματοποιήστε μια προ-δολωτική έρευνα της μολυσμένης περιοχής και μια επιτόπια αξιολόγηση προκειμένου να εντοπιστούν τα είδη τρωκτικών, οι τόποι δραστηριότητάς τους και να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία και η έκταση της προσβολής.
- Αφαιρέστε τρόφιμα που είναι εύκολα προσβάσιμα για τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή υπολείμματα τροφών). Εκτός από αυτό, μην καθαρίζετε την μολυσμένη περιοχή ακριβώς πριν από τη θεραπεία, καθώς αυτό ενοχλεί μόνο τον πληθυσμό των τρωκτικών και καθιστά πιο δύσκολη την επίτευξη της αποδοχής του δολώματος.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης τρωκτικών (IPM), συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, μέτρων υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικών μεθόδων καταπολέμησης.
- Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε άμεση γειτνίαση με μέρη όπου έχει προηγουμένως διερευνηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (περιοχές πεζοπορίας, σημεία φωλεοποίησης, τροφοδότες, τρύπες, λαγούμια...).
- Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση για να δείχνουν ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται (βλ. ενότητα 5.3 για τις πληροφορίες που πρέπει να εμφανίζονται στην ετικέτα).
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, θα πρέπει να επισημαίνονται οι περιοχές που υποβάλλονται σε θεραπεία κατά τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας και μια ειδοποίηση που να εξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και να αναφέρει τα πρώτα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης διατίθενται παράλληλα με τα δολώματα.

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

- Το δόλωμα πρέπει να είναι ασφαλισμένο έτσι ώστε να μην μπορεί να συρθεί μακριά από το δολωματικό σταθμό.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια και ζώα φάρμας και άλλα ζώα που δεν είναι στόχοι.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκευή ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στις χημικές ουσίες κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό γαντιών πρέπει να προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες του προϊόντος).
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το άμεσα εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Η συχνότητα των επισκέψεων στην υπό θεραπεία περιοχή θα πρέπει να είναι στη διακριτική ευχέρεια του χειριστή, υπό το φως της έρευνας που διενεργήθηκε στην αρχή της θεραπείας. Αυτή η συχνότητα θα πρέπει να είναι συνεπής με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.
- Εάν η πρόσληψη δολώματος είναι χαμηλή σε σχέση με το φαινομενικό μέγεθος της προσβολής, σκεφτείτε την αντικατάσταση των σημείων δολώματος σε περαιτέρω σημεία και τη δυνατότητα αλλαγής σε άλλη σύνθεση δολώματος.
- Εάν μετά από περίοδο θεραπείας 35 ημερών συνεχιστεί η κατανάλωση δολωμάτων και δεν παρατηρηθεί μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία. Όπου έχουν εξαιρεθεί άλλα στοιχεία, είναι πιθανό να υπάρχουν ανθεκτικά τρωκτικά, γι' αυτό σκεφτείτε τη χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου είναι διαθέσιμο, ή ενός πιο ισχυρού αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Εξετάστε επίσης τη χρήση παγίδων ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
- Μην ανοίγετε τα φακελάκια που περιέχουν το δόλωμα.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Ευρύ κοινό:

- Εξετάστε τα μέτρα προληπτικού ελέγχου (κλείσιμο τρυπών, αφαίρεση πιθανών τροφών και ποτών όσο το δυνατόν περισσότερο) για να βελτιώσετε την πρόσληψη του προϊόντος και να μειώσετε την πιθανότητα επανεισβολής.
- Μη χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή για την ανίχνευση δραστηριότητας τρωκτικών).
- Οι πληροφορίες προϊόντος (δηλαδή η ετικέτα ή/και το φυλλάδιο) πρέπει να δείχνουν σαφώς ότι:
 - Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατάλληλους δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση (π.χ. "χρήση μόνο σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση").
 - Οι χρήστες πρέπει να επισημαίνουν σωστά τους δολωματικούς σταθμούς με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ενότητα 5.3 της SPC (π.χ. "επισήμανση δολωματικών σταθμών σύμφωνα με τις συστάσεις του προϊόντος").
- Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες του προϊόντος (δηλαδή η ετικέτα ή/και το φυλλάδιο) θα συνιστούν σαφώς ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της θεραπείας (δηλαδή εξακολουθεί να παρατηρείται δραστηριότητα τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ή να καλέσει ένα συνεργείο απεντόμωσης.
- Αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας, τουλάχιστον όσο συχνά επιθεωρούνται οι δολωματικοί σταθμοί.
- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις [Η μέθοδος απόρριψης πρέπει να περιγράφεται ειδικά στο εθνικό SPC και να απεικονίζεται στην ετικέτα του προϊόντος].

Επαγγελματίες:

- Όπου είναι δυνατόν, πριν από τη θεραπεία ενημερώστε τυχόν παρευρισκόμενους για την εκστρατεία καταπολέμησης τρωκτικών.
- Οι πληροφορίες προϊόντος (π.χ. ετικέτα ή/και φυλλάδιο) πρέπει να δείχνουν ξεκάθαρα ότι το προϊόν θα παρέχεται μόνο σε επαγγελματίες χρήστες. (π.χ. "μόνο για εκπαιδευμένους επαγγελματίες").
- Να μη χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ανθεκτικότητας στη δραστική ουσία.
- Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πέραν των 35 ημερών χωρίς αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας
- Μην εναλλάσσετε τη χρήση διαφορετικών αντιπηκτικών με συγκρίσιμη ή ασθενέστερη ισχύ για σκοπούς διαχείρισης της αντίστασης. Για περιστροφική χρήση, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε ένα μη αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, εάν υπάρχει, ή ένα πιο ισχυρό αντιπηκτικό.

-
- Μην πλένετε τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σκεύη που χρησιμοποιούνται σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δολώματος με νερό μεταξύ των εφαρμογών.
 - Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις [Η μέθοδος απόρριψης πρέπει να περιγράφεται ειδικά στο εθνικό SPC και να απεικονίζεται στην ετικέτα του προϊόντος].

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

- Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία μπορεί να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία των ούλων. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα.
- Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 που χορηγείται μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.
- Σε περίπτωση:
 - Δερματικής έκθεσης, πλύνετε το δέρμα με νερό και στη συνέχεια με νερό και σαπούνι.
 - οφθαλμικής έκθεσης, ελέγχετε πάντα και αφαιρείτε τους φακούς επαφής, ξεπλένετε τα μάτια με υγρό ή νερό για τα μάτια, κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.
 - στοματικής έκθεσης, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό. Μην δίνετε ποτέ τίποτα από το στόμα σε αναισθητο άτομο. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος [εισαγάγετε συγκεκριμένες πληροφορίες για τη χώρα]. Επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο [εισαγάγετε συγκεκριμένες πληροφορίες για τη χώρα]
 - Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να φέρουν την σήμανση με τις ακόλουθες πληροφορίες: "μην μετακινείτε ή ανοίγετε". "περιέχει τρωκτικοκτόνο". "όνομα προϊόντος ή αριθμός εξουσιοδότησης". "δραστικές ουσίες" και "σε περίπτωση περιστατικού, καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων [τηλέφωνο 210 77 93 777]"
- Επικίνδυνο για την άγρια ζωή.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

- Στο τέλος της επεξεργασίας, πετάξτε το μη φαγωμένο δόλωμα και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις [Η μέθοδος απόρριψης θα περιγράφεται ειδικά στο εθνικό SPC και θα αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος].
- Συνιστάται η χρήση γαντιών.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Φυλάσσετε σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Φυλάσσετε σε μέρη όπου δεν επιτρέπεται η πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων ζώων και ζώων φάρμας.
- Χρόνος ζωής: δύο χρόνια

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα χρειάζονται από 4 έως 10 ημέρες για να είναι αποτελεσματικά μετά την κατανάλωση του δολώματος.

- Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή χρησιμοποιείτε εργαλεία όπως λαβίδες όταν τα πετάτε.

- Για το ευρύ κοινό: Η συσκευασία του προϊόντος πρέπει να φέρει προειδοποίηση αφής.

-Αυτό το προϊόν περιέχει ένα πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική.

Απαιτήσεις μετά την έγκριση:

Δοκιμή μακροπρόθεσμης σταθερότητας εντός 2 ετών