

# Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

**Όνομασία προϊόντος:** RATT ON 25

**Τύπος(οι) προϊόντος:** PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

**Αριθμός άδειας:** KY-0139

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο  
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** CY-0019867-0000

## Πίνακας περιεχομένων

|  |    |
|--|----|
| Διοικητικές πληροφορίες  | 1  |
| 1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος   | 1  |
| 1.2. Κάτοχος άδειας  | 1  |
| 1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων   | 1  |
| 1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών  | 1  |
| 2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος  | 2  |
| 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου                        | 2  |
| 2.2. Είδος τυποποίησης   | 2  |
| 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης   | 2  |
| 4. Εγκεκριμένες χρήσεις  | 3  |
| 5. Γενικές οδηγίες χρήσης  | 12 |
| 5.1. Οδηγίες χρήσης  | 12 |
| 5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου   | 15 |
| 5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών                     | 17 |
| 5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του                       | 17 |
| 5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης | 17 |
| 6. Άλλες πληροφορίες   | 18 |

## Διοικητικές πληροφορίες

### 1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

|            |
|------------|
| RATT ON 25 |
| TIGER 25   |

### 1.2. Κάτοχος άδειας

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας         | Επωνυμία        | Orma S.r.l.                                |
|   | Διεύθυνση       | Via A. Chiribiri 2 10028 Trofarello Ιταλία |
| Αριθμός άδειας                                    | KY-0139         |  |
| Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 | CY-0019867-0000 |  |
| Ημερομηνία έκδοσης της άδειας                     | 05/02/2014      |  |
| Ημερομηνία λήξης της άδειας                       | 01/07/2024      |  |

### 1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Όνομα του παρασκευαστή                | Ferbi S.r.l.  |
| Διεύθυνση του παρασκευαστή            | Via 1° Maggio 64023 Mosciano S. Angelo (TE) Ιταλία              |
| Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής | Ferbi S.r.l. Via 1° Maggio 64023 Mosciano S. Angelo (TE) Ιταλία |

### 1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστηκής ουσίας

11 - Brodifacoum (βρωδιφακούμη)

Όνομα του παρασκευαστή

Activa S.rl

Διεύθυνση του παρασκευαστή

via Feltre 32 20132 milano Ιταλία

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

Tezza S.r.l-via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio Ιταλία

## 2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

### 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

| Κοινή ονομασία             | Όνομασία κατά IUPAC   | Λειτουργία     | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|----------------------------|---|----------------|-------------|------------|--------------------|
| Brodifacoum (βρωδιφακούμη) | 3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin | Δραστηκή Ουσία | 56073-10-0  | 259-980-5  | 0,0025             |

### 2.2. Είδος τυποποίησης

RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

## 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση ..

Δηλώσεις προφύλαξης

Μακριά από παιδιά.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:Καλέστε αμέσως ιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:Συμβουλευθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:Επισκεφθείτε γιατρό.

Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους Εθνικούς Κανόνες..

Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους Εθνικούς Κανόνες..

## 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

### 4.1 Περιγραφή χρήσης

#### Χρήση 1 - Χρήση #1– Κατά των ποντικών σε εσωτερικούς χώρους από επαγγελματίες χρήστες

|  |   |
|--|---|
| <b>Τύπος προϊόντος</b>   | PT14 - Τρωκτικοκτόνα  |
| <b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται</b>             | Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα   |
| <b>Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</b> | επιστημονική ονομασία: Mus musculus<br>Κοινή ονομασία: House mouse<br>στάδιο ανάπτυξης: juveniles to adults   |
| <b>Πεδίο χρήσης</b>  | Εσωτερικοί Χώροι<br><br>Εσωτερικοί χώροι  |
| <b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>   | Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή<br>Λεπτομερής περιγραφή:<br>Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).  |
| <b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>  | Δόση εφαρμογής: 20 g - 40 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό<br>Αραίωση (%): 0,0025<br>Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:<br>20 g - 40 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό<br>Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί,<br>η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα<br>πρέπει να είναι 5 μέτρα. |
| <b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>   | Επαγγελματίες   |
| <b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>                              | Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 1,5 Kg.<br><br>Το είδος συσκευασίας περιορίζεται σε ξεχωριστά συσκευασμένους σάκους με μέγιστο βάρος σάκου 25Kg (Γραμμάρια/kg δολώματος ανά συσκευασμένο σάκο 10-20 g σε σακουλάκια πάστας)<br><br>Υλικό συσκευασίας: PE/Aluminium/Polyester   |

#### 4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον κάθε 2 με 3 μέρες μετά την αρχή της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα ακολούθως έτσι ώστε να ελέγχετε εάν το δόλωμα έχει φαγωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί έχουν αντοχή και για την αφαίρεση των σωμάτων των τρωκτικών.

Αναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

#### 4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

#### 4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

#### 4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

#### 4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

#### 4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Χρήση #2 – Κατά των αρουραίων σε εσωτερικούς χώρους από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα

Οργανισμός(οί)-στόχος(οί)  
(συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus  
Κοινή ονομασία: Brown rat  
στάδιο ανάπτυξης: juveniles to adults

|   |   |
|---|---|
| <b>Πεδίο χρήσης</b>                             | Εσωτερικοί Χώροι<br><br>Εσωτερικοί χώροι  |
| <b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>                    | Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή<br>Λεπτομερής περιγραφή:<br>Δολωματική εφαρμογή Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).  |
| <b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>             | Δόση εφαρμογής: 100 g - 200 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό.<br>Αραίωση (%): 0,0025<br>Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:<br>100 g - 200 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό.<br><br>Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 μέτρα. |
| <b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>                    | Επαγγελματίες   |
| <b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b> | Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 1,5 Kg.<br>Το είδος συσκευασίας περιορίζεται σε ξεχωριστά συσκευασμένους σάκους με μέγιστο βάρος σάκου 25Kg (Γραμμάρια/kg δολώματος ανά συσκευασμένο σάκο 10-20 g σε σακουλάκια πάστας)<br>Υλικό συσκευασίας: PE/Aluminium/Polyester   |

#### 4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον κάθε 5 με 7 μέρες μετά την αρχή της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε βδομάδα ακολούθως έτσι ώστε να ελέγχετε εάν το δόλωμα έχει φαγωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί έχουν αντοχή και για την αφαίρεση των σωμάτων των τρωκτικών.  
Αναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

#### 4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Όταν οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

#### 4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

#### 4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

#### 4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

#### 4.3 Περιγραφή χρήσης

##### Χρήση 3 - Χρήση #3 – Κατά των ποντικών και αρουραίων περιμετρικά των κτιρίων από επαγγελματίες χρήστες.

|  |   |
|--|---|
| <b>Τύπος προϊόντος</b>   | PT14 - Τρωκτικοκτόνα  |
| <b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται</b>             | Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα   |
| <b>Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</b> | επιστημονική ονομασία: Mus musculus<br>Κοινή ονομασία: House mouse<br>στάδιο ανάπτυξης: juveniles to adults<br><br>επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus<br>Κοινή ονομασία: Brown rat<br>στάδιο ανάπτυξης: Juveniles to adults   |
| <b>Πεδίο χρήσης</b>  | Other<br><br>Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων   |
| <b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>   | Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή<br>Λεπτομερής περιγραφή:<br>Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).  |
| <b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>  | Δόση εφαρμογής: Οικιακά ποντίκια: 20 – 40 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό<br>Καφέ αρουραίος: 100 g - 200 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό<br>Αραίωση (%): 0,0025<br>Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:<br>Οικιακά ποντίκια: 20 – 40 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό<br>Καφέ αρουραίος: 100 g - 200 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό<br><br>Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 μέτρα. |



#### Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες

#### Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 1,5 Kg.  
Το είδος συσκευασίας περιορίζεται σε ξεχωριστά συσκευασμένους σάκους με μέγιστο βάρος σάκου 25Kg (Γραμμάρια/kg δολώματος ανά συσκευασμένο σάκο 10-20 g σε σακουλάκια πάστας)  
Υλικό συσκευασίας: PE/Aluminium/Polyester

#### 4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Προστατέψτε το δόλωμα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι κ.λπ.). Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε πλημμύρες.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να ελέγχονται [για ποντίκια - τουλάχιστον κάθε 2 έως 3 ημέρες ] [για αρουραίους - μόνο 5 έως 7 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας και τουλάχιστον εβδομαδιαίως, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα έχει φαγωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί έχουν αντοχή και για την αφαίρεση των σωμάτων των τρωκτικών. Αναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.
- Αντικαταστήστε το δόλωμα σε ένα δολωματικό σταθμό στο οποίο το δόλωμα έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες.

#### 4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Μην εφαρμόζετε αυτό το προϊόν απευθείας στις υπόγειες τρύπες-αυλάκια.

#### 4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε επιφανειακά νερά (π.χ. ποτάμια, λίμνες, κανάλια νερού, αναχώματα, σχάρες άρδευσης) ή συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό.

#### 4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

#### 4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

#### 4.4 Περιγραφή χρήσης

#### Χρήση 4 - Χρήση #4 – Κατά των ποντικών σε εσωτερικούς χώρους από το ευρύ κοινό

|   |   |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος   | PT14 - Τρωκτικοκτόνα  |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται             | Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα   |
| Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | επιστημονική ονομασία: Mus musculus<br>Κοινή ονομασία: House mouse<br>στάδιο ανάπτυξης: juveniles to adults   |
| Πεδίο χρήσης  | Εσωτερικοί Χώροι<br><br>Εσωτερικοί χώροι  |
| Μέθοδος/-οι εφαρμογής   | Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή<br>Λεπτομερής περιγραφή:<br>Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).  |
| Δόση και συχνότητα εφαρμογής  | Δόση εφαρμογής: 20 g - 40 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό.<br>Αραίωση (%): 0,0025<br>Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:<br>20 g - 40 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό.<br>Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 μέτρα                                      |
| Κατηγορία/-ες χρηστών   | Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)  |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας                              | Έως 50 g (Γραμμάρια/kg δολώματος ανά συσκευασμένο σάκο 10-20 g σε σακουλάκια πάστας)<br>Υλικό συσκευασίας: PE/Aluminium/Polyesther<br><br>Η ανωτέρω συσκευασία αφορά προϊόντα που διατίθενται για αποκλειστική χρήση κατά των ποντικών. Για προϊόντα που διατίθενται για χρήση κατά των ποντικών και των αρουραίων η μέγιστη συσκευασία θα είναι 150 γραμμάρια. |

#### 4.4.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον κάθε 2 με 3 μέρες μετά την αρχή της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε βδομάδα ακολούθως έτσι ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει φαγωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί έχουν αντοχή και για την αφαίρεση των σωμάτων των τρωκτικών.  
Αναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

#### 4.4.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

#### 4.4.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

#### 4.4.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

#### 4.4.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

#### 4.5 Περιγραφή χρήσης

##### Χρήση 5 - Χρήση #5 – Κατά των αρουραίων σε εσωτερικούς χώρους από το ευρύ κοινό.

|  |  |
|--|--|
| <b>Τύπος προϊόντος</b>   | PT14 - Τρωκτικοκτόνα   |
| <b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται</b>             | Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα  |
| <b>Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</b> | επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus<br>Κοινή ονομασία: Brown rat<br>στάδιο ανάπτυξης: Juveniles to adults   |
| <b>Πεδίο χρήσης</b>  | Εσωτερικοί Χώροι<br><br>Εσωτερικοί χώροι   |
| <b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>   | Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή<br>Λεπτομερής περιγραφή:<br>Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση). |
| <b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>  | Δόση εφαρμογής: 100 g - 200 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό.<br>Αραίωση (%): 0,0025<br>Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:<br>100 g - 200 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό.   |

|   |   |
|---|---|
|   | Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 μέτρα. |
| <b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>                    | Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)  |
| <b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b> | Έως 150 g (Γραμμάρια/kg δολώματος ανά συσκευασμένο σάκο 10-20 g σε σακούλκια πάστας)<br>Υλικό συσκευασίας: PE/Aluminium/Polyester.        |

#### 4.5.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον κάθε 5 με 7 μέρες μετά την αρχή της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε βδομάδα ακολούθως έτσι ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει φαγωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί έχουν αντοχή και για την αφαίρεση των σωμάτων των τρωκτικών.  
Αναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

#### 4.5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

#### 4.5.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

#### 4.5.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

#### 4.5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

#### 4.6 Περιγραφή χρήσης

## Χρήση 6 - Χρήση #6 – Κατά των αρουραίων περιμετρικά των κτιρίων από το ευρύ κοινό.

|  |  |
|--|--|
| <b>Τύπος προϊόντος</b>   | PT14 - Τρωκτικοκτόνα   |
| <b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται</b>             | Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα  |
| <b>Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</b> | επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus<br>Κοινή ονομασία: Brown rat<br>στάδιο ανάπτυξης: Juveniles to adults   |
| <b>Πεδίο χρήσης</b>  | Other<br><br>Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων  |
| <b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>   | Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή<br>Λεπτομερής περιγραφή:<br>Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).   |
| <b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>  | Δόση εφαρμογής: 100 g - 200 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό.<br>Αραίωση (%): 0,0025<br>Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:<br>100 g - 200 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό.<br>Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 μέτρα |
| <b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>   | Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)   |
| <b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>                              | Έως 150 g (Γραμμάρια/kg δολώματος ανά συσκευασμένο σάκο 10-20 g σε σακουλάκια πάστας)<br><br>Υλικό συσκευασίας: PE/Aluminium/Polyester   |

### 4.6.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε πλημμύρες.

- Αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα σε ένα σταθμό δολώματος όπου το δόλωμα έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες.

- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισκέπτονται κάθε 5 με 7 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας και στην συνέχεια τουλάχιστον κάθε εβδομάδα , έτσι ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει φαγωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί έχουν αντοχή και για την αφαίρεση των σωμάτων των τρωκτικών.

Αναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

#### 4.6.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για επαγγελματική χρήση: Μην εφαρμόζετε αυτό το προϊόν απευθείας στις υπόγειες τρύπες-αυλάκια.

#### 4.6.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Για επαγγελματική χρήση: Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε επιφανειακά νερά (π.χ. ποτάμια, λίμνες, κανάλια νερού, αναχώματα, σχάρες άρδευσης) ή συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό.

#### 4.6.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

#### 4.6.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

## 5. Γενικές οδηγίες χρήσης

### 5.1. Οδηγίες χρήσης

Επαγγελματική χρήση:

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.

- Διεξάγετε μια επιτόπια έρευνα σχετικά με τη μολυσμένη περιοχή και μια επιτόπια αξιολόγηση προκειμένου να προσδιορίσετε τα είδη τρωκτικών, τους τόπους δραστηριότητάς τους και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και την έκταση της προσβολής.

- Αφαιρέστε τα τρόφιμα τα οποία είναι εύκολα προσβάσιμα για τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Εκτός από αυτό, μην καθαρίσετε την μολυσμένη περιοχή λίγο πριν την εφαρμογή, καθώς αυτό διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσχεραίνει την αποδοχή των δολωμάτων.

- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των παρασίτων (IPM), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικές μεθόδους ελέγχου.

- Εξετάστε την πιθανότητα εφαρμογής μέτρων προληπτικού ελέγχου (απομακρύνετε πιθανά τρόφιμα και ποτά όσο το δυνατόν περισσότερο) για να βελτιώσετε την πρόσληψη του προϊόντος και να μειώσετε την πιθανότητα επανάληψης.

- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γεινίαση με τα μέρη όπου παρατηρήθηκε προηγουμένως δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. μονοπάτια, περιοχές με φωλιές, τροφοδοσίες, τρύπες, ρέματα κ.λπ.).

- Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες δομές.

- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να είναι σαφώς επισημασμένοι ώστε να δείχνουν ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγουν.

- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται πρέπει να επισημαίνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής

με προειδοποιητική σήμανση που να εξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό, καθώς και την ένδειξη των πρώτων βοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.

- Το δόλωμα πρέπει να ασφαρίζεται έτσι ώστε να μην μπορεί να απομακρυνθεί από το σταθμό δολώματος.

- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια ζώα και ζώα εκτροφής και άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο.

- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.

- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.

- Εάν η πρόσληψη δολώματος είναι χαμηλή σε σχέση με το εμφανές μέγεθος της μόλυνσης, σκεφτείτε την μετακίνηση των δολωματικών σταθμών σε άλλες θέσεις καθώς και τη δυνατότητα χρήσης διαφορετικού τρωκτικοκτόνου.

- Εάν μετά από μια περίοδο εφαρμογής 35 ημερών τα δολώματα συνεχίζουν να καταναλώνονται και δεν παρατηρείται μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, πρέπει να διερευνηθεί η πιθανή αιτία.

Όταν έχουν αποκλεισθεί άλλα στοιχεία, είναι πιθανό να υπάρχουν ανθεκτικά τρωκτικά, οπότε θεωρήστε τη χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου.

Επίσης, σκεφτείτε τη χρήση παγίδων ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.

- Αφαιρέστε το υπόλοιπο δόλωμα ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.

Χρήση από το ευρύ κοινό:

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.

- Πριν από τη χρήση προϊόντων τρωκτικοκτόνου, διερευνήστε τη δυνατότητα εφαρμογής μη χημικών μεθόδων ελέγχου (π.χ. παγίδες).

- Αφαιρέστε τα τρόφιμα τα οποία είναι εύκολα προσβάσιμα για τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Εκτός από αυτό, μην καθαρίσετε την μολυσμένη περιοχή λίγο πριν την εφαρμογή, καθώς αυτό διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσχεραίνει την αποδοχή των δολωμάτων.

- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γεινίαση με τα μέρη όπου παρατηρήθηκε προηγουμένως δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. μονοπάτια, περιοχές με φωλιές, τροφοδοσίες, τρύπες, ρέματα κ.λπ.).

- Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες δομές.

- Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια ζώα, και άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο.

- Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκευή ή επιφάνειες που έχουν επαφή με αυτά.



- Μην τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με το νερό.

- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.

- Αφαιρέστε το υπόλοιπο δόλωμα ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.

## **5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Για επαγγελματική χρήση:

- Όπου είναι δυνατόν, πριν από την εφαρμογή, ενημερώστε τους πιθανούς παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της περιοχής εφαρμογής και του περιβάλλοντος χώρου) σχετικά με την εκστρατεία καταπολέμησης τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, αν υπάρχει].

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά σε συχνά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής(π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα). [Εάν χρειάζεται, πραγματοποιείτε συχνότερη ή καθημερινή επιθεώρηση].

- Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 35 ημέρες χωρίς αξιολόγηση της κατάστασης της μόλυνσης και της αποτελεσματικότητάς τους.

- Μη χρησιμοποιείτε δολώματα που περιέχουν αντιπηκτικές δραστικές ουσίες ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των τρωκτικών.

- Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ η ετικέτα ή/και το φύλλο οδηγιών) πρέπει να δείχνουν σαφώς ότι:

το προϊόν δεν πρέπει να πωλείται στο ευρύ κοινό (π.χ. "μόνο για επαγγελματίες").

το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε δολωματικούς σταθμούς με αντοχή σε παραβίαση (π.χ. "χρήση μόνο σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικών σε παραβίαση").

οι χρήστες πρέπει να επισημαίνουν κατάλληλα τους δολωματικούς σταθμούς με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο τμήμα 5.3 του SPC (π.χ. σήμανση δολωματικών σταθμών σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή).

- Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ η ετικέτα ή/και το φύλλο οδηγιών) συνιστούν ξεκάθαρα ότι στην περίπτωση ύπαρξης υποψίας μειωμένης αποτελεσματικότητας ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον προμηθευτή του προϊόντος.

- Μην πλένετε τους δολωματικούς σταθμούς με νερό μεταξύ των εφαρμογών.

- Απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις.

Για χρήση από το ευρύ κοινό:

- Σκεφτείτε τη χρήση προληπτικών μέτρων καταπολέμησης για να βελτιώσετε την πρόληψη του προϊόντος από τα τρωκτικά και να μειώσετε την πιθανότητα επαναπροσβολής.

- Μη χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτοκτόνα ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για την ανίχνευση της δραστηριότητας των τρωκτικών).

- Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ η ετικέτα ή/και το φύλλο οδηγιών) πρέπει να δείχνουν σαφώς ότι:

το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε δολωματικούς σταθμούς με αντοχή σε παραβίαση (π.χ. "χρήση μόνο σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικών σε παραβίαση").

οι χρήστες πρέπει να επισημαίνουν κατάλληλα τους δολωματικούς σταθμούς με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο τμήμα 5.3 του SPC (π.χ. σήμανση δολωματικών σταθμών σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή).

- Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ η ετικέτα ή/και το φύλλο οδηγιών) συνιστούν ξεκάθαρα ότι στην περίπτωση ύπαρξης υποψίας μειωμένης αποτελεσματικότητας ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον προμηθευτή του προϊόντος ή με συνεργείο εκτέλεσης επαγγελματικών εργασιών εφαρμογής βιοκτόνων.

- Αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, τουλάχιστον όσο συχνά ελέγχονται οι δολωματικοί σταθμοί.

- Απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις

### 5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Για επαγγελματική και χρήση από το ευρύ κοινό:

- Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγίες και αιμορραγία ούλων. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα.

- Αντίδοτο: Η βιταμίνη K1 χορηγείται μόνο από ιατρικό / κτηνιατρικό προσωπικό.

- Σε περίπτωση που υπάρξει:

- Δερματική έκθεση, πλύνετε το δέρμα σας με άφθονο νερό και στη συνέχεια με νερό και σαπούνι.

- Έκθεση οφθαλμών, ξεβγάλετε τα μάτια με υγρό καθαρισμού των οφθαλμών ή νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά τουλάχιστον για 10 λεπτά.

- Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε προσεκτικά το στόμα με νερό. Ποτέ μην δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο σε περίπτωση κατάποσης από ένα κατοικίδιο ζώο.

- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις: "Μη μετακινείτε ή ανοίγετε". "περιέχει ένα

Τρωκτικοκτόνο "; "όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης". "δραστική ουσία (-ες)" και "σε περίπτωση συμβάντος, καλέστε κέντρο δηλητηριάσεων (1401).

- Επικίνδυνο για την άγρια φύση.

### 5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Κατά το τέλος της εφαρμογής, απορρίψτε το άχρηστο δόλωμα και τη συσκευασία σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις.

### 5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Φυλάσσετε σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

- Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν επιτρέπεται η πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων ζώων και άλλων ζώων

- Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια

## 6. Άλλες πληροφορίες

- Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα χρειάζονται από 4 έως 10 ημέρες για να είναι αποτελεσματικά μετά την κατανάλωση του δολώματος.
- Τα τρωκτικά μπορούν να είναι φορείς ασθένειας. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή χρησιμοποιείτε εργαλεία όπως λαβίδες όταν τα απορρίπτετε.
- Αυτό το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα και μια βαφή.