

Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт

Наименование(я) на продукта: Executor

Продуктов(и) тип(ове): ПТ 14 - Родентициди

ПТ 14 - Родентициди

ПТ 14 - Родентициди

ПТ 14 - Родентициди

ПТ 14 - Родентициди

ПТ 14 - Родентициди

ПТ 14 - Родентициди

ПТ 14 - Родентициди

ПТ 14 - Родентициди

Номер на разрешението: 2941-2

**Референтен номер на актива
от Регистъра за биоциди
(R4BP 3):** BG-0025201-0000

Съдържание

Административна информация	1
1.1. Търговско наименование на продукта	1
1.2. Притежател на разрешение	1
1.3. Производител(и) на биоцидите	1
1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)	1
2. Състав и формулиране на продукта	2
2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида	2
2.2. Тип на формулирането	2
3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност	2
4. Разрешена(и) употреба(и)	2
5. Общи указания за употреба	20
5.1. Инструкции за употреба	21
5.2. Мерки за намаляване на риска	23
5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда	23
5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка	24
5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение	24
6. Друга информация	24

Административна информация

1.1. Търговско наименование на продукта

EXECUTOR

1.2. Притежател на разрешение

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	Farma Vet LTD
	Адрес	Otets Paisii 40 Saedinenie 66 9700 Shumen България
Номер на разрешението	2941-2	
Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3)	BG-0025201-0000	
Дата на издаване на разрешението	13/11/2020	
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението	23/11/2024	

1.3. Производител(и) на биоцидите

Име на производителя	„Фарма Вет“ ООД
Адрес на производителя	Ул. "Отец Паисий" №40 9700 Шумен България
Местонахождение на производствените обекти	Ул. "Отец Паисий" №40 9700 Шумен България

1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)

Активно вещество	12 - Бромадиолон
Име на производителя	ACTIVA/TEZZA
Адрес на производителя	VIA FELTRE 32 20132 MILAN Италия
Местонахождение на производствените обекти	VIA TRE PONTI 22 37050 S. MARIA DI ZEVIO (VR) Италия

2. Състав и формулиране на продукта

2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Бромадиолон	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Активно вещество	28772-56-7	249-205-9	0,0025

2.2. Тип на формулирането

Готова за употреба примамка под форма на житни зърна

3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Категория на опасност	Може да причини увреждане на органите (blood).
Препоръки за безопасност	<p>Не вдишвайте прах.</p> <p>При неразположение потърсете медицински съвет.</p> <p>Да се изхвърли съдържанието в съответствие с националната уредба..</p>

4. Разрешена(и) употреба(и)

4.1 Описание за използване

Употреба 1 - ДОМАШНИ МИШКИ И / ИЛИ ПЛЪХОВЕ - ОБУЧЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ - НА ЗАКРИТО

Продуктов тип	ПТ 14 - Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Не е от значение за родентициди
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: <i>Mus musculus</i> Общоприето наименование: Домашна мишка Етап на развитие: Juveniles and adults Научно наименование: <i>Rattus norvegicus</i> Общоприето наименование: Сив плъх Етап на развитие: Juveniles and adults Научно наименование: <i>Rattus rattus</i> Общоприето наименование: Черен или таванен плъх Етап на развитие: Juveniles and adults
Област на употреба	На закрито на закрито
Метод(и) на прилагане	Залагане на примамки - Продукти примамки: - Готова за употреба примамка за използване в защитени срещу манипулации поставки за примамка - Покрити и защитени точки за примамка
Дозировка(и) и честота на прилагане	Плъхове : 100 g примамка на една поставка за примамка. - мишки: 40 g примамка на една поставка за примамка. - 0 - <u>Плъхове (<i>Rattus norvegicus</i> & <i>Rattus rattus</i>):</u> 100 g зърна/ защитена точка за примамки раздалечени на 5-10 m. <u>- Домашни мишки (<i>Mus musculus</i>):</u> 40 g зърна/ защитена точка за примамки раздалечени на 1-2 m.
Категория(и) потребители	Индустриална Обучени професионалисти Професионална
Размери и материал на опаковките	Минимална опаковка 5 kg. За насипните продукти, максималната опаковка е от 10 kg. Екзекутор се доставя в торбички и насипно. Торбичките PE/PP (10-20-25-30-40-50-60-90-100 g) са опаковани в: - Кофи-варели от PP/PE (5-30 kg)

- Хартieni чували с или без вътрешен филм от PE/PP (5-30 kg)
 - Чувалята от фолио от PE/PP (5-30 kg)
 - Метални кутии без лак (5-30 kg)
 - Картонени кутии (5-50 kg)
- Насипният продукт се опакова в:
- Кофи-варели от PP/PE (5-10 kg)
 - Хартieni чували с вътрешен филм от PE/PP (5-10 kg)
 - Чувалята от фолио от PE/PP (5-10 kg)
 - Чуваля от PP/PE (50-100-150-200-250-300-350-400-450-500-550-600-650-700-750-800-850-900-950-1000-1050-1100-1150-1200-1250-1300-1350-1400-1450-1500 g), опаковани в картонена кутия (5-10 kg)
 - Метални кутии без лак (5-10 kg)
 - Кутии от картон (с пластмасова защита отвътре) (5-10 kg)

4.1.1 Специфични инструкции за употреба

- Премахнете останалия продукт в края на периода на лечение.
- Следвайте всички допълнителни инструкции, предоставени от съответния код на най-добра практика.

4.1.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

- Където е възможно преди началото на третирането информирайте всички възможни наблюдатели (напр. Потребители на третираната област и околностите) за контролната кампания за гризачи [в съответствие с приложимия код за добра практика, ако има такъв].
- Помислете за превантивни мерки за контрол (например затваряне на отворите, премахване на потенциалните храни и напитки, доколкото е възможно), за да подобрите приема на продукта и да намалите вероятността от повторно нанасяне.- За да се намали рискът от вторично отравяне, търсете и отстранявайте мъртвите гризачи по време на третиране на чести интервали, в съответствие с препоръките, дадени в съответния код за най-добра практика.- Не използвайте продукта в пулсиращо третиране с примамки.- Не използвайте този продукт като постоянни примамки за предотвратяване на заразяване с гризачи или наблюдение на дейностите с гризачи.

4.1.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

- При поставянето на точките за примамки близо до системи за отводняване на водата да се избягва контактът с вода.

4.1.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

-

4.1.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

-

4.2 Описание за използване

Употреба 2 - Домашни мишки и/или плъхове - обучени професионалисти - на открито около сгради

Продуктов тип	ПТ 14 - Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	не е от значение за родентициди
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: <i>Mus musculus</i> Общоприето наименование: Домашна мишка Етап на развитие: Juveniles and adults Научно наименование: <i>Rattus norvegicus</i> Общоприето наименование: Сив плъх Етап на развитие: Juveniles and adults Научно наименование: <i>Rattus rattus</i> Общоприето наименование: Черен или таванен плъх Етап на развитие: Juveniles and adults
Област на употреба	На открито на открито около сгради
Метод(и) на прилагане	Залагане на примамки - Формулации примамки: - Готова за употреба примамка за използване в защитени срещу манипулации поставки за примамка - Покрити и защитени точки за примамка
Дозировка(и) и честота на прилагане	Плъхове: 100g примамка за точка с примамка. - Мишки: 40 g примамка за точка с примамка - 0 - Плъхове (<i>Rattus norvegicus</i> & <i>Rattus rattus</i>): 100 g зърна/ защитена точка за примамки раздалечени на 5-10 m. - Домашни мишки (<i>Mus musculus</i>): 40 g зърна/ защитена точка за примамки раздалечени на 1-2 m.

Категория(и) потребители

Индустриална
Обучени професионалисти
Професионална

Размери и материал на опаковките

Минимална опаковка 5 kg.
За насипните продукти, максималната опаковка е от 10 kg.
Екзекутор се доставя в торбички и насипно.
Торбичките PE/PP (10-20-25-30-40-50-60-90-100 g) са опаковани в:
- Кофи-варели от PP/PE (5-30 kg)
- Хартиени чували с или без вътрешен филм от PE/PP (5-30 kg)
- Чувалчета от фолио от PE/PP (5-30 kg)
- Метални кутии без лак (5-30 kg)
- Картонени кутии (5-50 kg)
Насипният продукт се опакова в:
- Кофи-варели от PP/PE (5-10 kg)
- Хартиени чували с вътрешен филм от PE/PP (5-10 kg)
- Чувалчета от фолио от PE/PP (5-10 kg)
- Чували от PP/PE (50-100-150-200-250-300-350-400-450-500-550-600-650-700-750-800-850-900-950-1000-1050-1100-1150-1200-1250-1300-1350-1400-1450-1500 g), опаковани в картонена кутия (5-10 kg)
- Метални кутии без лак (5-10 kg)
- Кутии от картон (с пластмасова защита отвътре) (5-10 kg)

4.2.1 Специфични инструкции за употреба

- Защитете примамката от атмосферните условия. Поставете точките с примамката в зони, които не подлежат на наводняване.
- Заменете примамката в точките с примамка, в които примамката е била повредена от вода или е замърсена с мръсотия.
- Отстранете останалия продукт в края на периода на третиране.
- За използване на открито точките за примамки трябва да бъдат покрити и поставени на стратегически места, за да се сведе до минимум експозицията на нецелеви видове.
- Следвайте допълнителните указания, предоставени от съответния код за най-добра практика.

4.2.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

- Където е възможно преди началото на третирането информирайте всички възможни наблюдатели (напр. Потребители на третираната област и околностите) за контролната кампания за гризачи [в съответствие с приложимия код за добра практика, ако има такъв].
- Помислете за превантивни мерки за контрол (например затваряне на отворите, премахване на потенциалните храни и напитки, доколкото е възможно), за да подобрите приема на продукта и да намалите вероятността от повторно нанасяне.

- За да се намали рискът от вторично отравяне, търсете и отстранявайте мъртвите гризачи по време на третиране на чести интервали, в съответствие с препоръките, дадени в съответния код за най-добра практика.
- Не използвайте продукта в пулсиращо третиране с примамки.
- Не използвайте този продукт като постоянни примамки за предотвратяване на заразяване с гризачи или наблюдение на дейностите с гризачи.
- Не нанасяйте този продукт директно в дупките на гризачите.

4.2.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

-При поставянето на точките за примамки близо до повърхностните води (напр. реки, езера, водни канали, диги, напоителни канали) или системи за отводняване на водата се избягва контактът с вода.

4.2.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

-

4.2.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

-

4.3 Описание за използване

Употреба 3 - Домашни мишки и/или лъхове - обучени професионалисти - на отворени пространства & сметища за отпадъци на открито

Продуктов тип	ПТ 14 - Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	не е от значение за родентициди
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	<p>Научно наименование: <i>Rattus norvegicus</i> Общоприето наименование: Сив плъх Етап на развитие: Juveniles and adults</p> <p>Научно наименование: <i>Rattus rattus</i> Общоприето наименование: Черен (таванен) плъх Етап на развитие: Juveniles and adults</p> <p>Научно наименование: <i>Mus musculus</i> Общоприето наименование: Домашни мишки Етап на развитие: Juveniles and adults</p>
Област на употреба	<p>На открито</p> <p>Other</p> <p>отворени пространства на открито сметища за отпадъци на открито</p>

Метод(и) на прилагане

Залагане на примамки -
- Готова за употреба примамка за използване в защитени срещу манипулации поставки за примамка
- Покрити и защитени точки за примамка

Дозировка(и) и честота на прилагане

Плъхове: 100 g примамка за точка. - Мишки: 40 g примамка за станция - 0 -

Плъхове (*Rattus norvegicus* & *Rattus rattus*):
100 g зърна/ защитена точка за примамки раздалечени на 5-10 m.
- Домашни мишки (*Mus musculus*):
40 g зърна/ защитена точка за примамки раздалечени на 1-2 m.

Категория(и) потребители

Индустриална
Обучени професионалисти
Професионална

Размери и материал на опаковките

Минимална опаковка 5 kg.
За насипните продукти, максималната опаковка е от 10 kg.
Екзекутор се доставя в торбички и насипно.
Торбичките PE/PP (10-20-25-30-40-50-60-90-100 g) са опаковани в:
- Кофи-варели от PP/PE (5-30 kg)
- Хартиени чували с или без вътрешен филм от PE/PP (5-30 kg)
- Чуvalчета от фолио от PE/PP (5-30 kg)
- Метални кутии без лак (5-30 kg)
- Картонени кутии (5-50 kg)
Насипният продукт се опакова в:
- Кофи-варели от PP/PE (5-10 kg)
- Хартиени чували с вътрешен филм от PE/PP (5-10 kg)
- Чуvalчета от фолио от PE/PP (5-10 kg)
- Чували от PP/PE (50-100-150-200-250-300-350-400-450-500-550-600-650-700-750-800-850-900-950-1000-1050-1100-1150-1200-1250-1300-1350-1400-1450-1500 g), опаковани в картонена кутия (5-10 kg)
- Метални кутии без лак (5-10 kg)
- Кутии от картон (с пластмасова защита отвътре) (5-10 kg)

4.3.1 Специфични инструкции за употреба

- Защитете примамката от атмосферните условия. Поставете станциите за примамка в зони, които не подлежат на наводняване.
- Заменете всяка примамка в станцията, в която примамката е била повредена от вода или замърсена с мръсотия.
- Отстранете останалия продукт в края на периода на третиране
- Следвайте допълнителните указания, предоставени от съответния код за най-добра практика.
- За използване на открито точките за примамки трябва да бъдат покрити и поставени на стратегически места, за да се сведе до минимум експозицията на нецелесъобразни видове.

4.3.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

- Където е възможно преди началото на третирането информирайте всички възможни наблюдатели (напр. Потребители на третираната област и околностите) за контролната кампания за гризачи [в съответствие с приложимия код за добра практика, ако има такъв].
- За да се намали рискът от вторично отравяне, търсете и отстранявайте мъртвите гризачи по време на третирането на чести интервали, в съответствие с препоръките, дадени в съответния код за най-добра практика.
- Не прилагайте този продукт директно в дупките.

4.3.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

- При поставянето на станции за примамка близо до повърхностните води (напр. реки, езера, водни канали, диги, напоителни канали) или системи за отводняване на вода, да се гарантира избягване на контакт с вода.

4.3.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

-

4.3.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

-

4.4 Описание за използване

Употреба 4 - ДОМАШНИ МИШКИ - ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ - НА ЗАКРИТО

Продуктов тип

ПТ 14 - Родентициди

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

не е от значение за родентициди

Научно наименование: Mus musculus
Общоприето наименование: Домашни мишки
Етап на развитие: Juveniles and adults

Област на употреба

На закрито

на закрито

Метод(и) на прилагане

Залагане на примамки -
Готова за употреба примамка за използване в защитени срещу манипулации поставки за примамка

Дозировка(и) и честота на прилагане

40 g примамка на една поставка. Ако е необходима повече от една поставка за примамка, минималното разстояние между поставките за примамка трябва да бъде 1 метър - - -
40 g примамка на една поставка. Ако е необходима повече от една поставка за примамка, минималното разстояние между поставките за примамка трябва да бъде 1 метър.

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Минимална опаковка 5 kg.
За насипните продукти, максималната опаковка е от 10 kg.
Екзекутор се доставя в торбички и насипно.
Торбичките PE/PP (10-20-25-30-40-50-60-90-100 g) са опаковани в:
- Кофи-варели от PP/PE (5-30 kg)
- Хартиени чували с или без вътрешен филм от PE/PP (5-30 kg)
- Чувалчета от фолио от PE/PP (5-30 kg)
- Метални кутии без лак (5-30 kg)
- Картонени кутии (5-50 kg)
Насипният продукт се опакова в:
- Кофи-варели от PP/PE (5-10 kg)
- Хартиени чували с вътрешен филм от PE/PP (5-10 kg)
- Чувалчета от фолио от PE/PP (5-10 kg)
- Чували от PP/PE (50-100-150-200-250-300-350-400-450-500-550-600-650-700-750-800-850-900-950-1000-1050-1100-1150-1200-1250-1300-1350-1400-1450-1500 g), опаковани в картонена кутия (5-10 kg)
- Метални кутии без лак (5-10 kg)
- Кутии от картон (с пластмасова защита отвътре) (5-10 kg)

4.4.1 Специфични инструкции за употреба

- Поставките за примамка трябва да се посещават най-малко веднъж на всеки 2—3 дни в началото на третирането и поне седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали поставките за примамка са невредими и за да се отстранят трупове на гризачите. Примамката се зарежда отново при необходимост.

- Следвайте всички допълнителни инструкции, предоставени от съответния код на най-добрите практики.

4.4.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

4.4.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

- Когато поставяте поставки за примамка близо до отводнителни съоръжения, погрижете се примамката да не се мокри.

4.4.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

4.4.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

4.5 Описание за използване

Употреба 5 - ПЛЪХОВЕ - ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ - НА ЗАКРИТО

Продуктов тип

ПТ 14 - Родентициди

Когато е подходящо, точно описание на разрешената

не е от значение за родентициди

употреба

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Научно наименование: Rattus norvegicus
Общоприето наименование: Сив плъх
Етап на развитие: Juveniles and adults

Научно наименование: Rattus rattus
Общоприето наименование: черен или таванен плъх
Етап на развитие: Juveniles and adults

Област на употреба

На закрито

На закрито

Метод(и) на прилагане

Залагане на примамки -
Готова за употреба примамка за използване в защитени срещу манипулации поставки за примамка

Дозировка(и) и честота на прилагане

100 g примамка на една поставка. Ако е необходима повече от една поставка за примамка, минималното разстояние между поставките за примамка трябва да бъде 5 метра. - - -
100 g примамка на една поставка. Ако е необходима повече от една поставка за примамка, минималното разстояние между поставките за примамка трябва да бъде 5 метра.

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Минимална опаковка 5 kg.
За насипните продукти, максималната опаковка е от 10 kg.
Екзекутор се доставя в торбички и насипно.
Торбичките PE/PP (10-20-25-30-40-50-60-90-100 g) са опаковани в:
- Кофи-варели от PP/PE (5-30 kg)
- Хартиени чували с или без вътрешен филм от PE/PP (5-30 kg)
- Чувалчета от фолио от PE/PP (5-30 kg)
- Метални кутии без лак (5-30 kg)
- Картонени кутии (5-50 kg)
Насипният продукт се опакова в:
- Кофи-варели от PP/PE (5-10 kg)
- Хартиени чували с вътрешен филм от PE/PP (5-10 kg)
- Чувалчета от фолио от PE/PP (5-10 kg)
- Чували от PP/PE (50-100-150-200-250-300-350-400-450-500-550-600-650-700-750-800-850-900-950-1000-1050-1100-1150-1200-1250-1300-1350-1400-1450-1500 g), опаковани в картонена кутия (5-10 kg)
- Метални кутии без лак (5-10 kg)
- Кутии от картон (с пластмасова защита отвътре) (5-10 kg)

4.5.1 Специфични инструкции за употреба

4.5.1 Специфични инструкции за употреба

- Кутиите с примамка трябва да бъдат наблюдавани 5 до 7 дни след началото на приложението, а след това веднъж седмично, за да се провери дали примамката е приета, дали дератизационната кутия е непокътната и да се премахнат телата на гризачите. Ако е необходимо добавете нова примамка в кутията.
- Следвайте всички допълнителни инструкции, предоставени от съответния код на най-добрите практики.

4.5.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

4.5.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

- При поставянето на дератизационните кутии близо до системи за отводняване на водата да се осигури избягването на контакт с вода.

4.5.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

4.5.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

4.6 Описание за използване

Употреба 6 - Мишки и/или плъхове - професионални потребители - на открито около сгради

Продуктов тип	ПТ 14 - Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	не е от значение за родентициди
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: <i>Mus musculus</i> Общоприето наименование: Домашна мишка Етап на развитие: Juveniles and adults Научно наименование: <i>Rattus norvegicus</i> Общоприето наименование: Сив плъх Етап на развитие: Juveniles and adults Научно наименование: <i>Rattus rattus</i> Общоприето наименование: Таванен плъх Етап на развитие: Juveniles and adults

Област на употреба	На открито на открито около сгради
Метод(и) на прилагане	Залагане на примамки - Готова за употреба примамка за използване в защитени срещу манипулации поставки за примамка
Дозировка(и) и честота на прилагане	Плъхове: 100 g примамка за станция / Домашни мишки : 40 g примамка на станция - - - Продукт примамка: <u>Плъхове (Rattus norvegicus & Rattus rattus):</u> 100 g примамка за станция <u>Домашна мишка (Mus musculus):</u> 40 g примамка за станция
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Минимална опаковка 5 kg. За насипните продукти, максималната опаковка е от 10 kg. Екзекутор се доставя в торбички и насипно. Торбичките PE/PP (10-20-25-30-40-50-60-90-100 g) са опаковани в: - Кофи-варели от PP/PE (5-30 kg) - Хартиени чували с или без вътрешен филм от PE/PP (5-30 kg) - Чувалчета от фолио от PE/PP (5-30 kg) - Метални кутии без лак (5-30 kg) - Картонени кутии (5-50 kg) Насипният продукт се опакова в: - Кофи-варели от PP/PE (5-10 kg) - Хартиени чували с вътрешен филм от PE/PP (5-10 kg) - Чувалчета от фолио от PE/PP (5-10 kg) - Чували от PP/PE (50-100-150-200-250-300-350-400-450-500-550-600-650-700-750-800-850-900-950-1000-1050-1100-1150-1200-1250-1300-1350-1400-1450-1500 g), опаковани в картонена кутия (5-10 kg) - Метални кутии без лак (5-10 kg) - Кутии от картон (с пластмасова защита отвътре) (5-10 kg)

4.6.1 Специфични инструкции за употреба

- Защитете примамката от атмосферните условия (напр. дъжд, сняг и др.). Поставете точките с примамката в зони, които не подлежат на наводняване.

- Дератизационните кутии трябва да бъдат наблюдавани [за мишки - най-малко на всеки 2 до 3 дни в] [за плъхове - само 5 до 7 дни след] началото на лечението и най-малко веднъж седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали дератизационните кутии са непокътнати и да се премахват телата на гризачите. Ако е необходимо добавете нова примамка в кутията.

- Заменете примамката в точките с примамка, в които примамката е била повредена от вода или е замърсена с мръсотия.

- Следвайте допълнителните указания, предоставени от съответния код за най-добра практика.

4.6.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Не използвайте този продукт директно в дупките.

4.6.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

- При поставянето на точките за примамки близо до повърхностните води (напр. реки, езера, водни канали, диги, напоителни канали) или системи за отводняване на водата се избягва контактът с вода.

4.6.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

4.6.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

4.7 Описание за използване

Употреба 7 - Домашна мишка – масова употреба – на закрито

Продуктов тип	ПТ 14 - Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	не е от значение за родентициди
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: <i>Mus musculus</i> Общоприето наименование: Домашна мишка Етап на развитие: Juveniles and adults
Област на употреба	На закрито На закрито
Метод(и) на прилагане	Залагане на примамки -

	Готова за употреба родентицидна примамка, за употреба в дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия.
Дозировка(и) и честота на прилагане	<p>40 g примамка за станция с примамка - - - Продукти примамки</p> <p><u>Домашна мишка (Mus musculus):</u></p> <p>40 g примамка на една поставка. Ако е необходима повече от една поставка за примамка, минималното разстояние между поставките за примамка трябва да бъде 1 метър</p>
Категория(и) потребители	Масова употреба (непрофесионален)
Размери и материал на опаковките	<p>Максимална опаковка от 150 g (плъхове и мишки) или 50 g (само мишки) Екзекутор се опакова в торбички PE/PP (10-20-25-30-40-50-60-90-100 g). Торбичките са опаковани в:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кофи от PP/PE (до 150 g) - Картонени кутии (до 150 g) - Фолио от PE/PP (до 150 g) - Метални кутии без лак (до 150 g) - Флакони от PE/PP (до 150 g) - Предварително напълнени кутии за примамки ненарушими от PET/PP/PE/PVC.

4.7.1 Специфични инструкции за употреба

- Поставките за примамка трябва да се посещават най-малко веднъж на всеки 2—3 дни в началото на третирането и поне седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали поставките за примамка са невредими и за да се отстранят трупове на гризачите. Примамката се зарежда отново при необходимост.

4.7.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

-

4.7.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

-

4.7.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

-

4.7.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

-

4.8 Описание за използване

Употреба 8 - Плъхове – масова употреба – на закрито

Продуктов тип	ПТ 14 - Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Не е от значение за родентициди.
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: <i>Rattus norvegicus</i> Общоприето наименование: Сив плъх Етап на развитие: Juveniles and adults Научно наименование: <i>Rattus rattus</i> Общоприето наименование: Черен или таванен плъх Етап на развитие: Juveniles and adults
Област на употреба	На закрито На закрито
Метод(и) на прилагане	Залагане на примамки - Готова за употреба родентицидна примамка, за употреба в дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия.
Дозировка(и) и честота на прилагане	100 g примамка на една поставка за примамка. - - - Продукти примамки: Плъхове (<i>Rattus norvegicus</i> & <i>Rattus rattus</i>): 100 g примамка на една поставка. Ако е необходима повече от една поставка за примамка, минималното разстояние между поставките за примамка трябва да бъде 5 метра.

Категория(и) потребители

Масова употреба (непрофесионален)

Размери и материал на опаковките

Максимална опаковка от 150 g
Екзекутор се опакова в торбички PE/PP (10-20-25-30-40-50-60-90-100 g).
Торбичките са опаковани в:
- Кофи от PP/PE (до 150 g)
- Картонени кутии (до 150 g)
- Фолио от PE/PP (до 150 g)
- Метални кутии без лак (до 150 g)
- Флакони от PE/PP (до 150 g)
- Предварително напълнени кутии за примамки ненарушими от PET/PP/PE/PVC.

4.8.1 Специфични инструкции за употреба

- Поставките за примамка трябва да се посещават най-малко веднъж на всеки 5—7 дни в началото на третирането и поне седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали поставките за примамка са невредими и за да се отстранят трупове на гризачите. Примамката се зарежда отново при необходимост.

4.8.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

-

4.8.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

-

4.8.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

-

4.8.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

-

4.9 Описание за използване

Употреба 9 - Плъхове - масова употреба - на открито около сгради

Продуктов тип	ПТ 14 - Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Не е от значение за родентициди.
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: <i>Rattus norvegicus</i> Общоприето наименование: Кафяв плъх Етап на развитие: Juveniles and adults Научно наименование: <i>Rattus rattus</i> Общоприето наименование: Черен или таванен плъх Етап на развитие: Juveniles and adults
Област на употреба	На открито НА открито Около сгради
Метод(и) на прилагане	Залагане на примамки - Готова за употреба родентицидна примамка, за употреба в дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия.
Дозировка(и) и честота на прилагане	100 g примамка за станция за примамка - - - Продукти примамки: - Плъхове (<i>Rattus norvegicus</i> и <i>Rattus rattus</i>): 100 g примамка за една станция. Ако е необходима повече от една поставка за примамка, минималното разстояние между поставките за примамка трябва да бъде 5 метра.
Категория(и) потребители	Масова употреба (непрофесионален)
Размери и материал на опаковките	Максимална опаковка от 150 g (плъхове и мишки) или 50 g (само мишки) Екзекутор се опакова в торбички PE/PP (10-20-25-30-40-50-60-90-100 g). Торбичките са опаковани в: - Кофи от PP/PE (до 150 g) - Картонени кутии (до 150 g) - Фолио от PE/PP (до 150 g) - Метални кутии без лак (до 150 g) - Флакони от PE/PP (до 150 g)

- Предварително напълнени кутии за примамки ненарушими от PET/PP/PE/PVC.

4.9.1 Специфични инструкции за употреба

- Поставете дератизационните кутии в зони, които не подлежат на наводняване.
- Заменете всяка примамка в дератизационна кутия, в която примамката е била повредена от вода или замърсена с мръсотия.
- Дератизационните кутии трябва да бъдат наблюдавани само 5 до 7 дни след началото на третирането и най-малко веднъж седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали дератизационните кутии са непокътнати и да се премахват телата на гризачите. Ако е необходимо добавете нова примамка в кутията.

4.9.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Не използвайте този продукт директно в дупките.

4.9.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

-

4.9.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

-

4.9.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

-

5. Общи указания за употреба

5.1. Инструкции за употреба

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ И ОБУЧЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

- Прочетете и спазвайте информацията за продукта и данните, придружаващи продукта или предоставени на мястото на продажба, преди да го използвате.
- Извършете проучване на нападателната област преди поставянето на примамката и оценка на място, за да идентифицирате видовете гризачи, техните места на действие и да определите вероятната причина и мащабите на нападението.
- Отстранете леснодостъпната за гризачите храна (напр. разсипано зърно или хранителни отпадъци). Не правете обаче друго почистване на нападателната област непосредствено преди третирането, защото това само ще обезпокои популацията от гризачи и ще затрудни приемането на примамката.
- Продуктът трябва да се използва само като част от система за интегрирана борба с вредители (ИБВ), включваща освен всичко друго мерки за хигиена и — при възможност — физически методи за контрол.
- Поставките за примамка трябва да се поставят в непосредствена близост до местата със забелязани преди това действия на гризачи (напр. пътеки, свърталища, хранилки, дупки, тунели и пр.).
- Където е възможно, поставките за примамка трябва да се закрепват за земята или за други конструкции.
- Поставките за примамка трябва да бъдат ясно надписани, че съдържат отрови за гризачи и че не трябва да се преместват и отварят (вижте раздел 5.3 за информацията, която надписът трябва да съдържа).
- Когато продуктът се използва на обществени места, третираните площи трябва да бъдат обозначени по време на периода на третирането и до примамките трябва да бъде поставена табела с обяснение на риска от първично или вторично отравяне с антикоагуланта и мерките за първа помощ при евентуално отравяне.
- Примамката трябва да бъде закрепена така, че да не може да бъде отнесена от поставката.
- Поставяйте продукта извън досега на деца, птици, домашни любимци, селскостопански и други нецелесъобразни животни.
- Поставяйте продукта далеч от храни, напитки и фураж, както и от съдове, прибори или повърхности в контакт с такива.
- Носете устойчиви на химикали защитни ръкавици по време на боравенето с продукта (материалът на ръкавиците трябва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта)
- Докато използвате продукта, не се хранете, не пийте и не пушете. Измийте ръцете и изложената на пряк контакт кожа, след като използвате продукта.

САМО ЗА ОБУЧЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ - Честотата на посещенията в третираната зона трябва да бъде по преценка на оператора в светлината на изследването, проведено в началото на третирането. Тази честота трябва да съответства на препоръките, предоставени от съответния кодекс за най-добри практики.

- Ако поемането на примамката е сравнително слабо спрямо явните мащаби на нападението, помислете за преместване на поставките за примамката и — евентуално — за преминаване към друга формула на примамката.
- Ако след 35-дневен период на третиране примамките продължават да се изяждат и не се наблюдава спад в действията на гризачите, трябва да се определи вероятната причина за това. След като се изключат другите възможности, най-вероятно става дума за резистентни гризачи, затова преценете възможността за употреба на неантикоагулантна — ако има — или по-силна антикоагулантна отрова за гризачи. Също така преценете възможността за използване на капани като алтернативна мярка за контрол.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ Преценете възможните превантивни мерки (запушване на дупки, възможно най-пълно отстраняване на потенциалните места за хранене и пиене), за да подобрите приемането на продукта и намалите вероятността от повторно нахлуване.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ Премахнете останалата примамка или станциите за примамки в края на периода на третиране.

Указания за употреба, които са "специфични за примамката":

- Примамка в сашета: [За неотварящи се сашета - Не отваряйте сашетата, съдържащи примамката].
- Свободни пелети-гранули, зърна: Поставете примамката в точката за примамка с помощта на устройство за дозиране. Посочете методите за минимизиране на праха (напр. Мокро избърсване).
- Свободни пелети-гранули, зърна: Да се избягва пресипване. В случай, че пресипването не може да бъде избегнато, трябва да се използва PPE на APF 10.

Масова употреба:

- Прочетете и следвайте информацията за продукта, както и всяка информация, придружаваща продукта или предоставена на мястото на продажба, преди да го използвате.
- Преди да се използват родентицидните продукти, следва да се обмислят нехимични методи за контрол (например капани).
- Отстранете храната, която е лесно достижима за гризачите (например разсипани зърна или хранителни отпадъци). Освен това не почиствайте заразената зона точно преди третиране, тъй като това само смущава популацията на гризачите и прави приемането на примамки по-трудно постижимо.
- Станциите за примамка трябва да се поставят в непосредствена близост до местата, където преди това е наблюдавана активността на гризачите (напр. пътеки за преминаване, места за гнездене и складиране на храна, дупки и т.н.).
- Където е възможно, станциите за примамки трябва да бъдат закрепени към земята или други конструкции.
- Поставете продукта далеч от деца, птици, домашни любимци, селскостопански животни и други нецелесъобразни животни.
- Поставете продукта далеч от храна, напитки и фуражи, както и от съдове или повърхности, които са в контакт с тях. - Не поставяйте дератизационните кутии близо до системи за отвеждане на вода, където те могат да попаднат в контактът с водата.
- Когато използвате продукта, не яжте, не пийте и не пушете. Измийте ръцете и директно изложената кожа след употребата на продукта.
- Отстранете останалите примамки или станции в края на периода на третиране.

5.2. Мерки за намаляване на риска

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ И ОБУЧЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

- Когато е възможно, преди третирането уведомете евентуалните минувачи за кампанията за борба с гризачите.
- Информацията за продукта (т.е. етикет и / или брошура) трябва ясно да показва, че продуктът се предоставя само на обучени професионални потребители, притежаващи сертификат, демонстриращ съответствие с приложимите изисквания за обучение (например "само за обучени професионалисти").
- САМО ЗА ОБУЧЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ Да не се използва в райони, където може да се подозира резистентност към активното вещество.
- Продуктите не трябва да се използват повече от 35 дни без оценка на състоянието на заразяването и на ефикасността на третиране, освен ако не са разрешени за продължително третиране с примамки.
- САМО ЗА ОБУЧЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ Не използвайте различни антикоагуланти със сравнима или по-слаба способност за управление на резистентността. За ротационно използване, помислете за използването на не-антикоагулантен родентицид, ако има такъв, или по-мощен антикоагулант.
- Не мийте станциите за примамка или приборите, използвани в закрити и защитени места за примамка, с вода между приложенията.
- Изхвърлете мъртвите гризачи в съответствие с местните изисквания.
- САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ За да намалите риска от вторично отравяне, потърсете и отстранете мъртвите гризачи на чести интервали по време на третирането (например поне два пъти седмично).
- САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ Не използвайте примамки, съдържащи антикоагулантни активни вещества като постоянни примамки за предотвратяване на заразяване с гризачи или наблюдение на дейностите с гризачи.
- САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ . Информацията за продукта (т.е. етикет и / или листовка) ясно показва, че: продуктът не трябва да се предоставя на масовите потребители (напр. "само за професионалисти").
- .продуктът трябва да се използва в защитени срещу манипулации поставки за примамка (напр. "използвайте само в защитени срещу манипулации дератизационни кутии").
- .Потребителите трябва правилно да маркират станциите за примамки с информацията, посочена в раздел 5.3 на КХП (напр. да маркират станции за примамка съгласно препоръките на продукта).
- САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ Използването на този продукт трябва да елиминира гризачите в рамките на 35 дни.
- Информацията за продукта (т.е. етикет и / или листовка) трябва да препоръчва ясно, че в случай на съмнение за липса на ефикасност до края на третирането (т.е. активността на гризачи все още се наблюдава), потребителят трябва да потърси съвет от доставчика на продукта или да се обади на служба за контрол на вредителите

За масова употреба:

- Не започвайте работа, докато не прочетете и не разберете всички предпазни мерки.- Не яжте, не пийте и не пушете, когато използвате този продукт.
- Помислете за превантивни мерки за контрол (запушване на дупки, премахване на потенциални храни и напитки, доколкото е възможно), за да подобрите приема на продукта и да намалите вероятността от повторно заразяване.

- Не използвайте примамки, съдържащи антикоагулантни активни вещества, като постоянни примамки за предотвратяване на заразяване с гризачи или за мониторинг на активността на гризачи.- Информацията за продукта (т.е. етикет и / или листовка) трябва ясно да показва, че: Продуктът трябва да се използва в подходящи устойчиви станции за примамки (например "използвайте само в станции за примамка, които са устойчиви на разрушаване").
- Потребителите трябва правилно да обозначават станциите с примамка с информацията, посочена в раздел 5.3 от Кратката характеристика на продукта (например "етикетиране на станциите с примамка съгласно препоръките на продукта").
- Използването на този продукт трябва да елиминира гризачите в рамките на 35 дни. Информацията за продукта (т.е. етикет и / или листовка) трябва ясно да препоръчва в случай на съмнение за липса на ефикасност в края на третирането (т.е. все още се наблюдава активност на гризачи), потребителят да търси съвет от доставчика на продукта или да се обади на служба за контрол на вредителите.

- Търсете и отстранявайте мъртвите гризачи по време на третирането, поне толкова често, колкото се наблюдават дератизационните кутии.
- Изхвърлете мъртвите гризачи в съответствие с местните изисквания.

5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

- Този продукт съдържа антикоагулантно вещество. При поглъщане симптомите, които могат да бъдат забавени, могат да включват кървене от носа и кървене от венците. В тежки случаи може да има кръвонасядане и наличие на кръв във фекалиите или урината.

- Антидот: Витамин K1 се прилага само от медицински / ветеринарен персонал.

- В случай на:

Излагане на кожата, измийте кожата с вода и след това с вода и сапун.

Излагане на очите, изплакнете очите с течности за изплакване на очите или вода, задръжте клепачите отворени най-малко 10 минути.

Поглъщане, изплакнете внимателно с вода. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Не предизвиквайте повръщане. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ и покажете контейнера или етикета на продукта. Свържете се с ветеринарен хирург в случай на поглъщане от домашен любимец.

Допълнителни инструкции за професионална употреба:

- Станциите за примамка трябва да бъдат етикетирани със следната информация: "не се премествайте или отваряйте"; "Съдържа родентицид"; "Име на продукта или номер на разрешението"; "Активно вещество (а)" и "в случай на инцидент, се обадете на център по токсикология.

- Опасен за дивата природа.

5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

В края на третирането, изхвърлете неизядените примамки и опаковката в съответствие с местните изисквания.

5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

- Да се съхранява на сухо, хладно и добре проветриво място. Съхранявайте контейнера затворен и далеч от пряка слънчева светлина.

- Да се съхранява на места, които не са достъпни за деца, птици, домашни любимци и селскостопански животни.

- Срок на годност: 24 месеца.

6. Друга информация

- Поради своето забавено действие, антикоагулантните отрови за гризачи дават резултат от 4 до 10 дни след поемането на примамката.

- Гризачите могат да пренасят болести. Не докосвайте мъртви гризачи с голи ръце, използвайте ръкавици или инструменти от рода на щипци, когато ги изхвърляте.- Този продукт съдържа вгорчаващ агент и оцветител.