

# Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega proizvoda:** PestStop Active 10 EC

**Vrsta(-e) proizvoda(-ov):** Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

**Številka dovoljenja:** SI-0030872-0000

**Referenčna številka vnosa v R4BP 3:** SI-0030872-0000

## Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	2
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	3
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	18
5.1. Navodila za uporabo	18
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	18
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	18
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	18
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	18
6. Druge informacije	18

## Upravne informacije

### 1.1. Trgovska imena proizvoda

PestStop Active 10 EC
-----------------------

### 1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	Bábolna Bioenvironmental Centre Private Limited Company
	Naslov	Szállás u. 6. H-1107 Budapest Madžarska
Številka dovoljenja	SI-0030872-0000	
Referenčna številka vnosa v R4BP 3	SI-0030872-0000	
Datum dovoljenja	20/03/2023	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	16/02/2033	

### 1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	Activa S.r.l.
Naslov proizvajalca	Via Feltre 32 20132 Milano Italija
Lokacije proizvodnje	(1) c/o ALTHALLER ITALIA s.r.l. Strada Com.le per Campagna, 5 20078 San Colombano al Lambro (MI) Italija
	(2) c/o FERBI SRL Contrada Ripoli 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Italija
	(3) c/o DIACHEM SpA Via Mozzanica, 9/11 24043 Caravaggio (BG) Italija

<b>Ime proizvajalca</b>	Bábolna Bioenvironmental Centre Private Limited Company
<b>Naslov proizvajalca</b>	Szallas utca 6, 1107 Budapest Madžarska
<b>Lokacije proizvodnje</b>	Dr. Köves János út 1-3 2943 Bábolna Madžarska

#### 1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

<b>Aktivna snov</b>	1283 - (RS)- $\alpha$ -ciano-3-fenoksibenzil-(1RS)- cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (cipermetrin)
<b>Ime proizvajalca</b>	Limaru NV (acting for Tagros Chemicals India Ltd)
<b>Naslov proizvajalca</b>	Paalsesteenweg 170 Bus 7 B-3583 Beringen Belgija
<b>Lokacije proizvodnje</b>	Tagros Chemicals India Private Ltd, Plant: A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam, Cuddalore 607 005 Tamil Nadu Indija

## 2. Sestava in formulacija proizvoda

### 2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
(RS)- $\alpha$ -ciano-3-fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (cipermetrin)		Aktivna snov	52315-07-8	257-842-9	10,53
DPM – methoxymethyl-ethoxy propanol	2-methoxymethyl-ethoxy propanol	Neaktivna snov	34590-94-8	252-104-2	54,47

### 2.2. Vrsta formulacije

EC - koncentrat za emulzijo
-----------------------------

### 3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

#### Stavki o nevarnosti

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
Lahko škoduje organom živčni system pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti .

#### Previdnostni stavki

Preprečiti sproščanje v okolje.  
Prestreči razlito tekočino.  
Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi predpisi.  
Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi predpisi.  
Ne vdihavati prahu.  
Ne vdihavati dima.  
Ne vdihavati plina.  
Ne vdihavati meglice.  
Ne vdihavati hlapov.  
Ne vdihavati razpršila.  
Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč.  
Ob slabem počutju poiščite zdravniško oskrbo.

### 4. Dovoljena(e) uporaba

#### 4.1 Opis uporabe

#### Uporaba 1 - Točkovni nanos proti plazečim žuželkam v zaprtih prostorih -Profesionalni uporabnik

#### Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

#### Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Točkovni nanos

#### Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Blattella germanica  
Splošno ime: Nemški ščurek  
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: Blatta orientalis  
Splošno ime: Orientalski ščurki  
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: Lasius niger  
Splošno ime: Vrtna mravlja  
Razvojni stadij: Odrasli osebki

<b>Področje uporabe</b>	Notranjost, znotraj
<b>Način(-i) uporabe</b>	Metoda: Točkovni nanos s škropljenjem Podroben opis: Za obdelavo poroznih površin, uporabiti 10 g koncentriran izdelkom in razredčimo v 1 L vode (1%); temeljito premešajte in nanesite z ustreznim razpršilcem s količino 50 mL raztopina na 1 m <sup>2</sup> Za obdelavo neporozne površine, uporabiti 5 g koncentriran izdelkom in razredčimo v 1 L vode (0.5%); temeljito premešajte in nanesite z ustreznim razpršilcem s količino 40 mL raztopina na 1 m <sup>2</sup> . Preostalo delovanje izdelka je 4 tedne
<b>Odmerki in pogostost uporabe</b>	Odmerek: Na poroznih površinah: odmerek glede na zdravilno učinkovino je 52.7 mg t.g.a.i./m <sup>2</sup> . Neporozne površine: odmerek glede na zdravilno učinkovino je 21 mg t.g.a.i./m <sup>2</sup> . Redčenje (%): Število in časovni raspored uporabe: Zdravljenje se lahko izvaja do 2-krat na leto.
<b>Skupina(-e) uporabnikov</b>	Strokovnjak z licenco  Poklicni
<b>Velikosti in material embalaže</b>	HDPE steklenica z merilnim pokrovčkom: 100, 250, 500, 1000, 2000 ml. HDPE steklenica z merilno komoro (steklenica z dvojnimi vratom): 500, 1000 ml. HDPE Kanister : 5, 10, 20 L.

#### 4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Izdelek je treba uporabljati na omejenih območjih na površinah, ki se ne čistijo redno, na primer za ali pod hladilnikom, pod kuhinjskim koritom, pod pečico ali grelec vode, kjer se žuželke ponavadi skrivajo.

#### 4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ne uporabljajte na območjih, ki so občutljiva za mokro čiščenje.  
Izogibajte se stiku z obdelanimi površinami.  
V fazi ravnanja z izdelkom nosite zaščitne kemijsko odporne rokavice (material rokavic določi imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku).  
Nositi je treba zaščitni kombinezon (vsaj tip X, EN XXXXX).

#### 4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

### 4.2 Opis uporabe

#### Uporaba 2 - Točkovni nanos proti plazečim žuželkam v zaprtih prostorih -Splošna javnost

<b>Vrsta proizvoda</b>	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
<b>Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno</b>	Točkovni nanos
<b>Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)</b>	Znanstveno ime: Blattella germanica Splošno ime: Nemški ščurek Razvojni stadij: Odrasli osebki  Znanstveno ime: Blatta orientalis Splošno ime: Orientalski ščurki Razvojni stadij: Odrasli osebki  Znanstveno ime: Lasius niger Splošno ime: Vrtna mravlja Razvojni stadij: Odrasli osebki
<b>Področje uporabe</b>	Notranjost, znotraj
<b>Način(-i) uporabe</b>	Metoda: Točkovni nanos s škropljenjem Podroben opis: Pri poroznih površinah (npr. beton, opeka, lesena plastika, itd.) (52.7 mg t.g.a.i./m <sup>2</sup> ) • Steklenica z merilnim okencem: odmerite 1 mL izdelka in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m <sup>2</sup> • Pakiranje za enkratno uporabo 1 mL: odprite tesnilo in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m <sup>2</sup> • Sistem je pripravljen za redčenje: Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m <sup>2</sup> • Kartušni sistem: Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m <sup>2</sup>  Pri neporoznih površin (npr. plastika, kovina, keramika, itd.) (21 mg t.g.a.i./ m <sup>2</sup> ):

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steklenica z merilnim okencem: odmerite 0.5 mL izdelka in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 32 pršenj na m<sup>2</sup>.</li> <li>• Pakiranje za enkratno uporabo 1 mL: odprite tesnilo in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 16 pršenj na m<sup>2</sup>.</li> <li>• Sistem je pripravljen za redčenje: Dobro pretresite in opraviti 16 pršenj na m<sup>2</sup>.</li> <li>• Kartušni sistem: Dobro pretresite in opraviti 16 pršenj na m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Preostalo delovanje izdelka je 4 tedne</p>
<b>Odmerki in pogostost uporabe</b>	<p>Odmerek: Pri poroznih površih 52.7 mg t.g.a.i./m<sup>2</sup>. Pri neporoznih površih 21 mg t.g.a.i./m<sup>2</sup>.</p> <p>Redčenje (%): Število in časovni raspored uporabe: Zdravljenje se lahko izvaja do 2-krat na leto.</p>
<b>Skupina(-e) uporabnikov</b>	Splošna javnost (nepoklicna)
<b>Velikosti in material embalaže</b>	<p>Steklenica z merilnim okencem (20 mL) Pakiranje za enkratno uporabo: 1 mL Sistem je pripravljen za redčenje: 5 mL Kartušni sistem: 5 mL</p>

#### 4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Izdelek je treba uporabljati na omejenih območjih na površinah, ki se ne redno čistijo, na primer zadaj ali pod hladilnik, pod kuhinjskih korit, pod pečico ali grelnik vode, kjer se žuželke ponavadi skrivajo.

Pri sistem je pripravljen za redčenje, odstranite ovratnik, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljen z ustreznim sprožilcem.

Pri kartušni sistem, v steklenico dodajte 500 ml vode iz pipe, namestite kartušo v vrat steklenice, namestite sprožilec, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljen z ustreznim sprožilcem.

Pri steklenica z merilnim okencem in pakiranje za enkratno uporabo, uporabo se opravi s sprožilni razpršilec z odmerkom 1,25 ml/razpršilo. Ustrezna količina izdelka se doda potrebna količina vode in premeša

Za neprofesionalne uporabnike se predlaga vključitev naslednje omejitve: "Smrt ščurkov je predvidena 4 ure po izpostavljenosti insektom na obdelanih površinah".

#### 4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ne uporabljajte na območjih, ki so občutljiva za mokro čiščenje.  
Izogibajte se stiku z obdelanimi površinami

#### 4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja



Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

### 4.3 Opis uporabe

#### Uporaba 3 - Točkovni nanos v razpoke in špranje proti plazečim žuželkam -Profesionalni uporabnik

<b>Vrsta proizvoda</b>	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
<b>Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno</b>	Uporaba v razpokah in špranjah
<b>Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)</b>	Znanstveno ime: Blattella germanica Splošno ime: Nemški ščurek Razvojni stadij: Odrasli osebki  Znanstveno ime: Blatta orientalis Splošno ime: Orientalski ščurki Razvojni stadij: Odrasli osebki  Znanstveno ime: Lasius niger Splošno ime: Vrtna mravlja Razvojni stadij: Odrasli osebki
<b>Področje uporabe</b>	Notranjost, znotraj
<b>Način(-i) uporabe</b>	Metoda: Obdelava razpoke in špranje s škropljenjem Podroben opis: Pri poroznih površinah (npr. beton, opeka, lesena plastika, itd.) (52.7 mg t.g.a.i./m <sup>2</sup> ): uporabiti 10 g koncentriran izdelkom in razredčimo v 1 L vode (1%); temeljito premešajte in nanesite z ustreznim razpršilcem s količino 50 mL raztopina na 1 m <sup>2</sup> . Pri neporozne površinah (npr. plastika, kovina, keramika, itd.) (21 mg t.g.a.i./ m <sup>2</sup> ): uporabiti 5 g koncentriran izdelkom in razredčimo v 1 L vode (0.5%); temeljito premešajte in nanesite z ustreznim razpršilcem s količino 40 mL raztopina na 1 m <sup>2</sup> .  Preostalo delovanje izdelka je 4 tedne

<b>Odmerki in pogostost uporabe</b>	<p>Odmerek: Pri poroznih površinah 52.7 mg t.g.a.i./m<sup>2</sup>. Pri neporoznih površinah 21 mg t.g.a.i./ m<sup>2</sup>.</p> <p>Redčenje (%):</p> <p>Število in časovni razpored uporabe:</p> <p>Zdravljenje se lahko izvaja do 2-krat na leto.</p>
<b>Skupina(-e) uporabnikov</b>	<p>Strokovnjak z licenco</p> <p>Poklicni</p>
<b>Velikosti in material embalaže</b>	<p>HDPE steklenica z merilnim pokrovčkom: 100, 250, 500, 1000, 2000 mL.</p> <p>HDPE steklenica z merilno komoro (steklenica z dvojnim vratom): 500, 1000 mL.</p> <p>HDPE Kanister : 5, 10, 20 L.</p>

#### 4.3.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Nanesite na površine, razpoke in špranje, kot so: keramične ploščice, marmor, granit in druge površine v trd kamen, kovine (jeklo, železo itd.), plastika, steklo (npr. okenska stekla), pobarvane vezane plošče. Izdelkom nanesite neposredno v razpoke in špranje z razdalje 40 cm.

Izdelek je treba uporabljati na omejenih območjih na površinah, ki se ne redno čistijo, na primer zadaj ali pod hladilnik, pod kuhinjskih korit, pod pečico ali grelnik vode, v vseh razpoke in špranje, ki so lahko zatočišče za ščurke in mravelj.

#### 4.3.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ne uporabljajte na območjih, ki so občutljiva za mokro čiščenje.

Izogibajte se stiku z obdelanimi površinami.

V fazi ravnanja z izdelkom nosite zaščitne kemijsko odporne rokavice (material rokavic določi imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku).

Nositi je treba zaščitni kombinezon (vsaj tip X, EN XXXXX).

#### 4.3.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.3.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.3.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.4 Opis uporabe

##### Uporaba 4 - Točkovni nanos v razpoke in špranje proti plazečim žuželkam -Splošna javnost

###### Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

###### Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Obdelava razpok in špranj s škropljenjem

###### Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: *Blattella germanica*  
Splošno ime: Nemški ščurek  
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: *Blatta orientalis*  
Splošno ime: Orientalski ščurki  
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: *Lasius niger*  
Splošno ime: Vrtna mravlja  
Razvojni stadij: Odrasli osebki

###### Področje uporabe

Notranjost, znotraj

###### Način(-i) uporabe

Metoda: Obdelava razpoke in špranje s škropljenjem

Podroben opis:

- Pri poroznih površinah (npr. beton, opeka, lesena plastika, itd.) (52.7 mg t.g.a.i./m<sup>2</sup>)
- Steklenica z merilnim okencem: odmerite 1 mL izdelka in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m<sup>2</sup>
  - Pakiranje za enkratno uporabo 1 mL: odprite tesnilo in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m<sup>2</sup>
  - Sistem je pripravljen za redčenje: Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m<sup>2</sup>
  - Kartušni sistem: Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m<sup>2</sup>

Pri neporoznih površinah (npr. plastika, kovina, keramika, itd.) (21 mg t.g.a.i./ m<sup>2</sup>):

- Steklenica z merilnim okencem: odmerite 0.5 mL izdelka in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 32 pršenj na m<sup>2</sup>.
- Pakiranje za enkratno uporabo 1 mL: odprite tesnilo in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 16 pršenj na m<sup>2</sup>.
- Sistem je pripravljen za redčenje: Dobro pretresite in opraviti 16 pršenj na m<sup>2</sup>.
- Kartušni sistem: Dobro pretresite in opraviti 16 pršenj na m<sup>2</sup>.

Preostalo delovanje izdelka je 4 tedne

###### Odmerki in pogostost uporabe

Odmerki: Pri poroznih površinah 52.7 mg t.g.a.i./m<sup>2</sup>. Pri non poroznih površinah 21 mg t.g.a.i./m<sup>2</sup>.

Redčenje (%):

	Število in časovni raspored uporabe: Zdravljenje se lahko izvaja do 2-krat na leto.
<b>Skupina(-e) uporabnikov</b>	Splošna javnost (nepoklicna)
<b>Velikosti in material embalaže</b>	Steklenica z merilnim okencem (20 mL) Pakiranje za enkratno uporabo: 1 mL Sistem je pripravljen za redčenje: 5 mL Kartušni sistem: 5 mL

#### 4.4.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Nanesite v domačih prostorih, razpoke in špranje, kot so: keramične ploščice, marmor, granit in druge površine v trd kamen, kovine (jeklo, železo itd.), plastika, steklo (npr. okenska stekla), pobarvane vezane plošče. Izdelkom nanesite neposredno v razpoke in špranje z razdalje 40 cm.

Izdelek je treba uporabljati na omejenih območjih na površinah, ki se ne redno čistijo, na primer zadaj ali pod hladilnik, pod kuhinjskih korit, pod pečico ali grelnik vode, v vseh razpoke in špranje, ki so lahko zatočišče za ščurke in mravelj.

Za neprofesionalne uporabnike se predlaga vključitev naslednje omejitve: "Ubijanje ščurkov je predviden 4 ure po izpostavljenosti insektom na obdelane površine".

Pri sistem je pripravljen za redčenje, odstranite ovratnik, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljen z ustreznim sprožilcem.

Pri kartušni sistem, v steklenico dodajte 500 ml vode iz pipe, namestite kartušo v vrat steklenice, namestite sprožilec, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljen z ustreznim sprožilcem

Pri steklenica z merilnim okencem in pakiranje za enkratno uporabo, uporabo se opravi s sprožilni razpršilec z odmerkom 1,25 ml/razpršilo. Ustrezna količina izdelka se doda potrebna količina vode in premeša

#### 4.4.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ne uporabljajte na območjih, ki so občutljiva za mokro čiščenje.  
Izogibajte se stiku z obdelanimi površinami.

#### 4.4.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.4.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.4.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

### 4.5 Opis uporabe

#### Uporaba 5 - Površinske obdelave okoli stavbe proti tigrastim komarjem -Profesionalni uporabnik

##### Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

##### Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Izdelek se uporablja na prostem okoli stavb na podeželju za zatiranje tigrastih komarjev.

##### Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Aedes albopictus  
Splošno ime: tigrasti komar  
Razvojni stadij: Odrasli osebki

##### Področje uporabe

Zunanost, zunaj

Na prostem na podeželju

##### Način(-i) uporabe

Metoda: Razprševanje, površinske obdelave

Podroben opis:

Za tretiranje okoli stavbe do višine približno 50 cm do vključno 150 cm, skupina za zdravljenje visok približno en meter.

Uporabiti 2 g koncentriranega izdelka in razredčiti v 1 L vode (0.2%); temeljito premešajte in nanesite z ustreznim razpršilcem s količino 50 mL raztopine na 1 m<sup>2</sup>.

Preostalo delovanje proizvoda traja 3 dni.

##### Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: Odmerek glede na zdravilno učinkovino je 10.5 mg t.g.a.i. /m<sup>2</sup>.

Redčenje (%):

Število in časovni raspored uporabe:

Zdravljenje se lahko izvaja do 2-krat na leto.

**Skupina(-e) uporabnikov**

Strokovnjak z licenco

Poklicni

**Velikosti in material embalaže**

HDPE steklenica z merilnim pokrovčkom: 100, 250, 500, 1000, 2000 mL.

HDPE steklenica z merilno komoro (steklenica z dvojnimi vratom): 500, 1000 mL.

HDPE Kanister: 5, 10, 20 L.

**4.5.1 Uporba - posebna navodila za uporabo**

Izdelek razredčite z vodo do 0,2 % w/v, temeljito premešajte in s pomočjo razpršilca v nahrbtniku ali ustrezne naprave nanesite 50 mL insekticidne raztopine na m<sup>2</sup>.  
Izdelek je treba enakomerno nanesti na izbrano površino z razdalje 50 cm. Izdelek deluje proti tigrastim komarjem s stikom in hlapi.

**4.5.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Izdelka ne uporabljajte na območjih, ki so priključene na kanalizacijo, drenažna voda, jaški ali blizu njih  
Ne uporabljajte v deževnem ali vetrovnem vremenu. Preprečiti izpostavljenost neciljnih organizmov (npr. razmislite o uporabi čez noč, ko oprashaalci, vključno s čebelami, niso aktivni, ne tretirajte rastlin v obdobju cvetenja).  
V fazi ravnanja z izdelkom nosite zaščitne kemijsko odporne rokavice (material rokavic določi imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku).  
Nositi je treba zaščitni kombinezon (vsaj tip X, EN XXXXX).

**4.5.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

**4.5.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

**4.5.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja**

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

## 4.6 Opis uporabe

### Uporaba 6 - Površinske obdelave okoli stavbe proti tigrastim komarjem -Splošna javnost

<b>Vrsta proizvoda</b>	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
<b>Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno</b>	Izdelek se uporablja na prostem okoli stavb na podeželju za zatiranje tigrastih komarjev.
<b>Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)</b>	Znanstveno ime: <i>Aedes albopictus</i> Splošno ime: tigrasti komar Razvojni stadij: Odrasli osebki
<b>Področje uporabe</b>	Zunanost, zunaj  Na prostem na podeželju.
<b>Način(-i) uporabe</b>	Metoda: Razprševanje, površinske obdelave Podroben opis: Za tretiranje okoli stavbe do višine približno 50 cm do vključno 150 cm, območje za zdravljenje visokopribližno en meter. • Steklenica z merilnim okencem: odmerite 2 mL izdelka in prelijte s 1 L vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m <sup>2</sup> • Pakiranje za enkratno uporabo 2 mL: odprite tesnilo in prelijte s 1 L vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m <sup>2</sup> • Sistem je pripravljen za redčenje: Dobro pretresite in opraviti 8 pršenj na m <sup>2</sup> • Kartušni sistem: Dobro pretresite in opraviti 8 pršenj na m <sup>2</sup>  Preostalo delovanje proizvoda traja 3 dni.
<b>Odmerki in pogostost uporabe</b>	Odmerek: Odmerek glede na zdravilno učinkovino je 10.5 mg t.g.a.i./m <sup>2</sup> Redčenje (%): Število in časovni raspored uporabe: Zdravljenje se lahko izvaja do 2-krat na leto.
<b>Skupina(-e) uporabnikov</b>	Splošna javnost (nepoklicna)
<b>Velikosti in material embalaže</b>	Steklenica z merilnim okencem: 20 mL Pakiranje za enkratno uporabo: 2 mL Sistem je pripravljen za redčenje: 5 mL Kartušni sistem: 5 mL

#### 4.6.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Izdelek je treba enakomerno nanesti na izbrani površini z razdalje 50 cm. Izdelek deluje proti tigrastim komarjem s stikom in hlapi. Pri sistem je pripravljen za redčenje, odstranite ovrtnik, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljeno z ustreznim sprožilcem.

Pri kartušni sistem, v steklenico dodajte 500 ml vode iz pipe, namestite kartušo v vrat steklenice, namestite sprožilec, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljeno z ustreznim sprožilcem.

Pri steklenica z merilnim okencem in pakiranje za enkratno uporabo, uporabo se opravi s sprožilnim razpršilcem z odmerkom 1,25 ml/razpršilo. Ustrezni količini izdelka se doda potrebna količina vode in premeša.

#### 4.6.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Izdelka ne uporabljajte na območjih, ki so priključena na kanalizacijo, drenažna voda, jaški ali blizu njih.

Ne uporabljajte v deževnem ali vetrovnem vremenu. Preprečiti izpostavljenost neciljnih organizmov (npr. razmislite o uporabi čez noč, ko oprashačevalci, vključno s čebelami, niso aktivni, ne tretirajte rastlin v obdobju cvetenja).

#### 4.6.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.6.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.6.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

### 4.7 Opis uporabe

#### Uporaba 7 - Izkoreninjenje mravljišča -Profesionalni uporabnik

##### Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

##### Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Izdelek se uporablja na prostem s škropljenjem za izkoreninjenje mravljišča.

##### Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Lasius niger  
Splošno ime: Vrtna mravlja  
Razvojni stadij: Odrasli osebki

##### Področje uporabe



	Zunanost, zunaj
<b>Način(-i) uporabe</b>	<p>Metoda: Uporabiti okoli gnezdo in na vhodu v gnezdo s škropljenjem. Z enim samim nanosom za uničenje gnezdo</p> <p>Podroben opis:          Koncentriran izdelek je treba razredčiti z vodo do 0.5% v/v pred uporabo.          Količina insekticidne raztopine (razredčene), ki jo je treba nanesti na vsako gnezdo je 25 g/gnezdo.</p>
<b>Odmerki in pogostost uporabe</b>	<p>Odmerek: Odmerek glede na zdravilno učinkovino je 13.2 mg t.g.a.i./ gnezdo</p> <p>Redčenje (%):          Število in časovni raspored uporabe:          Brez omejitev.</p>
<b>Skupina(-e) uporabnikov</b>	<p>Strokovnjak z licenco</p> <p>Poklicni</p>
<b>Velikosti in material embalaže</b>	<p>HDPE steklenica z merilnim pokrovčkom: 100, 250, 500, 1000, 2000 mL.</p> <p>HDPE steklenica z merilno komoro (steklenica z dvojnim vratom): 500, 1000 mL.</p> <p>HDPE Kanister: 5, 10, 20 L.</p>

#### 4.7.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Izdelek razredčite z vodo v priporočeni količini, temeljito premešajte in nanašajte s posebnim nebulatorjem za razpršitev raztopine. Izdelek je treba uporabiti v količini 25 mL insekticidne raztopine na gnezdo, z nanosom okoli gnezda in na vhodu v gnezdo. Za optimalno učinkovitost tretiranja ne uporabljajte v primeru vetra ali dežja.

#### 4.7.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Obdelava enega samega gnezdo za nanosom.

V fazi ravnanja z izdelkom nosite zaščitne kemijsko odporne rokavice (material rokavic določi imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku).

Nositi je treba zaščitni kombinezon (vsaj tip X, EN XXXXX).

#### 4.7.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.7.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.7.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

### 4.8 Opis uporabe

#### Uporaba 8 - Izkoreninjenje mravljišča -Splošna javnost

##### Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

##### Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Izdelek se uporablja na prostem s škropljenjem za izkoreninjenje mravljišča.

##### Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Lasius niger  
Splošno ime: Vrtna mravlja  
Razvojni stadij: Odrasli osebki

##### Področje uporabe

Zunanost, zunaj

##### Način(-i) uporabe

Metoda: Uporabiti okrog gnezdo in na vhodu v gnezdo, s škropljenjem. Z enim samim nanosom za uničenje gnezdo.  
Podroben opis:  
• Pakiranje za enkratno uporabo 1 mL: odprite tesnilo in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 10 pršenj na gnezdo  
• Sistem je pripravljen za redčenje: Dobro pretresite in opraviti 10 pršenj na gnezdo  
• Kartušni sistem: Dobro pretresite in opraviti 10 pršenj na gnezdo.

##### Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: Odmerek glede na zdravilno učinkovino je 13.2 mg t.g.a.i./ gnezdo  
Redčenje (%):  
Število in časovni raspored uporabe:  
Brez omejitev.

**Skupina(-e) uporabnikov**

Splošna javnost (nepoklicna)

**Velikosti in material embalaže**Pakiranje za enkratno uporabo: 1 mL  
Sistem je pripravljen za redčenje: 5 mL  
Kartušni sistem: 5 mL**4.8.1 Uporba - posebna navodila za uporabo**

Pri sistem je pripravljen za redčenje, odstranite ovratnik, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljeno z ustreznim sprožilcem.

Pri kartušni sistem, v steklenico dodajte 500 ml vode iz pipe, namestite kartušo v vrat steklenice, namestite sprožilec, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljeno z ustreznim sprožilcem.

Pri pakiranje za enkratno uporabo, uporabo se opravi s sprožilnim razpršilcem z odmerkom 1,25 ml/razpršilo. Ustrezna količina izdelka se doda potrebna količina vode in premeša.

Izdelek je treba uporabiti v priporočeni količini, okoli gnezda in na vhodu v gnezdo. Za optimalno učinkovitost tretiranja ne uporabljajte v primeru vetra ali dežja.

**4.8.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Obdelava enega samega gnezdo za nanosom.

**4.8.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

**4.8.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

**4.8.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja**

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

## 5. Splošna navodila za uporabo

### 5.1. Navodila za uporabo

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa priložena navodila.

### 5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Izdelek je treba uporabljati tako, da otroci, rejne živali in hišnih ljubljencev, zlasti mačke, ne pridejo v stik z izdelkom. Mačke držite stran od obdelane površine. Zaradi posebne občutljivosti do piretroidi, izdelek lahko povzroči pri mačkah hude neželene reakcije.

Pred uporabo odstranite ali pokrijte terarije, akvarije in živalske kletke. Med pršenjem izklopite zračni filter v akvariju

Hranite zunaj dosega otrok in hišnih ljubljencev.

Nezainteresirane osebe, otrok in hišnih ljubljencev držite stran od obdelane površine/območja, dokler se površine ne posušijo.

Ne pršite na ljudi ali hišne ljubljence.

Za uporabo v zaprtih prostorih za zatiranje tigrastih komarjev:

- N-122 Pokrijte vse površine in prostore, ki bodo verjetno prišli v stik z živili, krmo in pitno vodo.

- N-127 Ne nanašajte neposredno na živila, krmo ali pijačo ter ga ne uporabljajte na površinah ali orodjih, ki bi lahko prišla v stik z živili, krmo, pijačo in živino/hišnih ljubljencev.

- N-132 Ne nanašajte neposredno na površine ali prostore, na katerem je shranjena, pripravljena ali zaužita hrana ali krma.

- N-301 Ne shranjujte v bližini hrane, pijače in živalske krme.

Glej zgoraj podrobno opisane ukrepe za zmanjševanje tveganja.

### 5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Piretroidi in piretrini lahko povzročijo parestezijo (pekoč občutek in zbadanje kože brez draženja). Če simptomi ne izginejo, poiščite zdravniško pomoč

- PRI VDIHAVANJU: Če se pojavijo simptomi, takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

- PRI ZAUŽITJU: Če se pojavijo simptomi, takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

- PRI STIKU S KOŽO: Če se pojavijo simptomi, takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

- PRI STIKU Z OČMI: Če se pojavijo simptomi, sperite z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

- Ne izpuščajte izdelka ali prazne posode v okolje.

### 5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi predpisi o ravnanju z odpadki.

Ne izprazniti v kanalizacijo. Ne uporabljajte prazne embalaže.

### 5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hranite zunaj dosega otrok. Shranjujte ločeno od hrane, pijače ali živilo.

Rok uporabe: 2 leti, v originalni embalaži pri sobni temperaturi. Izogibajte se ekstremne temperature in izpostavljenosti neposredni sončni. Zaščititi pred zmrzaljo.

## 6. Druge informacije

Vsebuje cipermetrin; lahko povzroči parestezijo.

